

Станция
Диагностика и лечение распространенных заболеваний у детей (педиатрия, неонатология, детские инфекционные заболевания)

2. Профессиональный стандарт

Интегрированное ведение болезней детского возраста (ИББДВ).

3. Проверяемые компетенции.

Выявление и оценка общих признаков опасности.

Сделать выводы в соответствии с алгоритмом светофора.

Определение тактики ведения пациента.

Алгоритм выполнения:

УІ. Диагностика и лечение местной бактериальной инфекции пупочной ранки

- Оцените общие признаки опасности (отказ от еды, летаргичен, рвота, судороги).
- Сделайте вывод относительно состояния ребенка по алгоритму «светофора».
- Оцените кожу и состояние пупочной ранки: (гиперемия пупочной ранки, гнойные выделения с пупочной ранки, пустулы на коже).
- Назначте Амоксициллин перорально в суспензии 125 мг /5мл 2 раза в сутки, на протяжении 5 дней 2,5 мл.
- Научите мать лечить местную инфекцию на дому: вымойте руки, аккуратно промойте пупочную ранку, просушите, нанесите на пупочную ранку спиртовой раствор метиленового синего, вымойте руки.
- Оцените, как мать самостоятельно дает препараты ребенку.
- Проинформировать мать о состояниях, которые требуют немедленного обращения к врачу.
- Повторный осмотр через 2 дня.
- Если есть улучшения, порекомендуйте матери продолжать принимать назначенное лечение в течение 5 дней.
- Если покраснение пупочной ранки сохраняется или появились гнойные выделения или состояние ребёнка ухудшилось направьте ребёнка в стационар.