

Станция
Диагностика и лечение распространенных заболеваний у детей (педиатрия, неонатология, детские инфекционные заболевания)

2. Профессиональный стандарт

Интегрированное ведение болезней детского возраста (ИББДВ).

3. Проверяемые компетенции.

Выявление и оценка общих признаков опасности.

Сделать выводы в соответствии с алгоритмом светофора.

Определение тактики ведения пациента.

УП. Диагностика и лечение местной бактериальной инфекции (уха).

1. Алгоритм действий врача первичного звена (ИББДВ)

Проверьте, есть ли признаки опасности или любые другие симптомы:

- Боль в ухе.
 - Гнойные выделения из уха.
 - Болезненная припухлость за ухом
1. Сделайте вывод относительно состояния пациента по алгоритму «светофора»
 2. Назначте Парацетамол перорально в сиропе 120 мг /5мл 4 раза в сутки, на протяжении 10 дней
 3. Назначте Амоксициллин перорально в суспензии 125 мг /5мл 2 раза в сутки, на протяжении 5 дней.
 4. Научите мать лечить инфекцию уха на дому: Вымойте руки. Сверните из ваты турунду. Введите турунду в ухо. Заберите турунду, когда она станет влажной. Заменяйте турунду пока она не станет сухой. Закапайте в ухо ушные капли 3 раза в сутки.
 5. Оцените, как мать самостоятельно дает препараты ребенку
 6. Проинформировать мать о состояниях, которые требуют немедленного обращения к врачу.
 7. Направить на консультацию к отоларингологу.
 8. Повторный осмотр через 2 дня.
 9. Если есть улучшения, порекомендуйте матери: Продолжать принимать назначенное лечение 10 дней.
 10. Если состояние ребёнка ухудшилось, появилась болезненная припухлость за ухом Направить ребёнка в стационар