

Практичні навички ОСКІ
Діагностика та лікування розповсюджених захворювань у дітей
(педіатрія, неонатологія, дитячі інфекційні захворювання)

Алгоритм виконання:

УІ. Діагностика та лікування місцевої бактеріальної інфекції (пупкової ранки)

Перевірте, чи є ознаки небезпеки та інші симптоми:

- Почервоніння пупкової ранки.
- Гнійні виділення з пупкової ранки.
- Пустули на шкірі
- Зробіть висновок стану дитини за правилом «світлофора»
- Оцінити наявність ознак небезпеки (відмова від їжі, летаргічна, блювота, судоми).
- Оцінка шкіри та пупкової ранки (почервоніння, гнійні виділення з пупкової ранки, пустули на шкірі)
- Призначте амоксицилін перорально суспензія 125 мг/5 мл 2 рази на добу протягом 5 днів 2,5 мл.
- Навчіть матір лікувати місцеву інфекцію вдома: вимийте руки, обережно промийте пупкову ранку кип'яченою водою, просушіть, нанесіть на пупкову ранку спиртовий розчин метиленового синього, вимийте руки.
- Поспостерігайте за тим, як матір в перший раз проводить лікування немовляти
- Проінформуйте матір про стани, що потребують негайного повторного звернення
- Повторний огляд через 2 дні
- Якщо є покращення, порекомендуйте матері
- Продовжувати призначене лікування 5 днів
- Якщо почервоніння пупкової ранки зберігаються або з'явилися гнійні виділення або стан погіршився направте немовля до стаціонару