

**Практичні навички ОСКІ**  
**Діагностика та лікування розповсюджених захворювань у дітей**  
**(педіатрія, неонатологія, дитячі інфекційні захворювання)**

**Алгоритм виконання:**

**УШ. Діагностика та лікування станів, що супроводжуються проблемами в горлі**  
**(гострий тонзилофарингіт, ймовірно бактеріальний)**

**Перевірити, чи є ознаки небезпеки або будь-які інші симптоми за сценарієм завдання:**

1. Запитати мати: Чи може дитина пити і їсти?
2. Чи є у дитини блювота після кожного прийому їжі або пиття?
3. Чи були у дитини судоми протягом даного захворювання?
4. Подивитися: чи не летаргічна дитина, в свідомості чи вона?
5. Чи є у дитини судоми в даний момент?

**Далі:**

1. Запитати, чи є у дитини біль у горлі?
2. Запитати чи може дитина пити, ковтати?
3. Запитати чи є у дитини кашель, нежить?
4. Запитати чи є у дитини підвищення температури тіла 37,5 С0 і вище?
6. Подивитися, чи є наліт в горлі?
7. Подивитися чи є болючість передніх шийних лімфатичних вузлів?

**Загальні ознаки небезпеки і дії:**

1. Наліт в горлі.
2. Лихоманка.
3. Відсутність кашлю і нежиті.
4. Збільшення передньошийних лімфовузлів.
5. Мазок на дифтерію з глотки і носа.
6. При підозрі на дифтерію - термінова госпіталізація.
7. Дати амоксицилін перорально 250 мг 3 рази на добу протягом 10 днів.
8. Парацетамол 250 мг перорально.
9. Поінформувати мати про станах, що вимагають негайного огляду лікаря.
10. Повторний огляд через 2 дні.