

Станція № 2 Хірургічна стоматологія, практичний навик «торусальна анестезія»

сценарій №2

Ви хірург-стоматолог, перебуваєте на робочому місці. До Вас звернулась пацієнтка 22 років, з метою санації порожнини рота.

Об'єктивно: Конфігурація обличчя не змінена, шкірні покриви фізіологічної забарвлення, регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. *При огляді порожнини рота:* Коронка зуба 4.6 на 1/3 відновлена пломбувальних матеріалів. Слизова оболонка альвеолярного відростка в області зуба 4.6 фізіологічної забарвлення. Перкусія зуба 4.6 безболісна. При пальпації на альвеолярному відростку нижньої щелепи, в проекції апекса медіального кореня зуба 4.6 пальпується незначне вибухне кісткової тканини (близько 0,5 см в діаметрі)

На рентгенограмі: медіальний зубний канал 4.6 запломбований на 2/3. У періапікальних тканинах в області апекса медіального кореня визначається округлий вогнище деструкції кісткової тканини округлої форми з чіткими контурами.



Поставлено діагноз: хронічний одонтогенний гранулематозний періодонтит.

Для лікування даної патології обраний метод резекції верхівки кореня.

завдання:

1. Назвіть нерви, які необхідно знеболити для обраного методу лікування.
2. Назвіть вид анестезії, який необхідно провести для знеболення зазначених нервів
3. Проведіть знеболювання на фантомі.