

Станція «Хірургія. Стандартизований пацієнт»
Сценарій № 1

До Вас, лікаря поліклініки звернувся хворий 26 років із скаргами на біль у нижній правій ділянці живота, підвищення температури тіла до 37,6°C. Ці скарги з'явилися вчора ввечері; біль наростав, у зв'язку з чим хворий звернувся до лікаря. У минулому подібних болів не було. Біль постійного характеру іррадіації немає. Ніяких ліків не приймав. Працює слюсарем на заводі. Ніколи нічим не хворів крім простудних захворювань. Звернувся за медичною допомогою вперше.

Об'єктивно: Шкіра та видимі слизові оболонки нормального кольору. Над легеньми вислуховується нормальне везикулярне дихання, хрипів немає. Діяльність серця ритмічна, тони ясні. АТ 120/70 мм рт.ст. Пульс 90 уд. в 1 хвилину, ритмічний. Живіт звичайної форми. Пальпаторно визначається напруження у правій здухвинній ділянці а також болючість. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний у гіпогастральній ділянці зправа.

Загальний аналіз крові:

Показник	Результат	Референтні значення
Еритроцити	$4.8 \times 10^{12} / \text{л}$	$4.5 - 5.5 \times 10^{12} / \text{л}$
Гемоглобін	145 г / л	140 - 160 г / л
Кольоровий показник	0.9	0.85– 1.05
Лейкоцити	$15.0 \times 10^9 / \text{л}$	$4.0 - 9.0 \times 10^9 / \text{л}$
ШОЕ	18 мм / г	До 10 мм / г

Завдання:

1. Виділіть основні клінічні синдроми
2. Дайте оцінку загальному аналізу крові
3. Сформулюйте попередній діагноз
4. Визначте тактику ведення хворого.