

Алгоритм действий студента при выполнении компетентности «Лапароцентез (пункция брюшной полости) »

Студент должен:

Положить манекен на стол в положение на спине.

Одеть маску, обработать руки.

Одеть стерильные резиновые перчатки.

Обработать операционное поле на 2 см ниже пупка антисептиком.

Провести местную инфильтрационную анестезию кожи, подкожной клетчатки и мышц до брюшины.

Оттяните кожу вниз, вкалывайте иглу со шприцем, постоянно аспирируя, до прокола брюшины и получения жидкости.

После диагностической эвакуации 50–100 мл прикройте место пункции стерильной повязкой.

Алгоритм действий студента при выполнении компетентности «Наложение жгута для остановки наружного кровотечения»

Студент должен:

1. Уложить манекен на стол.

2. Подложить под конечность прокладку в 2-3 слоя

3. Растянутый жгут обводят вокруг конечности и закрепляют в натянутом состоянии фиксируя кольцо цепочки крючком.

4. Проверяют остановилось ли кровотечение.

5. Накладывают стерильную повязку на рану

6. Под жгутом фиксируют бумажку в которой указывается время, когда был наложен жгут.

Алгоритм действия студента при выполнении компетентности «Плевральная пункция»

1. Студент должен посадить манекен с отведенной в сторону и размещенной на опоре рукой.

2. Обработать руки и одеть резиновые перчатки.

3. Обработать кожные покровы в области пункции спиртовым раствором йода.

4. Провести обезболивание раствором новокаина в месте будущей пункции.

5. Иглой толстого диаметра прокалывают кожу до ощущения «проваливания» в пустое пространство. Обычно в 7-8-м межреберье по лопаточной или задней подмышечной линии.
6. Обратным движением поршня отсасываем содержимое, определяем его характер - воздух или кровь.
7. Присоединяем к игле переходник и отсасываем содержимое.
8. Пункцию заканчиваем в случае прекращения поступления воздуха или крови в шприц.
9. Накладываем асептическую повязку.

**Алгоритм действия студента при выполнении компетентности:
«Первичная хирургическая обработка раны».**

Студент должен:

1. Одеть маску
2. Обработать руки антисептиком
3. Одеть резиновые перчатки
4. Трижды обработать кожу вокруг раны антисептиком
5. Провести пальпаторную и инструментальную ревизию раны
6. Обработать полость раны антисептиком
7. Просушить рану
8. Наложить асептическую повязку
9. Озвучить необходимость введения противостолбнячного анатоксина

**Алгоритм действия студента при выполнении компетентности:
«ПАРАНЕФРАЛЬНАЯ БЛОКАДА»**

Студент должен:

1. Положить манекен на валик на здоровую сторону.
2. Обработать руки, надеть стерильные резиновые перчатки.
3. Найти реберно-позвоночный угол; обработать операционное поле спиртом или хлоргексидином.
4. Выполнить обезболивания 0,25% раствором новокаина.
5. Перпендикулярно поверхности тела вводят длинную до 14 см иглу, вводя при продвижении раствор 0,25% новокаина
6. Определить момент «проваливания» иглы в паранефральное пространство.

7. Ввести в паранефральную пространство 60,0-80,0 0,25% раствора новокаина
8. Вынуть пункционную иглу.
9. Обработать место пункции антисептиком, наложить повязку.
10. Отработанный материал и инструментарий положить в контейнер для дезинфекции.