

Практичні навички до ОСКІ (Акушерство та гінекологія)

- Бімануальне піхвове дослідження
- Забір матеріалу для бактеріоскопічного дослідження, огляд шийки матки у дзеркалах
- Огляд шийки матки у дзеркалах, забір матеріалу для цитоморфологічного дослідження
- Клінічне обстеження молочних залоз
- Вимірювання та оцінювання розмірів жіночого тазу
- Зовнішнє акушерське обстеження, визначення топографії плода в матці
- Проведення аускультації плода, інтерпретація КТГ
- Визначення передбачуваної дати пологів та маси плода
- Оцінка новонародженої дитини за шкалою Апгар

Бімануальне (піхвове) дослідження Сценарій (тривалість 5 хвилин):

- 1) привітатись з пацієнтою;
- 2) ідентифікувати пацієнту (ПІБ, вік);
- 3) проінформувати пацієнту про необхідність проведення дослідження;
- 4) пояснити пацієнці, як проводиться дослідження;
- 5) отримати дозвіл на проведення дослідження;
- 6) вимити руки;
- 7) вдягнути оглядові рукавички;
- 8) першим та другим пальцями лівої (правої) руки розвести великі соромні губи, середній палець «домінантної» руки розташувати на рівні задньої спайки, обережно натиснути на неї, щоб відкрити вхід до піхви;
- 9) обережно та повільно ввести середній палець, потім вказівний палець у піхву по задній стінці до склепіння та шийки матки, четвертий та п'ятий пальці привести до долоні, великий палець відвести до верху;
- 10) визначити довжину піхвової частини шийки матки в сантиметрах;
- 11) визначити консистенцію шийки матки (щільна, м'яка);
- 12) визначити прохідність зовнішнього вічка цервікального каналу (закритий, пропускає кінчик пальця);
- 13) оцінити болісність екскурсії шийки матки;
- 14) другу долоню обережно покласти на живіт (над симфізом) та помірно надавити для визначення дна тіла матки;
- 15) вивести тіло матки між двома руками та визначити:
 - положення матки відносно шийки матки (anteflexio, retroflexio);
 - розміри тіла матки (нормальні, зменшені, збільшенні);
 - консистенцію тіла матки (щільно-еластична, м'яка, ущільнена);

- рухомість тіла матки (відносно рухома, обмежено рухома);
 - чутливість при пальпації (болісна, безболісна);
- 16) розмістити пальці в дні правого бокового склепіння та використовуючи обидві руки пропальпувати праве вагінальне склепіння та праві додатки матки, визначити їх розмір, рухливість та болісність;
- 17) розмістити пальці в дні лівого бокового скlepіння та використовуючи обидві руки пропальпувати ліве вагінальне скlepіння та ліві додатки матки, визначити їх розмір, рухливість та болісність;
- 18) визначити ємкість піхвових склепінь;
- 19) проінформувати пацієнту про результати дослідження;
- 20) подякувати пацієнтці;
- 21) зняти оглядові рукавички;
- 22) вимити руки.

Забір матеріалу для бактеріоскопічного дослідження, огляд шийки матки у дзеркалах

Сценарій (тривалість 5 хвилин):

- 1) привітатись з пацієнтою;
- 2) ідентифікувати пацієнту (ПБ, вік);
- 3) проінформувати пацієнту про необхідність проведення дослідження;
- 4) пояснити пацієнтці, як проводиться дослідження;
- 5) отримати дозвіл на проведення дослідження;
- 6) вимити руки;
- 7) вдягнути оглядові рукавички;
- 8) взяти предметне скло, що промарковано U/C/V;
- 9) провести забір матеріалу для бактеріоскопічного дослідження з уретри ватним аплікатором або ложкою Фолькмана з глубини 1,5-2 см шляхом зішкряба та нанести на предметне скло в ділянці U;
- 10) взяти гінекологічне дзеркало в домінуючу руку;
- 11) пальцями другої руки обережно розвести статеві губи, повільно ввести закрите дзеркало в піхву, не торкаючись уретри та клітора;
- 12) гінекологічне дзеркало розвернути в піхві та відкрити для огляду шийки матки;
- 13) оцінити стан вагінальної частини шийки матки та стінок піхви:
 - колір та стан слизової оболонки піхви (гіперемія, набряк)
 - характер піхвових видіlenь (фізіологічні, патологічні)
 - форму шийки матки (конічна, циліндрична)
 - довжину піхвової частини шийки матки (см)
 - форму зовнішнього вічка цервікального каналу (кругла, щілиноподібна, наявність розривів)
 - характер видіlenь з цервікального каналу (слизові, кров'яні, гнійні, водянисті)
- 14) провести забір матеріалу для бактеріоскопічного дослідження:
 - другий кінець ложки Фолькмана або цитошлітку обережно ввести у цервікальний канал, взяти матеріал шляхом зішкряба, нанести на предметне скло в ділянці С;

- шпателем Ейра взяти матеріал із заднього склепіння, нанести на предметне скло в ділянці V;
- 15) обережно видалити дзеркало;
 16) проінформувати пацієнту про результати дослідження;
 17) подякувати пацієнтці;
 18) зняти оглядові рукавички;
 19) вимити руки.

Огляд шийки матки у дзеркалах, забір матеріалу для цитоморфологічного дослідження

Сценарій (тривалість 5 хвилин):

- 1) привітатись з пацієнтою;
- 2) ідентифікувати пацієнту (ПБ, вік);
- 3) проінформувати пацієнту про необхідність проведення дослідження;
- 4) пояснити пацієнтці, як проводиться дослідження;
- 5) отримати дозвіл на проведення дослідження;
- 6) вимити руки;
- 7) вдягнути оглядові рукавички;
- 8) зняти гінекологічне дзеркало в домінуючу руку;
- 9) пальцями другої руки обережно розвести статеві губи, повільно ввести закрите дзеркало в піхву, не торкаючись уретри та клітора;
- 10) гінекологічне дзеркало розвернути в піхві та відкрити для огляду шийки матки;
- 11) оцінити стан вагінальної частини шийки матки та стінок піхви:
 - колір та стан слизової оболонки піхви (гіперемія, набряк)
 - характер піхвових видіlenь (фізіологічні, патологічні)
 - форму шийки матки (конічна, циліндрична)
 - довжину піхвової частини шийки матки (см)
 - форму зовнішнього вічка цервікального каналу (кругла, щілиноподібна, наявність розривів)
 - характер видіlenь з цервікального каналу (слизові, кров'яні, гнійні, водянисті)
- 12) ватним тампоном зняти зайві виділення;
- 13) зняти предметне скло, що промарковано Ш (екзоцервікс) та Ц (ендоцервікс);
- 14) провести забір матеріалу для цитоморфологічного дослідження:
 - шпателем Ейра (або зігнутою на 90° цитошіткою) провести зішкріб з поверхні шийки матки шляхом проведення повного оберту (на 360°), матеріал нанести на предметне скло широким штрихом, тонким та рівномірним мазком під позначкою Ш (екзоцервікс);
 - ввести цитошітку в цервікальний канал, повернути її на 360° 2-3 рази, зібраний матеріал обертальними рухами навколо своєї осі нанести на предметне скло під позначкою Ц (ендоцервікс);
- 15) обережно видалити дзеркало;
- 16) проінформувати пацієнту про результати дослідження;
- 17) подякувати пацієнтці;
- 18) зняти оглядові рукавички;
- 19) вимити руки.

Клінічне обстеження молочних залоз

Сценарій (тривалість 5 хвилин):

- 1) привітатись з пацієнтою;
- 2) ідентифікувати пацієнту (ПІБ, вік);
- 3) проінформувати пацієнту про необхідність проведення дослідження;
- 4) пояснити пацієнтці, як проводиться дослідження;
- 5) отримати дозвіл на проведення дослідження;
- 6) вимити руки;
- 7) вдягнути оглядові рукавички;
- 8) оглянути молочні залози, оцінити їх форму, колір шкіри, соски, ділянки навколо соска (асиметрію, втяжиння тощо);
- 9) обстежити тканину молочних залоз за годинниковою стрілкою чи по квадрантам та визначити її щільність, однорідність, чутливість, наявність/відсутність об'ємних новоутворень;
- 10) при виявленні новоутворення визначити його форму, розміри, консистенцію, межі утворення, рухомість, співвідношення з тканиною молочної залози, болісність;
- 11) провести пальпацію лімфовузлів в надключичній, підключичній та паховій ділянках;
- 12) визначити наявність патологічних видіlenь з молочних залоз;
- 13) проінформувати пацієнту про результати дослідження;
- 14) подякувати пацієнтці;
- 15) зняти оглядові рукавички;
- 16) вимити руки.

Вимірювання та оцінювання розмірів жіночого тазу.

Сценарій (тривалість 5 хвилин):

- 1) привітатись з пацієнтою;
- 2) ідентифікувати пацієнту (ПІБ, вік);
- 3) проінформувати пацієнту про необхідність проведення дослідження;
- 4) пояснити пацієнтці, як проводиться дослідження;
- 5) отримати дозвіл на проведення дослідження;
- 6) вимити руки;
- 7) вдягнути оглядові рукавички;
- 8) взяти в руки тазомер;
- 9) розташувати гудзики тазомера на передньо-верхні ости клубових кісток (вказати нормативний показник D. spinarum = 25-26 см);
- 10) перевести гудзики тазомера на найбільш віддалені місця гребенів клубових кісток (вказати нормативний показник D. cristarum = 28-29 см);
- 11) встановити гудзики тазомера на великі вертіла стегнових кісток (вказати нормативний показник D. trochanterica = 30-31 см);

- 12) укласти пацієнту на лівий бік із зігнутою у колінному суглобі лівою ногою; виміряти відстань від верхнього краю симфізу до надкріжової ямки (вказати нормативний показник С. externa = 20-21 см);
- 13) зняти оглядові рукавички, одягнути нові оглядові рукавички;
- 14) під час внутрішнього акушерського дослідження вимірюти відстань від нижнього краю симфізу до крижового мису (вказати нормативний показник С. diagonalis = 12,5-13 см);
- 15) проінформувати пацієнту про результати дослідження;
- 16) подякувати пацієнці;
- 17) зняти оглядові рукавички
- 18) вимити руки.

Зовнішнє акушерське обстеження, визначення топографії плода в матці Сценарій (тривалість 5 хвилин):

- 1) привітатись з пацієнтою;
- 2) ідентифікувати пацієнту (ПІБ, вік);
- 3) проінформувати пацієнту про необхідність проведення дослідження;
- 4) пояснити пацієнці, як проводиться дослідження;
- 5) отримати дозвіл на проведення дослідження;
- 6) вимити руки;
- 7) вдягнути оглядові рукавички;
- 8) шляхом пальпації живота ребрами обох долоней визначити рівень розташування дна матки та частини плоду, що розташована у дні матки;
- 9) покласти долоні на ліву та праву частину передньої стінки матки;
- 10) почергово провести пальпацію передньої стінки пальцями відповідної руки, одночасно фіксуючи протилежну сторону долонею іншої;
- 11) визначити положення, позицію та вид плода;
- 12) руку розмістити на верхньому краї лонної дуги, охопити передлеглу частину плоду;
- 13) визначити передлежання плода;
- 14) повернутись спиною до голови пацієнтки, розмістити долоні на передній стінці матки;
- 15) перемістити долоні зверху до низу та зовні до середини, намагаючись підвести пальці під передлеглу частину плоду;
- 16) визначити розташування передлеглої частини плода;
- 17) дати повну відповідь: положення, позиція, вид та передлежання плоду;
- 18) подякувати пацієнці;
- 19) зняти оглядові рукавички;
- 20) вимити руки.

Проведення аускультації плода, інтерпретація КТГ Сценарій (тривалість 5 хвилин):

- 1) привітатись з пацієнтою;
- 2) ідентифікувати пацієнту (ПІБ, вік);

- 3) проінформувати пацієнту про необхідність проведення дослідження;
- 4) пояснити пацієнці, як проводиться дослідження;
- 5) отримати дозвіл на проведення дослідження;
- 6) вимити руки;
- 7) вдягнути оглядові рукавички;
- 8) визначити розташування плоду в матці (візуально на фантомі) - положення, передлежання, позиція, вид плоду;
- 9) визначити та описати розташування точки для проведення аускультації (на фантомі), прикладти стетоскоп;
- 10) оцінити результати КТГ:
 - варіант норми
 - виразна тахікардія (дистрес плода)
 - виразна брадікардія (дистрес плода)
 - монотонний ритм (дистрес плода)
 - пізні децелерації (дистрес плода)
- 11) подякувати пацієнці;
- 12) зняти оглядові рукавички;
- 13) вимити руки.

Визначення передбачуваної дати пологів та маси плода

Сценарій (тривалість 5 хвилин):

- 1) привітатись з пацієнтою;
- 2) ідентифікувати пацієнту (ПБ, вік);
- 3) проінформувати пацієнту про необхідність проведення дослідження;
- 4) пояснити пацієнці, як проводиться дослідження;
- 5) отримати дозвіл на проведення дослідження;
- 6) вимити руки;
- 7) вдягнути оглядові рукавички;
- 8) визначити передбачувану дату пологів на основі даних про останню менструацію, використовуючи формулу Негеле: до дати першого дня останньої менструації додати 7 днів та від отриманого результата відняти 3 місяці;
- 9) пропальпувати пальцями середину верхньо-зовнішнього краю симфізу і притисніть до нього нульову позначку сантиметрової стрічки;
- 10) розгорнути сантиметрову стрічку так, щоб вона розмістилася по середній лінії живота;
- 11) ребром долоні відшукати дно матки, шляхом обережного натискання на живіт, рухаючись в напрямку від симфізу до мечоподібного відростка;
- 12) по ребру долоні, що притискає сантиметрову стрічку, визначити та запам'ятати цифру, яка відповідає висоті стояння дна матки над лобком;
- 13) розташувати сантиметрову стрічку навколо живота спереду на рівні пупка, ззаду – на рівні поперекової області, відмітити отриманий результат;
- 14) обчислити передбачувану масу плода за допомогою методу Жорданія шляхом множення: ОЖ × ВДМ ± 200 гр.
- 15) проінформувати пацієнту про результати дослідження;
- 16) подякувати пацієнці;

17) зняти оглядові рукавички;

18) вимити руки.

Оцінка новонародженої дитини за шкалою Апгар **Сценарій (тривалість 5 хвилин)**

1) привітатись з пацієнтою;

2) ідентифікувати пацієнту (ПБ, вік);

3) проінформувати пацієнту про необхідність проведення дослідження;

4) пояснити пацієнтці, як проводиться дослідження;

5) отримати дозвіл на проведення дослідження;

6) вимити руки;

7) вдягнути оглядові рукавички;

8) оцінити колір шкіри новонародженого:

- розовий – 2 бали
- акроцианоз – 1 бал
- генералізована блідість шкіри або генералізований ціаноз – 0 балів

9) оцінити дихання новонародженого:

- дихальні рухи в повному об'ємі, крик голосний – 2 бали
- дихальні рухи нерегулярні із залученням допоміжної мускулатури, крик слабий – 1 бал
- відсутність дихальних рухів – 0 балів

10) оцінити частоту серцевих скорочень:

- більше 100 ударів за 1 хвилину – 2 бали
- менше 100 ударів за 1 хвилину – 1 бал
- відсутність серцевиття – 0 балів

11) оцінити м'язовий тонус:

- активні рухи новонародженого в повному обсязі – 2 бали
- знижений тонус – 1 бал
- відсутність рухів, атонія – 0 балів

12) оцінити рефлекторні реакції:

- реакція в виді рухів, кашлю, чихання, голосного крику – 2 бали
- реакція слабка (гримаса) – 1 бал
- відсутність будь-яких реакцій – 0 балів

13) визначити загальну кількість балів за шкалою Апгар

14) визначити стан новонародженого (задовільний, середньої тяжкості, тяжкий)

15) подякувати пацієнці;

16) зняти оглядові рукавички;

17) вимити руки.