

1) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 32-х років після ретельно-го дослідження був встановлений діагноз: чорний "волосатий" язик. Які лікарські за-соби необхідно призначити хворому?

- A. Кератолітичні
- B. Кератопластичні
- C. Вітаміни
- D. Антисептики
- E. Протівірусні

2) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки дитини 5-ти місяців скаржаться на появу у неї білого нальоту у роті і від-мову від годування. Об'єктивно: загальний стан задовільний, t° - 37, $1^{\circ}C$. Визначаю-ться білі сирністі нашарування на слизо-вій шік, губ, твердому піднебінні. Наша-рування легко знімається, слизова під ним гіперемована. Який додатковий метод об-стеження підтвердить діагноз?

- A. Мікробіологічний
- B. Імунофлюоресцентний
- C. Цитологічний
- D. Імунологічний
- E. Вірусологічний

3) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Жінка 48-ми років скаржиться на відсу-тність 38, 37, 36, 45, 46, 47, 48 зубів. 35, 44 ін-тактні, стійкі, коронки анатомічної форми, досить високі. Яку ортопедичну констру-кцію найдоцільніше запропонувати пацієн-тові?

- A. Бюгельний протез
- B. Знімний пластинковий протез
- C. Мостоподібний протез
- D. Мікропротез
- E. Адгезивний мостоподібний протез

4) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки дівчинки 3-х років скаржаться на рухомість зубів. Об'єктивно: зуби рухомі, ясенні сосочки набряклі, синюшні, спосте-рігаються патологічні кишені з гнійним ви-діленням. Відмічається підвищене орого-віння шкіри, особливо долоней і підшов. Визначте попередній діагноз:

- A. Хвороба Папійона-Лефевра
- B. Хвороба Такахаха
- C. Хвороба Гоше
- D. Хвороба Німмона-Піка
- E. Хвороба Таратинова

5) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчик 9-ти років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури. Об'єктив-но: катаральний гінгівіт, нальот на язиці, гіперемія піднебінних дужок, гіпертрофія мигдаликів, неприємний запах із роту, лім-фаденіт. За даними педіатра - збільшення печінки, селезінки, виразний моноцитоз. Визначте попередній діагноз:

- A.** Інфекційний моноклеоз
- B.** Гострий герпетичний стоматит
- C.** Багатоформна ексудативна ерітема
- D.** Герпетичена ангіна
- E.** Синдром Стівенса-Джонсона

6) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчик 8-ми років скаржиться на біль в зубі під час їжі. Об'єктивно: в 55 на апро-ксимальній поверхні глибока каріозна по-рожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болі-сне, відмічається кровоточивість, перкусія безболісна. Яку пасту необхідно накласти в перше відвідування?

- A.** Параформальдегідна
- B.** Миш'яковиста
- C.** Резорцин-формалінова
- D.** Тимолова
- E.** Кальційвмісна

7) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчинка 8-ми років скаржиться на біль у роті під час їжі. Об'єктивно: на перехідній складці у фронтальному відділі нижньої щелепи ерозія овальної форми, вкрита жовтуватим нальотом, ерозія з облямів-кою червоного кольору, розміром - 5x7 мм. Така ерозія була рік тому. Визначте діа-гноз:

- A.** Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
- B.** Гострий герпетичний стоматит
- C.** Синдром Бехчета
- D.** Афта Сетона
- E.** -

8) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Чоловік 22-х років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: коронка зуба відновлена на 2/3 пломбою, меді-альна і язикові стінки тонкі, ЕОД- 6 мкА. Планується покриття зуба повною мета-левою штампованою коронкою з нержа-віуючої сталі. Який недолік буде мати дана коронка?

- A.** Не відновлює форму зуба
- B.** Не відповідає вимогам естетики
- C.** Травмує ясенний край
- D.** Не відновлює міжзубний контакт
- E.** Підвищує міжальвеолярну висоту

9) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хвора 69-ти років звернулася до кліні-ки зі скаргою на те, що при користуванні недавно виготовленими повними знімни-ми протезами виявляється стукіт зубів при розмові та утруднене ковтання. Якої по-милки було припущено лікарем при виго-товленні протезу?

- A.** Завищено висоту прикуса
- B.** Не створено трьохпунктний контакт Бонвіля
- C.** Неправильно визначено протетичну площину
- D.** Занижено висоту прикусу
- E.** Неправильно оформлені краї функціо-нального відбитку

10) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 57-ти років звернувся в клініку зі скаргами на рухомість значної групи зу-бів. Після обстеження вирішено в компле-ксі лікування виготовити даному хворому знімну шину. Шинуючі властивості знімних шин забезпечуються застосуванням таких кламерів:

- A. Багатоланкові і перекидні
- B. Вестибулярні
- C. Зубо-альвеолярні
- D. Утримуючі
- E. Опорні

11) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хлопчика 7-ми років діагностовано загострення хронічного гранулюючого пе-ріодонтиту 75 зуба. Коронка 75 зуба зруй-нована на 3/4. Під час обстеження дитина поводи-ла себе спокійно та відповідала на запитання. Хлопчик соматично здоровий. Оберіть доцільний метод знеболювання:

- A. Провідникова анестезія
- B. Внутрішньовенний наркоз
- C. Аплікаційна анестезія
- D. Інфільтраційна анестезія
- E. Масковий наркоз

12) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворому 58-ми років виготовлено знім-ний частковий протез для верхньої щелепи. Під час оцінки якості його виготовлення виявлено дрібні булькові пори по всій тов-щі базису. Що спричинило утворення пор?

- A. Швидке зростання температури при полімеризації пластмаси
- B. Використання пластмаси з минулим терміном придатності
- C. Велика товщина пластмаси
- D. Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси
- E. Мала товщина пластмаси

13) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнтка 55-ти років скаржить-ся на болі та лускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Об'єктивно: обличчя симетричне, пальпація латераль-них крилоподібних м'язів болісна зліва. Відкривання рота обмежене. На томогра-мах кісткові контури суглобових повер-хонь гладенькі. Якому з вказаних захво-рювань відповідає даний клінічний статус?

- A. Дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба
- B. Ревматичний артрит
- C. Деформуючий артроз
- D. Гострий післятравматичний артрит
- E. Анкілоз суглоба

14) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Пацієнту 67-ми років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Проводиться припасування індивідуальної ложки за методикою Гербста. Уточнюється межа ложки під'язикової

ділянки, відсту-пивши 1 см від середньої лінії. Яку пробу Гербста слід провести з цією метою?

- A.** Поперемінне дотикання язиком щоки
- B.** Провести язиком по червоній облямівці верхньої губи
- C.** Активні рухи мимічної мускулатури
- D.** Ковтання
- E.** Повільне відкривання рота

15) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Під час профілактичного огляду у 4,5-річної дитини виявлені приховані каріозні порожнини на контактних поверхнях 54 і зубів. Після видалення навислих країв емалі розм'якшений дентин був легко ви-далений екскаватором у межах плащово-го дентину. Оберіть оптимальний матеріал для постійної пломби:

- A.** Компомерний матеріал
- B.** Композитний матеріал
- C.** Силікатний цемент
- D.** Силікофосфатний цемент
- E.** Полікарбоксилатний цемент

16) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 75-ти років протезується повни-ми знімними протезами. Об'єктивно: повна відсутність зубів на верхній і нижній щеле-пах. На етапі перевірки воскової констру-кції протеза зі штучними зубами у поро-жнині рота визначається контакт між бі-чними зубами і відсутність його у передніх зубів у повних знімних протезах. Яка допу-щена помилка?

- A.** Фіксація передньої оклюзії
- B.** Деформація робочої моделі
- C.** Помилка під час постановки зубів
- D.** Відсутність контакту між прикусними валиками у бічних ділянках
- E.** Відсутність контакту між прикусними валиками у фронтальній ділянці

17) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Жінка 43-х років звернулась з приводу протезування дефекту коронки зуба. Об'є-ктивно: 25 зруйнований на рівні ясен. На Ро-грамі кореневий канал запломбований до верхівки. Перкусія безболісна. Яка кон-струкція протеза показана хворій?

- A.** Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян
- B.** Штифтовий зуб за Ахмедовим
- C.** Напівкоронка
- D.** Екваторна коронка
- E.** Вкладка

18) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворому 64-х років виготовляється бю-гельний протез на верхню щелепу при на-явності дефекту зубного ряду 2-го класу за Кеннеді. Після проведеної паралелометрії встановлені типи межевих ліній на опор-них зубах. На 24 зубі межева лінія - 1 типу. Який тип кламера із системи Нея показаний хворому?

- A.** I тип
- B.** IV тип
- C.** II тип

D. III тип

E. V тип

19) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 28-ми років після падіння звернувся до клініки щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на обмеження відкривання ро-та, відчуття оніміння шкіри у підочній ділянці зліва, верхньої губи, крила носа, біль лівій виличній ділянці, що посилюється при спробі відкрити рот. Пальпаторно визначається симптом "сходинки". Який най-більш імовірний діагноз?

- A. Перелом виличної кістки зі зміщенням**
- B. Перелом виличної кістки без зміщення**
- C. Перелом верхньої щелепи за середнім типом**
- D. Перелом верхньої щелепи за верхнім типом**
- E. Перелом виличної дуги зліва**

20) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 16-ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. З анамнезу: часті носові кровотечі, загальна слабкість. Об'єктивно: блідість шкірних покривів і слизової оболонки рота, на слизовій щік, язика та м'якого піднебіння - множинні петехії. В крові: ер. - 3, $1 \cdot 10^{12}/л$, Нб- 94 г/л, КП- 0,9, лейкоц. - $2,9 \cdot 10^9 /л$, тромбоц. - $80 \cdot 10^9 /л$, час зсідання крові - 9 хв., ШОЕ- 18 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Хвороба Верльгофа**
- B. Хвороба Вакеза**
- C. Хвороба Аддісона-Бірмера**
- D. Залізодефіцитна анемія**
- E. Хронічний лімфолейкоз**

21) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 48-ми років скаржиться на новоутворення в правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до $37,0-37,2^{\circ}C$. Хворому проводилась протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. В правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабо болюче кулясте новоутворення щільно-еластичної конси-стенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Якому захворюванню найбільш імовірно відповідає ця клінічна картина?

- A. Хронічний лімфаденіт**
- B. Хронічний сіалоаденіт**
- C. Слинокам'яна хвороба**
- D. Аденома слинної залози**
- E. Атерома**

22) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитина 14-ти років скаржиться на ко-сметичний дефект у ділянці передніх зубів. Об'єктивно: емаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 у ділянці ріжучого краю витончена, паралельно ріжучому краю визначається борозенчасте заглиблення емалі шириною 1,5 мм, що оперізує зуби. Горби 16, 26, 36, 46 недорозвинені, конічної форми. Який най-більш імовірний діагноз?

- A. Системна гіпоплазія**
- B. Недосконалий дентиногенез**
- C. Недосконалий амелогенез**

- D. Місцева гіпоплазія
- E. Дисплазія Стентона-Капдепона

23) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік 26-ти років скаржиться на по-стійний біль у зубі на верхній щелепі справа, який посилюється при накушуванні. Три дні тому в 12 зуб була накладена арсе-новмісна паста. Своєчасно на прийом паці-єнт не з'явився. Об'єктивно: на медіальній поверхні 12 - герметична пов'язка, перку-сія різко болісна. Лікарем-стоматологом було поставлено діагноз: гострий миш'я-ковистий періодонтит. Виберіть правильну тактику лікування:

- A. Антидот арсену залишають у коренево-му каналі під герметичною пов'язкою
- B. Антидот арсену залишають під гермети-чною пов'язкою у каріозній порожнині
- C. Призначають внутрішньоканальний електрофорез з антидотом, зуб лишають відкритим
- D. Промивають антидотом кореневий ка-нал, зуб лишають відкритим
- E. Видаляють дентинну пов'язку, при-значають електрофорез з антидотом по перехідній складці

24) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Пацієнту 59-ти років виготовляють час-ткові знімні пластинкові протези на етапі - визначення центральної оклюзії. Який ла-бораторний етап наступний?

- A. Загіпсовка моделей в оклюдатор
- B. Кінцеве моделювання
- C. Постановка зубів
- D. Загіпсовка в кювету
- E. Виготовлення воскових валиків

25) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчику 9-ти років. Знаходиться на обліку у отоларинголога з 4-х років з при-воду хронічного риніту. Скарги на непра-вильне положення зубів. Об'єктивно: під час огляду рот злегка відкритий, ніздрі не беруть участі в диханні, з-під верхньої губи виступають різці верхньої щелепи. Підбо-ріддя скошене назад. Сагітальна щілина - 5 мм. Вкажіть етіологію патології прикусу у цієї дитини:

- A. Патологія верхніх дихальних шляхів
- B. Зменшення сагітальних розмірів верх-ньої щелепи
- C. Шкідливі звички
- D. Спадковість
- E. Травма щелеп

26) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Жінка 59-ти років потребує шинування зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: зубна

17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27

формула 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 .

Коронки зубів нижньої щелепи високі, зу-би інтактні, шийки оголені, рухомість II ступеня.

Яку шину краще застосувати?

- A. Суцільнолита знімна
- B. Зі спаяних коронок
- C. З екваторних коронок
- D. Ковпачкова

Е. 3 напівкоронок

27) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік 36-ти років скаржиться на ниючий біль у ділянці 26 зуба, що посилюється при накушуванні. 26 у минулому лікований. Об'єктивно: слизова оболонка альвеолярного відростка верхньої щелепи з вестибулярного боку на рівні 26 зуба пастозна. На рентгенограмі 26 зуба визначається вогнище просвітління у верхівки медіального щічного кореня з чіткими контурами діаметром до 0,5 см. Встановіть найбільш імовірний діагноз:

А. Загострення хронічного грануломатозного періодонтиту 26

В. Хронічний фіброзний періодонтит 26

С. Хронічний гранулюючий періодонтит 26

Д. Кістогранульома

Е. Локальний пародонтит

28) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 43-х років скаржиться на відчуття важкості у правій навколонушній залозі, солонуватий присмак у роті, часті загострення. Об'єктивно: залоза щільна, пружно-еластичної консистенції, безболісна. З вустя протоки виділяється слина з домішкою комочків слизу. На сіалограмі у паренхімі залози велика кількість дрібних порожнин. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Хронічний паренхіматозний паротит

В. Паротит Герценберга

С. Хронічний інтерстиціальний паротит

Д. Синдром Шегрена

Е. Аденома правої навколонушної залози

29) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворому вперше виготовляються повні знімні протези. Хворий з'явився на клінічний етап "накладення протезів". У числі рекомендацій лікар вказує термін користування протезами. Визначте, коли слід виготовити нові протези даному хворому:

А. Через 3 роки

В. Через 2 роки

С. Через рік

Д. Через півроку

Е. Через 5 років

30) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Мати дитини 1,5 років звернулася зі скаргами на наявність виразок на слизовій оболонці порожни рота, слинотечу, в'ялість дитини, блювання, підвищення температури тіла до 39°C. Дитина хворіє другий день, захворіла раптово. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі. На слизовій оболонці язика, щік, губ знаходяться ерозії овальної форми, діаметром 2-3 мм, вкритих білуватим нальотом, болісні під час пальпації. На шкірі обличчя навколо губ 4 міхурці, наповнені напівпрозорим вмістом. Підщелепові лімфовузли збільшені. Який попередній діагноз?

А. Гострий герпетичний стоматит

В. Гострий грибовий стоматит

С. Багатоформна ексудативна еритема

Д. Медикаментозний стоматит

Е. Рецидивуючий герпетичний стоматит

31) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

У пацієнта 25-ти років вестибулярні по-верхні верхніх різців уражені флюорозом. Яка з перерахованих конструкцій дасть ма-ксимальний естетичний результат при за-стосуванні?

- A. Вінір
- B. Пластмасова коронка
- C. Керамічна коронка
- D. Металокерамічна коронка
- E. Металопластмасова коронка за Мате

32) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 35-ти років звернувся в кліні-ку зі скаргами на біль в ділянці тіла ни-жньої щелепи зліва. Об'єктивно припу-хлість обличчя зліва, гематома, зубні ря-ди цілі. Зміщення відламків немає. Під час пальпації біль, а при бімануальному об-стеженні - патологічна рухливість тіла ни-жньої щелепи в області 35 та 36 зубів. Який метод лікування необхідно застосувати?

- A. Алюмінієві шини із зачіпними гачками і міжщелепною тягою
- B. Виготовити пружну дугу Енгля на нижню щелепу
- C. Виготовити апарат Ванкевич
- D. Виготовити апарат Бетельмана
- E. Провести медикаментозне лікування

33) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 42-х років, за професією вчи-тель, звернувся з приводу протезування зу-бів. Об'єктивно: передні зуби верхньої ще-лепи мають рухомість III ступеня. Плану-ється виготовлення безпосереднього про-теза. В який термін після видалення зубів накладають безпосередні протези?

- A. Безпосередньо після видалення
- B. Через 1 день
- C. Через 2 дні
- D. Через 3 дні
- E. Через 4 дні і більше

34) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хвора 45-ти років скаржиться на пе-чіння у язиці, металевий присмак у роті. Три місяці тому був поставлений мосто-подібний протез із золота з опорою на 16, зуби. При огляді порожнини рота об'є-ктивних змін не виявлено. У 36, 37, 46 зубах пломби із амальгами. Яка найбільш імовір-на причина даного стану?

- A. Гальванічні струми
- B. Алергічна реакція
- C. Неврологічні порушення
- D. Хімічні фактори
- E. Механічна травма

35) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого 32-х років температура тіла - 38,9°C , загальна слабкість, утруднення мови, неможливість приймати їжу. Впродовж 4-х років захворювання повторюється в осінньо-весняний період. На

гіперемова-ній та набряклій слизовій губ, щок - міхури та ерозії, вкриті фібринозним нальотом сіруватого кольору. Симптом Нікольського негативний. Який з перерахованих діагно-зів найбільш імовірний?

- A.** Багатоформна ексудативна еритема
- B.** Вульгарна пухирчатка
- C.** Гострий герпетичний стоматит
- D.** Неакантолітична пухирчатка
- E.** Герпетичний дерматит Дюрінга

36) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Жінка 41-го року скаржиться на на-явність дефектів твердих тканин на цен-тральних та бокових різцях верхньої щеле-пи, які суб'єктивно її не турбують. Зі слів хворої, дефекти з'явилися рік тому, з ча-сом вони збільшуються. Об'єктивно: на ве-стибулярній поверхні 12, 11, 21 та 22 зубів визначаються дефекти твердих тканин ку-лястої форми в межах емалево-дентинного з'єднання. Дно дефектів гладеньке, блиску-че, тверде. Мешкає у місцевості з вмістом фтору у питній воді - 0,7 мг/л. Яка тактика лікування є найбільш доцільною у даному випадку?

- A.** Пломбування композитним матеріалом без препарування
- B.** Лікарське втручання не потрібне
- C.** Місцева флюоризація
- D.** Препарування і пломбування компози-тним матеріалом
- E.** Реміналізуюча терапія

37) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

В клініку звернувся пацієнт з дефектом коронкової частини 26 зуба. При обсте-женні виявлено каріозну порожнину I кла-су за Блекум. Запропонуйте оптимальне лікування:

- A.** Вкладка
- B.** Пломбування цементом
- C.** Штучна коронка
- D.** Штифтовий зуб
- E.** Видалення зуба і виготовлення мостопо-дібного протезу

38) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

При плановому профілактичному огля-ді у дівчинки 5-ти років виявлено утруднене носове дихання. Дитина дихає ротом, який постійно відкритий. До чого може призве-сти дана патологія?

- A.** Звуження верхнього зубного ряду в бокових ділянках
- B.** Розширення верхнього зубного ряду
- C.** Поворот зубів навколо вісі
- D.** Неповне прорізування фронтальних зубів
- E.** Часткова адентія

39) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 40-ка років звернувся у клініку зі скаргами на рухливість фронтальних зу-бів. Об'єктивно: рухливість фронтальних зубів на нижній щелепи 2 ступеня. Зуби де-пульповані. Вкажіть конструкцію незнім-ної шини у комплексному лікуванні паро-донтиту для профілактики вторинної де-формації:

- A.** Мамлока
- B.** 3 багатоланковим кламером

- С. Ельбрехта
- Д. Інтердентальна за Копейкіним
- Е. Новотні

40) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У жіночій консультації було проведено бесіди з вагітними жінками про значення характеру харчування для закладки та роз-витку зубів майбутньої дитини. На якому тижні внутрішньоутробного розвитку по-чинається закладка фолікулів тимчасових зубів у плода?

- А. 7-ий
- В. 15-ий
- С. 18-ий
- Д. 4-ий
- Е. 12-ий

41) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Для лікування скупченості зубів у дів-чинки 9-ти років було запропоновано ме-тод системного видалення зубів за Hotz. Що було підставою для вибору цього мето-ду лікування?

- А. Невідповідність розмірів зубів та щелеп
- В. Звуження щелеп
- С. Надкомплектні зуби
- Д. Подовження передньої ділянки зубної дуги
- Е. Невідповідність розмірів щелеп

42) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Чоловік 25-ти років скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи, патологічну ру-хливість, кровотечу з порожнини рота, по-рушення прикусу, неможливість пережову-вання їжі. 10 годин тому отримав травму. При обстеженні встановлений поодинокий перелом нижньої щелепи між першим і другим премолярами. Зміщення відлам-ків незначне. Зуби усі в наявності, стійкі, правильної анатомічної форми. Який опти-мальний метод лікування хворого?

- А. Двощелепні назубні шини
- В. Остеосинтез із використанням мініпла-стинки
- С. Однощелепна назубна шина
- Д. Капова шина
- Е. Накісний апарат

43) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки 12-річної дитини скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, які з'явилися півроку то-му. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 виявлені крейдоподібні плями. Емаль над ними втратила блиск, при зондуванні - під-датлива, шорстка. В анамнезі - короткоча-сний біль від хімічних подразників. Який попередній діагноз?

- А. Гострий початковий карієс
- В. Хронічний початковий карієс
- С. Гострий поверхневий карієс
- Д. Системна гіоплазія емалі
- Е. Флюороз зубів

44) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитині 9-ть років. Центральні різці верхньої щелепи повернуті навколо осі. Яке це аномальне положення?

- A. Тортооклюзія
- B. Транспозиція
- C. Супраоклюзія
- D. Інфраоклюзія
- E. Вестибулярне

45) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий скаржиться на постійний біль у ділянці 25 впродовж доби. Об'єктивно: на медіальній поверхні 25 каріозна поро-жнина, що не сполучається з порожни-ною зуба. Реакція на холод безболісна. На Ro-грамі: кісткова тканина періапикальної ділянки без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гострий серозний періодонтит
- B. Гострий дифузний пульпіт
- C. Гострий гнійний пульпіт
- D. Гострий гнійний періодонтит
- E. Загострення хронічного періодонтиту

46) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 45-ти років скаржиться на пухли-ноподібне слабкоболісне новоутворення в правій привушній ділянці, яке виникло 2 місяці тому без жодної причини. Відзначає слабкість, деколи підвищення температури до $37,2-37,6^{\circ}C$. Півмісяця тому проведена протизапальна терапія, яка не дала позитивних результатів. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок незначної припу-хлості в правій привушній ділянці. Пальпа-торно визначається округле новоутворен-ня щільно-еластичної консистенції з рівни-ми контурами, слабкоболісне, не спаяне зі шкірою. Із стенової протоки виділяється прозора слина в невеликій кількості. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Псевдопаротит Герценберга
- B. Атерома привушної ділянки
- C. Гострий інфекційний паротит
- D. Сіалопатія Шегрена
- E. -

47) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Жінка 51-го року скаржиться на відчут-тя печіння та поколювання спинки і бічних поверхонь язика, що зникає під час їжі, але посилюється увечері, сухість у роті, спотворення смакових відчуттів. Уперше подібні відчуття з'явилися рік тому після психічної травми, з плином часу відчут-тя посилюються. Страждає анацидним га-стритом, цукровим діабетом, погано спить. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Глосодинія
- B. Гангліоніт під'язикових гангліїв
- C. Глосит Гентера-Міллера
- D. Десквамативний глосит
- E. Кандидозний глосит

48) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 50-ти років із вогнепальним по-раненням нижньої щелепи та дефектом кісткової тканини в ділянці підборіддя. Який метод іммобілізації йому показаний?

- A.** Позаротовий апарат типу Рудько
- B.** Двощелепна шина із зачіпними петлями та міжщелепним еластичним витягуванням
- C.** Кістковий шов
- D.** Однощелепна шина-скоба
- E.** Фіксація за допомогою спиць і стрижнів

49) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 20-ти років скаржиться на відсутність зуба на верхній щелепі справа, естетичний дефект. Об'єктивно: відсутність 12, сусідні зуби інтактні, стійкі, з добре вираженою анатомічною формою, високою коронковою частиною. Прикус прямий. Під час опитування з'ясовано, що у хворого вроджена вада серця. Якій конструкції протезу потрібно надати перевагу в даному випадку?

- A.** Адгезивний мостоподібний
- B.** Пластмасовий мостоподібний
- C.** Металокерамічний мостоподібний з опорою на 14, 13
- D.** Металопластмасовий мостоподібний
- E.** Штамповано-паяний мостоподібний

50) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 45-ти років, скаржиться на дискомфорт в 27 зубі, виникнення ниючого болю при накушуванні. В анамнезі: при переохолодженні на яснах відкривається нориця. Об'єктивно: коронка 27 змінена в кольорі, пломба на жувальній поверхні, на слизовій оболонці в ділянці зуба рубець від нориці. Який попередній діагноз?

- A.** Хронічний гранулюючий періодонтит
- B.** Хронічний гангренозний пульпіт
- C.** Хронічний фіброзний періодонтит
- D.** Хронічний грануломатозний періодонтит
- E.** Хронічний фіброзний пульпіт

51) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 32-х років скаржиться на наявність припухлості у ділянці кута нижньої щелепи зліва. Об'єктивно: у ділянці нижньої щелепи на рівні відсутнього 38 зуба виявляється потовщення кістки, слизова оболонка альвеолярного відростка не змінена, пальпація безболісна. Регіонарні лімфо вузли не збільшені. На рентгенограмі визначається вогнище просвітлення кісткової тканини округлої форми до 3,5 см у діаметрі з чіткими рівними контурами, по периферії ободок склерозованої тканини. У порожнину вогнища просвітлення звернена коронкова частина ретинованого 38 зуба. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Фолікулярна кіста
- B.** Радикулярна кіста
- C.** Адамантинома
- D.** Остеобластокластома
- E.** Одонтома

52) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 47-ми років після безуспішно-го консервативного лікування хронічно-го гранулематозного періодонтиту 15 зуба з'явився для його видалення. Який вид щипців доцільно використати для видалення даного зуба?

- A. S-подібні
- B. S-подібні праві
- C. Прямі
- D. S-подібні ліві
- E. Байонети

53) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Які конструкції протезів необхідно вибрати при множинній адентії в ранній змінний період прикусу?

- A. Часткові знімні протези
- B. Мостоподібні протези
- C. Бюгельні протези
- D. Не потребує протезування
- E. Повні знімні протези

54) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворому 48-ми років планують виготовлення незнімного мостоподібного протеза на нижню щелепу з опорою на 15 і

18 зуби. Об'єктивно: 18 зуб нахилений дистально (дивергує). Яку поверхню 18 зуба необхідно зішліфувати у більшому об'ємі при препаруванні опорних зубів?

- A. Дистальна
- B. Щічна
- C. Медіальна
- D. Піднебінна
- E. Жувальна

55) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 20-ти років з приводу загострення хронічного періодонтиту показано видалення 12 зуба. Для знеболювання обрано інфраорбітальну та інцизивну анестезію. Які нервові утворення виключаються після проведення вказаної анестезії?

- A. Передні верхні альвеолярні гілки, *n. incisivus*
- B. Середні верхні альвеолярні гілки, *n. nasopalatinus*
- C. Задні верхні альвеолярні гілки, *n. incisivus*
- D. Великий нерв піднебіння, середні верхні альвеолярні гілки
- E. Носо-піднебінний нерв, передні верхні альвеолярні гілки

56) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 35-ти років, з одностороннім кінцевим дефектом зубного ряду верхньої щелепи був встановлений внутрішньокістковий імплантат у якості дистальної опори з метою протезування незнімним мостоподібним протезом з опорами на блоки "зуб-імплантат" і "імплантат-імплантат". Яким має бути оптимальне співвідношення опорних і штучних зубів у цьому мостоподібному протезі?

- A. 1
- B. 1,5

- C. 1,75
- D. 2
- E. 1,25

57) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 35-ти років скаржиться на само-вільний гострий нападоподібний біль в 25 зубі, що триває до 30 хвилин, вночі посилюється, безбольові проміжки до трьох годин. Біль виникає та посилюється при дії термічних і механічних подразників. Об'єктивно: на жувальній поверхні 25 зуба глибока каріозна порожнина, виповнена розм'якшеним дентином, пульпова камера закрита, зондування різко болюче в одній точці в місці проекції рогу пульпи. ЕОД- 25 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гострий обмежений пульпіт
- B. Гострий гнійний пульпіт
- C. Загострення хронічного періодонтиту
- D. Гіперемія пульпи
- E. Гострий дифузний пульпіт

58) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

У хворого 35-ти років свіжий ментальний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення уламків. Який ортопедичний апарат показаний в даному випадку?

- A. Фіксуєчий
- B. Репонуючий
- C. Заміщуючий
- D. Формуючий
- E. Комбінований

59) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 30-ти років звернувся до лікаря для видалення 26 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об'єктивно: коронка 26 зруйнована на 1/3. Які щипці можна використати для видалення даного зуба?

- A. S-подібної форми з шипом на лівій щічці
- B. S-подібної форми з шипом на правій щічці
- C. Прямі
- D. Прямий елеватор
- E. S-подібної форми без шипів

60) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Пацієнт 19-ти років звернувся до клініки з діагнозом: односторонній перелом тіла нижньої щелепи між 33 і 34 зубами зі зміщенням відламків у вертикальному напрямку. Визначити вид ортопедичного апарату за своїм призначенням для даного хворого:

- A. Репонуючий
- B. Фіксуєчий
- C. Заміщуючий
- D. Направляючий
- E. Формуючий

61) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворій 18-ти років, встановлено діагноз: хронічний катаральний генералізований гінгівіт, легкого ступеню важкості, загострення. Має місце скупчення нижніх фронтальних зубів. $PI=3,1$. Який з нижче-наведених засобів необхідно призначити хворій для профілактики утворення нальоту?

- A.** Хлоргексидин
- B.** Перекис водню
- C.** Хімопсин
- D.** Альобуцид
- E.** Фурацилін

62) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Під час лікування 16 зуба з приводу го-строого дифузного пульпиту через декілька хвилин після проведеної провідникової анестезії хворий відчув неспокій, відчуття жару, болю в грудях. Об'єктивно: утруднене дихання, рясний піт, гіперемія шкірного покриву, блювання, втрата свідомості, су-доми. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Анафілактичний шок
- B.** Бронхіальна астма
- C.** Колапс
- D.** Зомління
- E.** Гіпоглікемічна кома

63) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

На консультацію до ортодонта звернулись батьки 5-річної дівчинки зі скаргами на те, що дитина постійно вночі смочає великий палець правої руки. Які рекомендації необхідно дати батькам?

- A.** Використати фіксуючу ліктьову шину
- B.** Назначити міогімнастичні вправи для висувачів нижньої щелепи
- C.** Виготовити піднебінну пластинку з ретродугою
- D.** Виготовити пластинку на нижню щелепу з ретродугою
- E.** Використати пращеподібну пов'язку на ніч

64) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Чоловік 47-ми років звернувся зі скаргами на утруднене вживання їжі, деформацію прикусу. В анамнезі: перелом нижньої щелепи 2,5 місяці тому. Об'єктивно: дефект нижньої щелепи у фронтальній ділянці 1,8 мм (несправжній суглоб). По обидва боки фрагменту нижньої щелепи є 4 стійких зуба, перкусія безболісна. Яку конструкцію протеза слід використовувати у даному випадку?

- A.** Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом
- B.** Протез із шарніром за Оксманом з дво-суглобним зчленуванням
- C.** Протез із шарніром за Оксманом з одно-суглобним зчленуванням
- D.** Протез із шароамортизаційним кламом за Курляндським
- E.** Безшарнірний знімний протез

65) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 42-х років з'явився зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після обстеження встановлений попередній діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості. Оцінка результату якого дослідження найбільш інформативна для встановлення остато-

чного діагноза?

- A.** Рентгенографія
- B.** Глибина пародонтальних кишень
- C.** Рухливість зубів
- D.** Проба Кулаженко
- E.** Проба Кетчке

66) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дитини 9-ти років при санації поро-жнини рота в 85 зубі на жувальній поверхні виявлена каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. При зондуванні ви-никає різкий біль, помірна кровоточивість. Від холодної води повільно проходить біль. Перкусія зуба безболісна. Виберіть опти-мальний метод лікування:

- A.** Девітальна ампутація
- B.** Вітальна екстирпація
- C.** Девітальна екстирпація
- D.** Вітальна ампутація
- E.** Біологічний метод

67) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Жінка 28-ми років скаржиться на біль під час прийому їжі і ковтання, загальну слабкість. Захворювання почалося гостро з підйому температури тіла до $37,9^{\circ}\text{C}$, болі у м'язах. Об'єктивно: на фоні набряклої і гіперемованої слизової м'якого піднебін-ня, передніх дужок, задньої стінки глотки визначаються згруповані і поодинокі ве-зикули з серозно-геморагічним вмістом, а також ерозовані ділянки різної величини з фестончастими краями, вкриті фібрино-зним нальотом, слабо болісні під час до-тику. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Герпангіна
- B.** Грипозний стоматит
- C.** Оперізуючий лишай
- D.** Гострий герпетичний стоматит
- E.** Ящур

68) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Жінка 29-ти років скаржиться на свербіж, пе-чіння, болісність червоної облямівки губ, що з'являється навесні і влітку, і зника-ють в інші пори року. Хворіє впродовж 5-ти років. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи гіперемована, набрякла, на цьому фоні визначаються дрібні міхурці, ерозії діаметром до 3 мм, вкриті кірками, болісні під час дотику, поодинокі тріщини. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Актинічний хейліт, ексудативна форма
- B.** Метеорологічний хейліт
- C.** Гострий екзематозний хейліт
- D.** Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма
- E.** Ерозивна форма червоного вовчаку червоної облямівки губ

69) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік 46-ти років звернувся до кліні-ки для профілактичного огляду щелепно-лицевої ділянки. Об'єктивно: передні зуби верхньої щелепи перекиваються зуби ни-жньої щелепи на 3 мм. Щічно-мезіальний горбик верхніх перших молярів у цен-тральній оклюзії розташовується між ме-зіальним

і дистальним щічними горбиками нижніх перших молярів. Який вид прикусу у даного пацієнта?

- A.** Ортогнатичний
- B.** Прогнатичний
- C.** Прямий
- D.** Відкритий
- E.** Косий

70) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Одним із станів визначення центральної оклюзії є побудова площини, що при наявності достатньої кількості зубів проходить через ріжучі краї центральних різців нижньої щелепи та дистально-щічні горбики останніх молярів. Яка площина будується?

- A.** Протетична
- B.** Сагітальна
- C.** Вертикальна
- D.** Трансверзальна
- E.** Франкфуртська

71) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хлопчика 7-ми років діагностовано хронічний періодонтит 64 та 85 зубів. Дитина страждає на гемофілію А. Визначте лікувальну тактику:

- A.** Видалення можливе в гематологічному відділенні, після проведення відповідної підготовки
- B.** Видалення можливе як в щелепно-лицевому стаціонарі, так і в амбулаторії після відповідної підготовки
- C.** Видалення зубів можливе в амбулаторних умовах; після видалення слід тампонувати альвеоли гемостатичною губкою
- D.** Видалення зубів можливе в щелепно-лицевому відділенні
- E.** Видалення зубів протипоказане через високу імовірність кровотечі

72) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Оглядаючи дитину 5-ти років, лікар знайшов множинні крейдоподібні цятки, яскраво-жовтого кольору, що уражають емаль більшості зубів верхньої і нижньої щелеп. При висушуванні плями здобувають матовий відтінок і глянцевою поверхню. При фарбуванні 2% розчином метиленового синього, забарвлення не відбувається. Дитина мешкає в місцевості з вмістом фтору у воді 2,0 мг/л. Який попередній діагноз?

- A.** Флюороз зубів
- B.** Системна гіпоплазія емалі
- C.** Мармурова хвороба
- D.** Недосконалий амелогенез
- E.** Недосконалий дентиногенез

73) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Мати дівчинки 4-х років скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 39°C, кашель, нежить. Регіональні лімфатичні вузли збільшені. При огляді ротової порожнини на гіперемованій слизовій оболонці щік у ділянці кутніх зубів виявлені точкові плями розміром за шпилькову голівку, що нагадують бризки вапна. Під час пальпації уражених ділянок відчувається нерівність слизової оболонки. Вкажіть імовірний діагноз:

- A.** Стоматит при корі

- В. Стоматит при вітряній віспі
- С. Стоматит при краснусі
- Д. Багатоформна ексудативна еритема
- Е. Гострий герпетичний стоматит

74) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Пацієнт 47-ми років, вчитель, хворіє на генералізований пародонтит. Протягом 5-ти років користувався незнімною коронко-вою пластмасовою шиною з опорою на 32, 31, 41, 42 зуби. Об'єктивно: зуби фронтальної ділянки мають рухомість 3 ступеня та вестибулярний нахил. Планується видалення зубів. Яку конструкцію після видалення зубів слід запропонувати хворому з урахуванням фаху?

- А. Безпосередній
- В. Незнімний мостоподібний
- С. Знімний мостоподібний
- Д. Знімна шина-протез
- Е. Незнімна шина-протез

75) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дитини 13-ти років 23 прорізався орально, місця в зубній дузі достатньо, не-рекривається нижніми зубами на 1/2 ви-соті коронки. Без якого заходу **НЕМО-ЖЛИВА** зміна розташування ікла?

- А. Роз'єднання прикусу
- В. Розширення зубної дуги
- С. Зміщення нижньої щелепи
- Д. Видалення премоляра
- Е. Пальцевий масаж

76) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

При лікуванні пульпіту у хворого 32-х років, ВІЛ-інфікованого, лікар-стоматолог випадково пошкодив шкіру руки. Як повинен вчинити лікар в даному випадку?

- А. Витиснути кров з пошкодженої ділянки, обробити 70% розчином спирту
- В. Промити пошкоджену ділянку водою
- С. Обробити пошкоджену ділянку 2% розчином борної кислоти
- Д. Обробити пошкоджену ділянку 0,01% розчином перманганату калію
- Е. Обробити пошкоджену ділянку 0,05% розчином хлоргексидину

77) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 30-ти років звернувся зі скарга-ми на болі в ділянці передніх зубів нижньої щелепи, які пов'язує із травмою підборід-дя. Об'єктивно: співвідношення зубних рядів ортогнатичне. Рентгенологічно - сере-динний перелом нижньої щелепи. Яка ши-на найбільш раціональна?

- А. Гладка шина-скоба
- В. Гардашнікова
- С. Паяна на кільцях
- Д. Вебера
- Е. Васильєва

78) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 47-ми років скаржиться на зміну кольору 11 та 21 зубів. Об'єктивно: 11, 21 зуби рожевого кольору, канали запломбовано до верхівок. Вирішено виготовити металокерамічні коронки на 11 та 21 зуби. Під яким оптимальним кутом слід проводити препарування апроксимальних поверхоень опорних зубів?

- A. 5°
- B. 0°
- C. 10°
- D. 15°
- E. 20°

79) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 43-х років скаржиться на кровотечу з ясен, болі в яснах довкола окремих зубів, кровотечу під час чищення зубів. Встановлено діагноз: локалізований пародонтит. За допомогою оклюдограми визначено точки посиленого оклюзійного контакту. Яка тактика лікаря?

- A. Пришліфувати оклюзійні поверхні
- B. Виготовити металеві коронки
- C. Виготовити металокерамічні коронки
- D. Провести функціональні проби
- E. Виготовити шини-капи

80) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворому 53-ти років планують виготовити частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу при наявності 16, 15, 23, 24 та 27 зубів. Який вид кламерної фіксації найбільш доцільний у даному випадку?

- A. Площинний
- B. Точковий
- C. Лінійний діагональний
- D. Лінійний трансверзальний
- E. Лінійний сагітальний

81) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До стоматолога звернувся хворий 30-ти років зі скаргами на припухлість в ділянці верхньої губи. Об'єктивно: визначається асиметрія обличчя за рахунок набряку верхньої губи, носо-губна складка згладжена. У ротовій порожнині на вестибулярній поверхні верхньої щелепи перехідна складка на рівні 11, 21, 22 згладжена, гіперемована, під час пальпації відчувається біль та флюктуація. Діагностовано гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 21. Оберіть тактику лікування:

- A. Збереження 21, періостеотомія, протизапальна терапія
- B. Збереження 21, протизапальна терапія
- C. Видалення 21, періостеотомія, протизапальна терапія
- D. Видалення 21, періостеотомія
- E. Видалення 12, 21, 22 зубів, періостеотомія, протизапальна терапія

82) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Під час перебування в черзі на прийом до стоматолога жінку 48-ми років в шию вкусила бджола, внаслідок чого в неї розвився різкий симетричний набряк обличчя, почався бронхоспазм, почерво-

ніння шкіри, з'явилась кропивниця. Який з вказаних невідкладних станів виник у дано-му випадку?

- A.** набряк Квінке
- B.** ларингоспазм
- C.** астматичний статус
- D.** анафілактичний шок
- E.** асептичний шок

83) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 37-ми років скаржиться на наявність на червоній облямівці білястої плями. Об'єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи посередині між кутом рота і серединною лінією ділянки ураження сірувато-білого кольору, неправильної (полігональної) форми, 7x4 мм, ледь западає відносно рівня червоної облямівки, поверхня вкрита дрібними щільно прикріпленими лусочками. Пальпація не виявляє ущільнення основи ураження, а при бічній пальпації ураження відчувається поверхнєве ущільнення. Регіонарні лімфовузли - без змін. Який попередній діагноз?

- A.** обмежений передраковий гіперкератоз
- B.** лейкоплакія, плоска форма
- C.** хейліт Манганотті
- D.** червоний плоский лишай
- E.** рак нижньої губи

84) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 47-ми років, будівельник. Скаржи на наявність на нижній губі розростання, яке з'явилося 1 місяць тому. Крім естетичного дискомфорту нічим не турбує. Об'єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи - утворення (6 мм у діаметрі, 3 мм - висота) з гладенькою поверхнею синюшно-червоного кольору. Пальпаторно - утворення безболісне, помірно щільної консистенції, без інфільтрату у основі і по периферії утворення. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Який попередній діагноз?

- A.** бородавчастий передрак червоної облямівки
- B.** вірусна бородавка
- C.** кератоакантома
- D.** рак нижньої губи
- E.** піогенна гранульома

85) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Під час операції видалення дермоїдної кісти перенісся хлопчик 14-ти років по-скаржився на запаморочення, нудоту, слабкість. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск - знижений (80/60 рт.ст.), руки холодні. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** непритомність
- B.** травматичний шок
- C.** анафілактичний шок
- D.** колапс
- E.** токсичний шок

86) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 46-ти років скаржиться на швидкоминутий біль і на естетичну неповноцінність

фронтальних зубів. Дефекти почали проявлятися близько 10 років тому. В пришийковій ділянці на вестибулярній поверхні 23, 24, 44, 45 зубів дефекти твердих тканин зубів у вигляді двох площин, які сходяться під кутом у формі клину. Дно і стінки дефектів гладкі, блискучі, краї рівні. Який пломбувальний матеріал доцільно застосувати у даному випадку?

- A.** Гібридний склоіономерний цемент
- B.** Композит хімічного затвердіння
- C.** Силіко-фосфатний цемент
- D.** Композит світлового затвердіння
- E.** Силікатний цемент

87) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дівчинки 6-ти років індекс КПУ+кп дорівнює 3,0. ГІ за Федоровим-Володкіною - 3. У перших постійних молярах визначаються глибокі слабомінералізовані фісури. Який метод є оптимальним для профілактики карієсу у цих зубах?

- A.** Герметизація фісур
- B.** Імпрегнація азотнокислим сріблом
- C.** Аплікації 3% розчину ремодента
- D.** Аплікація 0,2% розчину фурациліну
- E.** Покриття зубів фтористим лаком

88) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 12-ти років тиждень тому переніс ГРВІ. Скарги на біль і свербіж у яснах, кровоточивість під час прийому їжі. На верхній і нижній щелепах ясна гіперемовані, набряклі, кровлять під час до-тику інструментом, індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5 бали, індекс КПУ- 6, про-ба Шилера-Пісарєва позитивна. Який най-більш імовірний діагноз?

- A.** Загострення хронічного катарального гінгівіту
- B.** Хронічний катаральний гінгівіт
- C.** Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
- D.** Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма
- E.** Пародонтит, стадія загострення

89) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 69-ти років скаржиться на су-хість, відчуття печіння в порожнині рота. Протягом останніх двох років користує-ться знімними пластинковими протезами. Слизова оболонка твердого піднебіння та спинки язика яскраво-червоного кольору, гіперемована, набрякла. В межах протезного ложа визначається невелика кіль-кість сіро-білого нальоту, який легко зні-мається. Які засоби використовуються для етіотропного лікування даного захворю-вання?

- A.** Протигрибкові
- B.** Противірусні
- C.** Протизапальні
- D.** Антипротозойні
- E.** -

90) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 68-ми років скаржиться на без-болісне збільшення ясен. В анамнезі: епі-лепсія, тривалий прийом гідантоїну. Об'є-ктивно: ясна на всьому протязі обох щелеп гіпертрофована, щільна, болісна при паль-пації, вкриває коронки зубів до половини їх висоти. Виявлені ясенні кишень

глибиною 5 мм. Який попередній діагноз?

- A.** Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
- B.** Вірусні бородавки
- C.** Фіброматоз ясен
- D.** Гіперпластичний синдром при лейкозі
- E.** Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма

91) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 30-ти років скаржиться на по-стійний різкий біль пульсуючого характеру у ділянці верхньої щелепи зліва, що іррадіює у вухо, скроню, посилюється при гори-зонтальному положенні і змиканні зубів, на безсоння, загальне нездужання. Хворіє третій день, усі прояви наростають. Об'єктивно: у 26 зубі глибока каріозна поро-жнина, перкусія болісна. Зуб рухливий. Слизова оболонка навколо зуба набрякла, гіперемована, перехідна складка з вестибу-лярного боку згладжена, пальпаторно - ін-фільтрат з нечіткими контурами, різко бо-лісний. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий гнійний періостит альвеолярно-го відростка верхньої щелепи у ділянці 26 зуба
- B.** Гострий остеомієліт альвеолярного від-ростка верхньої щелепи у ділянці 26 зуба
- C.** Гострий серозний періостит альвеоляр-ного відростка верхньої щелепи у ділянці 26 зуба
- D.** Гострий періодонтит 26 зуба
- E.** Гострий пульпіт 26 зуба

92) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого 37-ми років був видалений медіальний корінь 36 зуба, а його дисталь-ний У хворого 37-ми років був видалений медіальний корінь 36 зуба, а його дистальний корінь зламався у середній третині. Який інструмент слід обрати для видалення кореня?

- A.** Елеватор під кутом праворуч
- B.** Елеватор під кутом ліворуч
- C.** Прямий елеватор
- D.** Дзьобоподібні щипці, що не сходяться
- E.** Дзьобоподібні щипці, що сходяться

93) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У юнака 17-ти років скарги на незду-жання, лихоманку, болі у ясні. Захворів 2 дні тому, температура тіла - $38,5^{\circ}\text{C}$. Регі-онарні лімфовузли збільшені, болісні, ру-хливі. Ясна на нижній щелепі гіперемова-на, набрякла, ясенні сосочки кровлять, по краю сірувато-білий наліт, сосочки у ділян-ці 41, 42, 43 відсутні. Яка мікрофлора най-більш імовірно буде виявлена при мікроби-ологічному дослідженні?

- A.** Фузо-спірилярний симбіоз
- B.** Стрептококи
- C.** Дифтерійна паличка
- D.** Дріжджеподібні гриби
- E.** Стафілококи

94) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчинка 13-ти років скаржиться на болісність, кровоточивість ясен і запах з рота, які з'явилися близько півроку тому. Об'єктивно: у ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи ясенні сосочки і ясенний край гіпертрофовані, набряклі, ціанотичні. У пришийковій ділянці зубів наявний м'я-кий

наліт. ГІ=3. Лікар провів місцеву про-тизапальну терапію. Яке місцеве лікування слід провести у подальшому?

- A.** Повна професійна гігієна порожнини рота
- B.** Кюретаж кишень
- C.** Гінгівотомія
- D.** Фізіотерапія
- E.** Вестибулопластика

95) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Лікар-стоматолог проводить лікування карієсу в 37 зубі (I клас за Блеком) у пацієнта 18-ти років. Об'єктивно: у дистальній фісурі 37 визначається невелика каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим розм'якшеним дентином, решта фісур "закриті", глибокі, важкодоступні, пігментовані. Оберіть оптимальну тактику лікування 37 у даному випадку:

- A.** Профілактичне пломбування з інвазивним закриттям фісур
- B.** Метод "профілактичного розширення" за Блеком
- C.** ART-методика препарування і пломбування
- D.** Профілактичне пломбування з неінвазивним закриттям фісур
- E.** Щадне препарування за принципом "біо-логічної доцільності" Лукомського

96) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Вагітна (36 тижнів) скаржиться на кро-воточивість ясен, рясне утворення зубно-го нальоту, незважаючи на ретельний гі-гієнічний догляд за порожниною рота. Об'єктивно: ясеневі сосочки і маргінальний край ясен пухкі, кровоточать під час дотику. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,7 бали. Яку пасту слід ре-комендувати цій хворій після проведення професійної гігієни порожнини рота?

- A.** Що містить хлоргексидин
- B.** Що містить мінералізуючі препарати
- C.** Що містить рослинні препарати
- D.** Фторвмісну
- E.** Гелеву

97) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий висловлює скарги на відсутність зубів, естетичний дефект. Об'єктивно: при-сутні 46, 43, 32, 33, 37. Зуби стійкі, корені не оголені, 46, 37 зуби мають низькі клінічні коронки, горби і екватор не виражені. Яка конструкція протеза найбільш раціональна у даному випадку?

- A.** Дуговий з телескопічними коронками
- B.** ЧЗПІ
- C.** Дуговий з опорно-утримуючими кламе-рами
- D.** Штамповано-паяний мостоподібний
- E.** Піднебінна пластинки з вестибулярною дугою

98) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого планується розтин абсцеду-ючого фурункула верхньої губи. Який вид анестезії показаний для проведення даного втручання?

- A.** Двобічна інфраорбітальна
- B.** Двобічна інфраорбітальна та різцева
- C.** Двобічна інфраорбітальна та палати-нальна

- D. Двобічна туберальна та палатинальна
- E. Двобічна палатинальна

99) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дитини 14-ти років двобічний пере-лом нижньої щелепи у ділянці ментальних отворів. На фоні переломів наростає клі-ніка порушення дихання, аж до ядухи. Яка причина розвитку асфіксії?

- A. Зміщення кореня язика з фрагментом нижньої щелепи дозад
- B. набряк слизової порожнини рота
- C. Формування гематоми дна порожнини рота
- D. Рясне слиновиділення
- E. наявність сторонніх тіл у порожнині рота

100) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дівчинки 5-ти років діагностовано загострення хронічного періодонтиту 75 зуба. Дитина страждає на хронічний гломерулонефрит. Визначте лікувальну тактику:

- A. Видалення 75 зуба
- B. Ендодонтичне лікування 75 зуба
- C. Ендодонтичне лікування 75 зуба та пері-остотомія
- D. Ендодонтичне лікування 75 зуба та при-значення протизапальної терапії
- E. Видалення 75 зуба та періостотомія

101) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До хірурга-стоматолога звернулись ба-тьки хлопчика 5-ти років через наявність лійкоподібного шкірного поглиблення, яке знаходиться попереду основи великого за-витка вухної раковини. На дні цього по-глиблення відмічається норицевий отвір, з якого при натисканні на козелок вуха виді-ляється густа слизоподібна речовина. Який попередній діагноз?

- A. Парааурикулярна нориця
- B. Бічна кіста шиї
- C. Дермоїдна кіста
- D. Присередня нориця шиї
- E. Бічна нориця шиї

102) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Лікар стоматолог-ортопед, що має стаж роботи 7 років 6 місяців, за відповідності професійному стандарту, одержав I кваліфікаційну категорію. Яким повинен бути стаж роботи згідно затверджених нормативів для наступної атестації?

- A. 10 років
- B. 8 років
- C. 9 років
- D. 12 років
- E. 15 років

103) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчику 5-ти місяців з двобічним незрощенням верхньої губи планується хейлопластика. Який вид знеболювання потрібно застосувати при цьому оперативному

втручанні?

- A. Ендотрахеальний наркоз з інтубацією через рот
- B. Ендотрахеальний наркоз з інтубацією через ніс
- C. Ендотрахеальний наркоз з інтубацією через трахеостому
- D. Масковий наркоз
- E. Місцеве потенційоване знеболювання

104) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки дитини 6-ти років звернулися зі скаргами на припухлість у нього у навколоушно-жувальній ділянці справа, сухість у роті, підвищення температури тіла до $37,6^{\circ}\text{C}$. Близько 6 місяців тому спостерігалися подібні явища. Об'єктивно: горбистий, малоболісний інфільтрат у правій навколоушно-жувальній ділянці. Слина в'язка, з протоки правої слинної залози виділяється невелика кількість секрету з білуватими включеннями. Встановіть діагноз:

- A. Загострення хронічного паренхіматозного паротиту
- B. Гострий гнійний паротит
- C. Змішана пухлина слинної залози
- D. Епідемічний паротит
- E. Псевдопаротит Герценберга

105) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Пацієнт 70-ти років звернувся до ортопеда-стоматолога зі скаргами на повну відсутність зубів. Об'єктивно: має місце незначна рівномірна атрофія альвеолярного відростка нижньої щелепи, яка вкрита слизовою оболонкою помірної піддатливості. Який тип беззубої щелепи за класифікацією Келера характеризується даними ознаками?

- A. Перший
- B. Третій
- C. П'ятий
- D. Другий
- E. Четвертий

106) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого 33-х років під час препарування зубів без анестезії раптово виникло запаморочення, нудота, різке збліднення обличчя, легкий ціаноз губ, короткочасна втрата свідомості. Який невідкладний стан виник у пацієнта?

- A. Колапс
- B. Непритомність
- C. Стенокардія
- D. Гіпертонічний криз
- E. Інфаркт міокарда

107) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий звернувся зі скаргами на наявність безболісного пухлиноподібного новоутворення на нижній щелепі. Пальпаторно визначається симптом Дюпюїтрена. Коронка 36 зуба з глибокою каріозною порожниною. На Ro-грамі - ділянка деструкції кісткової тканини з чіткими межами, розташована у ділянці верхівок коренів 36 зуба, розміром - 2x2 см. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Радикулярна кіста нижньої щелепи
- В. Остеобластокластома
- С. Кератокіста нижньої щелепи
- Д. Фолікулярна кіста нижньої щелепи
- Е. Амелобластома нижньої щелепи

108) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 29-ти років скаржиться на короткочасний біль в області передніх зубів від температурних, механічних і хімічних подразників. Страждає на захворювання щитоподібної залози. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів дефекти, по краям емаль крейдяного кольору, шорстка, підвищеної ламкості, відколюється екскаватором. Дентин пігментований. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Некроз твердих тканин зуба
- В. Ерозія твердих тканин зуба
- С. Клиноподібний дефект
- Д. Гострий середній карієс
- Е. Гіпоплазія емалі

109) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого на цукровий діабет 29-ти років після ін'єкції 30 ОД інсуліну виникло короткочасне збудження, після чого знепритомнів. Яка найбільш імовірна причина?

- А. Гіпоглікемічна кома
- В. Інсульт
- С. Гіперглікемічна кома
- Д. Інфаркт міокарда
- Е. Кетоацидотична кома

110) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого після контакту з хімічними речовинами на виробництві раптово виникло стридорозне дихання, осиплість голосу, "гавкаючий" кашель, стала зростати задишка. Об'єктивно: акроціаноз. Який попередній діагноз?

- А. набряк гортані
- В. Рак гортані
- С. ТЕЛА
- Д. Ателектаз легень
- Е. Пневмоторакс

111) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 15-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на припухлість верхньої губи, біль, загальну слабкість, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$. Припухлість з'явилась 3 доби тому після видавлювання гнійничка. Об'єктивно: набряк тканин верхньої губи, шкіра гіперемована. Визначається щільний інфільтрат - 1,0x2,0 см, болючий під час пальпації, в центрі якого наявна гнійна кірка. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Фурункул верхньої губи
- В. Карбункул верхньої губи
- С. Абсцес верхньої губи
- Д. Дермоїдна кіста

Е. Атерома верхньої губи

112) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Чоловік 60-ти років із повною відсутністю зубів. Користується протезами 15 років. Об'єктивно: нижня третина обличчя знижена, альвеолярні відростки на верхній та нижній щелепах різко атрофовані, піднебіння пласке, торус різко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована, без підслизового шару. Який відбиток і який матеріал доцільно використати у даному випадку?

- А.** Функціональний декомпресійний дента-флексом
- В.** Повні анатомічні гіпсом
- С.** Повні анатомічні стомальгіном
- Д.** Функціональний компресійний стенсом
- Е.** Функціональний диференційований репі-ном

113) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Пацієнтка 40-ка років звернулася з метою протезування 12, 13 зубів. Зуби 12, раніше ліковані, мають рожеве забарвлення. Після обстеження вибрана конструкція металокерамічних коронок, протипоказань для застосування не виявлено. Який матеріал для отримання робочого відбитка необхідно використати?

- А.** Спідекс
- В.** Репін
- С.** Гіпс
- Д.** Стомальгін
- Е.** Ортокор

114) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 53-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних подразників. Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, корені оголені до 1/3 довжини. Незначна кількість зубних відкладень. В 15, 14, 24 зубах - клиноподібні дефекти. Зондування оголених шийок та дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз?

- А.** Пародонтоз I ступеня важкості
- В.** Катаральний гінгівіт
- С.** Пародонтит II ступеня важкості
- Д.** Пародонтит I ступеня важкості
- Е.** Виразковий гінгівіт

115) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 23-ти років скаржиться на біль в яснах, що посилюється при прийомі їжі, неприємний запах з рота, погане самопочуття. Температура тіла - 37°C. Занедужав 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, легко кровоточить при зондуванні. По ясенному краю в ділянці 36, 37 і 38 зубів - виразки, вкриті брудно-сірим нальотом. Значні зубні відкладення. У мазку - фузо-спірилярна флора. Який остаточний діагноз?

- А.** Виразковий гінгівіт
- В.** Гіпертрофічний гінгівіт
- С.** Фіброматоз ясен
- Д.** Генералізований пародонтит
- Е.** Катаральний гінгівіт

116) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 39-ти років звернувся зі скаргами на неприємний запах з рота, кровото-чність та болочність ясен, рухомість зубів. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, нижні фронтальні зуби рухомі, I-II ступінь рухомості. Пародонтальні кишені 4-5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
- B.** Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
- C.** Генералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг
- D.** Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
- E.** Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг

117) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 30-ти років скаржиться на біль у зубі при вживанні гарячого і холодно-го, який іррадіює у вухо, скроню. Раніше в цьому зубі турбував самовільний нічний біль. Об'єктивно: в 37 зубі на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, що в одній точці сполучається з порожниною зуба. Реакція на зондування в точці сполучення, на холодний подразник різко болісна, біль довго не вщухає. ЕОД- 55 мкА. Визначте діагноз:

- A.** Загострення хронічного пульпіту
- B.** Гострий дифузний пульпіт
- C.** Гострий гнійний пульпіт
- D.** Хронічний конкрементозний пульпіт
- E.** Загострення хронічного періодонтиту

118) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 17-ти років скаржиться на біль в зубі, який виник вперше. Тривалість болю до 2 хвилин. Об'єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина. Зондування дна чу-тливе. Перкусія безболісна. ЕОД- 12 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гіперемія пульпи
- B.** Гострий обмежений пульпіт
- C.** Гострий дифузний пульпіт
- D.** Гострий періодонтит
- E.** Загострення хронічного пульпіту

119) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнтка 22-х років звернулася до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Під час огляду ротової порожнини виявлено дефект твердих тканин у пришийковій ділянці в межах плащового дентину у 22 зубі. Дентин щільний, пігментований. Реакція на перкусію та зондування відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Хронічний середній карієс
- B.** Клиноподібний дефект
- C.** Гострий глибокий карієс
- D.** Гострий середній карієс
- E.** Некроз твердих тканин зуба

120) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчик 10-ти років скаржиться на на-явність болючої виразки в роті, яка збіль-шується і не гоїться вже 1,5 місяці, Об'є-ктивно: на слизовій щоки неглибока вираз-ка діаметром 2 см з нерівними підритими краями, м'якої консистенції. Дно виразки горбисте, вкрите жовто-сірим нальотом. Навколо виразки багато дрібних горбиків жовтуватого кольору. Регіонарні лімфати-чні вузли еластичні, болісні, спаяні в паке-ти. Проявом якого захворювання можуть бути дані симптоми?

- A.** Туберкульоз
- B.** Червоний плесканий лишай
- C.** Виразково-некротичний стоматит
- D.** Рак
- E.** Сифіліс

121) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 35-ти років скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи при спробі закрити рот. Травма сталась внаслідок по-биття невідомим. Об'єктивно: при пальпа-ції альвеолярний паросток верхньої щеле-пи рухомий з обох боків, позитивний сим-птом Малевича та симптом "навантажен-ня", на рентгенограмі лінія перелому ви-значається у ділянці нижньої стінки груше-подібного отвору, вилично-альвеолярних гребенів, зниження прозорості верхньоще-лепних пазух. Який найбільш імовірний ді-агноз?

- A.** Перелом верхньої щелепи за Le Fort I (нижній тип)
- B.** Перелом кісток носа
- C.** Перелом альвеолярного відростка верх-ньої щелепи зліва
- D.** Перелом верхньої щелепи за Le Fort II (середній тип)
- E.** Перелом верхньої щелепи за Le Fort III (верхній тип)

122) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік віком 30-ти років скаржиться на біль, відчуття тяжкості і розпирання в правій половині обличчя, закладеність носа справа та загальну слабкість. За ти-ждень до цього відмічав сильний біль в 15 зубі. Об'єктивно: обличчя дещо асиметри-чне за рахунок припухлості підочноямко-вої та щічної ділянок справа. 15 зуб зруй-нований на 2/3 коронки, перкусія різко бо-лісна. На оглядовій рентгенограмі спосте-рігається затемнення правої верхньощеле-пної пазухи різного ступеня інтенсивності. Верхівка кореня 15 зуба з ознаками хроні-чного періодонтиту. Який попередній діа-гноз?

- A.** Гострий правобічний одонтогенний гай-морит від 15 зуба
- B.** Одонтогенна флегмона підочної ділянки справа від 15 зуба
- C.** Одонтогенна флегмона щічної ділянки справа від 15 зуба
- D.** Хронічний правобічний одонтогенний гайморит від 15 зуба
- E.** Гострий гнійний одонтогенний періостит від 15 зуба

123) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 48-ми років скаржиться на порушення рухливості нижньої щелепи. Захворювання розпочалось поступово з погіршення рухливості, скутості рухів ни-жньої щелепи. На рентгенограмі СНЩС справа та зліва з відкритим та закритим ротом виявлені екзофіти на суглобових по-верхнях. Це характерно для такого захво-рювання:

- A.** Артроз
- B.** Гострий артрит
- C.** Хронічний артрит
- D.** Невралгія II гілки трійчастого нерву

Е. Внутрішньосуглобовий вивих

124) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворої встановлено попередній діагноз: слино-кам'яна хвороба з локалізацією каменя в слинній залозі. Оберіть метод дослідження для виявлення рентгеннегативних каменів слинних залоз?

А. УЗ-діагностика

В. Реографія

С. Комп'ютерна рентгенографія

Д. Прицільна рентгенографія

Е. Термометрія

125) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У 6-річної дитини біль у зубі і припухлість обличчя зліва. Об'єктивно: стан задовільний, температура тіла - $37,5^{\circ}\text{C}$. Обличчя асиметричне через колатеральний набряк м'яких тканин щічної і підще-лепної ділянок зліва. У 74 зубі пломба, перкусія болісна, рухливість I ступеня. Перехідна складка у 74, 75 згладжена, слизова гіперемована. Який попередній діагноз?

А. Гострий серозний періостит

В. Гострий гнійний періостит

С. Одонтогенний остеомиєліт

Д. Гострий гнійний пульпіт 74 зуба

Е. -

126) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки дитини 3-х років скаржаться на появу у неї болісних висипань і відмову від їжі. Під час огляду: на шкірі навколоротової ділянки - 10 пухирців з геморагічним вмістом. На слизовій оболонці губ - декілька афт округлої форми, діаметром 1-3 мм. Визначаються гострий катаральний гінгівіт і підщелепний лімфаденіт. Оберіть засоби для етіотропного лікування:

А. Противірусні

В. Протизапальні

С. Протигрибкові

Д. Гіпосенсибілізуючі

Е. Антибіотики

127) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік 36-ти років скаржиться на свербіж, почервоніння, наявність висипки на губах та шкірі. Об'єктивно: червона облямівка губ, прилегла шкіра та куточки рота гіперемовані, набряклі. На їх фоні визначаються дрібні пухирці з серозним ексудатом, деякі зливаються між собою, деякі зруйновані і вкриті кірочками. Наявне мокноття. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Гострий екзематозний хейліт

В. Актинічний хейліт, ексудативна форма

С. Контактний алергічний хейліт

Д. Хронічний рецидивуючий герпес

Е. Екскліатичний хейліт, ексудативна форма

128) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчина 18-ти років звернулася до сто-матолога з метою контролю якості герме-тизації фісур, яка була проведена рік тому. Об'єктивно: у 17, 16, 26, 27, 37 і 47 зубах - герметик повністю зберігся. У 36 і 46 - си-лант не виявлений, у дистально-поздовжніх фісурах цих зубів при зондуванні визначається розм'якшена емаль. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 2,5 бали. Яка тактика лікаря-стоматолога у відношенні і 46 у даному клінічному випадку?

- A.** Профілактичне пломбування
- B.** Повторна неінвазивна герметизація
- C.** Інвазивна герметизація
- D.** Аплікації фторвмісним гелем
- E.** Електрофорез з кальційвмісним розчи-ном

129) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

В процесі лікування 11 зуба з приводу пульпіту стоматолог проводить obturaцію кореневого каналу методом бічного ущільнення холодної гутаперчі. Оберіть інстру-мент для конденсації у каналі гутаперчі у даному випадку:

- A.** Спредер
- B.** Вертикальний конденсатор
- C.** Гутта-конденсор
- D.** Плагер
- E.** Ендодонтичний зонд

130) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Лікар-стоматолог закінчує розширен-ня кореневого каналу 32 зуба у чолові-ка 45-ти років, використовуючи для цього "Step Back"-техніку. Апікальна частина ка-налу розширена до 30 розміру файла. Для вирівнювання стінок кореневого каналу лі-кар використав обертальні рухи Н-файла розміру. У процесі роботи відбувся від-лам інструменту. Яка помилка допущена лікарем у процесі роботи?

- A.** Не дотримано техніки роботи інструмен-том
- B.** Неправильно обраний розмір файла
- C.** Цей етап не передбачає роботу з Н-файлом
- D.** При цій методиці Н-файл не використо-вується
- E.** Неправильно обраний метод інструмен-тальної обробки каналу

131) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Лікар-стоматолог проводить ендодон-тичне лікування 12 зуба з приводу хроні-чного періодонтиту. Рентгенологічно в ді-лянці верхівки кореня 12 визначається осе-редок деструкції розміром - 0,3x0,4 см без чітких контурів. Виберіть оптимальний ма-теріал для використання в якості силеру у даній клінічній ситуації:

- A.** Із вмістом гідроксиду кальцію
- B.** На основі резорцин-формалінової смоли
- C.** На основі епоксидних смол
- D.** Склоіономірний цемент
- E.** Цинкооксидевгенольний цемент

132) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік 35-ти років знаходиться на лі-куванні у хірурга-стоматолога з приводу гострого одонтогенного остеомієліту ни-жньої щелепи. З метою контролю яко-сті лікування і визначення

подальшої тактики планується проведення контрольно-го рентгенологічного дослідження. У які терміни від початку захворювання необхідно виконувати вказане дослідження цього хворому для виявлення ознак деструкції кісткової тканини?

- A.** До кінця 2-го тижня
- B.** Через 2-3 дні
- C.** Через 4-5 днів
- D.** Через тиждень
- E.** Через місяць

133) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До хірурга-стоматолога звернувся пацієнт зі скаргами на болі і припухлість у ділянці верхньої губи і нижніх відділів піддочноротової ділянки зліва, періодичний біль у зруйнованому 22 зубі. Після проведеного обстеження встановлений діагноз: загострення хронічного періодонтиту 22 зуба, абсцес іклової ямки. Показана операція: видалення 22 зуба, розтин абсцесу внутрішньоротовим доступом. Оберіть оптимальний метод анестезії:

- A.** Інфраорбітальна (позаротовий метод) і різнцева анестезія
- B.** Інфраорбітальна (внутрішньоротовий метод) і піднебінна анестезія
- C.** Туберальна і піднебінна анестезія
- D.** Інфільтраційна анестезія
- E.** Наркоз

134) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До клініки звернулися батьки з дівчинкою 9-ти років. При клінічному обстеженні виявлено: перекриття нижніми зубами верхніх середніх, піднебінне положення верхніх фронтальних зубів, нормальний розвиток фронтальної і бокових ділянок нижньої щелепи. Який апарат для лікування слід застосувати?

- A.** Капа Биніна
- B.** Апарат Френкеля II типу
- C.** Апарат Бабаскіна
- D.** Апарат Андресена-Гойпля
- E.** Платівку на верхню щелепу з петлями Рудольфа

135) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

В амбулаторному хірургічному кабінеті хворому видаляють 36 зубів. Після проведення анестезії лікар почав працювати елеватором. Одразу після цього у пацієнта було помічено збліднення обличчя, він почав скаржитися на запаморочення, шум у вухах, потемніння в очах, почав сповзати в кріслі. Поставте найбільш імовірний діагноз:

- A.** Непритомність
- B.** Анафілактичний шок
- C.** Колапс
- D.** Шок
- E.** Гіпоглікемічна кома

136) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

У хворого 56-ти років діагностовано перелом нижньої щелепи, який неправильно зрісся. Об'єктивно: на нижній щелепі наявні 48, 36, 35, 34 зуби, стійкі, інтактні, нерухомі. На верхній щелепі мостоподібні протези з опорою на 17, 15, 13, 24, 25, 27 зуби. Спостерігається перехресний

прикус. Який протез необхідно виготовити?

- А. Виготовити знімний протез з подвійним зубним рядом
- В. Частковий знімний пластинковий протез
- С. Бюгельний протез
- Д. Протезування на імплантах незнімною конструкцією
- Е. Протезування на імплантах знімною конструкцією

137) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

У клініку ортопедичного відділення звернувся пацієнт 43-х років із скаргами на неможливість пережовування їжі. Діагно-стовано хронічний генералізований паро-донтит середньої важкості, патологічна ру-хомість зубів 1-2 ступеня. Лікар-стоматолог вирішив використати для лікування вибір-кове пришліфовування зубів. Яку оклюзію передбачається створити у пацієнта?

- А. Ковзна з рівномірними контактами всіх зубів
- В. Центральна
- С. Захищена іклами
- Д. Бокова ліва
- Е. Задня

138) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

У хворого 75-ти років діагностовано перелом нижньої щелепи справа в ділян-ці ментального отвору. Об'єктивно: на ни-жній і верхній щелепах відсутні всі зуби. Зміщення уламків немає. Відкривання ро-та вільне до 3,5 см. Яку шину потрібно ви-готовити?

- А. Шину Порта
- В. Апарат Збаржа
- С. Шина Ванкевич
- Д. Шина Васильєва
- Е. Апарат Рудько

139) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 32-х років скаржиться на наяв-ність білих і пігментованих плям на зубах. Мешкає в місцевості із вмістом фтору у питній воді - 1,7 мг/л. Був поставлений ді-агноз: флюороз, крейдяно-крапчаста фор-ма. Використання яких паст показане в да-ній ситуації?

- А. Кальційфосфатвмісні
- В. Фторвмісні
- С. Високоабразивні
- Д. Що містять рослинні екстракти
- Е. Триклозанвмісні

140) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У щелепно-лицеве відділення посту-пи-ла дитина віком до 1-го року з вродженою вадою обличчя. Об'єктивно виявлено сере-динне незрощення м'якого та твердого під-небіння, яке доходить до різцевого отвору, леміш розташований посередині. Комір-ковий відросток та тканини верхньої губи без деформацій. Встановіть діагноз:

- А. Ізольоване повне незрощення твердого та м'якого піднебіння
- В. Комбіноване незрощення піднебіння
- С. Ізольоване неповне незрощення твердо-го та м'якого піднебіння
- Д. Приховане незрощення твердого та м'якого піднебіння
- Е. Повне незрощення м'якого та неповне незрощення твердого піднебіння

141) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки 3-річної дитини скаржаться на руйнування зубів верхньої щелепи. Об'єктивно: на жувальних поверхнях 54, 55 зубів виявлені каріозні порожнини у межах емалево-дентинного сполучення. Емаль в ділянці ураження розм'якшена, легко видаляється екскаватором. Дитина відмовляється від препарування, її психоемоційний стан нестабільний. Який метод лікування слід запропонувати у даному випадку?

- А. ART-методика
- В. Ремінералізуюча терапія
- С. Покриття фтор-лаком
- Д. Інвазивна герметизація
- Е. Неінвазивна герметизація

142) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До лікаря-стоматолога звернулася 12-річна дівчинка зі скаргами на самовільний, нападоподібний біль із короткочасними безболівовими проміжками, тривалістю 10-20 хв., у ділянці 16 зуба, який посилюється вночі при горизонтальному положенні тіла, що виник 2 доби тому. При об'єктивному обстеженні 16 зуба виявлено глибоку каріозну порожнину, заповнену розм'якшеним дентином. Зондування болісне по всьому дну, вертикальна перкусія злегка болісна, біль посилюється від температурних подразників, електростимуляція пульпи - 15-20 мкА. Встановіть діагноз:

- А. Гострий дифузний пульпіт
- В. Хронічний конкрементозний пульпіт
- С. Гострий обмежений пульпіт
- Д. Частковий дифузний пульпіт
- Е. Хронічний фіброзний пульпіт

143) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 12-ти років скаржиться на кро-воточивість, виражений біль в яснах і рухливість нижніх фронтальних зубів. Страждає цукровим діабетом з 5 років. Об'єктивно: ясна гіперемовані, міжзубні сосочки набряклі, розпушені, зуби рухливі, пародонтальні кишечки до 5 мм з гнійним вмістом. На рентгенограмі альвеолярного паростку у ділянці нижніх фронтальних зубів визначається деструкція компактної пластинки та губчастої речовини міжзубних перегородок до 1/3 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Генералізований пародонтит, загострення
- В. Локалізований пародонтит, хронічний перебіг
- С. Локалізований пародонтит у стадії загострення
- Д. Генералізований пародонтит, хронічний перебіг
- Е. Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг

144) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У пацієнта 18-ти років на жувальній поверхні 36 зуба виявлено пляму білого кольору без блиску. Який додатковий метод обстеження доцільно провести?

- А. Кольорові тести з барвниками
- В. ЕОД
- С. Визначення індексів гігієни
- Д. Проба Олдріча
- Е. Рентгенографія

145) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 24-х років з'явився для видалення 47 зуба з приводу загострення хро-нічного періодонтиту. Укажіть кращий ме-тод периферійної провідникової анестезії:

- A. Торусальна
- B. Інфільтраційна
- C. Позаротова мандибулярна
- D. Ментальна
- E. Плексуальна

146) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Лікар проштовхнув корінь у прище-лепові м'які тканини. Корінь розташував-ся під слизовою оболонкою альвеолярної частини щелепи і чітко пропальповується пальцем. Яка тактика лікаря?

- A. Зробити розтин м'яких тканин над коре-нем та видалити його
- B. Видалити корінь через комірку зуба
- C. Видалити корінь через підщелеповий оперативний доступ
- D. Зробити рентгенологічне обстеження хворого для визначення подальшої тактики
- E. Залишити корінь в м'яких тканинах

147) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Була проведена піднебінна анестезія. При виведенні голки з м'яких тканин вини-кла кровотеча. Що необхідно зробити для зупинки кровотечі?

- A. Притиснути тампоном місце ін'єкції
- B. Накласти шви
- C. Ввести внутрішньовенно 10% розчин хлористого кальцію
- D. Ввести внутрішньом'язово вікасол
- E. Перев'язати зовнішню сонну артерію

148) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

На амбулаторному хірургічному при-йомі треба провести хірургічне втручан-ня, яке потребує знеболювання. Що в пер-шу чергу повинен зробити лікар, перш ніж проводити анестезію?

- A. Провести алергічну пробу
- B. Зробити загальний аналіз крові
- C. Направити хворого до терапевта
- D. Зробити рентгенограму
- E. -

149) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий скаржиться на безболісне но-воутворення на нижній губі, що з'явилося 2 тижні тому після травми. Об'єктивно: без-болісне, пружне новоутворення. Який най-більш імовірний діагноз?

- A. Ретенційна кіста малої слинної залози
- B. Декубітальна виразка
- C. Поліп
- D. Трофічна виразка
- E. Епуліс

150) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До стоматолога звернулася пацієнтка 23-х років зі скаргами на підвищення тем-ператури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, головний біль, загальну слабкість, болісність при прийому їжі, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Об'єктивно: ясенний край виглядає начебто зрізаний, з нерівними контурами; поверхня його вкрита сірувато-жовтим нальотом, що легко знімається; при знятті оголюються ерозії та виразки, що кровоточать. У зскрібку з поверхні виразок виявляється велика кількість веретеноподібних фузобактерій та спірохет. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Виразково-некротичний стоматит Венсана

B. Третинний сифіліс

C. Цукровий діабет

D. Гострий лейкоз

E. Хвороба Верльгофа

151) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора із різаною раною щічної області звернулася до лікаря. Отримала побутову травму 4 доби тому, по медичну допомогу не зверталася. Об'єктивно: загоєння проходить шляхом поступового заповнення ранової порожнини, що містить гній, грануляційною тканиною з подальшими епіталізацією й утворенням рубця. Який вид загоєння має місце?

A. Вторинне натягнення

B. Первинне і вторинне натягнення

C. Комбінований

D. Третинне натягнення

E. Первинне і третинне натягнення

152) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора звернулася зі скаргами на сильні болі в ділянці верхньої щелепи, що посилюються від гарячої їжі, біль при накушуванні та полегшення болю від дії холодної рідини. Об'єктивно: в 24 зубі каріозна порожнина заповнена розм'якшеним дентином, зондування дна різко болісне, перкусія позитивна. ЕОД- 50 мкА. Який метод лікування слід застосувати для даного зуба?

A. Вітальна екстирпація

B. Вітальна ампутація

C. Девітальна екстирпація

D. Комбінований метод

E. Біологічний метод

153) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

На етапі кваліфікованої медичної допомоги під час сортування постраждалих у хворого за допомогою дозиметра виявлено значне радіоактивне забруднення рани щелепно-лицевої ділянки. Які дії лікаря?

A. Багаторазове промивання рани, видалення сторонніх тіл

B. Подальше скерування на спеціалізовану допомогу

C. Прошивання рани

D. Дренування рани

E. Електрофорез рани

154) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчика 5-ти років госпіталізовано в стаціонар щелепно-лищевої хірургії. При огляді і пальпації виявлено болючу "кульку", яка рухома, не спаяна з підлеглими тканинами, розміром - 1,5 см в діаметрі, яка з'явилась один тиждень тому. Шкіра над нею в кольорі не змінена, береться в складку. З анамнезу відомо, що дитина перенесла ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий серозний неодонтогенний лімфаденіт
- B.** Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт
- C.** Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт
- D.** Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт
- E.** Бічна кіста шиї

155) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитину 15-ти років скеровано на рентгенологічне обстеження у зв'язку з терапевтичним лікуванням 46 зуба. На рентгенограмі: періапикальних змін в ділянці коренів 46 зуба не виявлено; в ділянці кореня 45 зуба виявлено однорідну щільну тінь округлої форми з чіткими межами, діаметром - 5 мм. Новоутворення по структурі подібне до тканин кореня зуба. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Цементома
- B.** Одонтома
- C.** Гігантоклітинний епуліс
- D.** Амелобластома
- E.** Остеома

156) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До лікаря-стоматолога хірурга звернулися батьки 17-річного підлітка зі скаргами на новоутворення на верхній губі зліва, яке з'явилося кілька місяців тому. Об'єктивно: бородавкоподібне розростання на ніжці, чітко відмежоване від оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує "цвітну капусту". Який попередній діагноз?

- A.** Папілома
- B.** Вульгарна бородавка
- C.** Бородавчастий передрак
- D.** Шкірний ріг
- E.** Фіброма

157) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 42-х років звернувся у клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об'єктивно: відсутні 34, 35, 36, 43, 16 зуби. На етапі обстеження проведено огляд обличчя пацієнта: виділяється високий та широкий лоб, обличчя нагадує піраміду, спрямовану основою догори. До якого типу можна віднести дану форму обличчя?

- A.** Церебральний
- B.** Дигестивний
- C.** Респіраторний
- D.** Змішаний
- E.** М'язовий

158) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 45-ти років скаржиться на біль та хрускіт в ділянці СНЩС підчас рухів нижньої щелепи. Об'єктивно: обличчя симетричне, рот відкривається з невеликим зміщенням вліво. Зубні ряди збережені. Для уточнення діагнозу було проведене рентгенологічне дослідження СНЩС. Який вид рентгенологічного обстеження буде най-більш інформативний?

- A.** Комп'ютерна томографія СНЩС
- B.** Ортопантомографія
- C.** Рентгенографія по Парма
- D.** Рентгенографія по Шуллеру
- E.** Рентгенографія по Шульцу

159) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 45-ти років звернувся у клініку ортопедичної стоматології у зв'язку з неможливістю закрити рот. Під час проведення комп'ютерної томографії не виявлено контакту між суглобовими поверхнями СНЩС. Який діагноз найбільш імовірний?

- A.** Повний вивих суглобової головки
- B.** Підвивих суглобової головки
- C.** Деформуючий артроз
- D.** Хронічний артрит
- E.** Анкілоз

160) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 46-ти років скаржиться на металевий присмак у роті, відчуття печіння і сухість на кінчику і бічних поверхнях язика та нижній губі. Ці явища виникли після заміни мостоподібних протезів на нижній щелепі. Об'єктивно: слизова оболонка нижньої губи, кінчика язика яскраво червона, розпушена, малозволожена, на слизовій оболонці нижньої губи біля 43 зуба - вкраплення сірого кольору. Паяні мостоподібні протези з опорою на 45, 43, 41, 31, 33, 35 припасовані бездоганно. Яке з обстежень необхідно для підтвердження діагнозу?

- A.** Визначення електропотенціалів порожнини рота
- B.** Аналіз крові на цукор
- C.** Клінічний аналіз крові
- D.** Цитологічне дослідження з язика та нижньої губи
- E.** Обстеження у невропатолога

161) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 25-ти років, кореспондент, скаржиться на мимовільний нападаподібний біль в лівій скроні. Біль спонтанно виникає ввечері. Інколи біль виникає при нахилі голови, при злетах та посадках літака. Об'єктивно: всі зуби інтактні. Оголення шийок 24 і 36 зубів. Перкусія 24 дає слабо-виразний біль. Для встановлення діагнозу необхідно провести таке дослідження:

- A.** Рентгенографія зубів лівої половини обох щелеп
- B.** ЕОД зубів лівої половини обох щелеп
- C.** Термодіагностика 24 і 36
- D.** Діагностична блокада II гілки n.V
- E.** Діафаноскопія

162) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 25-ти років, кореспондент, скаржиться на мимовільний нападаподібний біль в лівій скроні. Біль спонтанно виникає ввечері. Інколи біль виникає при нахилах голови, при злетах літака. Об'є-

ктивно: всі зуби інтактні; оголення шийок і 36 зубів. Перкусія 24 дає слабковиразний біль. На рентгенограмі 24 в центральній частині коронкової порожнини визна-чається дентинової щільності утворення - 0,5x0,5 мм. Запропонуйте метод лікування:

- A.** Вігальна екстирпація пульпи 24
- B.** Курс новокаїнової блокади з вітаміном B₁
- C.** Вігальна ампутація 24
- D.** Електрофорез з йодидом калію в проєкції верхівки 24
- E.** Реміналізуюча терапія пришийкових ділянок 24 і 36

163) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворої 39-ти років під час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квінке з наростанням явищ асфіксії. Які дії лікаря стоматолога необхідні для попередження стенотичної асфіксії?

- A.** Проведення трахеостомії
- B.** Введення десенсибілізуючих засобів
- C.** Введення глюкокортикоїдів
- D.** Введення адреноміметиків
- E.** Проведення штучного дихання

164) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Постраждалий доставлений у приймальне відділення після ДТП у непритомному стані у положенні на спині. Відмічається синюшність шкірних покривів, утруднене дихання, блідість слизових оболонок, у порожнині рота згустки крові. Встановлено діагноз: двобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням фрагментів. Яка асфіксія виникла у постраждалого?

- A.** Дислокаційна
- B.** Аспіраційна
- C.** Стенотична
- D.** Клапанна
- E.** Обтураційна

165) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого ретенований, дистопований зуб "мудрості" зліва. Впродовж 6 місяців зуб періодично турбував хворого, виникали біль і запальні процеси. В даний час боль відсутній, рот відкриває вільно, при огляді видно медіальні горби атипово розташованого 48 зуба. На рентгенограмі нижньої щелепи справа видно дистопований зуб, коронка якого упирається в ділянку зуба. Які дії лікаря?

- A.** Операція - атипове видалення 48 зуба
- B.** Висікання "каптура" над 48 зубом
- C.** Ортодонтичне лікування
- D.** Спостереження
- E.** Видалення 47 зуба

166) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчик 10-ти років скаржиться на біль у верхньому зубі справа, який посилюється при накушуванні на 65 зуб. Біль з'явився 2 дні тому. Раніше зуб був лікований. Об'єктивно: коронка 65 зуба змінена в кольорі, зруйнована на 2/3, перкусія різко болюча. Слизова оболонка в ділянці проєкції верхівок кореня 65 зуба гіперемована, пальпація болісна. Який з наступних діагнозів найбільш імовірний?

- A.** Загострення хронічного періодонтиту
- B.** Гострий гнійний періостит верхньої ще-лєпи
- C.** Гострий одонтогенний остеомієліт
- D.** Гострий серозний періодонтит
- E.** Гострий гнійний періодонтит

167) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 43-х років звернувся зі скарга-ми на поступове болюче "почервоніння" обличчя, збільшення набряку в ділянках вилицєвих кісток та вії, що з'явилося 10 годин тому. Опіки пов'язані з гасінням по-жежі. Об'єктивно: відкриття рота болюче, колір слизової оболонки не змінений, шкіра обличчя на дотик дуже болюча, гли-бина ураження не досягає підшкірної клі-тковини, вкрита пухирями. Яка у хворого ступінь опікової хвороби?

- A.** II
- B.** I
- C.** IIIa
- D.** IIIб
- E.** IV

168) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 42-х років скаржиться на припу-хлість і гноєтечу з нориці у лівій навко-ловушної області, обмеження відкриття рота протягом трьох місяців. Півроку тому з приводу тривалого хронічного запалення було видалено 38 зуб. Об'єктивно: асимє-трія обличчя за рахунок інфільтрата в лівій навколовушній області синюшного кольо-ру, "дерев'янистої" щільності. На ньому дві нориці: з одної випинаються грануляції, з іншого виділяється рідкий крихтоподібний гній жовтуватого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Актиномікоз навколовушної області, шкірно-м'язова форма
- B.** Одонтогенна підшкірна гранулома нав-коловушної області
- C.** Хронічний дифузний остеомієліт кута і гілки нижньої щєлєпи
- D.** Паротит Герценберга
- E.** Слинна нориця навколовушної слинної залози

169) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитина 7-ми років скаржиться на біль під час їжі у верхньому правому кутньому зубі. На жувальній поверхні 55 зуба вияв-лена каріозна порожнина, заповнена роз-м'якшеним дентином, локалізована в ме-жах біляпульпарного дентину, яка сполуча-ється з порожниною зуба. При зондуванні сполучення виникає різкий біль, помірна кровоточивість. Перкусія зуба безболісна. Рентгенологічно змін у періодонті 55 зуба немає. Виберіть найбільш імовірний діа-гноз:

- A.** Хронічний фіброзний пульпіт
- B.** Хронічний гангренозний пульпіт
- C.** Загострення хронічного фіброзного пульпіту
- D.** Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- E.** Загострення хронічного гангренозного пульпіту

170) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчина 16-ти років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на порушен-ня зовнішнього вигляду. Об'єктивно: ве-стибулярний нахил верхніх, нижніх різців та ікол при незначному перекритті верхні-ми зубами нижніх, в бокових ділянках ней-тральне співвідношення зубів. Для

якого прикусу характерні такі прояви?

- A.** Біпрогнатичний
- B.** Прямий
- C.** Ортогнатичний
- D.** Опістогнатичний
- E.** Глибокий

171) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопець 21-го року звернувся до орто-донта зі скаргами на значну вираженість підборідної складки. Об'єктивно: зменше-на нижня третина обличчя, значно вираже-на підборідна складка. При внутрішньоро-товому огляді: відсутність контактів фронтальних зубів обох щелеп при їх змиканні, сагітальна щілина 4 мм, передньо-щічний горбик першого верхнього моляра зми-кається з одноіменним горбиком першого нижнього моляра. Для якого аномального прикусу це характерно?

- A.** Дистальний
- B.** Мезіальний
- C.** Перехресний
- D.** Відкритий
- E.** Глибокий

172) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитині з одностороннім незарощенням верхньої губи проведено хейлопластику за Лімбергом. Які оптимальні терміни опера-тивного втручання при незарощеннях верх-ньої губи?

- A.** 6-7 місяців
- B.** 2-3 роки
- C.** В перші дні
- D.** 4-6 років
- E.** 1 рік

173) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 42-х років 2 місяці тому видали-ли 36 зуб. В лівій щічній ділянці відмічено щільний інфільтрат, під час пальпації болі-сний, підщелепні лімфатичні вузли збіль-шені, рухомість 34, 35, 37 зубів, слизова оболонка в цій ділянці пастозна, синюшна, гнійне виділення з комірки 36 зуба та нори-цевого ходу. Який можливий діагноз?

- A.** Хронічний обмежений остеомиєліт аль-веолярного відростка
- B.** Хронічний обмежений остеомиєліт від 36 зуба
- C.** Хронічний періостит нижньої щелепи від 36 зуба
- D.** Вогнищева форма хронічного остеомиє-літу від 36 зуба
- E.** Гіперпластична форма хронічного остеомиєліту від 36 зуба

174) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 28-ми років звернувся зі скаргами на наявність виразки на язиці. Об'єктивно: відмічається щільний інфільтрат, ерозія червоного кольору з гладким бли-скупим дном, діаметром біля 1,5 см чітко окреслена, з рівними краями, безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Первинний сифіліс
- B.** Туберкульозна виразка
- C.** Актиномікоз язика
- D.** Абсцес язика

Е. Декубітальна виразка

175) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До лікаря-онколога звернувся хворий 67-ми років зі скаргою на болі в горлі при ковтанні. Хворіє 2 місяці, не лікувався. Під час обстеження в ділянці кореня язика справа виявлена болюча кратероподібна виразка. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Після проведення цитологічного обстеження встановлено діагноз раку кореня язика справа І стадії, Па клінічна група, T1N0M0. Який розмір виразкової пухлини в найбільшому вимірі?

- A.** Не більше 2 см
- B.** До 1 см
- C.** До 3 см
- D.** Від 1 до 3 см
- E.** Від 2 до 4 см

176) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

На клінічному огляді в пацієнта 8-ми років визначено інфантильний тип ковтання. Установлено діагноз: відкритий травматичний прикус 1-го ступеня тяжкості. Інфантильний тип ковтання вважається порушенням функції ковтання з:

- A.** 3-х років
- B.** 5-ти років
- C.** 2-х років
- D.** 6-ти років
- E.** 9-ти років

177) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки 4-річної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи дитини. Об'єктивно: в пришийково-вій ділянці вестибулярної поверхні різців верхньої щелепи виявлені дефекти, які не перетинають емалево-дентинного сполучення і мають вигляд ділянок крейдоподібно зміненої емалі з видимим руйнуванням її структури. При зондуванні визначається шорстка, розм'якшена поверхня. Реакція на холодові подразники відсутня. Визначте діагноз:

- A.** Гострий поверхневий карієс
- B.** Гострий середній карієс
- C.** Гострий початковий карієс
- D.** Хронічний початковий карієс
- E.** Хронічний поверхневий карієс

178) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчик 12-ти років скаржиться на постійний інтенсивний пульсуючий біль у зубі. Об'єктивно: підщелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації, у 26 - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на термічні подразники, зондування дна безболісна, перкусія різко болюча, зуб рухомий, слизова оболонка в ділянці 26 гіперемована, набрякла. Під час некретомії розкрита порожнина зуба, отримана крапля ексудату. На рентгенограмі 26 змін немає. Визначте діагноз:

- A.** Гострий гнійний періодонтит
- B.** Загострення хронічного періодонтиту
- C.** Гострий одонтогенний періостит
- D.** Гострий гнійний пульпіт

Е. Гострий серозний періодонтит

179) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворий 29-ти років звернувся з метою протезування зі скаргами на часте руйнування реставрації зуба у фронтальній ділянці на верхній щелепі. Об'єктивно: 11 відновлений пломбувальним матеріалом на 2/3 коронкової частини зуба, термодіагностика і перкусія безболісні. Який вид ортопедичної конструкції показано в дано-му випадку?

- A.** Металокерамічна коронка на 11
- B.** Штампована металева коронка на 11
- C.** Пластмасова коронка на 11
- D.** Телескопічна коронка на 11
- E.** Коронка за Белкіним на 11

180) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 25-ти років, яка працює вчителем, звернулася в клініку ортопедичної стоматології із скаргами на косметичний дефект, неможливість відкушування їжі, порушення дикції. Зуби втрачено внаслідок травми. Зубна формула: 87654300!00345678. 3!3 стійкі, інтактні, перкусія безболісна. Яку анестезію доцільно провести для цієї групи зубів перед препаруванням для виготовлення металокерамічного мостоподібного протеза?

- A.** Інфільтраційна
- B.** Аплікаційна
- C.** Центральна провідникова
- D.** Туберальна
- E.** Спонгіозна

181) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хвора 58-ми років звернулася в клініку зі скаргами на поломку часткового знімного протеза на верхній щелепі. З анамнезу відомо, що протезом користується 2 роки. Протез зламався - перелом базису. Яку пластмасу необхідно застосувати для лагодження протеза?

- A.** Редонт
- B.** Фторакс
- C.** ПМ-01
- D.** Етакрил
- E.** Карбопласт

182) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 34-х років скаржиться на наявність темних коричневих плям на зубах фронтальної ділянки верхньої щелепі. З анамнезу захворювання: плями утворилися біля 18 місяців тому. Об'єктивно: на контактній поверхні 22, 23 зубів наявні пігментовані ділянки емалі коричневого кольору з чіткими межами. Зондування безболісне, поверхня плям шорстка, зонд не затримується. Після висушування пустером поверхня плям втратила блиск, стала матовою. Пальпація і перкусія безболісні. Термодіагностика безболісна. ЕОД- 4 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Хронічний початковий карієс 22, 23
- B.** Хронічний поверхневий карієс 22, 23
- C.** Наліт курця 22, 23
- D.** Флюороз
- E.** Тетрациклінові зуби 22, 23

183) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 48-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий короткочасний зубний біль від температура-турних, механічних і хімічних подразників, який припиняється відразу після припинення їх дії. Під час огляду 36 зуба визначається глибока каріозна порожнина 5 класу за Блеком із вузьким входним отвором, заповнена великою кількістю розм'якшеного дентину. Зондування болюче по дну каріозної порожнини, сполучення каріозної порожнини з порожниною зуба немає. Перкусія і пальпація 36 безболісні. ЕОД- мКА. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Гострий глибокий карієс 36
- В. Гострий частковий пульпіт 36
- С. Гіперемія пульпи 36
- Д. Хронічний простий пульпіт 36
- Е. Клиноподібний дефект 36

184) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Жінка 36-ти років, яка користується кардіостимулятором, скаржиться на кро-воточивість ясен при чищенні зубів. На огляді ясна застійно гіперемовані, набряклі. Ясенні кишені глибиною 4-5 мм. Зуби рухомі 1-2 ступенів, на зубах визначається велика кількість над- і під'ясенного зубно-го каменю. Діагностовано хронічний генералізований пародонтит II ступеня. Який метод усунення зубних відкладень **ПРОТИПОКАЗАНИЙ** у цій клінічній ситуації?

- А. Ультразвуковий
- В. Комбінований
- С. Інструментальний
- Д. Хімічний
- Е. Ферментний

185) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворої 48-ми років діагностований ревматоїдний артрит СНЩС. Що є характерною ознакою ревматоїдного артриту СНЩС?

- А. Двобічність ураження
- В. Зниження гостроти слуху
- С. Наявність у анамнезі хронічної травми
- Д. Поєднання з артрогенною контракту-рою
- Е. "Тугорухомість" нижньої щелепи зранку

186) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 63-х років звернувся до лікаря зі скаргами на неболючий утвір із широкою основою до 2 см на шкірі лівої щоки. У центрі утворення - рогові маси. Зі слів хворого, утвір виник 4 місяці тому. Регіо-нарні лімфовузли не збільшені. Який найі-мовірніший діагноз?

- А. Кератоакантома
- В. Холестеатома
- С. Меланома
- Д. Атерома
- Е. -

187) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У пацієнта 37-ми років наявна асиметрія обличчя за рахунок припухлості привушно-жувальної ділянки справа. При пальпації - утвір щільної консистенції, без чітких меж, болючий. Кути рота й ока опущені. При намаганні надути щоки права щока парусить. Який попередній діагноз?

- A.** Злоякісна пухлина привушно-жувальної ділянки
- B.** Центральний парез лицьового нерва
- C.** Периферичний парез лицьового нерва
- D.** Невралгія трійчастого нерва
- E.** Флегмона привушно-жувальної ділянки

188) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Під час проведення інфраорбітальної анестезії у пацієнта виник осередок збільшення шкіри у підочномковій ділянці. Загальний стан пацієнта не погіршився. Лікар діагностував ішемію шкіри. Яку допомогу необхідно надати хворому?

- A.** Пацієнт лікування не потребує, ішемія проходить самостійно
- B.** Пацієнту необхідно ввести 1 мл 10% розчину кофеїну підшкірно
- C.** Дати понюхати нашатирний спирт
- D.** Необхідно ввести 1 мл кордіаміну
- E.** Необхідно ввести розчин тавегілу або супрастину внутрішньом'язово

189) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дитини 6-ти місяців на слизовій оболонці гребеня альвеолярного відростка верхньої щелепи визначається утворення кулястої форми, м'яко-еластичної консистенції діаметром 6 мм з вмістом блакитно-го відтінку, що просвічується. Який най-більш імовірний діагноз?

- A.** Гематома прорізування
- B.** Фіброма
- C.** Фолікулярна кіста
- D.** Радикулярна кіста
- E.** Папілома

190) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Чоловік 45-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. З анамнезу з'ясовано, що 13, 12, 11, 21, 22, у. Прикус ортогнатичний. 14, 15, 24, 25 зуби інтактні, нерухомі з високими клінічними коронками. Яку конструкцію протеза краще запропонувати пацієнту, враховуючи те, що він викладач?

- A.** Бюгельний протез з фіксацією на ата-чменах
- B.** Порцелянові коронки, фіксовані на імплантатах
- C.** Частковий знімний протез на верхню щелепу
- D.** Металокерамічний мостоподібний протез
- E.** Пластмасовий мостоподібний протез

191) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ТЕМА

Хворому 53-х років виготовлений частковий пластинковий протез на нижню щелепу. Об'єктивно: відсутні 48-43, 34-38, 18, 28. Зуби інтактні, стійкі. Ортогнатичний прикус. При перевірці конструкції протезу у порожнині рота природні зуби знаходяться в оклюзії, а між штучними і верхніми зубами щілина. На якому етапі протезування була допущена помилка?

- A.** Визначення центральної оклюзії
- B.** Встановлення штучних зубів
- C.** Виготовлення моделей
- D.** Виготовлення воскового базису і прику-сних валиків
- E.** Отримання відбитків

192) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту проводять ендодонтичне лі-кування 11 зуба. Лікар провів інструмен-тальну обробку кореневого каналу. Для пломбування каналу обрав методику га-рячої вертикальної конденсації гутаперчі. Оберіть інструмент для конденсації філе-ра:

- A.** Плагер
- B.** К-файл
- C.** Гутаконденсор
- D.** Інжектор
- E.** Коренева голка

193) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 44-х років після травми скар-житьсь на біль у нижній щелепі, що по-силюється під час ковтання, особливо при відкриванні рота. Об'єктивно: конфігура-ція обличчя порушена, обширна гемато-ма у ділянці кута нижньої щелепи зліва. Пальпація цієї ділянки болісна. Слизова оболонка блідо-рожева, вуздечка нижньої губи зміщена вліво від центральної лінії. При натисканні на підборіддя виникає біль у ділянці кута нижньої щелепи зліва. Який попередній діагноз?

- A.** Перелом кута нижньої щелепи зліва
- B.** Двобічний перелом гілки нижньої щеле-пи
- C.** Задній вивих нижньої щелепи зліва
- D.** Передній двобічний вивих нижньої ще-лепи
- E.** -

194) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 35-ти років два дні тому під місцевою анестезією проводилось лікуван-ня середнього карієсу 27, 28 зубів. Після відвідування лікаря, хворий виявив незна-чну припухлість у скроневої ділянці зліва. Впродовж наступного дня температура під-вищилася до 38,5°C . Об'єктивно: набряк скроневої і навколоушно-жувальної ді-лянок зліва (симптом "пісчаного годинни-ка"), набряк повік лівого ока. Відкривання рота до 0,5 см, болісне. Пальпація скроне-вої ділянки безболісна. За горбом верхньої щелепи зліва визначається різко болісний інфільтрат, слизова оболонка у цій ділян-ці гіперемована, набрякла. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Флегмона підскроневої і крилопіднебін-ної ямок зліва
- B.** Абсцес підчочномкової ділянки зліва
- C.** Флегмона підскроневої ямки зліва
- D.** Абсцес скроневої ділянки зліва
- E.** -

195) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 57-ми років звернувся до сто-матолога зі скаргами на застрягання їжі на зубах нижньої щелепі справа. Під час опитування з'ясовано, що у пацієнта є кар-діостимулятор. Об'єктивно: у 44 зуби на ди-стальній контактній поверхні каріозна по-рожнина в межах плащового дентину, ви-

повнена залишками їжі. Дентин пігменто-ваний, щільний. Зондування, перкусія, тер-мопроба - безболісні. Який пломбувальний матеріал **ПРОТИПОКАЗАНИЙ** даному пацієнту?

- A. Фотополімерний композит
- B. Амальгама
- C. Скклоіономерний цемент хімічного твер-діння
- D. Силікатний цемент
- E. Цинк-фосфатний цемент

196) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 33-х років, слюсар, звернувся зі скаргами на біль, кровотечу з ясен, які посилюються під час чищення зубів, свер-біж ясен. Захворів 1 рік тому. Об'єктив-но: ясна в ділянці нижніх і верхніх зубів фронтальної групи гіперемовані, набряклі, з ціанотичним відтінком. На зубах спосте-рігається велика кількість мінералізованих відкладень, визначаються незначні серозні виділення з пародонтальних кишень гли-биною 3 мм. Який діагноз найбільш імовір-ний?

- A. Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
- B. Локалізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
- C. Генералізований пародонтит II ступеня, загострення
- D. Локалізований пародонтит II ступеня, гострий перебіг
- E. Генералізований пародонтоз I ступеня

197) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 38-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчут-тя печіння, біль та кровоточивість ясен. Об'єктивно: ясна набряклі, гіперемовані, пастозні, при легкому дотику кровоточать. Зубо-ясеневе прикріплення не зруйноване. Який попередній діагноз?

- A. Гострий катаральний гінгівіт
- B. Хронічний катаральний гінгівіт
- C. Локалізований пародонтит
- D. Генералізований пародонтит
- E. Гіпертрофічний гінгівіт

198) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 30-ти років після переохо-лодження скаржить на перекошення обличчя вправо, підвищення температури тіла до $37,9^{\circ}C$. Об'єктивно: не може нахму-рити лоба зліва та закрити ліве око. Згла-джена ліва носогубна складка. Губи щільно не стуляються. Відсутній лівий надбрівний рефлекс. Назвіть патологію:

- A. Невропатія лицевого нерва
- B. Невралгія трійчастого нерва
- C. Лицевий геміспазм
- D. Прогресуча геміатрофія обличчя
- E. -

199) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Жінка 35-ти років скаржить на вира-жений біль, появу вузлика під слизовою оболонкою вестибулярної поверхні ни-жньої щелепи в ділянці 44, 45 зубів, онімін-ня шкіри половини нижньої губи. Перші скарги з'явилися після хірургічного втру-чання в даній ділянці. Пальпаторно визна-чається обмежений болісний вузлик щіль-ноеластичної консистенції із гладкою по-верхнею округлої форми, близько 1 см в діаметрі, слизова оболонка над ним не змі-нена. Який попередній діагноз?

- A.** Травматична неврома
- B.** Ліпома
- C.** Папілома
- D.** Фіброма
- E.** Епулід

200) крок 2017

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хлопчика 12-ти років в ділянці 46 зуба виникає тривалий біль від прийому гарячої їжі. Об'єктивно: коронка 46 зуба брудно-сірого кольору, глибока каріозна порожнина виповнена розм'якшеним дентином. Є сполучення з пульповою камерою, глибоке зондування болюче. Тепло-вий подразник викликає біль, який повільно вщухає. Перкусія 46 безболісна. Який діагноз найімовірніший?

- A.** Хронічний гангренозний пульпіт
- B.** Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- C.** Хронічний глибокий карієс
- D.** Хронічний фіброзний пульпіт
- E.** Хронічний гранулюючий періодонтит