

1) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Хворому 65-ти років з повною відсутністю зубів на верхній щелепі для виготовлення повних знімних пластинкових протезів необхідно зняти анатомічні відбитки з верхньої і нижньої щелеп. У пацієнта підвищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засіб необхідно використати для зниження блювотного рефлексу?

- A.** 1 % розчин димедролу
- B.** 10% розчин глюкози
- C.** 0.1% розчин атропіну
- D.** 10% розчин лідокаїну
- E.** 0.2% розчин норадреналіну

2) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Пацієнтка 48-ми років звернувся зі скаргами на субфебрильну температуру та наявність виразки на слизовій оболонці ясен в ділянці молярів, яка поступово збільшується; розхитаність зубів у зоні ураження. Об'єктивно: на слизовій оболонці ясен в ділянці нижніх лівих молярів мають місце дві поверхневі, різко болючі виразки, які мають підриті краї. Дно виразок зерняткового вигляду, вкрите жовтувато-сірим нальотом. Виразки оточені горбками. Шийки зубів оголені, спостерігається патологічна рухомість зубів. Регіональні лімфатичні вузли збільшені, болісні, утворюють щільні пакети. Поставте попередній діагноз:

- A.** Трофічна виразка
- B.** Ракова виразка
- C.** Сифіліс
- D.** Туберкульоз
- E.** Гострий афтозний стоматит

3) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Жінка 29-ти років скаржиться на гострий нападоподібний біль в ділянці верхньої щелепи зліва, посилюються від холодного, іррадіюють у вухо та скроню. Рік тому сильно болів 26 зуб, до лікаря не зверталась. Три дні тому знову виник біль. Об'єктивно: в 26 зубі глибока каріозна порожнина, що з'єднується з порожниною зуба. Зондування відкритої ділянки різко болюче. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Загострення хронічного періодонтиту
- B.** Гострий дифузний пульпіт
- C.** Загострений хронічний пульпіт
- D.** Гострий обмежений пульпіт
- E.** Гострий серозний періодонтит

4) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

У хворого 59-ти років внаслідок виробничої травми стався перелом нижньої щелепи. Раніше користувався знімними протезами (частковими пластинковими для верхньої щелепи і повними для нижньої щелепи). Що можна використовувати для транспортної іммобілізації перелому?

- A.** Шину Ентіна
- B.** Протези пацієнта з підборідною пращею Ентіна
- C.** Шину Васильєва
- D.** Шину Тігерштедта
- E.** Апарат Збаржа

5) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Хворій 42-х років після обстеження було поставлено діагноз: закритий серединний перелом нижньої щелепи в ділянці 31. 41 зубів, без зміщення. Коронкові частини решти зубів інтактні. Також діагностований хронічний генералізований пародонтит середнього ступеня тяжкості. Яка найраціональніша шина для лікування перелому у даної пацієнтки?

- A.** Шина Тігерштедта
- B.** Зл'бо-ясенна шина Вебера
- C.** Шина Тігерштедта із зачіпними гачками
- D.** Наясенна шина Порта
- E.** Зубо-ясенна шина Ванкевич

6) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Хворому тиждень тому були накладені знімні протези на верхню і нижню щелепи. Під час чергового прийому хворий скаржиться на прикушування щік, біль. Об'єктивно: гіперемія, набряк, з виразкуванням на слизовій щік в ділянці штучних молярів по лінії змикання зубів. Чим це може бути спричинене?

- A.** Горбки молярів верхньої та нижньої щелеп зникаються в одній вертикальній площині
- B.** Неправильно визначена висота прикусу
- C.** Зафіксована передня оклюзія
- D.** Токсико-алергічна дія компонентів базисної пластмаси
- E.** Травматичність слизової внаслідок діабету

7) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

У дитини 6-ти років третій день підвищена температура тіла до 38-39°C, болісність при ковтанні. Об'єктивно: на слизовій оболонці піднебінних дужок, мигдаликах, частково на м'якому піднебінні відзначаються декілька ерозій до 2 мм в діаметрі, які розташовані на гіперемованій слизовій оболонці та вкриті білуватим нальотом. Підщелепні лімфовузли збільшені, безболісні при пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий герпетичний стоматит
- B.** Герпетична ангіна
- C.** Багатоформна ексудативна еритема
- D.** Дифтерія
- E.** Інфекційний мононуклеоз

8) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Дитина 2-х років отримала травму зубів. Об'єктивно: коронки 51 і 61 зубів коротші від сусідніх на 1/3. Слизова оболонка в ділянці 51 і 61 зубів гіперемована, набрякла. На рентгенограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів 51 і 61 зубів відсутня. Яка лікувальна тактика буде оптимальною?

- A.** Видалення 51, 61 зубів
- B.** Лігатурне шинування
- C.** Диспансерне спостереження
- D.** Репозиція 51 і 61 зубів
- E.** Реплантація

9) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У жіночій консультації було проведено бесіди з вагітними жінками про значення характеру харчування для закладки та розвитку зубів майбутньої дитини. На якому тижні внутрішньоутробного розвитку починається закладка фолікулів тимчасових зубів у плода?

- A. 7-ий
- B. 4-ий
- C. 15-ий
- D. 12-ий
- E. 18-ий

10) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту показано проведення вестибулопластики на нижній щелепі. До якої патології найчастіше призводить мілкий рисунок порожнини рота?

- A. Тісне розташування фронтальних зубів
- B. Глибокий прикус
- C. Захворювання тканин пародонта
- D. Затримка росту щелепи
- E. Парафункція м'язів

11) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитині 10 років. Скарги на сухість, біль, збільшення в об'ємі і лущення губ. Під час огляду виявлено, що слизова оболонка губ гіперемована, губи збільшені в об'ємі, при натягуванні губи відзначається виділення секрету з дрібних слинних залоз у вигляді «крапель роси». Вкажіть найбільш імовірний попередній діагноз:

- A. Метеорологічний хейліт
- B. Актинічний хейліт
- C. Іландулярний хейліт
- D. Ексфоліативний хейліт
- E. Контактний алергічний хейліт

12) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 18-ти років скаржиться на наявність порожнини в 27 зубі, біль під час вживання твердої їжі. В анамнезі: сильні болі в 27 зубі рік тому, до лікаря не звертався. Об'єктивно: на жувальній поверхні 27 зуба глибока каріозна порожнина, сполучена з пульповою камерою, виповнена розростанням грануляційної тканини, що охоплює майже всю каріозну порожнину. Зондування грануляцій спричиняє кровоточивість та незначний біль. Перкусія безболісна. ЕОД- 45 мкА. Визначте діагноз:

- A. Хронічний фіброзний періодонтит
- B. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- C. Хронічний гранулюючий періодонтит
- D. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- E. Хронічний фіброзний пульпіт

13) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У пацієнта 37-ми років діагностовано: гострий остеомієліт нижньої щелепи справа в ділянці 45, 46, 47 зубів. При обстеженні виявлено симптом Венсана. Вкажіть ознаки цього симптому:

- A. Рухомість причинного і сусідніх зубів

- B.** Відчуття оніміння м'яких тканин нижньої губи і підборіддя
- C.** Біль при перкусії причинного і сусідніх зубів
- D.** Інтенсивний біль в ділянці причинного зуба
- E.** Наявність інфільтрату з обох боків альвеолярного відростку

14) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопець 18-ти років звернувся до лікаря - стоматолога зі скаргами на чутливість зубів при вживанні солодкого на нижній щелепі зліва. При огляді: на жувальній поверхні 37 зуба емаль у фісурах білого кольору, без блиску, крихка (відколюється) при зондуванні. Встановіть діагноз:

- A.** Хронічний початковий карієс 37 зуба
- B.** Гострий початковий карієс 37 зуба
- C.** Хронічний поверхневий карієс 37 зуба
- D.** Гострий поверхневий карієс 37 зуба
- E.** Хронічний середній карієс 37 зуба

15) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Жінка 36-ти років скаржиться на сухість та лущення червоної облямівки нижньої губи. Сухість і лущення турбують протягом місяця. Змащування індиферентними мазями ефекту не дає. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи насичено червоного кольору, помірно інфільтрована, вкрита щільно посадженими білувато-сірими лусочками, при спробі видалення яких відзначаються біль і кровотеча. На периферії вогнища визначаються ділянки помутніння епітелію у вигляді нерівномірно виражених смужок білого кольору, а в центрі вогнища - ділянки западання. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Кандидозний хейліт
- B.** Червоний плесканий лишай
- C.** Лейкоплакія
- D.** Червоний вовчак
- E.** Ексфоліативний хейліт

16) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У пацієнта після операції видалення зуба (діагностовано кровотечу) із лунки видаленого зуба. Виберіть раціональну лікувальну тактику:

- A.** Внутрішньом'язове введення розчину вікасолу
- B.** Внутрішньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцію хлориду
- C.** Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню
- D.** Накладання швів на м'які тканини
- E.** Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлі

17) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

При обстеженні дітей в школі стоматолог-ортодонт виявив в декількох з них напруження колового м'язу рота. Який з перерахованих апаратів можна використовувати для гімнастики колового м'язу рота?

- A.** Активатор Дасса
- B.** Активатор Андресена-Вейпля
- C.** Апарат Брюкля
- D.** Регулятор функції Френкеля-3
- E.** Апарат Енгля

18) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 32-х років після ретельного дослідження був встановлений діагноз: чорний "волосатий" язик. Які лікарські засоби необхідно призначити хворому?

- A. Противірусні
- B. Антисептики
- C. Кератопластичні
- D. Вітаміни
- E. Кератолітичні

19) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

При обстеженні дитини виявлено мікрогнатію і відкритий прикус. На рентгенограмі суглобова щілина відсутня, гілка нижньої щелепи справа переходить в скроневу кістку. Поставте діагноз:

- A. Синдром 1-2 зяберних дуг
- B. Склерозуючий правосторонній артроз СНЩС
- C. Хронічний правосторонній артрит СНЩС
- D. Правосторонній фіброзний анкілоз СНЩС
- E. Правосторонній кістковий анкілоз СНЩС

20) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У стоматологічній поліклініці, що за районом обслуговування забезпечує стоматологічною допомогою понад 25 тисяч мешканців мікрорайону міста, є по 10 посад лікарів стоматологів-терапевтів, та хірургів. Як розрахувати кількість посад стоматологів-ортопедів?

- A. В залежності від потреби населення та обсягу роботи
- B. 1 посада на 2 тисячі населення
- C. 1 посада на 3 тисячі населення
- D. 1 посада на 4 тисячі населення
- E. 1 посада на 2,5 тисячі населення

21) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчина 20-ти років скаржиться на болісність і виражену кровоточивість ясен під час чищення і прийомі навіть м'якої їжі. Об'єктивно: слизова оболонка ясен набрякла, гіперемована, кровить при найменшому дотику. Зуби вкриті помірною кількістю м'якого зубного нальоту. Яку пасту необхідно рекомендувати цій хворій для чищення зубів, проводячи комплексну терапію захворювання?

- A. Гелеву з мікроелементами
- B. Пасту, що містить мінеральні компоненти
- C. Пасту, що містить протигрибкові засоби
- D. Пасту, що містить настої лікарських трав
- E. Фторвмісну пасту

22) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитина 6-ти років направлена для видалення нижніх молочних центральних різців з приводу зміни прикусу. Зуби рухомі III-ГО ступеня. Виберіть оптимальний вид знеболення:

- A. Інгаляційний наркоз
- B. Аплікаційне знеболення
- C. •С. Внутрішньокісткове знеболення

- D. Інфільтраційне знеболення
- E. Провідникове знеболення

23) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчина 16-ти років скаржиться на постійний ниючий біль у зубі нижньої щелепи, який посилюється при накушуванні. Об'єктивно: в 46 зубі - каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Порівняльна перкусія різко болюча. Реакція на термічні подразники, зондування безболісні. Слизова оболонка ясен у ділянці 46 зуба яскраво гіперемована, набрякла, болюча при пальпації. На рентгенограмі: вогнище деструкції кісткової тканини неправильної форми, з нечіткими обрисами. Визначте діагноз:

- A. Загострення хронічного фіброзного періодонтиту
- B. Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту
- C. Гострий серозний періодонтит
- D. Гострий гнійний періодонтит
- E. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту

24) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дівчинки 11-ти років діагностовано хронічний паренхіматозний паротит. Назвіть рентгенологічну ознаку цього захворювання:

- A. Симптом "грона винограду"
- B. Симптом роси
- C. Симптом "сухого дерева"
- D. Симптом дефекту наповнення
- E. Симптом флюктуації

25) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнтка скаржиться на біль від термічних подразників в нижній щелепі справа, що швидко зникає після їх усунення. Об'єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба каріозна порожнина з вузьким "вхідним" отвором в межах плащового дентину. Дентин розм'якшений, світлого кольору. Перкусія 26 зуба безболісна. Поставте діагноз:

- A. Хронічний глибокий карієс
- B. Гострий середній карієс
- C. Гострий глибокий карієс
- D. Хронічний середній карієс
- E. Хронічний поверхневий карієс

26) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Жінка 20-ти років, на 22 тижні вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на чутливість верхніх передніх зубів від термічних подразників, яка з'явилася місяць тому. Поставлений діагноз: гострий початковий карієс 12, 11, 21, 22 зубів, V клас за Блеком. Гігієнічний індекс Федорова-Володкіної - 1,8. Визначте оптимальну тактику лікування:

- A. Проведення професійного чищення зубів і пломбування 12,11,21, 22 зубів
- B. Проведення професійного чищення зубів, ремінералізуючої терапії і пломбування 12, 11, 21, 22 зубів
- C. Проведення професійного чищення зубів і ремінералізуючої терапії
- D. Ремінералізуюча терапія і пломбування 12,11, 21,22 зубів
- E. Відтермінувати лікування до 30-го тижня вагітності

27) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Дівчинка 12-ти років скаржиться на спонтанний біль в 16 зубі з короткими періодами ремісій (10-20 хвилин), який з'явився 4 дні тому. Вночі біль посилюється, іррадіює на праву частину верхньої щелепи. При огляді виявлено глибоку каріозну порожнину у 16 зубі, дентин м'який, зондування болісне по всьому дну вертикальна перкусія трохи болісна, біль підсилюється під дією термічних подразників. ЕОД- 25 мкА. Поставте діагноз:

- A. Хронічний фіброзний пульпіт
- B. Гострий дифузний пульпіт
- C. Гострий обмежений пульпіт
- D. Гострий апікальний періодонтит
- E. Хронічний конкрементознийиульгіт

28) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Хворому 50-ти років було встановлено діагноз: рецидив слинокам'яної хвороби з локалізацією каменя в товщі підщелепної слинної залози. Виберіть лікувальну тактику:

- A. Видалення підщелепної слинної залози
- B. Видалення каменя із збереженням залози
- C. Променева терапія
- D. Медикаментозне консервативне лікування
- E. Склерозуюча терапія

29) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Чоловік 34-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на гострий нападоподібний самочинний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що посилюється від холодних подразників, іррадіює у вухо та скроню. Рік тому сильно болів 27 зуб, до лікаря не звертався. З дні тому знову виник біль. Об'єктивно: у 27 зубі глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування розкритої точки різко болісне. На рентгенограмі 27 зуба у ділянці верхівок коренів визначається розширення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Загострення хронічного фіброзного періодонтиту
- B. Загострення хронічного гранулематозно-гоперіодонтиту
- C. Загострення хронічного гангренозного пульпіту
- D. Загострення хронічного фіброзного пульпіту
- E. Гострий дифузний пульпіт

30) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

В якому періоді формування прикусу дитини нормою є фізіологічні тремі та діастеми?

- A. Це є симптом патології
- B. Формування молочного прикусу (6 місяців - 3 роки)
- C. Постійному прикусі
- D. Змінному прикусі
- E. В періоді підготовки до зміни зубів (4,5-6 років)

31) крок 2019
ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Чоловік 60-ти років із повною відсутністю зубів. Користується протезами 15 років. Об'єктивно: нижня третина обличчя знижена, альвеолярні відростки на верхній та нижній щелепах різко

атрофовані, піднебіння пласке, торус різко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована. без підслизового шару. Який відбиток і матеріал доцільно використати у даному випадку?

- A. Повні анатомічні гіпсом
- B. Функціональний компресійний стенсом
- C. Функціональний декомпресійний дентафлексом
- D. Повні анатомічні стомальгіном
- E. Функціональний диференційований репі-ном

32) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворого 57-ми років із шизофренією в стадії загострення, направлено до щелепно-лицьового стаціонару з діагнозом: перелом нижньої щелепи в ділянці 34-35 зубів зі зміщенням відламків. Який метод лікування йому показаний?

- A. Двощелепна зубна шина
- B. Шина Ванкевич
- C. Однощелепна гладенька шина-скоба
- D. Шина Вебера
- E. Остеосинтез

33) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До лікаря-стоматолога звернулися батьки 17-річного підлітка зі скаргами на новоутворення на верхній губі зліва, яке з'явилося кілька місяців тому. Об'єктивно: бородавкоподібне розростання на ніжці, чітко відмежоване від оточуючих тканин. Поверхня горбиста, крупнозерниста, за своїм виглядом нагадує «цвітну капусту». Який попередити діагноз?

- A. Вульгарна бородавка
- B. Фіброма
- C. Шкірний ріг
- D. Папілома
- E. Бородавчастий передрак

34) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До лікаря-стоматолога звернулася мама з 11-річним хлопчиком зі скаргами у нього на виражений самовільний біль у 46 зубі, який хвилеподібно наростає та віддає у верхню та нижню щелепу. Больовий напад поступово посилюється, стає пульсуючим і стихає на декілька хвилин від холодної води. Об'єктивно: у 46 зубі виявлено глибоку каріозну порожнину з розм'якшеним пігментованим дентином, пульпова камера легко перфорується зондом, зондування болісне по всьому дну, перкусія болісна. Електрозбудливість - 40-50 мкА. Встановіть діагноз:

- A. Гострий обмежений пульпіт
- B. Гострий дифузний пульпіт
- C. Загострення хронічного гангренозного пульпіту
- D. Травматичний пульпіт
- E. Гострий гнійний пульпіт

35) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий виготовляється частковий знімний пластинковий протез на в/щ. Який клінічний етап є наступним після визначення і фіксації центральної оклюзії?

- A. Постановка штучних зубів
- B. Заміна воску на пластмасу
- C. Визначення меж базису
- D. Перевірка воскової композиції протеза в порожнині рота
- E. Визначення міжальвеолярної висоти

36) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 38-ми років, електрозварник, зловживає палінням, з'явився для протезування зубів, але на нижній губі, посередині, на фоні незміненої червоної облямівки визначається чітко обмежене вогнище ураження 6x4 мм полігональної форми, сірувато-білого кольору, вкрите дрібними щільно прикріпленими лусочками і виглядає на рівні (не підвищується і не западає) червоної облямівки. Пальпація вогнища - безболісна, без ущільнення основи; при бічній пальпації - поверхня ураження ущільнена. Регіонарні лімфовузли без змін. Ваш попередній діагноз:

- A. Обмежений передраковий гіперкератоз
- B. Червоний плесканий лишай, гіперкератотична форма
- C. Бородавчатий передрак
- D. Рак нижньої губи
- E. Червоний вовчак

37) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 50-ти років звернулася зі скаргами на біль і хрускіт в ділянці СНЩС. Об'єктивно: виявлені множинні передчасні контакти зубів, локалізовану форму патологічної стертості зубів. Зуби стійкі, шийки їх оголені, гіперемія ясенного краю. Планується проведення вибіркового пришліфування зубів. В скільки відвідувань проводиться пришліфування?

- A. 1-2 відвідування протягом року
- B. 2-3 відвідування через місяць
- C. 3-4 відвідування через тиждень
- D. Одноразово
- E. 2-3 відвідування через день

38) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 25-ти років доставлений у відділення для надання спеціалізованої допомоги через 48 годин після отримання уламкового поранення щелепно-лицьової ділянки. При огляді велика зяюча рана м'яких тканин обличчя неправильної форми, краї інфіковані, набряклі. Який вид хірургічної обробки рани проводиться на даному етапі?

- A. Рання первинна
- B. Вторинна
- C. Відтермінована первинна
- D. -
- E. Пізня первинна

39) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 45-ти років з'явився зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після обстеження поставлений попередній діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості. Для уточнення остаточного діагнозу найбільш доцільно:

- A. Визначити рухомість зубів
- B. Провести пробу Кулаженко

- C. Провести пробу Кетчке
- D. Визначити глибину пародонтальних кишень
- E. Зробити рентгенографію

40) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

В клініку звернулися батьки хлопчика 8-ми років із скаргами на ниючий біль в зубі у дитині на нижній щелепі праворуч, що виникає від дії термічних подразників і повільно минає після їх усунення. Об'єктивно: на апроксимальній поверхні 46 зуба - глибока каріозна порожнина. Під час некре-ктомії екскаватором виявлене сполучення з порожниною зуба, зондування якого супроводжується різким болем і кровоточивістю. Який метод лікування пульпіту показаний у даному випадку?

- A. Вітальна екстирпація
- B. Девітальна ампутація
- C. Біологічний
- D. Девітальна екстирпація
- E. Вітальна ампутація

41) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого діагностовано амелобластому нижньої щелепи. Який вид хірургічного лікування показаний цьому хворому?

- A. Кріодеструкція пухлини
- B. Резекція нижньої щелепи, відступивши 1,5 см від вогнища ураження
- C. Проводиться тільки консервативне лікування
- D. Цистектомія
- E. Вишкрібання пухлини в межах здорових тканин

42) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 45-ти років звернувся до ортопедичного відділення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин інтактних зубів проведено інфільтраційне знеболювання 0,5% розчином лідокаїну. Через декілька хвилин з'явилося пригнічення свідомості, падіння АТ, судоми, самовільне сечовипускання. Який невідкладний стан розвинувся?

- A. Серцева недостатність
- B. Анафілактичний шок
- C. Колапс
- D. Больовий шок
- E. Зомління

43) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

На прийом до лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка 28-ми років з метою санації порожнини рота. Поставлений діагноз: гострий глибокий карієс 24 зуба. В анамнезі: сезонний алергічний риніт і медикаментозна алергія, яка проявляється висипом на шкірі і набряком Квінке. Чи проводилося раніше місцеве знеболення у стоматолога, пацієнтка не пам'ятає. Якою має бути тактика лікаря-стоматолога при проведенні анестезії в даному випадку?

- A. Проведення внутрішньошкірної проби на анестетик в стоматологічному кріслі безпосередньо перед анестезією
- B. Виконати анестезію анестетиком ефірного ряду
- C. Виконати анестезію анестетиком амідно-го ряду

Д. Проведення скарифікаційної проби на анестетик в стоматологічному кріслі безпосередньо перед анестезією

Е. Направлення до лікаря-алерголога для консультації і проведення алергологічних проб на анестетики

44) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік 35-ти років знаходиться на лікуванні у хірурга-стоматолога з приводу гострого одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи. З метою контролю якості лікування і визначення подальшої тактики планується проведення контрольного рентгенологічного дослідження. У які терміни від початку захворювання необхідно виконувати вказане дослідження цьому хворому для виявлення ознак деструкції кісткової тканини?

А. Через місяць

В. Через тиждень

С. До кінця 2-го тижня

Д. Через 2-3 дні

Е. Через 4-5 днів

45) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 18-ти років у дитинстві була оперована з приводу двобічного повного не- зрощення верхньої губи. При огляді на значно сплюсненій верхній губі спостерігаються множинні рубці, виразної асиметрії не відзначається, але є порушення форми верхньої губи. Широкі основи крил носа симетрично зміщені у бік та дозад, перетинка носа вкорочена, роздвоєний кінчик носу підтягнутий до верхньої губи, спинка носу має дугоподібну форму. Які зміни здійснюються з кістками щелеп?

А. Верхня та нижня щелепи внаслідок зменшення функціонального навантаження недорозвинені, сплюснені у фронтальній ділянці

В. Верхні щелепи недорозвинені у фронтальній ділянці, у бічних відділах не змінені

С. Нижня щелепа внаслідок зменшення жувального навантаження відстає у рості, сплющуються верхні щелепи

Д. Верхня та нижня щелепи внаслідок порушення носового дихання сплюснені у бічних відділах та сплюснені

Е. Верхні щелепи відстають у рості, міжщелепна кістка внаслідок порушення безперервності м'язового шару губи просувається допереду

46) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 2,5 років. Визначте, прорізуванню якої групи тимчасових зубів відповідає 1 етап фізіологічного підйому висоти прикусу:

А. Фронтальної групи зубів

В. Тимчасових іклів

С. Тимчасових молярів

Д. Тимчасових центральних різців

Е. Тимчасових латеральних різців

47) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 38-ми років звернувся до лікаря. Після збору анамнезу і проведення обстеження виявлено загострення генералізованого пародонтиту II ступеня, глибина пародонтальних кишень - 3-5 мм. Після усунення місцевих факторів, а також після проведення протизапального лікування необхідно перейти до усунення пародонтальних кишень. Який метод слід застосувати?

- A. Кюретаж
- B. Клаптикова операція
- C. Гінгівектомія
- D. Пластика передсінка
- E. Гінгівотомія

48) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 30-ти років звернувся до лікаря - стоматолога зі скаргами на випадіння пломби з зуба на верхній щелепі справа. Об'єктивно: в 16 зубі глибока каріозна порожнина, виповнена щільним пігментованим дентином. Який шар дентину утворюється в результаті подразнення зуба каріозним процесом?

- A. Вторинний
- B. Гібридний
- C. Первинний
- D. Предентин
- E. Третинний

49) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитині 8-ми років встановлений діагноз: гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи справа від 74 зуба. Виберіть найбільш доцільний метод лікування:

- A. Видалення 74 зуба, періостотомія, медикаментозна терапія
- B. Періостотомія, медикаментозна терапія
- C. Ендодонтичне лікування 74 зуба, періостотомія
- D. Ендодонтичне лікування 74 зуба, медикаментозна терапія
- E.

50) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У пацієнта 47-ми років після втрати пре молярів на н/щ зліва зуби, що обмежують дефект, поступово змістились всередину дефекту. Одночасно зуби-антагоністи висунулись в бік беззубої частини альвеолярного відростка. Яку назву має в літературі описана клінічна ситуація?

- A. Синдром Костена
- B. Синдром Папійона-Лефевра
- C. Феномен Попова-Юдона
- D. Феномен відносного зубо-альвеолярного видовження
- E. Феномен Курляндського

51) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчик 12-ти років скаржиться на постійний біль у зубі верхньої щелепи, який посилюється при накушуванні. Об'єктивно: у 26 зубі - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на термічні подразники відсутня, зондування дна безболісне, перкусія різко болюча. слизова оболонка в ділянці 26 зуба має незначні ознаки запалення. На рентгенограмі 26 зуба змін немає. Визначте діагноз:

- A. Гострий гнійний пульпіт
- B. Хронічний гранулюючий періодонтит
- C. Загострення хронічного періодонтиту
- D. Гострий серозний періодонтит
- E. Гострий гнійний періодонтит

52) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту 60-ти років планується виготовлення часткового знімного протеза на верхню щелепу. Проведено перевірку постановки штучних зубів на восковому базисі в ротовій порожнині. Який буде наступний клінічний етап виготовлення часткових знімних протезів?

- A. Примірка та фіксація часткових знімних протезів в ротовій порожнині
- B. Кінцеве полірування протезу
- C. Гіпсування гіпсових моделей в артикуля- тор
- D. Кінцеве моделювання базису протеза
- E. Визначення та фіксація центрального співвідношення щелеп

53) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки дівчинки 5-ти років звернулись до стоматолога-педіатра з метою санації порожнини рота у дитини. Після клінічного обстеження був поставлений діагноз: хронічний глибокий карієс 54 зуба. Виберіть доцільний пломбувальний матеріал для лікування 54 зуба:

- A. Цинк-фосфатний цемент
- B. Композитний матеріал
- C. Силікофосфатний цемент
- D. Силікатний цемент
- E. Склоіономерний цемент

54) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 23-х років скаржиться на різку кровотечу з ясен, неприємний запах з рота, що з'явилися 5 днів тому. Об'єктивно: міжзубні сосочки та ясенний край повсюди розпушені, яскраво-червоного кольору, набряклі, болючі і інтенсивно кровоточать під час пальпації. Ясенна кишеня - 3 мм. На рентгенограмі - виражений остеопороз міжальвеолярних перегородок, розширення періодонтальної щілини навколо верхівок міжальвеолярних перегородок. Компактна пластинка не порушена. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гострий виразково-некротичний гінгівіт
- B. Гострий лейкоз
- C. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- D. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
- E. Гострий катаральний гінгівіт

55) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До лікаря-стоматолога звернулася хвора 28-років зі скаргами на ниючий біль при накушуванні в 16 зубі. Після обстеження поставлений діагноз: загострення хронічного періодонтиту. Показано видалення 16-го зуба. Який вид щипців доцільно використати для видалення?

- A. Дзьобоподібні щипці з щічками, що не сходяться
- B. Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині
- C. S-подібної форми ліві
- D. S-подібної форми праві
- E. Прямі щипці

56) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

В якому лікувальному закладі поранені на полі бою у щелепно-лицеву ділянку одержують відповідну ортопедичну (виготовлення лікувальних шин, апаратів, протезів) та зуболікарняну допомогу?

- A. У ОМЗ (окремому медичному загоні)
- B. У ОМедБ (окремому медичному батальйоні)
- C. У цивільних медичних закладах
- D. У евакогоспіталях
- E. У СВПХГ (спеціалізованому військово-польовому хірургічному госпіталі)

57) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 64-х років виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу при наявності дефекту зубного ряду 2-го класу за Кеннеді. Після проведеної паралелометрії встановлені типи межових ліній на опорних зубах. На 24 зубі межова лінія -1 типу. Який тип кламера із системи Нея показаний хворому?

- A. I
- B. III
- C. V
- D. II
- E. IV

58) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнтці 35-ти років виготовляється незнімний металокерамічний мостоподібний протез. Одержано двошарові відбитки силіконовим матеріалом «Сілафлекс». Відбитки скеровано на знезараження. Який антисептичний розчин слід застосувати для їх обробки?

- A. 0,5% розчин перекису водню
- B. 3% розчин хлораміну
- C. 1,5% розчин двовуглекислої соди
- D. 70% розчин спирту
- E. 0,5% розчин гіпохлориту натрію

59) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту 67-ми років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Проводиться припасування індивідуальної ложки за методикою Гербста. Уточнюється межа ложки під'язикової ділянки, відступивши 1 см від середньої лінії. Яку пробу Гербста слід провести з цією метою?

- A. Провести язиком по червоній облямівці верхньої губи
- B. Повільне відкривання рота
- C. Поперемінне дотикання язиком щоки
- D. Активні рухи мимічної мускулатури
- E. Ковтання

60) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хлопчика 7-ми років під час первинного огляду ортодонтом визначена звичка спати, підклавши кулачок під щоку. Розвитку якої аномалії прикусу може сприяти ця звичка?

- A. Косого прикусу
- B. Прогиатії
- C. Відкритого прикусу
- D. Мезіального прикусу

Е. Глибокого прикусу

61) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий скаржиться на наявність каріозної порожнини в 11 зубі. Пломба з даного зуба випала тиждень тому. Коронка зуба темного кольору, на дні каріозної порожнини залишки пломбувального матеріалу. Вертикальна перкусія безболісна. На рентгенограмі - резорбція кісткової тканини овальної форми, з чіткими контурами. розміром 0.4x0,3 см. Кореневий канал запломбований на 2/3 довжини. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Радикулярна кіста
- В. Хронічний гранулюючий періодонтит
- С. Хронічний гранульоматозний періодонтит
- Д. Хронічний фіброзний періодонтит
- Е. Загострення хронічного періодонтиту

62) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Під час бойових дій у зубного техника спеціалізованого шпиталю для виготовлення зубних протезів виникла потреба поповнення зуботехнічних матеріалів з комплекту. В якому комплекті вони знаходиться?

- А. ЗТ-1
- В. ЗТ-2
- С. ЗП
- Д. ЗТ-3
- Е. ЗВ

63) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Лікар-ортодонт з метою уточнення діагнозу у пацієнта провів клінічні діагностичні проби за Ешлером-Бітнером. Лицеві ознаки дитини погіршилися. Яка аномалія щелеп найбільш імовірна?

- А. Макрогнатія верхньої щелепи
- В. Макрогнатія нижньої щелепи
- С. Мікрогнатія нижньої щелепи
- Д. Поєднана патологія обох щелеп
- Е. Мікрогнатія верхньої щелепи

64) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 46-ти років з метою протезування показана класична 2-х етапна хірургічна установка імплантатів на верхній щелепі. Який повинен бути інтервал між цими етапами?

- А. 2 місяці
- В. 1,5 місяця
- С. 3-6 місяців
- Д. 0,5 місяця
- Е. 1 місяць

65) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 46-ти років, викладач, звернувся зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи, що утруднює відкушування їжі. Об'єктивно: безперервний зубний ряд, рухомість фронтальних зубів II

ступеня. Рентгенологічно: кореневі канали 32, 31, 41, 42 зубів прямі, запломбовані. Який засіб стабілізує фронтальні зуби зі збереженням естетичного вигляду?

- A. Шина з амбразурними кламерами
- B. Коронково-ковпачкова шина
- C. Знімна багатоланкова шина для фронтальних зубів
- D. Шина Мамлока
- E. Шина з напівкоронки

66) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дитини 6,5 років індекс інтенсивності карієсу КПУ+кп=7. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною -1,5 бали. Фісури у постійних молярах інтактні, глибокі, відкриті. Який метод профілактики карієсу зубів доцільно обрати у даному випадку?

- A. Аплікації ремрозчином
- B. Покриття зубів фторлаком
- C. Неінвазивний метод герметизації фісур
- D. Інвазивний метод герметизації фісур
- E. Електрофорез ремрозчином

67) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту планується виготовлення повного знімного пластинкового протезу на верхню щелепу. Об'єктивно: на слизовій оболонці протезного ложа значна кількість ущільнених папілом різної величини. Визначте тактику лікаря:

- A. Виготовлення металевого базису протезу
- B. Зменшити площу базису протезу
- C. Об'ємне моделювання базису протезу
- D. Після видалення папілом виготовити протез з двошаровим базисом з еластичною підкладкою
- E. Користування знімним протезом протипоказано

68) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 52-х років скаржиться на косметичні дефекти зубів, які помітила декілька років тому. Об'єктивно: на вестибулярних поверхнях в пришийковій області премолярів і різців щілиноподібні дефекти в межах плащового дентину, утворені гладенькими, блискучими поверхнями. Шийки зубів оголені, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. Зондування дефектів безболісне. Встановіть діагноз:

- A. Ерозія твердих тканин зубів
- B. Некроз твердих тканин зуба
- C. Клиноподібний дефект
- D. Хронічний середній карієс
- E. Гострий середній карієс

69) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Після виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу оцінюється якість виготовленої конструкції. В межах яких значень повинна бути ширина дуги протезу?

- A. 5-8 мм
- B. 10-12 мм
- C. 12-15 мм
- D. 3-5 мм
- E. 1,5-2 мм

70) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 66-ти років скаржиться на ниючий біль в лівій привушно-жувальній ділянці, наростання асиметрії обличчя, яку помітила 2-3 місяці тому. Об'єктивно: хвора зниженого харчування, бліда, відзначається парез м'язів обличчя зліва. Попереду мочки вуха наявний горбистий інфільтрат без чітких меж, розміром 4x5 см. спаяний з навколишніми тканинами, помірно болісний. З протоки лівої привушної слинної залози слини отримати не вдалося. Піднижньоще-лепні і шийні лімфовузли зліва збільшені. На оглядовій рентгенограмі нижньої щелепи порушень структури кісткової тканини не відзначається. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- A. ПсевдопаротитІерценберга
- B. Загострення хронічного паротиту
- C. Актиномікоз лівої привушно-жувальної ділянки
- D. Аденокарцинома
- E. Змішана пухлина лівої привушної слинної залози

71) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 42-х років надійшов до клініки в тяжкому стані: млявий, температура тіла - 39,1⁰С, різко болючий інфільтрат дна порожнини рота та підщелепної ділянки справа. Шкіра над інфільтратом напружена, синюшного кольору. Під час пальпації під шкірою відчувається крепітація. Який діагноз можна поставити у даному випадку?

- A. Аденофлегмона дна порожнини рота
- B. Одонтогенна флегмона дна порожнини рота
- C. Актиномікоз дна порожнини рота
- D. Гнилісно-некротична флегмона дна порожнини рота
- E. Злоякісна пухлина дна порожнини рота

72) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 63-х років скаржиться на множинні болісні висипання у порожнині рота, на шкірі обличчя і тулуба, підвищення температури. За 3-4 дні до висипань відзначалося печіння, а потім різкий біль, що нагадує простріл. Пацієнт приймає цитотоксичні препарати з приводу лейкоемії. При огляді на червоній облямівці і слизовій оболонці губ, язика і щоки справа виявлені множинні маленькі ерозії, розташовані у вигляді ланцюжка, з обідками гіперемії, не схильні до злиття, різко болісні при пальпації. На шкірі обличчя справа визначаються везикули і ерозії. Поставте попередній діагноз:

- A. Багатоформна ексудативна еритема
- B. Вторинний сифіліс
- C. Оперізувальний лишай
- D. Токсико-алергічний дермато-стоматит
- E. Хронічний рецидивний герпес

73) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

В клініку ортопедичної стоматології з метою протезування звернувся пацієнт 55-ти років з відсутністю 11 зуба. Два тижні тому виписаний із стаціонару після перенесеного інфаркту міокарда. Яка тактика лікаря?

- A. Виготовити тимчасовий знімний протез
- B. Тимчасово відмовити в протезуванні
- C. Провести імплантацію
- D. Виготовити мостоподібний протез з опорою на 12,21

Е. Виготовити бюгельний протез

74) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 20-ти років звернувся зі скаргами на виникнення безпричинних больових нападів (5-7 хвилин) в ділянці 36 зуба протягом доби. Об'єктивно: в 36 зубі глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Зондування болісне в одній точці, холодова проба болісна, з післядією 5 хвилин. Перкусія безболісна. На рентгенограмі кореневі канали мають незначний вигин, просвіт каналів чітко відображений. Зуб планується як опора для мостоподібного протеза. Який з перерахованих методів лікування є найбільш прийнятним?

- А. Вігальна ампутація
- В. Вігальна екстирпація
- С. Біологічний метод
- Д. Девігальна ампутація
- Е. Пломбування каріозної порожнини

75) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчинка 13,5 років скаржиться на припухлість і кровоточивість ясен при чищенні зубів впродовж півроку. Об'єктивно: слизова оболонка ясен в ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи набрякла, має ціано-тичне забарвлення. Ясенні сосочки округлої форми, ущільнені, збільшені у розмірах і перекривають коронкові частини зубів на 1/3 висоти. Відзначається вестибулярне положення 13 і 23 зубів. Визначте попередній діагноз:

- А. Хронічний катаральний гінгівіт
- В. Гострий катаральний гінгівіт
- С. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- Д. Генералізований пародонтит Г ступеня
- Е. Локалізований пародонтит Г ступеня

76) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 28-ми років скаржиться на естетичний дефект. Об'єктивно: коронки 12, 11 та 21, 22, 23 - зруйновані каріозним процесом більш ніж на 2/3 висоти коронки. Прикус ортогнатичний. На рентгенограмі: канали даних зубів запломбовані на всю довжину, патологічних змін в периапікальних тканинах не виявлено. Запропонуйте найбільш раціональну конструкцію в цьому випадку:

- А. Куксові вкладки, облицьовані пластмасою
- В. Виготовлення куксових вкладок та металокерамічних коронок
- С. Виготовлення комбінованих штампованих коронок за Бородюком
- Д. Виготовлення іммедіат-протезу на штифтах
- Е. Відновлення коронкових частин за допомогою фотополімерних пломбувальних матеріалів

77) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Лікар-стоматолог ортопедичного відділення ЗФ зміну надав консультацію та обстежив пацієнта, перевіряв коронки, зафіксував мостоподібні протези, визначив центральне співвідношення щелеп та здійснив корекцію знімних протезів. Якими є норми навантаження лікаря в умовних одиницях праці (УОП) за зміну та на місяць при п'ятиденному робочому тижні за нормативами надання допомоги дорослому населенню?

- А. 5 УОП - 105 УОП
- В. 7 УОП - 147 УОП

- C. 9 УОП -189 УОП
- D. 6 УОП -126 УОП
- E. 8 УОП -168 УОП

78) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Група спеціалістів проводить епідеміологічне обстеження певних вікових груп по вивченню поширеності ознак ураження пародонта і потреб у лікуванні. За допомогою якого індексу вивчаються ці показники?

- A. CPITN (ВООЗ)
- B. PNI-S (Гріна-Вермільйона)
- C. PI (Рассела)
- D. PDI (Рамф'єрда)
- E. PMA (Парма)

79) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловікові 29-ти років поставлено діагноз: перелом верхньої щелепи за середнім типом. Лінія розлому симетрична з обох боків. В яких межах може бути порушена чутливість зубів та слизової оболонки?

- A. Від 13 до 23 зуба
- B. Від 15 до 25 зуба
- C. -
- D. Від 18 до 28 зуба
- E. Від 11 до 21 зуба

80) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

З вогнища ураження в ретромолярній ділянці взято біоптат. Патогістологічні дані: спостерігається поліморфізм клітин шипуватого шару, збільшення числа мітозів, гігантські багатоядерні клітини, акантоз, паракератоз частини клітин шипуватого шару, відзначаються 'рогові перлини'. Якому захворюванню відповідає дана патогістологічна картина?

- A. Кератоакантома
- B. Хвороба Боуена
- C. Лейкоплакія
- D. Червоний вовчак
- E. Бородавчаста форма червоного плескатоного лишая

81) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Який з перерахованих ортопедичних апаратів належить до групи механічної дії?

- A. Розширювальна пластинка з пружиною Коффіна
- B. Регулятор функції Френкеля
- C. ОбтураторКеза
- D. Вестибулярна пластинка Шонхера
- E. Капа Биніна

82) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 67-ми років скаржиться на появу виразки на слизовій оболонці порожнини рота, біль при

прийманні їжі. Із анамнезу: страждає на декомпенсовані вади серця. При огляді в задньому відділі слизової оболонки щоки зліва визначається виразка неправильної форми вкрита біло-сірим нальотом. В навколишніх тканинах відсутня запальна реакція слизової оболонки. Назвіть попередній діагноз:

- A. Декубітальна виразка
- B. Виразково-некротичний стоматит
- C. Ракова виразка
- D. Трофічна виразка
- E. Туберкульозна виразка

83) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 25-ти років скаржиться на неправильне положення верхнього центрального різця зліва внаслідок травми, що мала місце 2 місяці тому. Об'єктивно: 21 зуб повернутий по осі, в піднебінному положенні. Яким з методів лікування найбільш доцільно усунути даний дефект?

- A. Хірургічний
- B. Протезування
- C. Ортодонтичний
- D. Апаратурно-хірургічний
- E. Шинування з наступним протезуванням

84) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дитини 6-ти місяців діагностовано двобічну бронхопневмонію. Призначено антибіотики широкого спектру дії. Знаходиться на штучному вигодовуванні, наявні розлади травлення (диспепсія). Які можливі патологічні зміни твердих тканин зубів?

- A. Синдром Стейнтона-Капдепона
- B. Зуби Фурньє
- C. Місцева гіоплазія
- D. Системна гіоплазія емалі
- E. Зуби Іетчінсона

85) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік 21-го року скаржиться на неприємні відчуття в 26 зубі. Інколи виникає біль при вживанні їжі, частіше гарячої. Зуб змінений в кольорі. Об'єктивно: в 26 зубі глибока каріозна порожнина, яка з'єднана з порожниною зуба. Поверхнєве зондування безболісне. Реакція на тепловий подразник - повільно зростаючий та повільно затихаючий біль. ЕОД- 70 мкА. Встановіть діагноз:

- A. Хронічний гангренозний пульпіт
- B. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- C. Хронічний фіброзний періодонтит
- D. Хронічний фіброзний пульпіт
- E. Загострення хронічного фіброзного пульпіту

86) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Потерпілий доставлений у приймальне відділення після ДТП у непритомному стані у положенні на спині. Відзначається синюшність шкірних покривів, утруднене дихання, блідість слизових оболонок. Встановлено діагноз: двобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням фрагментів. Яка асфіксія виникла у потерпілого?

- A. Аспіраційна
- B. Стенотична

- C. Клапанна
- D. Дислокаційна
- E. Обтураційна

87) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 28-ми років звернувся у відділення ЩЛХ зі скаргами на наявність новоутворення на шкірі в підщелепній ділянці справа, що з'явилося приблизно 2 роки тому. Досить часто під час гоління відбувалось травмування новоутворення. Встановлено діагноз: папілома. Під час огляду ділянки новоутворення виявлено наявність виразки на тлі гіперемованої шкіри. Яка повинна бути тактика хірурга-стоматолога?

- A. Протизапальна терапія, після чого видалення папіломи
- B. Видалення папіломи. Післяопераційна променева терапія
- C. С Виключення малігнізації папіломи. Видалення папіломи
- D. Протизапальна терапія з наступним спостереженням
- E. Антибактеріальна, протизапальна терапія, спостереження

88) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитині 4-х років встановлено діагноз: загострення хронічного періодонтиту 85 зуба. Рентгенологічно: руйнування замикаючої пластинки фолікула 45 зуба, затемнення в ділянці біфуркації 85 зуба, патологічна резорбція медіального кореня на 2/3. Якою буде тактика лікування?

- A. Виконати екстракцію 85 зуба
- B. Запломбувати кореневі канали в одне відвідування та виконати періостотомію
- C. Зняти больові та запальні явища, виконати імпрегнацію корневих каналів і зберегти зуб відкритим до його фізіологічної зміни
- D. Ендодонтична та медикаментозна обробка корневих каналів 85 зуба, герметична пов'язка
- E. Виконати періостотомію та гемісекціюрезорбованого кореня

89) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитина 14-ти років скаржиться на сухість і лущення губ, особливо в осінньо-зимовий період. Об'єктивно: червона облямівка губ суха, інфільтрована, вкрита численними лусочками. Шкіра губ ущільнена, пігментована, визначається посилення її малюнка, лущення, а також радіальні тріщини. Водночас, відзначається сухість, ліхенізація і екскоріація шкіри обличчя. Визначте попередній діагноз:

- A. Актинічний хейліт
- B. Атопічний хейліт
- C. Ексфолюативний хейліт
- D. Контактний алергічний хейліт
- E. Метеорологічний хейліт

90) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У дитини 3-х років під час планової санації в 54 зубі виявлено глибоку каріозну порожнину, заповнену рештками їжі та розм'якшеним дентином. Після препарування 54 зуба пульпа кровоточить, зондування різко болісне. Для проведення лікування пульпіту методом де вітальної ампутації під час першого відвідування необхідно застосувати:

- A. Цинк-евгенолову пасту
- B. Дентин-пасту
- C. Параформальдегідну пасту

- D. Йодоформну пасту
- E. Кальційвмісну пасту

91) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У пацієнта діагностовано фібропапілому шкіри обличчя. Який метод лікування необхідно застосувати?

- A. Фізіотерапевтичний
- B. Хірургічний
- C. Медикаментозний
- D. Променевий
- E. Комбінований

92) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 53-х років страждає на цукровий діабет, має скарги на печіння, сухість в роті, біль при вживанні їжі, виділення в'язкої слини. Впродовж 7-ми років користується знімними пластинковими протезами. Об'єктивно: на гіперерованій, набряклій слизовій оболонці щік в ділянках кутів рота, спинці язика та піднебінні незначний наліт, що важко знімається, після видалення якого оголюється ерозивна поверхня. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. Хронічний атрофічний кандидоз
- B. Червоний плесканий лишай, ексудативно-гіперемічна форма
- C. Лейкоплакія, ерозивна форма
- D. Гострий атрофічний кандидоз
- E. Червоний плесканий лишай, ерозивно- виразкова форма

93) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік 49-ти років з'явився через 2 днів після видалення 38 зуба. Скаржитися на біль та утруднене відкривання рота. Об'єктивно: температура - 38°C, загальний стан задовільний, незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку м'яких тканин під кутом нижньої щелепи зліва. Запальна контрактура III ступеня. Лунка 38 зуба виповнена гнилісно-некротичними масами сірого кольору з неприємним запахом. Для виконання кюретажу лунки зуба лікар застосував анестезію за Берше. Метою проведення цієї анестезії у даного хворого є блокада:

- A. Язикового та нижньокоміркового нервів
- B. Щічного та нижньокоміркового нервів
- C. Язикового, щічного та нижньокоміркового нервів
- D. Рухових волокон трійчастого нерва
- E. Нижньокоміркового нерва

94) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого 70-ти років повна відсутність зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: верхньощелепні горби і альвеолярні відростки повністю атрофовані, склепіння піднебіння пласке, вкрите шаром помірно піддатливої слизової оболонки. До якого типу атрофій беззубих щелеп можна віднести цей випадок?

- A. IV тип за Келлером
- B. II тип за Шредером
- C. III тип за Келлером
- D. III тип за Шредером
- E. II тип за Келлером

95) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 12-ти років тиждень тому переніс ГРВІ. Скарги на біль і свербіння у яснах, кровоточивість під час прийому їжі. На верхній і нижній щелепах ясна гіперемовані, набряклі, кровоточать під час дотику інструментом, індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5 бали, індекс КПУ- 6, проба Шилера-Пісарєва позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма
- B. Загострення хронічного катарального гінгівіту
- C. Хронічний катаральний гінгівіт
- D. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
- E. Пародонтит, стадія загострення

96) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту 35-ти років проводиться лікування хронічного фіброзного пульпіту 25 зуба. Планується пломбування каналу методом вертикальної конденсації розігрітої гутаперчі. Який інструмент необхідний для конденсації гутаперчі?

- A. Коренева голка
- B. Ендодонтичний зонд
- C. Плагер
- D. К-файл
- E. Спредер

97) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У вогнищі природної катастрофи виявлений хворий з рваною раною м'яких тканин обличчя у ділянці нижньої губи і підборіддя з ознаками зовнішньої кровотечі, у свідомості. Який об'єм першої медичної допомоги має бути наданий?

- A. Вкласти клапті у правильне положення і накласти пластинкові шви
- B. Первинна хірургічна обробка рани, накладання швів
- C. Зупинка зовнішньої кровотечі, тампонада рани, накладання стерильної пов'язки, транспортна іммобілізація
- D. Знеболювання 2% розчином промедолу з шприц-тюбика аптечки індивідуальної
- E. Надійно перев'язати судину у рані, вкласти клапті у правильне положення, накласти пластинкові шви і стерильну пов'язку

98) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 47-ми років скаржиться на зміну кольору 11 та 21 зубів. Об'єктивно: 11,21 зуби рожевого кольору, канали запломбовано до верхівок. Вирішено виготовити металокерамічні коронки на 11 та 21 зуби. Під яким оптимальним кутом слід проводити препарування апроксимальних поверхонь опорних зубів?

- A. 0°
- B. 20°
- C. 5°
- D. 10°
- E. 15°

99) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До приймального відділення лікарні надійшов хворий 43-х років зі скаргами на набряк обличчя, збільшення в об'ємі верхньої губи, язика. Такий стан з'явився близько 40 хвилин тому після прийому аспірину. Об'єктивно: хворий занепокоєний, шкірні покриви звичайного кольору. Дихання частково утруднене. Визначається набряк верхньої губи, повік, щік, язика, м'якого піднебіння. Назвіть найбільш імовірний діагноз:

- A. Набряк Квінке
- B. Синдром Мелькерсона-Розенталя
- C. Контактний алергічний хейліт
- D. Лімфедема губ
- E. Іландулярний хейліт

100) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнтка 27-ми років звернулася в стоматологічну клініку зі скаргами на естетичний дефект в області верхніх центральних різців. Поставлений діагноз: хронічний глибокий карієс, IV клас за Блеком. Планується естетична реставрація 11 і 21 лубів. Виберіть матеріал з найкращим поєднанням міцності і естетичних властивостей:

- A. Компомери
- B. Рідкі композити
- C. Макронаповнені композити
- D. Гібридні композити
- E. Мікронаповнені композити

101) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 50-ти років скаржиться на зміну кольору ясен, біль при вживанні гострої їжі, слабкість, дратівливість. Зазначає, що періодично виникають плями і бульбашки на шкірі. Тривалий час працює в гальванічному цеху. При огляді хворий блідий, на яснах виявлена облямівка сіро-чорного кольору, на слизовій порожнині рота поодинокі ерозії, болючі при пальпації. Поставте попередній діагноз:

- A. Отруєння солями ртуті
- B. Багатоформна ексудативна еритема
- C. Інтотоксикація солями свинцю
- D. Гострий лейкоз
- E. Виразково-некротичний стоматит Венса- на

102) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До відділення хірургічної стоматології надійшла хвора з скаргами на припухлість правої половини обличчя, погане самопочуття. З анамнезу відомо: тиждень тому на правій половині обличчя відчула свербіння шкіри і помітила невеликий щільний вузлик. Почала прикладати різні мазі. Припухлість стала наростати, з'явився біль, лихоманка. Об'єктивно: загальний стан середньої важкості, температура тіла до 39°C. Щічна ділянка справа набрякла, шкіра гіперемована, в центрі набряк овальної форми, припіднятий над поверхнею оточуючих тканин, на верхівці якого помітна чорна кірочка. При пальпації: болючий інфільтрат діаметром 3,5 см, піднижньощелепні лімфатичні вузли збільшені та болючі. Відкривання рота дещо обмежене, порожнина рота сано-вана. Встановіть діагноз:

- A. Фурункул
- B. Флебівт лицевої вени
- C. Гострий лімфаденіт
- D. Гострий лімфангоїт
- E. Карбункул

103) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 25-ти років скаржиться на наявність порожнини у зубі на нижній щелепі зліва, біль від солодкого, кислого і під час прийому твердої їжі. Об'єктивно: в 16 зубі глибока каріозна порожнина, виповнена світлим розм'якшеним дентином. Зондування болісне по дну каріозної порожнини, реакція на холод болісна, зникає відразу після усунення подразника. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Хронічний глибокий карієс
- B. Гострий вогнищевий пульпіт
- C. Гострий середній карієс
- D. Гострий глибокий карієс
- E. Хронічний фіброзний пульпіт

104) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на відчуття оскомини, злипання зубів при змиканні, чутливість фронтальних зубів до термічних і механічних подразників. Об'єктивно: зміна зовнішнього вигляду емалі 13, 12, 11, 21, 22, 23. Емаль матова, шорстка, на ріжучих краях відсутня. Зондування вестибулярної поверхні вказаних зубів болісне, термопроба позитивна. З анамнезу встановлено, що пацієнт працює на виробництві неорганічних кислот. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- A. Флюороз
- B. Патологічна стертість зубів
- C. Гіпоплазія емалі
- D. Некроз твердих тканин зуба
- E. Ерозія емалі

105) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 25-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно: гіперемія і набряк ясенного краю фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп, ясенні сосочки при дотику кровоточать. Пародонтальні кишені відсутні. Рентгенологічних змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Генералізований пародонтит 1 ступеня
- B. Хронічний катаральний гінгівіт
- C. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- D. Гострий катаральний гінгівіт
- E. Гострий виразковий гінгівіт

106) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворій 39-ти років під час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квінке з наростанням явищ асфіксії. Які дії лікаря стоматолога необхідні для попередження стенотичної асфіксії?

- A. Проведення штучного дихання
- B. Введення десенсибілізуючих засобів
- C. Введення глюкокортикоїдів
- D. Проведення трахеостомії
- E. Введення адреноміметиків

107) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 57-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на біль і хрускіт у правому СНГЦС під час прийому їжі, який зменшується до вечора. Біль турбує останні 2-3 роки. Об'єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене до 2,5 см. На обох щелепах відсутні моляри. На рентгенограмі: СНГЦС визначається деформація суглобових поверхонь СНГЦС справа. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Анкілоз правого СНГЦС
- B. Артроз правого СНГЦС
- C. Больова дисфункція СНГЦС
- D. Контрактура правого СНГЦС
- E. Гострий артрит правого СНГЦС

108) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 48-ми років скаржиться на пухлиноподібне утворення на твердому піднебінні. Під час обстеження в передньому відділі піднебіння виявлено напівкулясте випинання з чіткими межами. 11, 21 зуби інтактні. Рентгенологічно наявне вогнище гомогенного розрідження кісткової тканини з чіткими межами, розмірами 3,5x2,5 см. На тлі розрідження кісткової тканини проєктуються корені інтактних 11, 21 зубів, періодонтальна щілина простежується. Поставте попередній діагноз:

- A. Фолікулярна кіста верхньої щелепи
- B. Радикулярна кіста верхньої щелепи
- C. Кіста носо-піднебінного каналу
- D. Остеобластокластома верхньої щелепи
- E. Амелобластома верхньої щелепи

109) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 30-ти років після переохолодження скаржиться на перекошення обличчя вправо, підвищення температури тіла до 37,9°C. Об'єктивно: не може нахмурити лоба зліва та закрити ліве око. Згладжена ліва носогубна складка. Губи щільно не стуляються. Відсутній лівий надбрівний рефлекс. Назвіть патологію:

- A. Невропатія лицевого нерва
- B. Невралгія трійчастого нерва
- C. Прогресуюча геміатрофія обличчя
- D. -
- E. Лицевий геміспазм

110) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 64-х років проводиться фіксація часткового знімного протеза на нижню щелепу. При огляді базиса лікарем виявлено чіткий "мармуровий малюнок" в вигляді сітки білих смуг, які пронизують товщу базисної пластмаси. Яка найбільш імовірна причина виникнення цього дефекту?

- A. Порушення процесу поліровки базису протеза
- B. Порушення процесу полімеризації акрилової пластмаси
- C. Сторонні включення в товщі базису протеза
- D. Нерівномірне зволоження мономером акрилової пластмаси
- E. Тріщини в базисі протезу в результаті механічного пошкодження

111) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Явище, за якого нормально розвинений зуб не прорізався у відповідний час на тому місці в зубному

ряду, де він мав прорізатися, має назву:

- A. Тортоаномалія
- B. Ретенція
- C. Дистопія
- D. Інклюзія
- E. Надкомплектний зуб

112) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловік 36-ти років скаржиться на свербіння, почервоніння, наявність висипки на губах та шкірі. Об'єктивно: червона облямівка губ, прилегла шкіра та куточки рота гіперемовані, набряклі. На їх фоні визначаються дрібні пухирці з серозним ексудатом, деякі зливаються між собою, деякі зруйновані і вкриті кірочками. Наявне мокнуття. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Контактний алергічний хейліт
- B. Іландулярний хейліт
- C. Актинічний хейліт, ексудативна форма
- D. Гострий екзематозний хейліт
- E. Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма

113) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому поставлений діагноз: рак правої привушної слинної залози T2N2M0. Який метод лікування показано хворому?

- A. Хірургічне видалення новоутворення
- B. Хірургічне видалення лімфатичного вузла
- C. Комбінована терапія
- D. Хіміотерапія
- E. Променева терапія

114) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитина 1,5 років хворіє протягом двох днів, відмовляється від їжі, неспокійна. Батьки відзначають підвищення температури тіла до 38,5°C, появу болісних виразок у ротовій порожнині. Об'єктивно: на слизовій оболонці м'якого і твердого піднебіння визначається 5-7 дрібних ерозій овальної форми з тонкою червоною облямівкою, вкритих фібринозним нальотом. Регіонарні лімфатичні вузли дещо збільшені, болісні під час пальпації. Відзначається набряк, гіперемія і кровоточивість ясен. Визначте найбільш імовірний діагноз:

- A. Інфекційний мононуклеоз
- B. Гострий герпетичний стоматит
- C. Герпетична ангіна
- D. Гострий кандидозний стоматит
- E. Багатоформна ексудативна еритема

115) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки дитини 3-х років звернулися до лікаря-ортодонта зі скаргами на естетичний дефект. З анамнезу відомо, що дитина має звичку смоктати язик. Вертикальна щілина у фронтальній ділянці 5 мм. Який ортодонтичний апарат показаний для лікування даної патології?

- A. Активатор Дасса
- B. Пластинка Кербітца
- C. Пластинка Шонхера

- D. Пластинка Крауса
- E. Диск Фріеля

116) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

При огляді дитини виявлено втягнуту слизову оболонку на м'якому піднебіння і язичку. Поставлено діагноз: вроджене приховане незрощення м'якого піднебіння. Яке оперативне втручання необхідне?

- A. Ураностафілопластика
- B. Уранопластика
- C. Ринопейлопластика
- D. Велопластика
- E. Хейлопластика

117) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворого віком 21 рік доставлено в щелепно-лицеве відділення з фурункулосом обличчя. Фурункули та карбункули якої локалізації найчастіше ускладнюються тромбофлебітом кутової вени обличчя?

- A. Носа та зовнішнього кута ока
- B. Щоки, привушно-жувальної ділянки
- C. Верхньої губи, підочної ділянки
- D. Нижньої губи та кута щелепи
- E. Нижньої губи та підборіддя

118) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту 54-х років показано виготовлення суцільнолитих металокерамічних мостоподібних протезів на верхню та нижню щелепи. Яку групу відбиткових матеріалів необхідно вибрати при виготовленні даних зубних протезів?

- A. Цинкооксидевгенолові
- B. Термопластичні
- C. Силіконові
- D. Альгінатні
- E. Гіпс

119) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 27-ми років скаржиться на загальну слабкість, біль в нижній щелепі, при ковтанні. Два дні тому почав боліти 38 зуб. Відкриття рота неможливе. Яку анестезію необхідно виконати для огляду ротової порожнини та видалення 38 зуба?

- A. Ментальна
- B. За Верлоцьким
- C. За Берше-Дубовим
- D. Інфільтраційна
- E. Туберальна

120) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 21-го року три години тому отримав ножове поранення в ділянці правої щоки; була кровотеча, на момент огляду припинилася. Об'єктивно: в ділянці правої щоки наявна рана з рівними краями, яка не проникає в порожнину рота, розміром 4x1

см. заповнена згустком. Накладання яких швів показане хворому?

- A. Первинні глухі
- B. Ранні вторинні
- C. Пізні вторинні
- D. Первинні направляючі
- E. Первинні зближуючі

121) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

З якою частотою проводиться генеральне прибирання в стоматологічному кабінеті?

- A. Не рідше 1 разу на місяць
- B. Не рідше 2 разів на тиждень
- C. Не рідше 1 разу на тиждень
- D. Не рідше 1 разу на рік
- E. Не рідше 1 разу на 2 тижні

122) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 50-ти років скаржиться на болісний дефект щілиноподібної форми нижньої губи, який з'явився місяць тому. Об'єктивно: встановлено сухість нижньої губи, лінійне порушення цілісності червоної облямівки нижньої губи, що частково переходить на слизову оболонку, локалізується в середній частині, вкрита кров'янистою кіркою. Встановіть можливий діагноз:

- A. Атопічний хейліт
- B. Синдром Мелькерсона-Розенталя
- C. Хронічна лімфадема губ
- D. Гранулематозний хейліт Мішера
- E. Хронічна тріщина губи

123) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Жінка 39-ти років звернулася зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: зубна формула: 17 16 15 14 13 12 11 / 21 22 23 24 25 26 27, 47 46 45 44 43 42 41/31 32 33 34 35 36 37. Зуби інтактні, коронки високі. Навколо 42 41/31 32 зубів ясенні кишени, рухомість I та II ступенів. Для імобілізації рухомих зубів виготовлена ков-пачкова шина з фіксуєчими коронками на 43/33 зуби. Яку стабілізацію зубів дозволяє провести дана шина?

- A. Сагітальна
- B. Парасагітальна
- C. Фронтальна
- D. Фронтально-сагітальна
- E. Колова

124) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 35-ти років скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи при спробі закрити рот. Травма сталась внаслідок побиття невідомим. Об'єктивно: при пальпації альвеолярний паросток верхньої щелепи рухомий з обох боків, позитивний симптом Малевича та симптом "навантаження" на рентгенограмі лінія перелому визначається у ділянці нижньої стінки грушеподібного отвору, вилично-альвеолярних гребенів, зниження прозорості верхньощелепних пазух. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи зліва
- B. Перелом кісток носа

- C. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор I (нижній тип)
- D. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор III (верхній тип)
- E. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор II (середній тип)

125) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 37-ми років зі звичним вивихом нижньої щелепи, виготовляється незнімний апарат для обмеження відкривання рота. Який термін користування даним апаратом?

- A. 2-3 місяці
- B. 3-4 тижні
- C. 6-12 місяців
- D. 4-5 років
- E. 1-2 тижні

126) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Після видалення 27 зуба у хірурга - стоматолога виникла підозра на перфорацію гайморової пазухи. Для уточнення діагнозу лікар вирішив провести носоротову пробу. Які дії потрібно виконати хворому?

- A. Зробити вдих через ніс і видихнути через рот, затуливши при цьому ніс
- B. Закрити пальцями ніс і намагатися видихнути повітря через ніс, при цьому стежити за лункою 27 зуба
- C. Видихнути повітря через ніс, слідкуючи за лункою 27 зуба
- D. Закрити пальцями ніс і видихнути повітря через рот, слідкуючи за лункою 27 зуба
- E. Видихнути повітря через рот, слідкуючи за лункою 27 зуба

127) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Під час підготовки до протезування у пацієнта 38-ми років виявлена перфорація дна пульпової камери в ділянці біфуркації коренів 46 зуба. Об'єктивно: 46 зуб нерухомий, пародонтальних кишень в ділянці 46 зуба не виявлено. На рентгенограмі: канали 46 зуба запломбовані на всю довжину, патологічних змін в периапікальній ділянці коренів немає. В області біфуркації коренів 46 зуба невелике розрідження верхівки міжкореневої перегородки. Який вид зубозберігаючої операції показаний в даному випадку?

- A. Резекція
- B. Іемісекція
- C. Реплантація
- D. Ампутація
- E. Коронаро-радикулярна сепарація

128) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворого 40-ка років серединний дефект твердого піднебіння розміром 2x3 см. Зубні ряди інтактні. Яку конструкцію obturatora краще застосувати у даному випадку?

- A. Піднебінна пластинка
- B. Obturator за Померанцевою-Урбанською
- C. Плаваючий obturator
- D. Obturator за Ільїною-Маркосян
- E. Пластинковий протез з obturуючою частиною

129) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 29-ти років потребує заміщення дефектів зубного ряду верхньої щелепи, яке може бути здійснено шляхом виготовлення мостоподібних протезів з естетичним облицюванням. При виготовленні суцільнолитих металопластмасових мостоподібних протезів надійна фіксація пластмасового облицювання ("Сінма-М") до каркасу досягається при використанні:

- A. Ретенційних кульок
- B. Обробки в піскоструменевому апараті
- C. Лаку ЕДА
- D. Лаку "Коналор"
- E. Якісного полірування каркасу

130) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопець 21-го року звернувся до ортодонта зі скаргами на значну вираженість підборідної складки. Об'єктивно: зменшена нижня третина обличчя, значно виражена підборідна складка. При внутрішньоротовому огляді: відсутність контактів фронтальних зубів обох щелеп при їх змиканні, сагітальна щілина 4 мм, передньо-щічний горбик першого верхнього моляра змикається з одноіменним горбиком першого нижнього моляра. Для якого аномального прикусу це характерно?

- A. Відкритий
- B. Глибокий
- C. Мезіальний
- D. Перехресний
- E. Дистальний

131) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Під час лікування гострого глибокого карієсу 16 зуба у пацієнтки 18-ти років було перфоровано пульпову камеру. Перфорація у вигляді крапки в проекції рогу пульпи. Яку тактику лікування доцільно застосувати в даному випадку?

- A. Девітальна ампутація
- B. Вітальна екстирпація
- C. Накласти ізоляційну прокладку та постійну пломбу
- D. Біологічний метод
- E. Девітальна екстирпація

132) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки дівчинки віком 6-ти років звернулися зі скаргами на біль і набряк у дитини в ділянці верхньої щелепи справа, підвищення температури тіла до 37,9°C, погіршення загального самопочуття. Дані симптоми з'явилися три дні тому. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин щічної та підочної ділянок справа. Коронка 54 зуба зруйнована на 1/2, перкусія болюча, зуб раніше лікований з приводу ускладненого карієсу. З піднебінної сторони в ділянці вказаного зуба виявлено болючий інфільтрат з флюктуацією в центрі, вкритий гіперемованою оболонкою. Встановіть попередній діагноз:

- A. Загострення хронічного періодонтиту 54 зуба
- B. Хронічний одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи
- C. Гострий серозний періостит верхньої щелепи від 54 зуба
- D. Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи
- E. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 54 зуба

133) крок 2019

Чоловік скаржиться на печіння в ділянці слизової оболонки твердого піднебіння при користуванні частковим знімним пластинковим протезом, виготовленим тиждень тому. Діагностовано алергічний контактний стоматит. Визначте тактику лікування, коли відомо, що умов для виготовлення дугового протезу немає, а пацієнт вперше користується знімною конструкцією:

- A. Виготовлення нового протезу з додаванням в пластмасове тісто меншої кількості полімеру
- B. Кип'ятіння раніше виготовленого протезу в дистильованій воді протягом 10 хвилин
- C. Накладання виготовленого протезу з частим полосканням водою, та прийомом гіпосенсибілізуючих засобів
- D. Виготовлення нового протезу з додаванням в пластмасове тісто меншої кількості мономеру
- E. Виготовлення нового знімного протезу з металевим базисом

134) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Хворий 36-ти років звернувся зі скаргами на наявність виразки на нижній губі зліва. Три тижні тому з'явилося на губі незначне почервоніння округлої форми, яке з часом стало інтенсивнішим і ущільненим. В центрі його утворилася виразка 2-3 дні тому, а під щелепою з'явилися множинні вузлики, які хворому не болять. Об'єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи зліва виразка овальної форми розміром 1,2 см з рівними, чіткими межами. Яскраво-червоним блискучим дном. Краї виразки мають вигляд валика, що плавно спускається до низу, а в її основі щільний безболісний інфільтрат. Підщелепні лімфовузли збільшені, безболісні. Шкіра над ними не змінена. Якому захворюванню відповідає клінічна картина?

- A. Виразковий хейліт
- B. Сифіліс (первинний період)
- C. Трофічна виразка
- D. Червоний вовчак
- E. Рак губи

135) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

Хворий 35-ти років страждає на локалізований пародонтит фронтальних зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: на верхній щелепі зубний ряд безперервний, на нижній щелепі відсутні 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38 зуби, інші зуби мають рухомість II ступеня, тріми, діастему. Визначте тактику лікаря-ортопеда в даній клінічній ситуації:

- A. Шинувати рухливі зуби з подальшим протезуванням
- B. Ортодонтичне лікування з подальшим шинуванням і протезуванням
- C. Відновити оклюзійну висоту частковим знімним пластинковим протезом
- D. Відновити оклюзійну висоту бюгельним протезом
- E. Виконати тимчасове шинування зубів нижньої щелепи

136) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА
ТЕМА

В хірургічне відділення стоматологічної поліклініки звернувся пацієнт 29-ти років зі скаргами на болісну припухлість обличчя справа, що з'явилась 1,5-2 місяці тому і поступово збільшувалась. Об'єктивно: відкриття рота вільне, обличчя асиметричне за рахунок припухлості в правій привушно- жувальній ділянці. Шкіра над припухлістю гіперемована, набрякла, пальпаторно визначається болісний інфільтрат розміром до 3 см. При масуванні із вивідної протоки правої привушно- слинної залози виділяється прозора слина. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнта?

- A. Хронічний гнійний лімфаденіт правої привушно-жувальної ділянки
- B. Фурункул правої привушно-жувальної ділянки

- C. Гострий гнійний паротит справа
- D. Субмасетеріальний абсцес справа
- E. Хронічний інтерстиціальний паротит справа

137) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту 25-ти років встановлений діагноз: гострий глибокий карієс 13 зуба V клас за Блекум. Планується проведення естетичної реставрації 13 зуба фотополімерним композитним матеріалом. Який матеріал слід використати для прокладки на дно каріозної порожнини в даному випадку?

- A. Девіталізуюча паста
- B. Дентин-паста
- C. Резорцин-формалінова паста
- D. Йодоформна паста
- E. Кальційвмісна паста

138) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Внаслідок удару у хлопчика віком 15 років верхні центральні різці заглибилися у щелепу на половину висоти коронок. Визначте тактику лікаря-стоматолога:

- A. Динамічне спостереження, з можливим подальшим ендодонтичним лікуванням 11, 21 зубів
- B. Трансплантація 11, 21 зубів у зубний ряд, ендодонтичне лікування
- C. Оперативне виведення 11, 21 зубів у зубний ряд, іммобілізація зубів, подальше можливе ендодонтичне лікування
- D. Реплантація 11,21 зубів у зубний ряд
- E. Видалення 11, 21 зубів, ортопедичне протезування їх

139) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту показане ендодонтичне лікування 21 зуба. Інструментальна обробка каналу проводиться ручними ендодонтичними інструментами. Як називається ендодонтичний інструмент, виготовлений шляхом спіральної конусоподібної нарізки (виточування) сталевого дроту круглого перерізу (фрезерування)?

- A. Спредер
- B. К-файл
- C. К-ример
- D. Н-файл
- E. Плагер

140) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Одним з етапів виготовлення повного знімного протеза є припасування індивідуальної ложки і зняття функціонального відбитка. Яким із перерахованих матеріалів проводиться функціональне оформлення країв індивідуальної ложки?

- A. Ортокор
- B. Стомальгін
- C. Хромопан
- D. Гіпс
- E. Тюдент

141) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 28-ми років виготовляється вкладка на 24 зуб непрямым методом. Сформована порожнина для вкладки. Який етап протезування має бути наступним?

- A. Моделювання вкладки
- B. Відливка вкладки
- C. Виготовлення моделі
- D. Отримання відбитка
- E. Фіксація вкладки

142) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий звернувся зі скаргами на біль в нижній щелепі справа, утруднене відкривання рота. Об'єктивно: при зовнішньому огляді обличчя симетричне, відкривання рота злегка утруднене тризм - 1 ступеня. Слизова оболонка за 47 зубом набрякла, гіперемована, болісна при пальпації, видно медіальні горби 48 зуба, що не прорізався повністю. Який діагноз можна припустити?

- A. Абсцес крило-нижньощелепного простору
- B. Перикоронарит
- C. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту
- D. Гострий одонтогенний періостит
- E. Гострий одонтогенний остеомієліт

143) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловіку 32-х років встановлений діагноз: виразковий гінгівіт. Після антисептичної обробки порожнини рота під анестезією лікар провів видалення зубних відкладень і некротичного нальоту. Планується закінчити відвідування накладенням ясенної пов'язки. Який препарат етіотропної дії необхідно ввести в склад ясенної пов'язки?

- A. Метронідазол
- B. Метил урацил
- C. Пімафуцин
- D. Контрикал
- E. Терилітин

144) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 60-ти років звернувся в щелепно-лицевий стаціонар зі скаргами на біль, кровотечу, порушення жування. В анамнезі травма нижньої щелепи на рівні центральних різців. Об'єктивно: припухлість в місці травми, відкривання рота не обмежене. Діагностований серединний перелом нижньої щелепи. Обидві щелепи беззубі. Яка конструкція найбільш доцільна?

- A. Наясенна шина Іунінга
- B. Апарат Рудько
- C. Наясенна шина Порта
- D. Зубо-ясенна шина Ванкевич
- E. Зубо-ясенна шина Вебера

145) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

При профілактичному огляді дитини 10-ти років виявлено білі, матові плями на вестибулярній поверхні 11, 21 зубів, які локалізуються в пришийковій ділянці. Поверхня емалі в ділянці ураження не пошкоджена, забарвлюється метиленовим синім. Суб'єктивні скарги дитини відсутні. Виберіть оптимальний метод лікування:

- A. Імпрегнаційний метод
- B. Застосування ART-методики
- C. Препарування і пломбування
- D. Герметизація зубів
- E. Ремінералізуюча терапія

146) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 49-ти років скаржиться на прогресуюче утруднене відкривання рота, болісне ковтання зліва, різке погіршення загального стану, підвищення температури до 39,3°C. Скарги на гострий біль у зруйнованому 38 зубі. Об'єктивно: обличчя симетричне, піднижньощелепні лімфатичні вузли зліва збільшені, болісні під час пальпації. Пальпація під лівим кутом нижньої щелепи та в лівій позадущелепній ділянці викликає різкий біль. Відкривання рота та бокові рухи вліво значно обмежені. Наявна гіперемія та інфільтрація лівої крило-щелепної складки. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Абсцес щелепно-язикового жолобка
- B. Флегмона позадущелепної ділянки
- C. Флегмона крило-щелепного простору
- D. Флегмона піднижньощелепного простору
- E. Флегмона приглоткового простору

147) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки 7,5-річної дитини скаржаться на косметичний недолік переднього зуба верхньої щелепи. На вестибулярній поверхні 11 зуба поблизу ріжучого краю виявлена блискуча пляма жовтого кольору з чіткими обрисами. Емаль при зондуванні гладка. В анамнезі - вивих 51 зуба. Визначте попередній діагноз:

- A. Системна гіпоплазія емалі
- B. Флюороз зубів
- C. Гострий поверхневий карієс
- D. Гострий початковий карієс
- E. Місцева гіпоплазія емалі

148) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчик віком 15 років звернувся до лікаря стоматолога з приводу видалення 26 зуба. Під час проведення туберальної анестезії з'явилося швидке наростання набряку тканин і обмеження відкривання рота. Чим обумовлений такий стан?

- A. Анафілактичний шок
- B. Травма судин
- C. Травма м'язів під час проведення анестезії
- D. Травма нервових стовбурів
- E. Ішемія шкіри

149) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчина 18-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль в привушних ділянках загальне нездужання. При огляді відзначається припухлість привушних ділянок з обох сторін, болюче відкривання рота, в ротовій порожнині - гіперемія та набряк слизової оболонки навколо усть протоків привушних слинних залоз. Наявні симптоми загальної інтоксикації: температура тіла - 38°C, біль в м'язах. Встановіть попередній діагноз:

- A. Флегмона привушно-жувальної ділянки

- В. Гострий гнійний лімфаденіт
- С. Гострий неепідемічний паротит
- Д. Гострий епідемічний паротит
- Е. Псевдопаротит Герценберга

150) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий звернувся зі скаргами на зруйновану коронку 16 зуба. При об'єктивному обстеженні: коронкова частина 16 зуба зруйнована повністю. Діагностовано: хронічний гранулюючий періодонтит 16 зуба. Хворому показано видалення даного зуба. Під яким знеболенням доцільно виконати цю операцію?

- А. Гнфраорбітальна та туберальна анестезія
- В. Гнфраорбітальна анестезія
- С. Туберальна і різцева анестезія
- Д. Туберальна анестезія
- Е. Туберальна і палатинальна анестезія

151) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 55-ти років скаржиться на печіння, неприємні відчуття у язиці. Близько 5-ти років хворіє на гіпоацидний гастрит. Які зміни язика найбільш імовірні для цього хворого?

- А. Атрофія і згладженість сосочків
- В. Ерозії на бічних поверхнях язика
- С. Гіпертрофія сосочків
- Д. Складчастість язика
- Е. Обкладеність язика

152) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 22-х років направлений на видалення 36-го зуба. На прийомі у хірурга - стоматолога перед проведенням анестезії, хворий відчув слабкість, шум у вухах, потемніння в очах. Об'єктивно: шкіра обличчя бліда, вкрита холодним потом, АТ-110/70 мм рт.ст. Пацієнт на декілька секунд втратив свідомість. Яке ускладнення виникло на прийомі у хворого?

- А. Стенокардія
- В. Зомління (Непритомність)
- С. Епілептичний напад
- Д. Колапс
- Е. Анафілактичний шок

153) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 39-ти років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Після об'єктивного обстеження хворому показано виготовлення металокерамічних коронок на 13,14 зуби. Який відбитковий матеріал потрібно використати для отримання робочого відбитка?

- А. У пін
- В. Кромопан
- С. Ортокор
- Д. Спідекс
- Е. Репін

154) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 68-ми років виготовляють часткові знімні протези. На етапі перевірки конструкції протезів спостерігається горбково-горбковий контакт у бічних ділянках та сагітальна щілина у фронтальній. Яку помилку допустив лікар?

- A. Зафіксована бічна оклюзія
- B. Завищена висота ЦО
- C. Зафіксована передня оклюзія
- D. Занижена висота ЦО
- E. Неправильна побудова протетичної площини

155) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 44-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології за скаргами на біль і хрускіт в ділянці СНЩС, порушення функції жування внаслідок часткової відсутності зубів на нижній щелепі. Об'єктивно: відсутні 38 37 36 35 / 45 46 47 48 зуби, патологічна стертість зубів нижньої щелепи II ступеню. Як зміщується положення голівок СНЩС при зниженні висоти прикусу в положенні центральної оклюзії?

- A. Вгору попереду суглобового горбка
- B. Дистально і вглиб суглобової ямки
- C. Вниз позаду суглобового горбка
- D. Вниз попереду суглобового горбка
- E. Займають центральне положення суглобової ямки

156) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитині 8 років. Під час огляду порожнини рота в 46 зубі, який має сіро-коричневий колір, виявлено глибоку каріозну порожнину, що сполучається з порожниною зуба; зондування коронкової пульпи безболісне, зондування вустів кореневих каналів болюче. Перкусія злегка відчутна. На рентгенограмі - корені зуба сформовані на 3/4 довжини. Що з переліченого найбільш ефективно для медикаментозної обробки кореневих каналів при лікуванні 46 зуба?

- A. 0,9% розчин натрію хлориду
- B. 3% розчин перекису водню
- C. 40% розчин формаліну
- D. 1 % розчин гіпохлориту натрію
- E. 1:5000 розчин фурациліну

157) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Встановлено, що хворий отримав хімічний опік обличчя сірчаною кислотою. Яку речовину необхідно використовувати для обробки рани з метою нейтралізації?

- A. Антисептик
- B. Кислоту
- C. Спирт
- D. Луг
- E. Проточну воду

158) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 39-ти років звернувся зі скаргами на неприємний запах з рота, кровоточивість та болючість ясен, рухомість зубів. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, нижні фронтальні зуби рухомі, I-II

ступінь рухомості. Пародонтальні кишені 4-5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
- B. Генералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг
- C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
- D. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
- E. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг

159) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

При профілактичному огляді стоматологом у пацієнта 20-ти років виявлені дефекти емалі у вигляді шорохуватих білих плям з нерівними контурами в пришийковій області вестибулярної поверхні 11 і 12 зубів, які зафарбовуються 2% розчином метиленового синього. Встановіть діагноз:

- A. Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів V клас за Блекум
- B. Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів V клас за Блекум
- C. Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів III клас за Блекум
- D. Вогнищева гіпоплазія емалі 11 і 12 зубів
- E. Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів III клас за Блекум

160) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У пацієнта 41-го року, після видалення 46 зуба, на контактано-дистальній поверхні 45 зуба виявлений дефект в межах емалі з нечіткими контурами, темно-коричневого кольору, крихкий при зондуванні. Встановіть діагноз:

- A. Хронічний поверхневий карієс II клас за Блекум
- B. Хронічний середній карієс IV клас за Блекум
- C. Хронічний поверхневий карієс IV клас за Блекум
- D. Хронічний початковий карієс IV клас за Блекум
- E. Хронічний початковий карієс II клас за Блекум

161) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Організовується міська стоматологічна поліклініка. В лікувально-хірургічному відділенні планується 38 посад лікарів- стоматологів. Скільки посад завідуючих відділенням має бути згідно нормативам?

- A. 5
- B. 1
- C. 2
- D. 4
- E. 3

162) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 28-ми років отримав удар в підборіддя. Скаржиться на біль в боковій ділянці обличчя справа. При огляді відзначається асиметрія обличчя за рахунок набряку тканин верхньої частини правої привушної ділянки, відкривання рота болісне, обмежене, зміщення щелепи в правий бік. косий правобічний прикус. Який попередній діагноз у хворого?

- A. Травматичний однобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків
- B. Травматичний ментальний перелом нижньої щелепи зі зміщенням відламків
- C. Травматичний подвійний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків
- D. Травматичний перелом шийки суглобового відростку нижньої щелепи зі зміщенням відламків
- E. Травматичний центральний перелом нижньої щелепи зі зміщенням відламків

163) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту з метою видалення 27 зуба була проведена туберальна і піднебінна анестезія. При виведенні голки з м'яких тканин при виконанні піднебінної анестезії виникла кровотеча. Що необхідно зробити для зупинки кровотечі?

- A. Ввести внутрішньовенно 10% розчин хлористого кальцію
- B. Ввести внутрішньом'язово вікасол
- C. Притиснути тампоном місце вколу
- D. Перев'язати зовнішню сонну артерію
- E. Накласти шви

164) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 47-ми років, будівельник. Скарги на наявність на нижній губі розростання, яке з'явилося 1 місяць тому. Крім естетичного дискомфорту нічим не турбує. Об'єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи - напівсферичне утворення (6мм у діаметрі, 3 мм - висота) з горбистою поверхнею синюшно-червоного кольору. Пальпаторно - утворення безболісне, помірно-щільної консистенції, без інфільтрату у основі і по периферії утворення.

Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Який попередній діагноз?

- A. Піогенна гранульома
- B. Кератоакантома
- C. Бородавчастий передрак червоної облямівки
- D. Вірусна бородавка
- E. Рак нижньої губи

165) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У пацієнта 37-ми років наявна асиметрія обличчя за рахунок припухлості привушно- жувальної ділянки справа. При пальпації - утвір щільної консистенції, без чітких меж, болючий, нерухомий. Кути рота й ока опущені. При намаганні надути щоки права щока парусить. Який попередній діагноз?

- A. Периферичний парез лицьового нерва
- B. Флегмона привушно-жувальної ділянки
- C. Центральний парез лицьового нерва
- D. Невралгія трійчастого нерва
- E. Злоякісна пухлина привушної слинної залози

166) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки 5-річної дитини звернулись до лікаря-стоматолога з метою санації її ротової порожнини. Об'єктивно: на жувальних поверхнях 54, 64, 74, 75 і 85 зубів виявлено каріозні порожнини в межах розм'якшеного плащового дентину. Дитина нервово збуджена, поводить неадекватно. Виберіть найбільш доцільну лікувальну тактику у даному випадку:

- A. Інвазивна герметизація
- B. ART-методика
- C. Профілактичне пломбування
- D. Імпрегнаційна терапія
- E. Глибоке фторування

167) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчинка 8-ми років скаржиться на кровоточивість ясен. Дитина хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: ясенні сосочки у ділянці зубів верхньої і нижньої щелеп гіперемовані, набряклі, вкривають коронки на 1/3. Рухливість зубів I ступеня. Який метод дослідження необхідно провести для встановлення діагнозу?

- A. Реопародонтографія
- B. Вакуумна проба
- C. Стоматоскопія
- D. Рентгенографія
- E. Індекс ПМА

168) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Яка форма верхнього зубного ряду повинна бути в постійному прикусі?

- A. Трапеція
- B. Сідлоподібна
- C. Напівколо
- D. Парабола
- E. Напівеліпс

169) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 21-го року звернувся зі скаргами на утруднене відкривання рота, зміну зовнішнього вигляду обличчя протягом останніх 2-х років. В анамнезі: травма обличчя декілька років тому. При огляді: сплюснення правої половини обличчя, зміщення підборіддя вліво. При пальпації відмічається зменшення екскурсії суглобової голівки нижньої щелепи зліва. Обмеження відкривання рота до 1 см. Встановіть попередній діагноз:

- A. Загострення хронічного артрити СНЩС зліва
- B. Передній вивих нижньої щелепи
- C. Артроз лівого СНЩС
- D. Гострий артрит лівого СНЩС
- E. Анкілоз лівого СНЩС

170) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 57-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на застрягання їжі на зубах нижньої щелепи справа. Під час опитування з'ясовано, що у пацієнта є кардіостимулятор. Об'єктивно: у 44 зубі на дистальній контактній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину, виповнена залишками їжі. Дентин пігментований, щільний. Зондування, перкусія, термопроба - безболісні. Який пломбувальний матеріал ПРОТИПОКАЗАНИЙ даному пацієнту?

- A. Силікатний цемент
- B. Амальгама
- C. Склоіономерний цемент хімічного твердіння
- D. Цинк-фосфатний цемент
- E. Фотополімерний композит

171) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Чоловікові 35-ти років планується виготовлення адгезивного мостоподібного протеза. Об'єктивно: втрачений 15 зуб. Опорні 14 і 16 зуби стійкі. Коронки зубів середньої висоти. Екватор виражений.

Прикус орто-гнатичний. Що може бути опорною частиною адгезивного протеза?

- A. Куксові вкладки
- B. Повні литі коронки
- C. Комбіновані коронки
- D. Литі панцерні або перфоровані накладки
- E. Екваторні коронки

172) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У хворої 48-ми років діагностований ревматоїдний артрит СНЩС. Що є характерною ознакою ревматоїдного артриту СНЩС?

- A. "Тугорухомість" нижньої щелепи зранку
- B. Зниження гостроти слуху
- C. Двобічність ураження
- D. Наявність у анамнезі хронічної травми
- E. Поєднання з артрогенною контрактурою

173) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

При обстеженні дитини 5-ти років був встановлений діагноз: гострий дифузний пульпіт 74 зуба. Який метод лікування найбільш раціональний у даному випадку?

- A. Екстирпація пульпи
- B. Видалення зуба
- C. Вітальна ампутація
- D. Девітальна ампутація
- E. Біологічний метод

174) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 44-х років звернувся до стоматологічної поліклініки з метою протезування. Скарги на утруднене пережовування їжі, естетичний дефект. Об'єктивно: відсутні 14, 15 і 22 зуби. Вкажіть втрату жувальної ефективності за Агаповим:

- A. 12%
- B. 20%
- C. 16%
- D. 18%
- E. 9%

175) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 62-х років скаржиться на наявність болючих пухирів, які швидко лопаються й утворюють ерозивну поверхню. На об'єктивному обстеженні виявлений позитивний симптом Нікольського. За допомогою цитологічного дослідження виявлені акантолітичні клітини мальпігійового шару епідермісу (клітини Тцанка). Встановіть діагноз:

- A. Пемфігоїд
- B. Герпетичний стоматит
- C. Багатоформна ексудативна еритема
- D. ХРАС
- E. Пухирчатка

176) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дитина 12,5 років звернулася до лікаря - стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об'єктивно: інтенсивність карієсу відповідає високому рівню - КПВ=2+4+0=6. Індекс Green-Vermillionдорівнює 1,7. Слизова оболонка ясен блідо-рожевого кольору. У даному випадку для індивідуальної гігієни ротової порожнини доцільно призначити зубні пасти, що містять:

- A. Екстракти трав
- B. Сольові добавки
- C. Амінофториди
- D. Ферменти
- E. Антисептики

177) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 37-ми років звернулася до лікаря- стоматолога з метою видалення 25 зуба. Який метод знеболення треба застосувати?

- A. Одностороння інфраорбітальна і палати-нальна анестезія
- B. Одностороння інфраорбітальна і різцева анестезія
- C. Одностороння туберальна, інфраорбітальна, палатинальна анестезія
- D. Двостороння центральна анестезія
- E. Одностороння туберальна і палатинальна анестезія

178) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

При внутрішньоротовому огляді пацієнта у лікаря-стоматолога ортопеда виникла підозра на наявність у нього сифілісу. Які на Вашу думку правильні подальші дії?

- A. Зняти відбитки для вивчення діагностичних моделей
- B. Закінчити огляд, направити пацієнта на відповідні аналізи
- C. Сказати хворому про свою підозру і закінчити прийом
- D. Відмовити пацієнту в наданні стоматологічної допомоги
- E. Продовжити огляд і почати препарування зубів

179) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнтка звернулася в стоматологічний кабінет для лікування другого нижнього моляра справа. Була проведена мандибулярна анестезія 4% розчином убістизину. Через кілька хвилин пацієнтка зблідла, вкрилася холодним потом, втратила свідомість. З рота виділяється велика кількість слини. Пульс - ниткоподібний, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Зіниці розширені, щелепи міцно стиснені, з'явилися судоми. Вкажіть невідкладний стан, який виник у хворої:

- A. Епілептичний напад
- B. Зомління (Непритомність)
- C. Колапс
- D. набряк Квінке
- E. Анафілактичний шок

180) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнту виготовляється металокерамічна коронка на 11 зуб. Планується зуб залишити вітальним. Які заходи на час лікування доцільно застосувати для профілактики виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба?

- A. Виготовлення провізорної коронки

- В. Призначення кальційвмісних препаратів
- С. Призначення протизапальних препаратів
- Д. Фізіотерапевтичні заходи
- Е. Призначення фторвмісних препаратів

181) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 42-х років із скаргами на неможливість пережовування їжі у зв'язку з частковою втратою зубів. Об'єктивно: у бокових ділянках відсутні 18, 16, 15, 25, 26, 28, 38, 35, 36, 44, 46, 48. Інші зуби мають рухомість I-II ступеня. Діагноз: генералізований пародонтит II ступеня. Яка на Вашу думку конструкція протезів найбільш раціональна в даному випадку?

- А. Бюгельні протези з шинуючими елементами
- В. Часткові знімні пластинкові протези
- С. Незнімні суцільнолітні мостоподібні протези
- Д. Протези з металевим базисом
- Е. -

182) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Дівчинка 7-ми років скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, яке з'явилося 3 місяці тому. Спостерігається його повільний ріст. Об'єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи справа є кругле новоутворення діаметром 0,5-1 см, яке підвищується над рівнем слизової оболонки, поверхня гладка, просвічується прозоро- блакитний вміст утворення. Пальпація безболісна. Консистенція пружно еластична. Поставте клінічний діагноз:

- А. Гемангіома нижньої губи
- В. Папілома нижньої губи
- С. Ретенційна кіста нижньої губи
- Д. Лімфангіома нижньої губи
- Е. Фіброма нижньої губи

183) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12-ти років зі скаргами на відсутність зуба на верхній щелепі. Зі слів батьків: тимчасовий зуб був видалений у 4-х річному віці внаслідок травми. Під час обстеження: обличчя без особливостей. Прикус постійних зубів. На верхній щелепі відсутній 21. Проміжок між 11 та 22 - 4 мм. На рентгенограмі: 21 розташований під кутом у 45 градусів до 11. Виберіть раціональний метод лікування:

- А. Апаратурний
- В. Комбінований метод лікування [хірургічний та апаратурний]
- С. Фізіотерапевтичний
- Д. Хірургічний
- Е. Ортопедичний

184) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчик 12-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури до 38,5°C, утруднене відкривання рота, біль під час ковтання, вживання їжі, розмови. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, обличчя незначно асиметричне через припухлість у лівій підщелепній ділянці. Відкривання рота обмежене до 1,2 см, болісне. набряк тканин у лівій під'язиковій ділянці, лівий щелепно-язиковий жолобок інфільтрований, згладжений, болісний під час глибокої пальпації, слизова оболонка тут

різко гіперемована. Коронка 36 зуба зруйнована повністю. Який діагноз можна припустити?

- A. Одонтогенна флегмона лівої підщелепної ділянки
- B. Одонтогенна флегмона лівої крило- щелепної ділянки
- C. Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 36 зуба
- D. Одонтогенний абсцес щелепно-язикового жолобка від 36 зуба
- E. Іострийодонтогенний періостит нижньої щелепи від 36 зуба

185) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнтка 18-ти років звернулася до лікаря-стоматолога на консультацію з приводу наявності новоутворення лобної ділянки. На лобній ділянці відмічається рожево- червона пляма шкіри напівкруглої форми з чіткими контурами, розміром 3-4 см. При натискуванні на ушкоджену ділянку тіла пальцями шкіра змінюється у кольорі, стає білішою. При припиненні тиску шкіра набуває попереднього рожево-червоного кольору. При нахиленні голови пляма стає більш насиченою в кольорі і збільшується в об'ємі; пацієнтка піднімає голову - пляма поступово набуває червоно-рожевого кольору. Поставте діагноз:

- A. Капілярна гемангіома
- B. Кавернозна гемангіома
- C. Лімфангіома
- D. Нейрофіброматоз
- E. Родима пляма (невус)

186) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хвора 26-ти років звернулася з приводу протезування зубів. Об'єктивно: коронка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується відновлення її анатомічної форми фарфоровою вкладкою, яку будуть виготовляти прямим методом. За допомогою чого потрібно зняти відбиток з сформованої порожнини для вкладки?

- A. Віск
- B. Твердокристалічні матеріали
- C. Термопластичні матеріали
- D. Золота або платинова фольга
- E. Силіконові матеріали

187) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 45-ти років скаржиться на ниючий, тривалий біль в 46 зубі, який з'являється під дією температурних і хімічних подразників. При огляді 46 зуба в пришийковій області на вестибулярній поверхні глибока каріозна порожнина, заповнена пігментованим розм'якшеним дентином. Зондування різко болюче в одній точці. На холодну воду з'являється повільно наростаючий ниючий біль. Поставте діагноз:

- A. Хронічний фіброзний періодонтит
- B. Хронічний глибокий карієс
- C. Хронічний гангренозний пульпіт
- D. Гострий глибокий карієс
- E. Хронічний фіброзний пульпіт

188) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки дівчинки 8-ми років звернулися зі скаргами на естетичне порушення. Об'єктивно: нижня частина обличчя вкорочена, підборіддя висунуте вперед, верхня губа западає. Під час змикання зубів

виявляється зворотне глибоке різцеве перекриття. У бічних ділянках мезіооклюзія. Виберіть апарат для лікування:

- A. Регулятор функції Френкля-2
- B. Апарат Осадчого
- C. Регулятор функції Френкля-3
- D. Регулятор функції Френкля-1
- E. Активатор Андресена-Гойпля

189) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До лікаря звернулася хвора з приводу утвору в під'язиковій ділянці, який утруднює мову та процес вживання їжі. При огляді в під'язиковій ділянці відзначено утвір м'яко-еластичної консистенції, з гладкою поверхнею, чіткими контурами та розміром 1 см в діаметрі. Під час пальпації відзначається симптом флюктуації. Слизова оболонка порожнини рота над утвором розтягнена, напівпрозора з блакитним відінком. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Калькульозний сіалоденіт
- B. Аденолімфома
- C. Змішана пухлина підщелепної слинної залози
- D. Ранула під'язикової слинної залози
- E. Гемангіома під'язикової ділянки

190) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До клініки звернулася батьки дитини 7-ми років з метою санації порожнини рота. Хлопчик народився і проживав у місцевості, де вміст фтору у воді 2,5 мг/л. Під час огляду було виявлено, що на вестибулярній поверхні 11, 21, 31, 41, 16, 26, 36, 46 наявні темні плями. З анамнезу відомо, що зуби прорізалися ураженими. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Недосконалий амелогенез
- B. Гіперплазія емалі
- C. Ерозія зубів
- D. Гіпоплазія емалі
- E. Флюороз

191) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 32-х років поставлений діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 27 зуба. Планується проведення лікування методом вітальної екстирпації з використанням анестетика амідного ряду для туберальної та піднебінної анестезії. Виберіть розчин для анестезії:

- A. Новокаїн 2%
- B. Лідокаїн 10%
- C. Анестезин 5 %
- D. Мепівастезин 3%
- E. Дикаїн 2%

192) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворому 38-ми років показане видалення 12 зуба. Який метод знеболення слід застосувати при видаленні цього зуба?

- A. Підочну та різцеву
- B. Підочну, піднебінну та різцеву
- C. Підочну та піднебінну

- D. Різцеву
- E. Підочну

193) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 25-ти років скаржиться на мимовільний нападopodobний біль в лівій скроні. Біль спонтанно виникає ввечері. Гнколи біль виникає при нахилах голови, при злетах літака. Об'єктивно: всі зуби інтактні; оголення шийок 24 і 36 зубів. Перкусія 24 зуба дає слабковиразний біль. На рентгенограмі 24 зуба в центральній частині коронкової порожнини визначається дентинової щільності утворення - 0,5x0,5 мм. Запропонуйте метод лікування:

- A. Курс новокаїнової блокади з вітаміном В₁
- B. Вігальна ампутація 24 зуба
- C. Вігальна екстирпація пульпи 24 зуба
- D. Ремінералізуюча терапія пришийкових ділянок 24 і 36 зубів
- E. Електрофорез з йодидом калію в проекції верхівки 24 зуба

194) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Пацієнт 40-ка років з вогнепальним пораненням нижньої щелепи і дефектом кісткової тканини розміром 2 см в ділянці підборіддя. Який метод іммобілізації йому показаний?

- A. Кістковий шов
- B. Двощелепна шина із зачіпними петлями і міжщелепним еластичним витягуванням
- C. Однощелепна шина-скоба
- D. Фіксація за допомогою спиць і стержнів
- E. Позаротовий апарат типу Рудько

195) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 57-ти років звернувся в клініку зі скаргами на рухомість значної групи, зубів. Після обстеження вирішено в комплексі лікування виготовити даному хворобу знімну шину. Шинуючі властивості знімних шин забезпечуються застосуванням таких кламерів:

- A. Утримуючі
- B. Вестибулярні
- C. Багатоанкерні і перекидні
- D. Зубо-альвеолярні
- E. Опорні

196) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

До хірурга-стоматолога звернувся пацієнт зі скаргами на біль і припухлість у ділянці верхньої губи і нижніх відділів підчонамкової ділянки зліва, періодичний біль у зруйнованому 22 зубі. Після проведеного обстеження встановлений діагноз: загострення хронічного періодонтиту 22 зуба, абсцес іклової ямки. Показана операція: видалення 22 зуба, розтин абсцесу внутрішньоротовим доступом. Виберіть оптимальний метод анестезії:

- A. Інфільтраційна анестезія
- B. Туберальна і піднебінна анестезія
- C. Наркоз
- D. Інфраорбітальна (позаротовий метод) і різцева анестезія
- E. Інфраорбітальна (внутрішньоротовий метод) і піднебінна анестезія

197) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хворий 19-ти років звернувся в травмпункт зі скаргами на біль і асиметрію обличчя, кровотечу з носа. Травму отримав близько 3-х годин тому. Свідомості не втрачав. Об'єктивно: виражена асиметрія обличчя за рахунок набряку і гематоми правої нижньої повіки та підчюномкової ділянки. Відкривання рота обмежене незначно. Прикус не порушений. Пальпаторно визначається симптом "сходинки", деформація в ділянці зовнішнього краю правої орбіти та вилично-альвеолярного гребеня. Порушення чутливості верхньої губи справа. Поставте діагноз:

- A. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор III (верхній тип)
- B. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор I (нижній тип)
- C. Перелом правої виличної кістки
- D. Перелом верхньої щелепи за ЛеФор II (середній тип)
- E. Перелом кісток носа

198) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Батьки 4-річної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи дитини. Об'єктивно: в пришийковій ділянці вестибулярної поверхні різців верхньої щелепи виявлені дефекти, які не перетинають емалево-дентинного сполучення і мають вигляд ділянок крейдоподібно зміненої емалі з видимим руйнуванням її структури. При зондуванні визначається шорстка, розм'якшена поверхня. Реакція на холододові подразники відсутня. Визначте діагноз:

- A. Іострий середній карієс
- B. Хронічний поверхневий карієс
- C. Іострий поверхневий карієс
- D. Іострий початковий карієс
- E. Хронічний початковий карієс

199) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

У щелепно-лицеве відділення госпіталізований 6-місячний хлопчик з приводу кровотечі з рани на вуздечці язика. З анамнезу відомо, що напередодні хірург-стоматолог провів френулотомію вуздечки язика. Кровотеча виникла через 6 годин після операції. Накладання швів на рану кровотечу не зупинило, дитину перевели до відділення гематології, де кровотечу зупинили внутрішньовенним введенням концентрату IX фактора зсідання крові. Встановіть діагноз:

- A. Іемофілія B
- B. Нагноєна рана язика
- C. Залізодефіцитна анемія
- D. Ідіопатичнатромбоцитопенічна пурпура
- E. Хвороба Віллебранда

200) крок 2019

ДИСЦИПЛІНА

ТЕМА

Хлопчика 7-ми років привели на консультацію до лікаря-стоматолога. Об'єктивно: ясна гіперемовані, відзначається кровоточивість, рухомість зубів, корені оголені, вкриті нальотом, наявність патологічних зубо-ясенних кишень, заповнених грануляціями. Дитина знаходиться на обліку у педіатра. Зі слів мами останнім часом стан дитини погіршився, відзначається нецукро-вий діабет, екзофтальм. Який діагноз можна запідозрити у дитини?

- A. Хвороба Хенда-Шюллера-Крістчена
- B. Хвороба Леттера-Сіве
- C. Хвороба Іюше
- D. Хвороба Таратинова
- E. Синдром Папійона-Лефевра

