

№	крок 2017
Тема	«Піодермії» (Основні клінічні прояви при стафілодерміях)
Текст завдання	Хворий 62-х років скаржитися на висип в ділянці лівої гомілки. Хворіє більше 2-х місяців. Лікувався самостійно, застосовуючи різні мазі та компреси, без покращення. Об'єктивно: на передній поверхні лівої гомілки вогнище хронічного запального характеру з чіткими краями. Поверхня нерівна, сосочкоподібні розростання. При натисканні виділяються краплі гною. Хворий відчуває незначний біль. RW, РІТ, РІФ, реакція Манту - негативні. Яка найбільш імовірна патологія у даного хворого?
Правильна відповідь	Піодермія
В	Туберкульозний вовчак
С	Бородавчастий туберкульоз
D	Третинний сифіліс
Е	Лейшманіоз
№	крок 2017
Тема	«Піодермії» (Основні клінічні прояви при стрептодерміях)
Текст завдання	Мати привела на прийом до лікаря хлопчика 5-ти років зі скаргою на висип на обличчі, що з'явився 5 днів тому назад. Об'єктивно: на обличчі помітні декілька пухирів розмірами 0,5-1,5 см в діаметрі, з тонкими в'ялими кришками, виповнені серозним каламутним ексудатом і розташовані на гіперемованій, набряклій основі. Поряд з цими вогнищами ураження спостерігаються ерозії з виділенням серозногнійної рідини та товсті медово-жовті кірки. Поставте клінічний діагноз:
Правильна відповідь	Вульгарне імпетиго
В	Дитяча екзема
С	Простий пухирцевий лишай
D	Контактний дерматит
Е	Кандидоз
№	крок 2017
Тема	«Дерматити, токсидермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування»
Текст завдання	У пацієнта 2-х місяців у паховостегнових складках спостерігаються чітко окреслені гострозапальні вогнища у вигляді плям, дещо припіднятих над довколишніми ділянками через набряк шкіри. Висипання з'явилися протягом тижня. Везикуляція та попрілість не спостерігались. Яким буде попередній діагноз?
Правильна відповідь	Пелюшковий дерматит
В	Дитяча екзема
С	Мікоз гладенької шкіри
D	Псоріаз

Е	Ускладнений перебіг корости
№	крок 2017
Тема	«Вірусні дерматози. Клініка, діагностика, лікування»
Текст завдання	Хвора 21-го року звернулася до жіночої консультації зі скаргами на значне нездужання, сильний біль у ділянці вульви, подразнення, свербіння, прискорене сечовипускання. З анамнезу з'ясовано, що жінка 10 днів тому мала позашлюбний статевий контакт. Під час огляду зовнішніх статевих органів виявлено: на гіперемованій, набряклій слизовій оболонці великих статевих губ розташовані численні пухирці 2-3 мм в діаметрі. Після проведення додаткових методів діагностики виявлено вірус простого герпесу. Який препарат використовується для лікування даного захворювання?
Правильна відповідь	Ацикловір
В	Тетрациклін
С	Сульфадимізин
Д	Метронідазол
Е	Прогестерон
№	крок 2010
Тема	«Дерматити, токсидермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування»
Текст завдання	Дівчина 22-х років впродовж 2-х діб скаржиться на висипку в ділянці обличчя з свербіжем. Захворювання пов'язує із застосуванням косметичного крему. Об'єктивно: виражене почервоніння та набряк шкіри в ділянці щік, підборіддя, лоба; наявність дрібної папуло-везикулярної висипки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Алергічний дерматит
В	Простий дерматит
С	Екзема
Д	Бешиха
Е	Нейродерміт
№	крок 2010, 2016
Тема	«Атопічний дерматит. Клініка та лікування»
Текст завдання	Дитина госпіталізована з вогнищевими змінами в складках шкіри. При огляді дитина неспокійна, шкіра суха, з окремими папульозними елементами і зонами ліхеніфікації з нечіткими краями. Висипка на шкірі супроводжується сильним свербінням. Покращення стану дитини відзначається в літні місяці, погіршення - взимку. Дитина з 2-х мі-сяців на штучному вигодовуванні, перенесла ексудативний діатез. Бабуся по материнській лінії страждає на бронхіальну астму. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Атопічний дерматит
В	Контактний дерматит

С	Себорейна екзема
D	Строфулюс
Е	Кропивниця
№	крок 2010, 2009
Тема	«Дерматити, токсидермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування»
Текст завдання	Хворий 72-х років скаржиться на свербіж шкіри лівої гомілки, особливо навкруги трофічної виразки, де шкіра почервоніла та набрякла, місцями наявні мокнуття, поодинокі жовтуваті кірочки. Межі вогнища ураження чіткі. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	Мікробна екзема
В	Алергічний дерматит
С	Себорейна екзема
D	Туберкульоз шкіри
Е	Стрептодермія
№	крок 2010, 2011
Тема	«Вторинний період сифілісу та його диференціювання»
Текст завдання	Хворий 36-ти років скаржиться на висипку на шкірі, яка з'явилася тиждень тому і суб'єктивно не турбує. Об'єктивно: на шкірі долоней та підшв - множинні лентикулярні дисеміновані папули, які не підвищуються над рівнем шкіри, застійно-червоного кольору, покриті скупченням рогових лусочок, під час пальпації щільні. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Сифіліс вторинний
В	Множинні бородавки
С	Долонно-підшвовий псоріаз
D	Руброфітія долоней та підшв
Е	Омозолістості долоней та підшв
№	крок 2010
Тема	«Особливості клінічного перебігу корости, педикульозу та демодекозу. Принципи їхнього диференціювання, профілактики та лікування»
Текст завдання	Учень 5-го класу звернувся з приводу розповсюдженої висипки на шкірі, що супроводжується сильним свербіжем, особливо у нічний час. Об'єктивно: у ділянці міжпальцевих складок обох кистей, згинальної поверхні променевоzap'ясткових суглобів, на шкірі живота і сідниць та на внутрішній поверхні стегон виявлені дрібні червоні папули, що мають тенденцію до попарного розташування. У центрі окремих папул видно міхурці або серозно-геморагічні кірки. Відзначаються множинні екскоріації. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Короста

В	Дерматит
С	Мікоз гладенької шкіри
D	Токсикодермія
Е	Екзема
№	крок 2010
Тема	«Дерматити, токсидермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування»
Текст завдання	Жінка 32-х років звернулася до лікаря із скаргами на ураження шкіри тулуба, обличчя та кінцівок після перорального прийому бісептолу. Встановлено діагноз медикаментозної токсикодермії. Які методи лікування найбільш ефективні для пацієнтки?
Правильна відповідь	Екстракорпоральна терапія
В	Протизапальна терапія
С	Антигістамінна терапія
D	Дезінтоксикаційна терапія
Е	Імунотерапія
№	крок 2010, 2012
Тема	«Особливості ураження сечостатевого каналу гонококами. Принципи терапії та профілактики»
Текст завдання	Пацієнт 25-ти років висловлює скарги на різь і біль під час сечовипускання, гнійні виділення з уретри, що з'явилися 2 дні тому. Об'єктивно: губки уретри набряклі, гіперемовані, з уретри рясні гнійні виділення. Попередній діагноз: свіжий гострий гонорейний уретрит. Які додаткові дані клінічних обстежень допоможуть уточнити діагноз?
Правильна відповідь	Мікроскопія виділень з уретри
В	Серологічне дослідження крові
С	Загальний аналіз крові
D	Виявлення кокових клітин під час мікроскопії виділень
Е	Виявлення дріжджових клітин під час мікроскопії виділень
№	крок 2010
Тема	«Особливості ураження сечостатевого каналу гонококами. Принципи терапії та профілактики»
Текст завдання	Хвора 28-ми років через три доби після випадкового статевого акту доставлена до гінекологічного відділення. Непокоїть біль внизу живота та під час сечовипускання, значні гнійні виділення з піхви, підвищення температури тіла до 37, 80С. Встановлено діагноз: гострий двобічний аднексит. При додатковому обстеженні виявлено: 4 ступінь чистоти піхвового вмісту, лейкоцити вкривають все поле зору, бактерії диплококи, розташовані внутрішньо та позаклітинно. Яка етіологія гострого аднекситу в хворої?
Правильна відповідь	Гонорейна

В	Колі-бацилярна
С	Хламідійна
D	Трихомонадна
Е	Стафілококова
№	крок 2010, 2009
Тема	«Особливості ураження сечостатевого каналу гонококами. Принципи терапії та профілактики»
Текст завдання	До венеролога звернувся хворий зі скаргами на болісне сечовипускання, почервоніння зовнішнього отвору уретри, рясні гнійні виділення із сечівника. Вважає себе хворим 3 дні. Захворювання зв'язує з випадковим половим контактом, приблизно тиждень тому. Якщо попередній діагноз гострого гонорейного уретриту підтвердиться, то при бактеріоскопічному дослідженні у виділеннях з уретри будуть виявлені:
Правильна відповідь	Грамнегативні диплококи
В	Грампозитивні диплококи
С	Спірохета
D	Вульгарний протей
Е	Мікоплазма
№	крок 2010, 2012, 2015
Тема	«Кератомікози, епідермомікози. Клінічні прояви, лабораторна діагностика, терапія та профілактика»
Текст завдання	Хворий готується до операції з приводу варикознорозширених вен нижніх кінцівок. При огляді на підшвах виявлене мукоподібне лушення по ходу шкірних складок. Всі нігті стоп сірувато-жовтого кольору, потовщені і частково зруйновані. Про який дерматоз слід думати в даному випадку?
Правильна відповідь	Рубромікоз
В	Висівковий лишай
С	Кандидоз
D	Мікроспорія
Е	Мікробна екзема
№	крок 2007
Тема	«Дерматити, токсидермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування»
Текст завдання	У хворої 35-ти років, після сильного нервового напруження, на тильній поверхні кистей з'явилися ділянки почервоніння та набряку з подальшим утворенням на цьому фоні невеликих запальних вузликів, міхурців, а потім ерозій із значним виділенням серозної рідини. Процес супроводжується сильним свербінням. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Справжня екзема
В	Алергічний дерматит

С	Мікробна екзема
D	Простий контактний дерматит
E	Токсикодермія
№	крок 2007
Тема	«Кератомікози, епідермомікози. Клінічні прояви, лабораторна діагностика, терапія та профілактика»
Текст завдання	Хворий 37-ми років скаржиться на ураження нігтьових пластинок упродовж 2-х років. Об'єктивно: нігтьові пластинки I, II, III пальців обох стоп та II, III пальців кистей потовщені, тьмяні, з явищами піднігтьового гіперкератозу; по вільному краю нігті обламані. На підшвах та правій долоні - гіперкератоз, в складках шкіри - мукоподібне лущення. Інші ділянки шкіри без висипки. Які додаткові методи дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	Мікроскопічне та бактеріологічне дослідження лусочок
B	Загальний аналіз крові
С	Серологічне дослідження крові
D	Аналіз крові на цукор
E	Біопсія шкіри
№	крок 2007, 2008
Тема	«Піодермії. Основні клінічні прояви при стафілодерміях»
Текст завдання	Мати новонародженої дитини страждає на хронічний пієлонефрит. Перед пологами перенесла ГРВІ. Пологи термінові, тривалий безводний період. На 2-й день у дитини з'явилося еритематозне висипання, у подальшому - пухирі розміром близько 1 см, наповнені серозно-гнійним вмістом. Симптом Нікольського - позитивний. Після розтинання пухирів з'являються ерозії. Дитина млява, температура тіла субфебрильна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Пухирчатка новонародженого
B	Везикулопустульоз
С	Псевдофурункульоз
D	Сепсис
E	Дерматит Ріттера
№	крок 2007
Тема	«Особливості ураження сечостатевого каналу гонококами. Принципи терапії та профілактики»
Текст завдання	Хворий 29-ти років скаржиться на гнійні виділення з уретри, різь під час сечовипускання. Ці симптоми з'явилися через 5 днів після випадкового статевого зв'язку. У мазку з виділень уретри, забарвленим за Грамом, виявлені парні коки червоно-фіолетового кольору. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гонорейний уретрит

В	Трихомонадний уретрит
С	Дріжджовий уретрит
D	Бактеріальний уретрит
Е	Хламідійний уретрит
№	крок 2007
Тема	«Особливості клінічного перебігу корости, педикульозу та демодекозу. Принципи їхнього диференціювання, профілактики та лікування»
Текст завдання	У чоловіка 30-ти років на шкірі тулуба з'явилася багаточисельна висипка, що складається з дрібних парних елементів, які розкидані по шкірі неупорядковано та переважно фокусно і супроводжуються свербезом. Висипка виникла через кілька днів після відвідування ним спортивно-оздоровчого центру та сауни. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	Короста
В	Екзема
С	Контактний дерматит
D	Алергічний дерматит
Е	Нейродерміт
№	крок 2007
Тема	«Особливості ураження сечостатевого каналу гонококами. Принципи терапії та профілактики»
Текст завдання	Жінка 32-х років скаржиться на біль внизу живота, підвищення температури тіла до 38, 0°С, гнійні виділення зі статевих шляхів. Захворіла 5 днів тому після випадкового статевого контакту. Об'єктивно: у ділянці вивідних протоків бартолінієвих залоз відзначається гіперемія. Бімануально: матка не збільшена, рухлива, чутлива під час пальпації. Придатки з обох боків збільшені, пастозні, різко болісні. Виділення гноєподібні, зеленуватого кольору, з неприємним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гонорейний аднексит
В	Параметрит
С	Метроендометрит
D	Кольпіт
Е	Пельвіоперитоніт
№	крок 2007
Тема	«Кератомікози, епідермомікози. Клінічні прояви, лабораторна діагностика, терапія та профілактика»

Текст завдання	Жінка 37-ми років скаржиться на біль в горлі. Температура тіла - 36, 9 <sup>0</sup> С, загальний стан задовільний. Хвора з приводу іншої хвороби тривалий час приймає преднізолон. Орофарингоскопія: слизова оболонка горла дещо гіперемована, на піднебінних мигдаликах та передніх дужках м'якого піднебіння спостерігаються білувато-сірі нашарування, які легко знімаються; поверхня слизової під ними дещо ерозована. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Фарингомікоз
В	Дифтерія зіву
С	Виразково-плівчаста ангіна Плаута-Венсана
D	Лакунарна ангіна
Е	Туберкульоз глотки
№	крок 2008, 2011
Тема	«Піодермії. Основні клінічні прояви при стафілодерміях»
Текст завдання	У доношеної дитини 3-ї доби життя на різних ділянках шкіри виявляються еритема, ерозивні поверхні, тріщини, лущення епідермісу. Немовля виглядає ніби опшарене окропом. Виявлено позитивний симптом Нікольського. Загальний стан дитини важкий. Виражений неспокій, гіперестезія, фебрильна температура. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Ексфоліативний дерматит Ріттера
В	Флегмона новонародженого
С	Псевдофурункулез Фігнера
D	Пухирчатка новонародженого
Е	Мікотична еритема
№	крок 2008
Тема	«Дерматити, токсидермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування»
Текст завдання	До лікаря звернулась жінка 35-ти років з ураженням шкіри кистей і нижньої третини передпліччя у вигляді значного набряку, гіперемії, везикуляції, мокнуття. Захворювання розвилось після використання для прання білизни прального порошку, яким хвора користується протягом місяця. Раніше дерматологічних захворювань не було. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Алергічний дерматит
В	Простий дерматит
С	Токсикоалергічний дерматит
D	Мікробна екзема
Е	Обмежений нейродерміт
№	крок 2008, 2009



Тема	«Псоріаз. Червоний плоский лишай. Діагностика, клініка, лікування»
Текст завдання	У хворого 20-ти років на шкірі розгинальної поверхні кінцівок, спини та волосистої частини голови спостерігається розсіяна папульозна висипка яскраво-червоного кольору, розміром від просяного зерна до сочевиці, поверхня елементів якої в центрі вкрита білуватими лусочками. Застосовуючи метод зішкрібвання, можна виявити симптом "стеаринової плями", "термінальної плівки" та "кров'яної роси". Про яке захворювання слід думати?
Правильна відповідь	Псоріаз
B	Червоний плескатий лишай
C	Вторинний сифіліс
D	Папульозно-некротичний туберкульоз шкіри
E	Атопічний дерматит
№	крок 2009
Тема	«Особливості клінічного перебігу корости, педикульозу та демодекозу. Принципи їхнього диференціювання, профілактики та лікування»
Текст завдання	Хворий 30-ти років скаржиться на інтенсивний свербіж шкіри, переважно вночі. Об'єктивно: хворіє 1 тиждень. На шкірі тулуба та живота спостерігаються дрібні, парно розташовані папули, везикули, розчухи, кірочки. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Короста
B	Кропив'янка
C	Екзема
D	Алергічний дерматит
E	Нейродерміт
№	крок 2009, 2011, 2012
Тема	«Піодермії. Основні клінічні прояви при стафілодерміях»
Текст завдання	У дитини на 6-й день життя в ділянці потилиці, шиї та сідниць з'явилися пухирці, заповнені серозно-гнійним вмістом, які щільно вкривають шкіру. Загальний стан дитини не порушений. Про яке захворювання слід думати?
Правильна відповідь	Везикулопустульоз
B	Пухирчатка новонароджених
C	Пітниця
D	Імпетиго
E	Бульозний епідермоліз
№	крок 2011
Тема	«Дерматити, токсидермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування»

Текст завдання	У хворої 35-ти років після сильного нервового напруження на тильній поверхні кистей з'явилися ділянки почервоніння і набряку з подальшим утворенням на цьому фоні невеликих запальних вузликів, міхурців, а потім ерозій із значним виділенням серозної рідини. Процес супроводжується сильним свербіжем. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Справжня екзема
B	Алергічний дерматит
C	Мікробна екзема
D	Простий контактний дерматит
E	Токсикодермія
№	крок 2011
Тема	«Дерматити, токсидермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування»
Текст завдання	Зварювальник на роботі отримав опік першого ступеня середньої третини правої гомілки. Через 5 днів навколо опіку з'явилися набряклість шкіри, свербіж. Об'єктивно: на фоні еритеми з чіткими межами поліморфний висип, представлений папулами, везикулами, пустулами, ерозіями з серозним виділенням. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Мікробна екзема
B	Істинна екзема
C	Токсикодермія
D	Професійна екзема
E	Стрептодермія
№	крок 2011
Тема	«Псоріаз. Червоний плоский лишай. Діагностика, клініка, лікування»
Текст завдання	Хворий 45-ти років скаржиться на появу на шкірі попереку та кінцівок вузликових безболісних елементів, схильних до периферичного росту та злиття. Хворіє 2 роки. Загострення переважно весною. В анамнезі: у батька хворого було подібне ураження шкіри. Об'єктивно: патологічні елементи представлені краплеподібними та монетоподібними вузликами, бляшками, вкритими білими лусочками. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Псоріаз
B	Червоний плескатий лишай
C	Нейродерміт
D	Рожевий лишай
E	Себорейна екзема
№	крок 2011
Тема	«Особливості ураження сечостатевого каналу гонококами. Принципи терапії та профілактики»

Текст завдання	У хворої 25-ти років після випадкового статевого контакту, який був п'ять днів тому, з'явилися гнійні виділення з статевих шляхів, свербіж. При піхвовому дослідженні: піхвова частина шийки матки гіперемована, набрякла, навколо зовнішнього вічка ділянка ерозії, із цервікального каналу витікають рясні слизово-гнійні виділення; тіло матки та додатки без особливостей. При бактеріоскопічному дослідженні виявлені диплококи бобоподібної форми, при забарвленні за Грамом диплококи набувають червоного кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гонорейний ендocerвіцит
В	Трихомонадний кольпіт
С	Кандидозний вульвовагініт
D	Хламідійний ендocerвіцит
Е	Бактеріальний вагіноз
№	крок 2012
Тема	«Псоріаз. Червоний плоский лишай. Діагностика, клініка, лікування»
Текст завдання	Хворий скаржиться на висипання по всій поверхні тіла, свербіж, відчуття стягнення шкіри, які через місяць після психотравми з'явилися на волосистій частині голови, потім на розгинальній поверхні верхній і нижніх кінцівок, на спині. Об'єктивно: висипання представлені мономорфною папульозною висипкою, яскраво-червоного кольору, округлої форми, розміром від 0,5 до 3 см у діаметрі. Поверхня папул в центрі вкрита сріблясто-білими лусочками, по периферії - обідок яскраво-червоного кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Псоріаз
В	Червоний плескатий лишай
С	Вторинний папульозний сифіліс
D	Рожевий лишай
Е	Себорея
№	крок 2012
Тема	«Піодермії. Основні клінічні прояви при стрептодерміях»
Текст завдання	До дерматолога звернулась хвора 32-х років зі скаргами на появу висипань в ділянці кутиків губ, що супроводжуються незначним свербіжем. Хворіє близько трьох днів. Об'єктивно: на фоні незначної гіперемії поодинокі дрібні фліктени та поверхневі ерозії, вкриті медово-жовтими кірочками. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Стрептодермія
В	Герпес
С	Атопічний хейліт
D	Дерматит
Е	Екзема

№	крок 2012, 2013
Тема	«Атопічний дерматит. Клініка та лікування»
Текст завдання	Хлопчик 8-ми років впродовж 2-х років страждає на появу плямистих висипів та свербіж, які виникають після вживання цитрусових. З анамнезу: вперше висипка виникла у 6 місяців після введення до раціону харчування соків. Батько страждає на бронхіальну астму, мати - на алергічний риніт. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	Атопічний дерматит
B	Псоріаз
C	Розовий лишай
D	Кропив'янка
E	Набряк Квінке
№	крок 2013
Тема	«Вірусні дерматози. Клініка, діагностика, лікування»
Текст завдання	Хвора 20-ти років звернулася до лікаря жіночої консультації зі скаргами на свербіж, печіння і біль у ділянці зовнішніх статевих органів, підвищення температури тіла, дратівливість, порушення сну, головний біль. Хвора незаміжня, веде безладне статеве життя. Під час огляду зовнішніх статевих органів на фоні гіперемованої, набряклої слизової оболонки визначаються везикули, група яких займає до 2 см ураженої поверхні. Яка найбільш імовірна причина зумовлює таку клінічну картину?
Правильна відповідь	Генітальна герпетична інфекція
B	Папіломавірусна інфекція
C	Кандиломатоз
D	Первинний сифіліс
E	Цитомегаловірусна інфекція
№	крок 2013
Тема	«Піодермії. Основні клінічні прояви при стафілодерміях»
Текст завдання	На 8-му добу життя у дитини, яка народилась у строк, з масою 3500 г, піднялась температура тіла до 37, 5° С, стала мляво брати груди. Дитина була прикладена до грудей матері на 3-тю добу в зв'язку з післяпологовим ендометритом у матері. Об'єктивно: дитина активна. На шкірі грудей, живота, стегон виявлені поверхневі в'ялі пухирі числом 10, діаметром 5-10 мм, з мутним вмістом. Деякі з них зруйнувались, при цьому з'явилась яскраво-рожева поверхня. З боку внутрішніх органів змін немає. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Пухирчатка новонароджених
B	Везикулопустульоз
C	Ексфоліативний дерматит Ріттера
D	Синдром Лайєла

Е	Інфікована пострілість
№	крок 2013
Тема	«Особливості клінічного перебігу корости, педикульозу та демодекозу. Принципи їхнього диференціювання, профілактики та лікування»
Текст завдання	Жінка 30-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на свербіж шкіри, який посилюється увечері і турбує її вже тиждень. Патологічний процес поширюється з кистей на шкіру живота, сідниць, лобка. Об'єктивно: поліморфний висип, що складається з дрібних парних міхурців, цяткових папул, екскоріацій, розчухів, запальних папул червоно-коричневого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Короста
В	Педикульоз
С	Нейродерміт
D	Дисгідротична екзема
Е	Контактно-алергійний дерматит
№	крок 2013
Тема	«Кератомікози, епідермомікози. Клінічні прояви, лабораторна діагностика, терапія та профілактика»
Текст завдання	Під час огляду пацієнта 32-х років, з надлишковою вагою, шкіра міжпальцевих ділянок обох ступнів еритематозна, мацерована, дрібно лущиться, у складках між V, IV та III пальцями є поодинокі тріщини, що мокнуть. Турбує незначний свербіж. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Епідермомікоз
В	Рубромікоз
С	Алергічний дерматит
D	Стрептодермія
Е	Мікробна екзема
№	крок 2014
Тема	«Особливості ураження сечостатевого каналу трихомонадами, кандидами, хламідіями. Принципи терапії та профілактики»
Текст завдання	Хвора 36-ти років скаржиться на нестерпний свербіж і печіння у піхві, що посилюється у нічний час. Під час огляду виявлена різка гіперемія вульви, слизової піхви і піхвової частини шийки матки. Виділення рідкі, рясні, пінисті з зеленуватим відтінком. Під час огляду матки і додатків патології не виявлено. Про яке захворювання можна думати у даному випадку?
Правильна відповідь	Урогенітальний трихомоніаз
В	Урогенітальний герпес
С	Гонококова інфекція

D	Бактеріальний вагіноз
E	Урогенітальний кандидоз
№	крок 2014
Тема	«Піодермії. Основні клінічні прояви при стафілодерміях»
Текст завдання	У новонародженої дитини через 10 днів після народження раптово підвищилася температура до 39° С. Об'єктивно: на еритематозній шкірі в ділянці пупка, живота та грудей з'явилися множинні міхури величиною з горошину, без інфільтрації в основі, місцями визначаються яскраво-червоні вологі ерозії з обривками епідермісу по периферії. Вкажіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Епідемічна пухирчатка новонароджених
B	Сифілітична пухирчатка
C	Стрептококове імпетиго
D	Вульгарне імпетиго
E	Алергічний дерматит
№	крок 2015
Тема	«Особливості клінічного перебігу корости, педикульозу та демодекозу. Принципи їхнього диференціювання, профілактики та лікування»
Текст завдання	Хворий 19-ти років скаржиться на свербіж у міжпальцевих складках кистей, шкіри живота, який посилюється ввечері. Хворіє протягом 2 тижнів. Об'єктивно: в міжпальцевих складках кистей, на шкірі живота велика кількість розміщених попарно папуловезикул, розчухів, геморагічних кірочок. У зскрібку виявлено <i>Sarcoptes scabiei hominis</i> . Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Короста
B	Мікробна екзема
C	Нейродерміт
D	Контактний дерматит
E	Червоний плоский лишай
№	крок 2015
Тема	«Особливості ураження сечостатевого каналу трихомонадами, кандидами, хламідіями. Принципи терапії та профілактики»
Текст завдання	На прийом до венеролога звернувся пацієнт, якому на підставі клінічних проявів і даних лабораторного обстеження був установлений діагноз трихомоніаз. При призначенні лікування цьому хворому основним препаратом варто вважати:
Правильна відповідь	Тінідазол
B	Інтерферон

С	Бісептол
D	Пімідель
Е	Тетрациклін
№	крок 2016
Тема	«Особливості клінічного перебігу корости, педикульозу та демодекозу. Принципи їхнього диференціювання, профілактики та лікування»
Текст завдання	До лікаря-терапевта звернувся хворий 30-ти років зі скаргами на свербіння шкіри, що підсилюється ввечері. Хворіє 1,5 місяця. Об'єктивно: на шкірі міжпальцевих складок кистей, згинальних поверхнях кінцівок, животі, стегнах, сідницях спостерігається висип, що складається з парних папул, вкритих кров'янистими кірочками, лінійні розчухи. Які додаткові методи обстеження слід провести для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	Дослідження зіскобу висипних елементів
В	Визначення дермографізму
С	Серологічне дослідження крові
D	Визначення рівня глюкози в крові
Е	Обстеження на гельмінти
№	крок 2016
Тема	«Піодермії. Основні клінічні прояви при стрептодерміях»
Текст завдання	У хлопчика 10-ти років діагностовано стрептококове імпетиго. Які з названих препаратів найбільш прийнятні для лікування даної хвороби?
Правильна відповідь	Мазь тетрациклінова
В	Флуцинар
С	Зовіракс
D	Нізорал
Е	20% водномильна емульсія бензил-бензоата
№	крок 2018
Тема	Вірусні дерматози. Клініка, діагностика, лікування
Текст завдання	Хвора 65-ти років скаржитья на висип, сильний біль у підлопатковій ділянці справа. Об'єктивно: на шкірі в підлопатковій ділянці справа розміщені лінійно рожево-червоні набряклі вогнища, дещо інфільтровані, з чіткими межами. На поверхні вогнищ згруповані везикули з прозорим вмістом. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Оперізувальний лишай ( <i>Herpes Zoster</i> )
В	Дерматит Дюрінга
С	Бешиха
D	Алергічний дерматит

Е	Імпетиго
№	крок 2018
Тема	Псоріаз. Червоний плоский лишай. Діагностика, клініка, лікування
Текст завдання	У студента 18-ти років на шкірі розги-нальних поверхонь кінцівок та волосистої частини голови спостерігається розсіяний папульозний висип яскраво-червоного кольору, розміром від 1,0 до 5,0 см у діаметрі, поверхня якого у центрі вкрита сріблястими лусочками. Застосовуючи метод зішкрібування, можна виявити симптом "стеарінової плями", "термінальної плівки" та "кров'яної роси". Який попередній діагноз Вам здається найі-мовірнішим?
Правильна відповідь	Псоріаз
В	Червоний плесканий лишай
С	Вторинний сифіліс
D	Папульозно-некротичний туберкульоз шкіри
Е	Атопічний дерматит
№	крок 2018
Тема	Піодермії: основні клінічні прояви
Текст завдання	У доношеної дитини на 3-тю добу життя на різних ділянках шкіри виявляються еритема, ерозивні поверхні, тріщини, лущення епідермісу. Немовля виглядає ніби опшпарене окропом. Виявлено позитивний симптом Ні-кольського. Загальний стан дитини тяжкий. Виразений неспокій, гіперестезія, фебрильна температура. Найімовірніший діагноз у цьому випадку:
Правильна відповідь	Ексфоліативний дерматит
В	Флегмона новонародженого
С	Псевдофурункульоз Фігнера
D	Пухирчатка новонародженого
Е	Мікотична еритема
№	крок 2018
Тема	Себорея. Акне.
Текст завдання	У юнака 16-ти років на тлі підвищеної сальності шкіри обличчя, верхньої частини спини, передньої поверхні грудей, множинні комедони, періодично з'являються фолікулярні вузлики, пустули. Суб'єктивних відчуттів немає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Звичайні вугри
В	Вторинний сифіліс
С	Вульгарний сикоз
D	Фурункульоз
Е	Рожеві вугри



№	крок 2018
Тема	Дерматити, токсикодермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування
Текст завдання	Робітник заводу з виготовлення цементу, стаж роботи 21 рік, надійшов зі скаргами на виражене свербіння шкіри. Під час огляду на різних ділянках шкіри визначалися по-ліморфні висипи. Спочатку вони з'явилися на шкірі кистей і пальців рук, передпліччях, обличчі, а за останні півроку розповсюдилися й на інші ділянки. Місцями є елементи везикуляції і попрілості. Під час перебування у відпустці ці прояви зникали. Шкірна проба з хромом дала позитивний результат. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Професійна екзема
B	Обмежений нейродерміт
C	Мікробна екзема
D	Професійна кропивниця
E	Себорейна екзема
№	крок 2018
Тема	Дерматити, токсикодермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування
Текст завдання	Дитині 3-х років у зв'язку із захворюван-ням на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) призначено: бісептол, парацетамол, назоферон. На третій день стан дитини погіршився: з'явилися біль у горлі, стоматит, кон'юнктивіт, гіперсалівація, болючі плями темно-червоного кольору на шиї, обличчі, грудях та кінцівках, потім на місці плям з'явилися пухирі. Спостерігалось ураження сли-зових оболонок навколо рота та ануса. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Синдром Стівенса-Джонсона
B	Атопічний дерматит
C	Вітряна віспа
D	Сироваткова хвороба
E	Бульозний дерматит
№	крок 2018
Тема	Кератомікози, епідермомікози. Клінічні вияви, лабораторна діагностика, терапія та профілактика
Текст завдання	Хворий 22-х років звернувся до лікаря зі скаргами на появу білих плям на тлі засмаглої шкіри. На шкірі тулуба множинні гіпопигментовані плями, при пошкрябуванні спостерігається муковидне лущення. Проба Бальцера позитивна. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Висівкоподібний лишай
B	Вітіліго
C	Склеродермія
D	Лейкодерма
E	Рожевий лишай

№	крок 2018
Тема	Піодермії: основні клінічні прояви
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність декількох щільних, болючих вузлів у правій пахвовій ділянці, підвищення температури тіла до 38° С, загальну слабкість. Хворіє 3 доби. Локально: в правій пахвовій ділянці є три вузлоподібних утворення, які підвищуються над поверхнею шкіри, розмірами від 0,5 см до 1,5 см в діаметрі, різко болючі при пальпації, з чіткими контурами, шкіра над ними багрово-синюшного відтінку, підняття верхньої кінцівки обмежене через біль. По-ставте діагноз:
Правильна відповідь	Гнійний гідраденіт
В	Абсцес
С	Карбункул
D	Фурункул
Е	Гнійний лімфаденіт
№	крок 2019
Тема	Піодермії : основні клінічні прояви
Текст завдання	На 8-му добу життя у новонародженого хлопчика з масою тіла 3500 г підвищується температура тіла та з'являється висип. Напередодні дитина була дуже дратівлива та мала субфебрильну температуру, що поступово підвищувалася. Мати повідомила, що до зазначеного епізоду дитина була здорова та ніяких ліків не приймала. Температура тіла - 38,9°С, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., пульс - 160/хв., частота дихання - 17/хв., SpO <sub>2</sub> - 98% при кімнатному повітрі. При огляді виявлено висип у вигляді пухирів, що легко лопаються. Висип займає 60% поверхні тіла, навкруги рота, але не виявлено на слизових оболонках. Позитивний симптом Нікольського. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Стафілококовий синдром "обпеченої шкіри" (SSSS, синдром Ріттера)
В	Вроджена вітряна віспа
С	Токсичний епідермальний некроліз
D	Кропив'янка
Е	Синдром Стівенса-Джонсона
№	крок 2019
Тема	Псоріаз. Червоний плоский лишай. Діагностика, клініка, лікування
Текст завдання	Чоловік 32-х років звернувся до лікаря зі скаргами на висип, що з'явився на колінах 4 місяці тому і зараз вперше починає з'являтися на ліктях. Зі слів пацієнта болю не відчуває, але місце висипу злегка свербить та кровоточить при розчісуванні. Він відзначив, що на ліктях висип з'явився після подряпин, які йому наніс його домашній кіт. При фізикальному обстеженні лікарем виявлено на колінах та ліктях еритематозні бляшки діаметром від 2 до 3 см із чітким контуром, щільні, вкриті сріблястими лусочками. Який діагноз є найбільш імовірним?

Правильна відповідь	Псоріаз
B	Хвороба котячих подряпин
C	Себорейний дерматит
D	Екзема
E	Контактний дерматит
№	крок 2019
Тема	Піодермії : основні клінічні прояви
Текст завдання	Мати привела на прийом до лікаря хлопчика 5-ти років зі скаргами на висип обличчя, що з'явився 5 днів тому. Об'єктивно: на обличчі помітні декілька пухирів розмірами 0,5-1,5 см в діаметрі, з тонкими в'ялими кришками, виповнені серозним каламутним ексудатом і розташовані на гіперемованій, набряклій основі. Поряд з цими вогнищами ураження спостерігаються ерозії з виділенням серозно-гнійної рідини та товсті медово-жовті кірки. Поставте клінічний діагноз:
Правильна відповідь	Вульгарне імпетиго
B	Кандидоз
C	Контактний дерматит
D	Дитяча екзема
E	Простий пухирцевий лишай
№	крок 2019
Тема	Клініко-серологічні особливості первинного періоду сифілісу
Текст завдання	Чоловік 19-ти років, звернувся до лікаря зі скаргами на безболісні ерозії на голівці статевого члена, які з'явилися 2-3 дні тому. У анамнезі незахищений статевий контакт приблизно місяць тому. При обстеженні на голівці статевого члена ерозія овальної форми діаметром до 5 мм, безболісна, яскраво-червоного кольору. Пахвинні лімфовузли не збільшені. Яке першочергове лабораторне дослідження буде найбільш доречним?
Правильна відповідь	Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном
B	–
C	Реакція іммобілізації блідих трепонем
D	Реакція імунофлюоресценції
E	Культуральне дослідження
№	крок 2019
Тема	Кератомікози, епідермомікози. Клінічні вияви, лабораторна діагностика, терапія та профілактика
Текст завдання	Хворий 22-х років звернувся до лікаря зі скаргами на появу білих плям на тлі засмаглої шкіри. На шкірі тулуба множинні гіпопигментовані плями, при пошкрябуванні спостерігається мукоподібне лущення. Проба Бальцера позитивна. Яке захворювання можна припустити?

Правильна відповідь	Висівкоподібний лишай
B	Лейкодерма
C	Склеродермія
D	Вітиліго
E	Рожевий лишай
№	крок 2019
Тема	Особливості ураження сечостатевого каналу гонококами. Принципи терапії та профілактики
Текст завдання	Хвора 21-го року скаржиться на часті позиви до сечовиділення, біль та печію при сечовипусканні. Захворювання пов'язує з випадковим статевим актом 4 дні тому. При огляді: уретра пальпується у вигляді потовщеного болючого тяжа, набряк та гіперемія зовнішнього отвору сечівника, при на-тискуванні на уретру виділяється краплина гною. При бактеріоскопічному дослідженні виділень з уретри виявлено розміщені всередині лейкоцитів грамнегативні диплококи. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Уретрит викликаний <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
B	Гострий цистит
C	Неспецифічний уретрит
D	Уретрит викликаний <i>Chlamidiya trachomatis</i>
E	Вагініт
№	крок 2019
Тема	Паразитарні захворювання шкіри
Текст завдання	Чоловік 25-ти років, звернувся до лікаря зі скаргами на появу висипань в міжпальцевих проміжках, в ділянці променевоzap'ястних суглобів, паховій ділянці та живота, які супроводжуються сильним свербіжем, особливо в нічний час. Пацієнт зазначає, що після вечірнього душу покращення не наступає. Також йому здається, що як тільки висип проходить в одному місці, він одразу з'являється в іншому. При фізикальному обстеженні на фоні неураженої шкіри множинні еритематозні папули та екскоріації. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Короста
B	Екзема
C	Обсесивно-компульсивний розлад
D	-
E	Епідермофітія
№	крок 2019
Тема	Дерматити, токсикодермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування

Текст завдання	Чоловік 31-го року доставлений до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на утруднене дихання, відчуття стороннього тіла в горлі, осиплість, сильний набряк обличчя та шії. Вищевказані симптоми швидко наростають та з'явилися протягом декількох хвилин після куштування меду Який стан найбільш імовірно розвинувся у хворого?
Правильна відповідь	Ангіоневротичний набряк Квінке
B	Синдром Стівенса-Джовсона
C	Запальний набряк гортані
D	Гострий ларинготрахеїт
E	Токсичний епідермальний некроліз
№	крок 2019
Тема	Піодермії : основні клінічні прояви
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність декількох щільних, болючих вузлів у правій пахвовій ділянці, підвищення температури тіла до 38°C, загальну слабкість. Хворіє 3 доби. Локально: в правій пахвовій області є три вузлоподібних утворення, які підвищуються над поверхнею шкіри, розмірами від 0,5 см до 1,5 см в діаметрі, різко болючі при пальпації, з чіткими контурами, шкіра над ними багрово-синюшного відтінку, підняття верхньої кінцівки обмежено через біль. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гнійний гідраденіт
B	Гнійний лімфаденіт
C	Карбункул
D	Абсцес
E	Фурункул
№	крок 2019
Тема	Вірусні дерматози. Клініка, діагностика, лікування
Текст завдання	Чоловік 25-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність висипки протягом 2 тижнів, яка з'явилась несподівано. Під час збору анамнезу пацієнт повідомив, що почуває себе повністю здоровим, але зазначив що 2 місяці тому влітку мав "жахливу, грипоподібну" застуду. При фізикальному обстеженні на шкірі лобка, геніталій та стегон розташовані сферичні папули, рожевого та тілесного кольору, без запалення, з центральним заглибленням. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Контагіозний моллюск
B	Оперізуєчий герпес
C	Вторинний сифіліс
D	Папілома
E	Фурункул

№	крок 2019
Тема	Дерматити, токсикодермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування
Текст завдання	Чоловік 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на появу висипань в ділянці кистей рук, що супроводжуються сильним свербіжем і турбують протягом тижня. У анамнезі бронхіальна астма, сезонні алергії. Пацієнт відзначає, що має дуже суху шкіру. При фізикальному обстеженні на тильній стороні правої та лівої кисті виявлено множинні еритематозні папули та везикули з серозним вмістом, ділянки ліхеніфікації та екскоріації. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Екзема
B	Контактний дерматит
C	Псоріаз
D	Короста
E	Себорейний дерматит
№	крок 2020
Тема	Дерматити, токсикодермії, екзема. Клініка, діагностика, лікування
Текст завдання	До дерматолога звернувся чоловік віком 43 роки у зв'язку із наявністю висипки на шкірі кистей, яка супроводжується свербіжем. Хворіє 2 тижні. Об'єктивно: у вказаних місцях відзначається гіперемія та набряк шкіри, везикули, мокнуття, екскоріації на місцях розчухування. Який найбільш імовірний діагноз у хворого?
Правильна відповідь	Дерматит контактний
B	Екзема мікробна
C	Токсикодермія
D	Дерматит алергічний
E	Екзема справжня
№	крок 2020
Тема	Піодермії: основні клінічні прояви
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність декількох щільних, болючих вузлів у правій пахвовій ділянці, підвищення температури тіла до 38°(7, загальну слабкість. Хворіє 3 доби. Локально: в правій пахвовій області є три вузлоподібних утворення, які підвищуються над поверхнею шкіри, розмірами від 0,5 см до 1,5 см в діаметрі, різко болючі при пальпації, з чіткими контурами, шкіра над ними багрово-синюшного відтінку, підняття верхньої кінцівки обмежене через біль. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гнійний гідраденіт
B	Абсцес
C	Карбункул
D	Фурункул

Е	Гнійний лімфаденіт
№	крок 2020
Тема	Псоріаз. Червоний плоский лишай. Діагностика, клініка, лікування
Текст завдання	Чоловік 32-х років звернувся до лікаря зі скаргами на висип, що з'явився на колінах 4 місяці тому і зараз вперше починає з'являтися на ліктях. Зі слів пацієнта болу не відчуває, але місце висипу злегка свербить та кровоточить при розчухуванні. Він відзначив, що на ліктях висип з'явився після подряпин, які йому наніс його домашній кіт. При фізикальному обстеженні лікарем виявлено на колінах та ліктях еритематозні бляшки діаметром від 2 до 3 см із чітким контуром, щільні, вкриті сріблястими лусочками. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Псоріаз
В	Контактний дерматит
С	Екзема
Д	Хвороба котячих подряпин
Е	Себорейний дерматит
№	крок 2020
Тема	Особливості враження сечостатевого каналу гонококами. Принципи лікування та профілактики
Текст завдання	Хворий скаржиться на гнійні виділення з пенісу вранці перед сечовиділенням, різі, полакіурію. Визначена піурія при проведенні трьохсканної проби в першій порції сечі. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий уретрит
В	Хронічний простатит
С	Гострий баланопостит
Д	Хронічний пієлонефрит
Е	Гострий цистит
№	крок 2020
Тема	Трихоікози. Мікроспорія, трихофітія, парша. Клінічні прояви, лабораторна діагностика. Лікування. Профілактика
Текст завдання	У вогнищах облісіння на голові волосся обламане на рівні 4-6 мм від поверхні шкіри, відзначається гіперемія, мукоподібне лущення. Імовірний попередній діагноз?
Правильна відповідь	Мікроспорія волосистої частини голови
В	Дискоїдний червоний вовчак
С	Себорейне облісіння
Д	Гніздова плішивість
Е	Вторинний сифіліс