

№	крок 2017
Тема	Набута кишкова непрохідність
Текст завдання	У дитини 6-ти місяців 8 годин тому раптово виник інтенсивний переймоподібний біль в животі. Періоди неспокою дитини тривають 5 хвилин, з проміжком в 15 хвилин. Випорожнень не було. Годину тому виникла прямокишкова кровотеча. Під час пальпації: живіт м'який, болючий у правій половині, де нечітко визначається видовжене утворення - 10x4 см. При ректальному дослідженні - сліди крові. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Ілеоцекальна інвагінація
B	Кишкова кровотеча
C	Гострий апендицит
D	Заворот кишківника
E	Гострий ентероколіт
№	крок 2017, 2016
Тема	Вади розвитку серця
Текст завдання	Дівчинці 8 місяців; народилася недоношеною. Під час огляду: спостерігаються задуха, тахікардія, гепатоспленомегалія, відставання в фізичному розвитку, ціаноз кінцівок. Визначається парастернальний серцевий горб, у II міжребер'ї зліва вислуховується систолодіастолічний шум, артеріальний тиск - 90/0 мм рт.ст. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Відкрита артеріальна протока
B	Коарктація аорти
C	Стеноз аортального клапана
D	Стеноз легеневої артерії
E	Незарощення міжшлуночкової перегородки
№	крок 2017
Тема	Вади розвитку серця
Текст завдання	У хворого 18-ти років артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст. В III міжребер'ї зліва від краю грудини систолічне тремтіння. Ліва межа серця зміщена на 1 см назовні. У III міжребер'ях зліва систоло-діастолічний шум, який посилюється під час систоли, акцент II тону. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Відкрита артеріальна протока
B	Коарктація аорти
C	Дефект міжшлуночкової перегородки
D	Дефект міжпередсердної перегородки

Е	-
№	крок 2010, 2009, 2011, 2012
Тема	Вади розвитку серця
Текст завдання	У дівчинки 9-ти місяців при об'єктивному обстеженні відмічаються: блідість шкірних покривів, виникнення ціанозу під час неспокою. Перкуторно: розширення меж серця в поперечному напрямку. Аускультативно: зліва від груднини у 3-4 міжребер'ї вислуховується тривалий систолічний шум, що проводиться над усією ділянкою серця і на спину. Яку вроджену ваду серця можна запідозрити у дитини?
Правильна відповідь	Дефект міжшлуночкової перегородки
В	Дефект міжпередсердної перегородки
С	Коарктація аорти
Д	Тетрада Фалло
Е	Стеноз легеневої артерії
№	крок 2010, 2015
Тема	Вади розвитку серця
Текст завдання	Хлопчика 3-х років виписано з відділення кардіології, де він перебував у зв'язку із частими задухо-ціанотичними нападами внаслідок тетради Фалло. Який препарат найбільш доцільно використовувати для подальшої профілактики нападів?
Правильна відповідь	Обзідан
В	Курантіл
С	Реланіум
Д	Дигоксин
Е	Кордарон
№	крок 2010
Тема	Вади розвитку серця
Текст завдання	Мати скаржиться на задишку та кашель у дитини 2-х років. В періоді новонародженості у дівчинки встановлено грубий систолічний шум в серці. Об'єктивно: шкіра бліда, зрушення меж серця у лівий бік та вгору, грубий систоло-діастолічний шум у II міжребер'ї з лівого боку, який проводиться до верхівки серця, на шийні судини, аорту, міжло-патковий простір, посилення II тону на легеневій артерії. Над легенями жорстке дихання, різнокаліберні вологі хрипи. Печінка +3 см. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Відкрита артеріальна протока

В	Стеноз легеневої артерії
С	Дефект міжпередсердної перегородки
D	Легенева гіпертензія
Е	Двобічна бронхопневмонія
№	крок 2010, 2013, 2016
Тема	Гнійно-запальні захворювання
Текст завдання	Три дні тому у хлопчика з-під нігтьової пластинки видалено стороннє тіло. Через 2 дні з'явився різкий пульсуючий біль у кінці нігтьової фаланги, особливо при натисканні, гіперемія нігтьового валика, підвищилася температура тіла до 37, 5оС, змінився колір нігтьової пластинки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Піднігтьовий панарицій
В	Бешиха
С	Пароніхія
D	Ерзіпелоїд
Е	Абсцес
№	крок 2010
Тема	Вади розвитку серця
Текст завдання	Хлопчику 8 років. Стан фізичного розвитку відповідає віку. З народження над серцем вислуховується шум. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові звичайного кольору. АТ- 100/70 мм рт.ст. Над легеневою артерією вислуховується систоло-діастолічний шум та акцент II тону. На ЕКГ - ознаки перевантаження лівих відділів серця. При рентгеноскопії відмічається посилення легеневого малюнку, затемнення серця звичайної форми. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Дефект міжпередсердної перегородки
В	Стеноз легеневої артерії
С	Коарктація аорти
D	Тетрада Фалло
Е	Відкрита артеріальна протока
№	крок 2007
Тема	Вади розвитку серця

Текст завдання	У хворого 15-ти років під час проходження медичної комісії зафіксовано АТ- 170/85 мм рт.ст. Скарг немає. Об'єктивно: м'язи нижніх кінцівок погано розвинені, пульсація на артеріях ступень послаблена. Межі серця розширені вліво, при аускультатії - акцент другого тону над аортою, систолічний шум. У крові - без змін. У сечі: питома вага - 1020, лейкоцитів - 2-4 у п/з, еритроцитів - 0-1 у п/з, кристали сечової кислоти. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Коарктація аорти
В	Вазоренальна гіпертензія
С	Есенційна гіпертензія
Д	Вегетосудинна дистонія
Е	Ренопаренхіматозна гіпертензія
№	крок 2007, 2008
Тема	Вади розвитку передньої черевної стінки
Текст завдання	У хлопчика 1 року виникло защемлення пахвинної грижі. Об'єктивно: гіперемія та пастозність тканин грижового випину. Який метод лікування оптимальний?
Правильна відповідь	Негайне оперативне втручання
В	Комплекс консервативних заходів, розрахованих на самовправлення грижі
С	Ручне вправлення грижі
Д	Негайне вправлення грижі під короткочасним наркозом
Е	Призначення барбітуратів
№	крок 2008, 2009
Тема	Вроджені вади гепатобіліарної системи
Текст завдання	У 6-ти місячної дитини з народження наростає жовтяниця з зеленуватим відтінком. Спостерігаються явища геморагічного діатезу та сверблячки. Яка найбільш вірогідна патологія у дитини?
Правильна відповідь	Атрезія жовчовивідних шляхів
В	Еритробластоз
С	Синдром Жільбера
Д	Синдром Криглера-Найяра
Е	Синдром Дабіна-Джонсона
№	крок 2008
Тема	Вади розвитку серця

Текст завдання	Хворого 15-ти років турбує головний біль, носові кровотечі, відчуття похолодання нижніх кінцівок. Об'єктивно: м'язи плечового поясу добре розвинуті, нижні кінцівки гіпотрофовані. Пульсація на артеріях ступні та стегновій артерії різко ослаблена. АТ-150/90 мм рт.ст. - на руках, 90/60 мм рт.ст. - на ногах. Над сонними артеріями - систолічний шум. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Коарктація аорти
B	Аневризма аорти
C	Аортальний стеноз
D	Аортальна недостатність
E	Коарктація легеневої артерії
№	крок 2008
Тема	Захворювання опорно-рухового апарату
Текст завдання	У хлопчика 11-ти років під час профілактичного медичного огляду визначався вид постави. Встановлено, що у дитини плечі похилені і зведені вперед, голова нахилена вперед, грудна клітина сплюснена, живіт випуклий. В хребті спостерігається збільшення глибини шийного та поперекового викривлень. Який вид постави виявлений у дитини?
Правильна відповідь	Кіфоз
B	Лордоз
C	Сутулувата
D	Виправлена
E	Нормальна
№	крок 2008
Тема	Набута кишкова непрохідність
Текст завдання	Дитина 4-х місяців госпіталізована до хірургічного відділення через 8 годин з нападами неспокою протягом 2-3 хвилин, з інтервалами 10 хвилин. Відмічалось одноразове блювання. Об'єктивно: стан дитини важкий. Під час пальпації живіт м'який, в правій клубовій ділянці визначається пухлиноподібне утворення. При ректальному огляді - на пальці кров. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Ілеоцекальна інвагінація
B	Пухлина Вільмса
C	Глистна інвазія
D	Пілоростеноз
E	

№	крок 2009
Тема	Сторонні тіла дихальних шляхів
Текст завдання	У дівчинки 4-х років раптово під час гри з іграшками з'явився напад кашлю, задишка. Об'єктивно: ЧДР-45/хв., ЧСС- 130/хв. Перкуторно: вкорочення перкуторного звуку з правого боку в нижніх відділах. Аускультативно: з правого боку послаблене дихання с бронхіальним відтінком. На рентгенограмі: затемнення нижньої частки легень праворуч. У крові запальних змін не виявлено. Поставлено діагноз: стороннє тіло правого бронху. Вкажіть, яке ускладнення викликало дану клінічну картину:
Правильна відповідь	Ателектаз
В	Емфізема
С	Пневмоторакс
Д	Бронхіт
Е	Пневмонія
№	крок 2009
Тема	Вроджені вади серця
Текст завдання	На прийомі у лікаря після об'єктивного клінічного обстеження дитині 12-ти років встановлений діагноз: пролапс мітрального клапана. Який з додаткових інструментальних методів обстеження необхідно використати для підтвердження діагнозу?
Правильна відповідь	Ехокардіографія
В	Рентгенографія органів грудної клітки
С	ФКГ
Д	ЕКГ
Е	Велоергометрія
№	крок 2009
Тема	Гнійно-запальні захворювання кісток та суглобів
Текст завдання	Після раніше перенесеного гнійного отиту хлопчика 1-го року став турбувати біль у верхній третині лівого стегна, підвищилася температура тіла до 39°C. Об'єктивно: припухлість стегна у верх-ній третині та згладженість пахвинної складки. Кінцівка у напівзігнутому стані. Активні та пасивні рухи неможливі з причини різкого болю. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гематогенний остеомиєліт
В	Гострий коксит

С	Міжм'язова флегмона
D	Остеосаркома
Е	Абсцес Броді
№	крок 2009
Тема	Природжений вивих стегна
Текст завдання	Немовля народилося вчасно. Пологи патологічні, сідницями вперед. При огляді дитини: обмеження відведення правої нижньої кінцівки до 50°, позитивний симптом луску з правого боку. Асиметрія пахвинних складок. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Вроджений вивих правого стегна
В	Вроджений вивих стегон
С	Варусна деформація шийок стегон
D	Перелом шийок стегнових кісток
Е	Дисплазія правого стегна
№	крок 2009
Тема	Сторонні тіла дихальних шляхів
Текст завдання	Дитина 4-х років подавилася волоським горіхом декілька днів тому. В теперішній час турбує кашель, підвищення температури до 37, 5°C. При аускультатії - множинні сухі та вологі хрипи над правою легенею. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Стороннє тіло правого бронху
В	Стороннє тіло лівого бронху
С	Стороннє тіло гортані
D	Стороннє тіло трахеї
Е	Стороннє тіло глотки
№	крок 2009, 2011
Тема	Невідкладні стани
Текст завдання	При трансфузії еритроцитарної маси у 8-ми річного хлопчика, хворого на гемофілію А, раптово з'явилися біль за грудниною та у попереку, задишка, холодний піт. Об'єктивно: шкіра бліда, ЧСС- 100/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Олігурія, сеча коричневого кольору. В лікуванні даного ускладнення першочерговим є призначення:
Правильна відповідь	Преднізолону
В	Лазиксу

С	Адреналіну
D	Еуфіліну
Е	Анальгіну
№	крок 2012, 2013, 2015
Тема	Гнійні захворювання легенів та плеври
Текст завдання	Дитина знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострої стафілококової деструкції правої легені. Раптово з'явилися гострий біль у правій половині грудної клітки, задишка, ціаноз. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно справа внизу - тупість, в верхніх відділах - коробковий звук. Межі відносної серцевої тупості зміщені вліво. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло?
Правильна відповідь	Піопневмоторакс справа
В	Емпієма плеври
С	Спонтанний пневмоторакс
D	Ексудативний плеврит
Е	Абсцес правої легені
№	крок 2013
Тема	Гнійно-запальні захворювання кісток та суглобів
Текст завдання	У дитини 9-ти років виник біль у верхній третині правої гомілки, підвищилась температура до 39° С, не може стати на ногу. В анамнезі мав травму гомілки та переніс ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гематогенний остеомієліт
В	Перелом кістки
С	Гострий ревматизм
D	Туберкульозний остеомієліт
Е	Злоякісна пухлина
№	крок 2014
Тема	Вроджені вади серця
Текст завдання	Під час обстеження в лікарні у дівчинки 7-ми місяців діагностовано високий дефект міжшлуночкової перегородки. Який відділ серцево-судинної системи буде перенавантажений у першу чергу?
Правильна відповідь	Правий шлуночок
В	Праве передсердя
С	Лівий шлуночок

D	Ліве передсердя
E	Велике коло кровообігу
№	крок 2014
Тема	Вроджені вади стравоходу
Текст завдання	У новонародженого 3-х діб годування майже завжди супроводжується виникненням задишки, нападopodobним кашлем, ціанозом, пінистими виділеннями з рота. Після їди при аускультатції кількість вологих великопухирчастих хрипів у легенях збільшується. Годування через зонд не супроводжується кашлем і наростаючим ціанозом. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Стравохідно-трахеальна нориця
B	Атрезія стравоходу
C	Атрезія хоан
D	Діафрагмальна кила
E	Незрощення твердого піднебіння
№	крок 2015, 2016
Тема	Вроджені вади серця
Текст завдання	Юнак 17-ти років на призовній комісії поскаржився на шум у вухах, який підсилюється при фізичному навантаженні. АТ-150/30 мм рт.ст., вислуховується діастолічний шум над аортою. На оглядовій рентгенограмі тінь серця аортальної конфігурації, збільшені дуга аорти та лівий шлуночок. Легеневий малюнок не змінений. Пульсація аорти підсилена. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Аортальна недостатність
B	Атеросклероз аорти
C	Гіпертонічна хвороба
D	Декстрапозиція аорти
E	Коарктація аорти
№	крок 2015
Тема	Вроджені вади серця
Текст завдання	Дитині 5 років. Знаходиться на диспансерному обліку у кардіолога з приводу вродженої вади серця. Мати звернулась до лікаря зі скаргами на появу задишки при фізичному навантаженні та у спокої, нестійкі набряки гомілок і стоп, які під кінець дня посилюються і зникають після нічного сну. З анамнезу відомо, що 3 тижні назад дитина перехворіла на ангіну. Вкажіть походження периферичних набряків:

Правильна відповідь	Серцеве
B	Ортостатичне
C	Цирротичне
D	Ниркове
E	Внаслідок тромбофлебіту
№	крок 2015
Тема	Висока кишкова непрохідність
Текст завдання	У хлопчика у віці 1 місяць виникає блювання фонтаном після кожного годування. Блювотні маси являють собою звуржене молоко і перевищують за обсягом попереднє годування. Дитина за перший місяць набрала у вазі 200 г. Сечовиділення рідкі, випорожнення мізерні, нерегулярні. Який метод обстеження ви призначите для верифікації діагнозу?
Правильна відповідь	Гастрофіброскопічне дослідження
B	Ультразвукове дослідження
C	Біохімічне дослідження
D	Рентгенографія черевної порожнини
E	Копрологічне дослідження
№	крок 2015
Тема	Висока кишкова непрохідність
Текст завдання	У 1-місячного хлопчика з симптомами збудження обвід голови складає 37 см, розміри великого тім'ячка 2x2 см. Дитина зригує після годування малими порціями молока; випорожнення нормальні за складом та об'ємом. М'язовий тонус у нормі. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Пілороспазм
B	Менінгіт
C	Пілоростеноз
D	Мікроцефалія
E	Краніостеноз
№	крок 2016
Тема	Висока кишкова непрохідність

Текст завдання	Батьки дитини 2-х місяців скаржаться на часте зригування, блювання після їжі неперетравленим молоком. Об'єктивно: неспокійна. Вага тіла відповідає віку. Тургор м'яких тканин задовільний. Живіт помірно здутий, м'який. Випорожнення 5 разів на добу, жовті, без слизу. Копрограма та бактеріальне дослідження випорожнень без патології. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Пілороспазм
B	Пілоростеноз
C	Кишкова інфекція
D	Вада розвитку кишечника
E	Дизбактеріоз кишечника
№	крок 2016
Тема	Вади розвитку сечової та статеві системи
Текст завдання	У дитини 3-х років з періодичним боєм у животі та піурією в ході УЗД виявлено збільшену нирку та округлої форми порожнини, сполучені з розширеною мискою. Права нирка не змінена. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Гідронефроз
B	Полікістоз
C	Мультикістоз
D	Ехінокок
E	Коралоподібний камінь нирки
№	крок 2016
Тема	Гнійно-запальні захворювання кісток та суглобів
Текст завдання	Дівчинку 3-х років доставлено до хірургічного відділення у важкому стані. Об'єктивно: Ps- 126/хв., температура тіла - 40, 3° C . Нижня кінцівка зігнута у коліні, дещо приведена до середини, пасивні рухи у колінному і кульшовому суглобах болісні. Пальпація нижньої третини лівого стегна також викликає різкий неспокій хворої. Гіперемії на шкірі немає. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гематогенний остеомиєліт
B	Туберкульоз стегнової кістки
C	Ревматизм
D	Тифозне ураження лівої стегнової кістки
E	Остеосаркома
№	крок 2016

Тема	Гнійні захворювання легенів та плеври
Текст завдання	Дитина перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу гострої стафілококової деструкції правої легені. Раптово з'явилися гострий біль у правій половині грудної клітки, задишка, ціаноз. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно справа знизу - тупість, в верхніх відділах - коробковий звук. Межі відносно серцевої тупості зміщені вліво. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло?
Правильна відповідь	Піопневмоторакс справа
В	Емпієма плеври
С	Спонтанний пневмоторакс
D	Ексудативний плеврит
Е	Абсцес правої легені
№	крок 2016
Тема	Вади розвитку сечової та статевих систем
Текст завдання	До поліклініки звернулися батьки хлопчика 2-х років зі скаргами на відсутність у дитини в калитці правого яєчка. В ході огляду виявляється гіпоплазія правої половини калитки, яєчко відсутнє. Воно зменшене в розмірах, пальпується за ходом пахвинного каналу, але в калитку не опускається. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Правобічний крипторхізм, пахвинна форма
В	Ретракція правого яєчка (псевдокрипторхізм)
С	Лівобічний монорхізм
D	Правобічний крипторхізм, черевна форма
Е	Ектопія правого яєчка, лобкова форма
№	крок 2016
Тема	Політравма. Закрита травма органів грудної клітини.
Текст завдання	Хлопчик 10-ти років тижень тому зазнав тупої травми грудної клітки. Другу добу перебуває у кардіологічному відділенні з приводу травматичного перикардиту. На ехокардіограмі ознаки випоту в перикарді. За останню годину прогресують ознаки серцевої недостатності. Виникла загроза тампонади серця. Якою повинна бути першочергова лікарська тактика?
Правильна відповідь	Пункція перикарда
В	Серцеві глікозиди в/в
С	Постійна оксигенотерапія
D	Діуретики в/в

Е	Антибіотики в/в
№	крок 2017
Тема	Політравма.Закрита травма органів грудної клітини.
Текст завдання	Хлопчик 10-ти років надійшов до відділення політравми після тупої травми грудної клітки в результаті падіння з велосипеда. При надходженні артеріальний тиск - 110/80 мм рт.ст., пульс - 96/хв. Рентгенограма грудної клітки необтяжена. На ехокардіограмі виявлена вільна рідина у порожнині перикарду, в кількості до 100 мілілітрів. Через годину після надходження почали наростати ознаки серцевої недостатності: набрякання шийних вен, зниження артеріального тиску до 90/70 мм рт.ст., прискорення пульсу до 120/хв. Аускультативно серцеві тони ледве чутні. Якою повинна бути першочергова лікарська тактика?
Правильна відповідь	Пункція перикарду
В	Серцеві глікозиди в/в
С	Постійна оксигенотерапія
Д	Діуретики в/в
Е	Антибіотики в/в
№	Крок 2018-2019
Тема	
Текст завдання	До ортопеда звернулись батьки 3-мі- сячної дитини зі скаргами на асиметрію шкірних складок правого стегна. Під час огляду виявлено: різна кількість складок шкіри на правому та лівому стегні, їх аси-метрія, обмеження розведення правої ни-жньої кінцівки зігнутої під кутом 90 ⁰ в кульшовому та колінному суглобах. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Дисплазія кульшового суглоба
В	Вроджений вивих стегна
С	Контрактура кульшового суглоба
Д	Ушкодження кульшового суглоба під час пологів
Е	–
№	Крок 2018-2019
Тема	
Текст завдання	У хірургічний кабінет звернувся хло-пець 17-ти років, зі скаргами на наявність рубаної рани правої стопи. Із анамнезу відомо, що травму отримав сокирою під час роботи по господарству. Усі щеплен-ня отримував відповідно до віку за На-ціональним календарем профілактичних щеплень. Об'єктивно: температура тіла - 36,8°С, пульс - 68/хв., артеріальний тиск - 120/75 мм рт.ст. Який наступний крок ліка-ря буде найбільш доречними?

Правильна відповідь	Динамічне спостереження
B	Ввести правцевий анатоксин
C	Ввести протиправцеву сироватку
D	Ввести правцевий анатоксин та проти-правцевий імуноглобулін
E	Ввести правцевий анатоксин з дифте-рійним анатоксином
№	Крок 2018-2019
Тема	
Текст завдання	Восьмирічна дитина скаржиться на три-валий вологий кашель з виділенням великої кількості харкотиння гнійного характеру з неприємним запахом, інколи з домішкою крові. Загальний стан тяжкий, температура тіла - 38,7° С, шкіра бліда, периферичний ціаноз, пальці у вигляді "бара-банних паличок". Над легенями: ослаблене дихання, різнокаліберні вологі хрипи. Рентгенологічно: ателектатичні ділянки. Яке з обстежень для уточнення діагнозу буде найбільш доцільним?
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія з високою розподільною здатністю
B	Бронхоскопія
C	Рентгенографія ОГК
D	Ехокардіографія
E	-
№	Крок 2018-2019
Тема	
Текст завдання	В ході обстеження дитини 5-ти років зі скаргами на постійний кашель з виділенням гнійного мокротиння та вологі хрипи справа у задньонижніх відділах виявлено: гнійний ендобронхіт II-III ступеня, переважно справа, хлориди поту - 36 ммоль/л (норма - 0-35 ммоль/л), на КТ - циліндричні бронхоектази в S9 та S10. Запропонуйте оптимальний метод лікування даної дитини:
Правильна відповідь	Видалення уражених сегментів
B	Кінезотерапія
C	Генно-інженерна терапія
D	Лаваж бронхіального дерева
E	Тривала антибіотикотерапія
№	крок 2020
Тема	Гнійно-запальні захворювання кісток та суглобів

Текст завдання	У дитини 9-ти років з'явився біль у верхній третині правої гомілки, підвищи-лась температура тіла до 39°C. Дитина не може стати на праву ногу. З анамнезу відомо, що дитина мала травму гомілки та перенесла ангіну. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Гострий гематогенний остеомиєліт
В	Злоякісна пухлина кістки
С	Гострий ревматизм
Д	Туберкульозний артрит
Е	Перелом кісток правої гомілки
№	крок 2020
Тема	Вроджені вади розвитку
Текст завдання	При огляді дитини віком 3 місяці, ви-значається асиметрія сідничних складок, обмеження відведення в правому куль-шовому суглобі. На рентгенограмі куль-шових суглобів - кути альфа справа 28 градусів, зліва - 32 градуси, ядра окосте-ніння відсутні. Вкажіть імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Двобічна дисплазія кульшових суглобів
В	Дисплазія правого кульшового суглоба
С	Вікова норма
Д	Дисплазія лівого кульшового суглоба
Е	Рахіт
№	крок 2020
Тема	Гнійно-запальні захворювання
Текст завдання	В ході обстеження дитини 5-ти років зі скаргами на постійний кашель з виділен-ням гнійного мокротиння та вологі хрипи справа у задньонижніх відділах виявлено: гнійний ендобронхіт II-III ступеню, пере-важно справа, хлориди поту - 36 ммоль/л, на КТ - циліндричні бронхоектази в S9 та S10. Запропонуйте оптимальний метод лікування даної дитини:
Правильна відповідь	Видалення уражених сегментів легень
В	Тривала антибіотикотерапія
С	Іенно-інженерна терапія
Д	Лаваж бронхіального дерева
Е	Кінезотерапія
№	крок 2020

Тема	Невідкладні стани
Текст завдання	Після ДТП у хлопчика 12-ти років з закритою травмою живота та переломом стегна зліва спостерігається чітко виражена загальмованість. Блідість шкіри, спад температури тіла. Артеріальний тиск - 75 мм рт.ст. Пульс - 120/хв., слабкого наповнення і напруги, нерівний. Подих прискорений, поверхневий. Визначте ступінь травматичного (гіповолемічного) шоку у потерпілого:
Правильна відповідь	Шок 3 ступеня (тяжкий)
В	Шок 2 ступеня (середньої тяжкості)
С	Шок 4 ступеня (передагональний стан)
Д	Шок 1 ступеня (легкий)
Е	Шок не визначається