

№	крок 2017
Тема	Геморагічний інсульт, діагностика
Текст завдання	Хворий 30-ти років, який страждав на головний біль, при піднятті важкого предмету відчув сильний головний біль, що нагадував удар по голові. З'явилися нудота, блювання, легке запаморочення. Об'єктивно через добу: виражений менінгеальний синдром, температура тіла - 37,6°C. Лікар припустив субарахноїдальний крововилив. Яке додаткове обстеження необхідно провести в першу чергу, щоб підтвердити діагноз?
Правильна відповідь	Люмбальна пункція з дослідженням ліквору
B	Рентгенографія черепа
C	Комп'ютерна томографія
D	Реоенцефалографія
E	Церебральна ангиографія
№	крок 2012, 2013, 2015, 2016
Тема	Геморагічний інсульт, діагностика
Текст завдання	У хворого 50-ти років раптово виникли кинджальний біль у потиличній ділянці та блювання. Об'єктивно: сопор, гіперемія шкіри обличчя, артеріальний тиск - 210/120 мм рт.ст., пульс - 60/хв., напружений, температура тіла - 37,8°C. Горизонтальний ністагм. Виражені рефлекси орального автоматизму. Сухожилкові рефлекси рівномірні. Ригідність потиличних м'язів, двобічний симптом Керніга. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Субарахноїдальний крововилив
B	Геморагічний паренхіматозний інсульт
C	Субдуральна гематома
D	Гостра гіпертонічна енцефалопатія
E	Менінгококовий менінгіт
№	крок 2010
Тема	Геморагічний інсульт, лікування
Текст завдання	Чоловіка 34-х років доставлено до неврологічного відділення зі скаргами на інтенсивний головний біль, двоїння в очах при погляді прямо, нестерпність світла та шуму. Захворів гостро, напад стався під час підняття вантажу. Об'єктивно: оглушення, помірна розбіжна косоокість, диплопія. Симптоми Керніга з обох боків. Парезів немає. Ліквор кров'янистий. Який препарат треба призначити в першу чергу?

Правильна відповідь	Епсілон-амінокапронова кислота
B	Ацетилсаліцилова кислота
C	Гепарин
D	Нікотинова кислота
E	Глютамінова кислота
№	крок 2010
Тема	Менінгіт, діагностика
Текст завдання	Дитина 1,5 років захворіла гостро: підвищилася температура до 39°C, з'явилося блювання до 5 разів. Дослідження нервової системи виявило позитивні симптоми Керніга, Брудзинського. Перераховані симптоми відносяться до:
Правильна відповідь	Менінгеальних знаків
B	Синдрому дискоординації
C	Синдрому рухових розладів
D	Енцефалічного синдрому
E	Ознак інфекційного токсикозу
№	крок 2010, 2011, 2015, 2016
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, діагностика
Текст завдання	Жінка 62-х років після підняття вантажу відчула гострий біль у поперековій зоні, сідниці, задньобочковій поверхні правого стегна, зовнішній поверхні правої гомілки та тильній поверхні стопи. Об'єктивно: слабкість переднього великогомілкового м'яза, довгого розгинача великого пальця, короткого розгинача пальців правої стопи. Знижений ахіллів рефлекс справа. Позитивний симптом Ласега. Який найбільш інформативний метод дослідження для уточнення діагнозу диско-генної компресії L <sub>5</sub> корінця?
Правильна відповідь	Магнітно-резонансне сканування поперекового відділу хребта
B	Рентгенографія поперекового хребта
C	Електроміографія
D	Ангіографія
E	Люмбальна пункція
№	крок 2010
Тема	Пароксизмальні стани, епілепсія, лікування

Текст завдання	Хворий 28-ми років доставлений бригадою швидкої допомоги до приймального відділення у непритомному стані з генералізованими епілептичними нападами, що повторюються через 15-20 хвилин. Під час транспортування хворому двічі вводились сибазон, сірчанокисла магnezія, однак рівень свідомості не відновився. У якому відділенні необхідно надавати невідкладну допомогу?
Правильна відповідь	Реанімаційне
B	Неврологічне
C	Хірургічне
D	Терапевтичне
E	Психіатричне
№	крок 2007
Тема	Пароксизмальні стани, епілепсія, лікування
Текст завдання	Жінка 52-х років госпіталізована до відділення невідкладної терапії з епілептичним нападом. Першою дією під час надання допомоги в даному випадку є:
Правильна відповідь	Упевнитися у прохідності дихальних шляхів та достатній оксигенації пацієнтки
B	Зафіксувати язик
C	Ввести в/в струминно 50% розчин декстрози
D	Ввести 5 мг діазепама з послідуєчим введенням фенітоїну
E	Викликати медикаментозну пентобарбіталову кому
№	крок 2007
Тема	Розсіяний склероз, лікування
Текст завдання	Чоловік 25-ти років, який 4 роки хворіє на розсіяний склероз, скаржиться на посилення хиткості, слабкість нижніх кінцівок, затримку сечі. Об'єктивно: центральний тетрапарез. Мозочкова атаксія. Порушення функції тазових органів. Яка найбільш доцільна терапія в цьому випадку?
Правильна відповідь	Глюкокортикоїди
B	Антибіотики
C	Ноотропи
D	Десенсибілізуючі
E	Вітаміни

№	крок 2007
Тема	Ішемічний інсульт, лікування
Текст завдання	У хворого 60-ти років протягом місяця відмічалось короточасне зниження сили у лівих кінцівках. Пізніше вранці після сну з'явилася стійка слабкість у кінцівках. Об'єктивно: притомний, АТ-140/90 мм рт.ст., центральний парез VII та XII пар черепних нервів зліва, з того ж боку центральний геміпарез та гемігіперестезія. Які препарати вибору при диференційованому лікуванні даного хворого?
Правильна відповідь	Антикоагулянти
В	Гемостатики
С	Гіпотензивні
Д	Діуретики
Е	Кортикостероїди
№	крок 2007, 2008
Тема	Невралгія трійчастого нерву, лікування
Текст завдання	Хвора 43-х років скаржиться на періодичні напади болю у ділянці правої половини обличчя. Під час нападу спостерігається спазм мимічної мускулатури правої половини обличчя, шкірні покриви на цьому боці обличчя червоніють. У крові - без патології. Було діагностовано невралгію трійчастого нерва з правого боку. Який препарат найбільш доцільно призначити?
Правильна відповідь	Карбамазепін (Фінлепсин)
В	Преднізолон
С	Актовегін
Д	Анальгін
Е	Індометацин
№	крок 2007, 2011
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, лікування
Текст завдання	У хворого після підняття вантажу виник нестерпний біль у попереку. Дільничний терапевт діагностував гострий попереково-крижовий радикуліт. Що з нижче перерахованих призначень ПРОТИПОКАЗАНО хворому?
Правильна відповідь	Зігрівальні процедури
В	Дегідратуючі засоби

С	Аналгетики
D	Вітаміни групи В
E	Внутрішньовенно еуфілін
№	крок 2007
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, діагностика
Текст завдання	У хворого 38-ми років після підняття вантажу з'явився біль в поперековому відділі хребта з іррадіацією по задній поверхні лівої ноги. Біль наростає при зміні положення тіла та у вертикальному положенні. Під час обстеження виявлені позитивні симптоми натягу. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Вертеброгенний (дискогенний) корінцевий синдром
В	Пухлина спинного мозку
С	Арахномієліт
D	Поліневрит
E	Мієлопатія
№	крок 2008, 2009
Тема	Геморагічний інсульт, діагностика
Текст завдання	У хворого 39-ти років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово виникли інтенсивний головний біль в потилиці, нудота і повторне блювання, що тривають п'яту годину. Об'єктивно: Рс-88/хв, АТ- 205/100 мм рт.ст., болючість окципітальних точок, ригідність потиличних м'язів. Симптом Керніга позитивний з обох боків. Є підозра на субарахноїдальний крововилив. Який з нижче наведених методів дослідження має вирішальне значення для підтвердження попереднього діагнозу?
Правильна відповідь	Люмбальна пункція з дослідженням ліквору
В	Дослідження очного дна
С	Ультразвукова доплерографія
D	ЕЕГ
E	Комп'ютерна томографія
№	крок 2008, 2009
Тема	Неврит лицьового нерву, діагностика

Текст завдання	Жінка 52-х років скаржиться на перекіс обличчя. Захворіла 2 дні тому після переохолодження. Об'єктив-но: температура 38, 2 <sup>0</sup> С. Відмічається асиметрія обличчя. Лобні складки з лівого боку згладжені. Ліве око ширше правого і не закривається. Згладжена ліва носогубна складка, опущений кут рота. Іншої патології не виявлено. В крові: лейкоц.- 10 · 10 <sup>9</sup> /л, ШЗЕ- 20 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Неврит лицевого нерва
В	Невралгія трійчастого нерва
С	Гемікранія (мігрень)
Д	Ішемічний інсульт
Е	Пухлина мозку
№	крок 2008
Тема	Пароксизмальні стани, епілепсія, діагностика
Текст завдання	У 7-ми річного хлопчика протягом дня відмічаються "відключення" свідомості на 10-15 секунд, під час яких він застигає в одній позі, не реагує на запитання, не відгукається на своє ім'я. Про напади потім нічого не пам'ятає. Неврологічне дослідження не виявило ніяких змін. Який метод дослідження найдоцільніше використати для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	Електроенцефалографія
В	Рентгенограма черепа
С	Комп'ютерна томограма
Д	Ехоенцефалоскопія
Е	Дослідження викликаних потенціалів
№	крок 2008
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, діагностика
Текст завдання	Чоловік 45-ти років, вантажник, скаржиться на біль у попереку та правій нозі. Ця симптоматика утримується 2 місяці та після курсу консервативної терапії не зменшилася. Об'єктивно: динаміка хребта у поперековому відділі обмежена, симптом Ласега позитивний праворуч. Колінні рефлекси D = S, жваві. Ахіллові: S > D, праворуч різко знижений. Яке обстеження треба виконати хворому для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу хребта
В	Рентгенографія поперекового відділу хребта

С	Електроміографія м'язів ніг
D	Реовазографія ніг
E	-
№	крок 2008
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, лікування
Текст завдання	У 52-х річної хворої з поширеним остеохондрозом хребта, після підняття важкості, з'явився біль у попереку та по ходу лівого сідничного нерва. Об'єктивно: з лівого боку позитивний симптом Ласега і знижений ахілов рефлекс. Призначення якого препарату патогенетично найбільш виправдане?
Правильна відповідь	Диклофенак
B	Аспірин
С	Анальгін
D	Новокаїн
E	Спазмалгон
№	крок 2009
Тема	Черепно-мозкова травма, діагностика
Текст завдання	7-ми річну дитину госпіталізовано до клініки з переломом верхньої щелепи після автокатастрофи. Непритомніючи, дитина блювала. Через 2 години опритомніла, відповідала на запитання, але через 4 години розвинувся сопор. Об'єктивно: Ps- 60/хв., судомні скорочення лівих кінцівок, анізокорія. Який основний діагноз?
Правильна відповідь	Епідуральна гематома
B	Струс головного мозку
С	Забій головного мозку
D	Перелом основи черепа
E	Дислокаційний синдром
№	крок 2009
Тема	Невралгія трійчастого нерва, діагностика
Текст завдання	Жінка 45-ти років скаржить на нападаподібний нестерпний біль у лівій половині обличчя тривалістю 1-2 хвилини. Напади провокуються жуванням. Захворіла два місяці тому після переохолодження. Об'єктивно: біль у точках виходу трійчастого нерва зліва. Дотик біля крила носа зліва викликає черговий напад з тонічною судомою м'язів обличчя. Який із перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

Правильна відповідь	Невралгія трійчастого нерва
B	Невралгія язикоглоткового нерва
C	Артрит нижньощелепного суглобу
D	Лицева мігрень
E	Гайморит
№	крок 2009
Тема	Головний біль, діагностика
Текст завдання	Жінка 29-ти років скаржиться на періодичний біль в правій половині голови, який провокується різкими запахами, хвилюванням. На подібне захворювання страждає мати хворої. Внутрішні органи - без патології. Під час нападу спостерігається загальна гіперестезія, нудота, а в кінці - поліурія. При пальпації правої скроневої артерії під час нападу відмічається її напруженість і болючість. Загальні аналізи крові та сечі без особливостей. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Мігрень
B	Неврит лицевого нерву
C	Невралгія трійчастого нерву
D	Синдром Мен'єра
E	Епілепсія
№	крок 2009
Тема	Пароксизмальні стани, епілепсія, діагностика
Текст завдання	Було помічено, що 7-ми річний школяр під час уроків по кілька разів ставав неуважним. Вчитель звернув увагу на "відсутній" погляд у дитини, прицмокування губами. Падіння та судом не спостерігалось. Під час короткої "відсутності" він не відгукувався на своє ім'я. Мати помічала такі ж явища і раніше, але не надавала їм значення, вважаючи, що дитина замислилася. Який тип епілептичного нападу, відповідно до прийнятої класифікації, найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	Абсанс
B	Генералізований тоніко-клонічний напад
C	Простий парціальний напад
D	Складний парціальний напад



Е	Джексо́нівський парціа́льний напад
№	крок 2009
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, діагностика
Текст завдання	У шахтаря 37-ми років після підняття вантажу виник біль у попереку, що іррадіює в ліву ногу. Хода щадна. Сплющений поперековий лордоз. Сколіоз випинанням вліво. Напруження пара-вертебральних м'язів. Позитивні симптоми Нері, Дежеріна, симптом Ласега зліва з кута 35 градусів. Зазначте не-обхідне дослідження для уточнення діагнозу:
Правильна відповідь	МРТ попереково-крижового відділу хребта
В	Люмбальна пункція
С	Сонографія нирок
D	Низхідна мієлографія
Е	Електроміографія
№	крок 2011
Тема	Менінгеальні знаки, діагностика
Текст завдання	Хворий 27-ми років на 2-й день хвороби скаржиться на нестерпний головний біль, багаторазове блювання. Об'єктивно: стан важкий. У свідомості, адинамічний. В ліжку займає вимушене положення із запрокинутою головою. Шкіра без висипу. Виражені ригідність м'язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського. Температура 39, 5° С, Ps- 52/хв, АТ- 130/80 мм рт.ст. Чим зумовлений провідний синдром захворювання?
Правильна відповідь	Лікворна гіпертензія
В	Лікворна гіпотензія
С	Ураження ядер черепно-мозкових нервів
D	Крововиливи в надниркові залози
Е	Гіпертермія
№	крок 2011
Тема	Геморагічний інсульт, діагностика
Текст завдання	Хворий 39-ти років при підйомі вантажу раптово відчув сильний головний біль, біль у міжлопатковій ділянці; виникло блювання. Об'єктивно: пульс ритмічний, 60/хв., АТ- 180/100 мм рт.ст. Хворий збуджений. Світлобоязнь, гіперакузія. Позитивні симптоми Керніга, Брудзинського з обох сторін. У крові: лейкоцити - $10 \cdot 10^9$ /л. Ліквор кров'янистий, цитоз 240/3. Який з діагнозів найбільш імовірний?

Правильна відповідь	Субарахноїдальний крововилив
B	Симпато-адреналовий криз
C	Гостра гіпертонічна енцефалопатія
D	Менінгококовий менінгіт
E	Ішемічний інсульт
№	крок 2011
Тема	Черепно-мозкова травма, лікування
Текст завдання	Хлопчик 9-ти років упав з дерева, ударився потиличною ділянкою, спостерігалась короткочасна непритомність. Об'єктивно: стан дитини задовільний, турбують головний біль, запаморочення. На рентгенограмах черепа виявлено вдавнений уламчастий перелом потиличної кістки в ділянці потиличного горба. Яке лікування показане хворому?
Правильна відповідь	Оперативне втручання
B	Протизапальна терапія
C	Гемостатична терапія
D	Розвантажувальні люмбальні пункції
E	Комплексне консервативне лікування
№	крок 2011
Тема	Менінгіт, діагностика
Текст завдання	У хворого з гнійним отитом різко погіршився стан: з'явилися головний біль, блювання, фебрильна температура, загальна гіперестезія. Виявляються менінгеальні знаки, застійні диски зорових нервів. Вогнищева симптоматика відсутня. Ліквор мутний, тиск підвищений, клітиннобілкова дисоціація за рахунок нейтрофілів. Про яке захворювання слід думати?
Правильна відповідь	Вторинний гнійний менінгіт
B	Менінгоенцефаліт
C	Серозний менінгіт
D	Первинний гнійний менінгіт
E	Субарахноїдальний крововилив
№	крок 2011

Тема	Пароксизмальні стани, епілепсія, діагностика
Текст завдання	У хлопчика 10-ти років періодично виникають короточасні стани (до 10-15 секунд) у вигляді "раптового відключення", які супроводжуються зупинкою і фіксацією погляду у прямому положенні, відсутнім беззмістовним виразом обличчя, зупинкою рухів та наступною амнезією. Який найбільш імовірний стан описано?
Правильна відповідь	Абсанс
В	Обнубіляція
С	Транс
D	Фуга
Е	Шперрунг
№	крок 2012
Тема	Геморагічний інсульт, діагностика
Текст завдання	Хворий 30-ти років, який страждає на головні болі, при піднятті важкого предмету відчув сильний головний біль у вигляді удару по голові; з'явилися нудота, блювання, легке запаморочення. Через добу - об'єктивно виражений менінгеальний синдром, температура тіла - 37, 6° С. Лікар запідозрив субарахноїдальний крововилив. Яке додаткове обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?
Правильна відповідь	Люмбальна пункція з дослідженням ліквору
В	Рентгенографія черепа
С	Комп'ютерна томографія
D	Реоенцефалографія
Е	Церебральна ангіографія
№	крок 2012
Тема	Пароксизмальні стани, епілепсія, лікування
Текст завдання	У 13-річного хлопчика раптово виникли втрата свідомості, генералізовані клонікотонічні судоми. Об'єктивно: зіниці розширені, фотореакція відсутня, виражений ціаноз обличчя, прикушування язика, виділення білої піни з рота, мимовільне сечовипускання і дефекація. З анамнезу відомо, що дані напади відбуваються з трирічного віку декілька разів на рік, дитина постійно приймає седативні та протисудомні препарати. Бригадою швидкої медичної допомоги діагностований епілептичний статус. Оберіть препарат для купірування нападу:
Правильна відповідь	Діазепам

В	Корглікон
С	Атропін
D	Аміназин
Е	Адреналін
№	крок 2013
Тема	Демієлінізуючі захворювання, діагностика
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на значне зниження зору на праве око, що виникло раптово. При обстеженні окуліста: ознаки ретробульбарного невриту. Об'єктивно: червні рефлексів відсутні, вібраційна чутливість знижена. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Розсіяний склероз
В	Бічний аміотрофічний склероз
С	Фунікулярний мієлоз
D	Пухлина головного мозку
Е	Атрофія зорових нервів
№	крок 2013
Тема	Черепно-мозкова травма, діагностика
Текст завдання	Потерпілий в автомобільній катастрофі доставлений в клініку нейрохірургії, оскільки були наявними ознаки черепно-мозкової травми. Під час огляду виявлені симптоми вогнищового ушкодження мозку, запідозрено його забій. Який метод дослідження слід застосувати в даному випадку?
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія <b>голови</b>
В	Рентгенографія кісток черепа
С	Ангіографія судин головного мозку
D	Ультразвукове дослідження судин головного мозку
Е	Обстеження очного дна
№	крок 2013
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, лікування
Текст завдання	Хворий 48-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у попереку. Хворіє 3 дні після переохолодження. Після огляду лікар поставив діагноз: гострий поперековокризовий радикуліт. Які ліки слід призначити хворому?

Правильна відповідь	Нестероїдні протизапальні засоби
B	Кортикостероїди
C	Вітаміни
D	Антибактеріальні
E	Десенсибілізуючі
№	крок 2013
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, діагностика
Текст завдання	Гірничий робітник очисного вибою 37-ми років після довготривалого вимушеного зігнутого положення тулуба у шахті відчув інтенсивний, стріляючого характеру біль у поперековому відділі хребта, який поширювався вниз у ліву ногу до підколінної ямки. Рухи хребта у поперековій ділянці різко обмежені. Позитивний симптом Ласега зліва. Пальпаторна болючість паравертебральних точок L5-S1. Сухожилкові рефлекси на нижніх кінцівках - знижений лівий ахіловий рефлекс. Гіпотонія м'язів лівого стегна і гомілки. Встановіть попередній клінічний діагноз:
Правильна відповідь	Попереково-крижова радикулопатія
B	Ниркова коліка
C	Спінальний інсульт
D	Перелом поперекового хребця
E	Транзиторна ішемічна атака
№	крок 2013
Тема	Пароксизмальні стани, епілепсія, діагностика
Текст завдання	Жінка 40-ка років з 15-ти років страждає на епілепсію з генералізованими епіпадами, які виникають 2-3 рази на місяць у нічний час та супроводжуються мимовільним сечовиділенням та дефекацією. Після психотравми (смерть батька) напади почастишали, виникають з періодичністю 2-3 хвилини, між нападами до свідомості не повертається, реакція зіниць на світло відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Епілептичний статус
B	Істеричний напад
C	Збільшення кількості великих епіпадів
D	Абсанс
E	Епілептичний психоз

№	крок 2014
Тема	Ішемічний інсульт, діагностика
Текст завдання	Чоловіка 57-ми років доставлено до неврологічного відділення зі скаргами на слабкість лівих руки і ноги, головний біль, опущення правої повіки, двоїння. Захворів поступово протягом доби після нервового перевантаження. Об'єктивно: оглушення, мова збережена, розбіжна косоокість лівого ока, птоз правої повіки, диплопія. Сила м'язів в лівих кінцівках знижена. Сухожилкові рефлекси зліва вищі. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Інсульт
В	Субарахноїдально-паренхіматозний крововилив
С	Менінгоенцефаліт
Д	Міастенія
Е	Ботулізм
№	крок 2014
Тема	Пароксизмальні стани, епілепсія, діагностика
Текст завдання	У хворого 26-ти років за добу спостерігалось 4 генералізованих судомних напади, між якими хворий не приходив до ясної свідомості (перебуває в комі або сопорі). Визначте стан:
Правильна відповідь	Епілептичний статус
В	Часті генералізовані судомні напади
С	Часті джексоновські напади
Д	Істеричні напади
Е	Часті складні парціальні напади
№	крок 2015
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, діагностика
Текст завдання	У хворої після підняття важкої сумки раптово з'явився гострий біль у попереку. Рухи в хребті обмежені. Не викликається ахіловий рефлекс зліва, з'явилась анестезія больової чутливості на зовнішній поверхні лівої гомілки. Яке захворювання запідозрите?
Правильна відповідь	Попереково-крижовий радикуліт
В	Люмбаго
С	Люмбалгія

D	Неврит стегнового нерва
E	Спінальний арахноїдит
№	крок 2015
Тема	Геморагічний інсульт, діагностика
Текст завдання	Хворий 42-х років раптово, на фоні повного здоров'я, відчув біль по типу "удару по голові", після чого розвилось блювання, втратив свідомість, генералізовані судоми. Об'єктивно: кома I, ригідність потиличних м'язів, ліва зіниця більше у розмірі ніж права, праві кінцівки ротовані, м'язовий тонус значно зменшений. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Субарахноїдальний крововилив внаслідок розриву аневризми головного мозку
B	Менінгіт
C	Епілепсія
D	Ішемічний інсульт
E	Внутрішньочерепна гематома
№	крок 2016
Тема	Захворювання периферичної нервової системи, діагностика
Текст завдання	У хворого, що отримав травму з переломом ключиці, з'явився в'ялий атрофічний параліч правої руки з порушенням всіх видів чутливості в ній. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Плексит плечового сплетення
B	Шийно-грудний радикуліт
C	Синдром кубітального каналу
D	Цервікоторакалгія
E	Поліневрит
№	крок 2016
Тема	Геморагічний інсульт, діагностика
Текст завдання	Хворий 30-ти років, який страждає на головні болі, під час підняття важкого предмету відчув сильний головний біль схожий на удар по голові; з'явилися нудота, блювання, легке запаморочення. Через добу - об'єктивно виражений менінгеальний синдром, температура тіла - 37, 6° C . Лікар припустив субарахноїдальний крововилив. Яке додаткове обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

Правильна відповідь	Люмбальна пункція з дослідженням ліквору
B	Рентгенографія черепа
C	Комп'ютерна томографія
D	Реоенцефалографія
E	Церебральна ангіографія
№	крок 2016
Тема	Менінгіт, діагностика
Текст завдання	Хворий 27-ми років на 2-й день хвороби скаржиться на нестерпний головний біль, багаторазове блювання. Об'єктивно: стан важкий. У свідомості, адинамічний. В ліжку набув вимушеного положення із закинутою головою. Шкіра без висипу. Виражені ригідність м'язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського. Температура - $39, 5^{\circ}C$ , Ps- 52/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. Чим зумовлений провідний синдром захворювання?
Правильна відповідь	Лікворна гіпертензія
B	Лікворна гіпотензія
C	Ураження ядер черепно-мозкових нервів
D	Крововиливи в надниркові залози
E	Гіпертермія
№	крок 2016
Тема	Менінгіт, діагностика
Текст завдання	Під час огляду дитини 1,5 років виявлено, що вона захворіла гостро, підвищилася температура до $39^{\circ}C$ , відбулося блювання до 5 разів. Дослідження нервової системи виявило позитивні симптоми Керніга, Брудзинського. Перераховані симптоми належать до:
Правильна відповідь	Менінгеальних знаків
B	Синдрому дискоординації
C	Синдрому рухових розладів
D	Енцефалічного синдрому
E	Ознак інфекційного токсикозу
№	крок 2010
Тема	Черепно-мозкова травма, діагностика



Текст завдання	Чоловік 38-ми років під час падіння з висоти двох метрів ударився головою об металевий предмет, короткочасно знепритомнів. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення, виділення крапель світлої рідини з правого носового ходу. Об'єктивно: симптом "окулярів", ретроградна амнезія. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Яка найбільш імовірна причина назальної ліквореї?
Правильна відповідь	Перелом основи черепа
B	Лікворна гіпертензія
C	Порушення відтоку ліквору
D	Запалення слизової оболонки носа
E	Забій головного мозку
№	крок 2007
Тема	<b>Ішемічний інсульт, лікування</b>
Текст завдання	У чоловіка 44-х років виникла дизартрія, синдром Горнера з правого боку, гикавка, правобічна атаксія, втрата больової чутливості обличчя праворуч та тулуба ліворуч. Свідомість збережена. КТ мозку в межах норми. Найбільш раціональною дією буде:
Правильна відповідь	Введення прямих антикоагулянтів та спостереження
B	Ендартеректомія правої сонної артерії
C	Ендартеректомія лівої сонної артерії
D	Амбулаторне спостереження
E	Хірургічна декомпресія мозку
№	крок 2007
Тема	<b>Інсульт, діагностика</b>
Текст завдання	Жінка 75-ти років з ІХС постійно приймає варфарин. Госпіталізована до відділення невідкладної терапії зі скаргами на раптову появу слабкості у лівій половині тіла і відхилення очного яблука в правий бік. Яке першочергове дослідження слід провести пацієнтці?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Комп'ютерна томографія мозку
B	<b>B.</b> МРТ мозку
C	<b>C.</b> Електроенцефалограма
D	<b>D.</b> Ультразвукове дослідження сонних артерій

Е	Е. Спинальна пункція
№	крок 2008, 2015
Тема	Дегенеративні захворювання головного мозку, діагностика
Текст завдання	Хворий 68-ми років, службовець. Близько двох років тому почалися порушення пам'яті: став забудькуватим в роботі і побуті, не справлявся із службовими обов'язками. Поступово став забувати імена рідних, назви предметів, став безпорадним, порушилася мова. Втратив навички письма, читання, догляду за собою. При комп'ютерно-томографічному дослідженні: атрофія кори великих півкуль мозку. Який діагноз є найбільш вірогідним?
Правильна відповідь	Хвороба Альцгеймера
В	Хвороба Піка
С	Атеросклеротична деменція
Д	Сенільна деменція
Е	Прогресивний параліч
№	крок 2019
Тема	Неепілептичні пароксизмальні стани
Текст завдання	Чоловіку 42-х років, з діагнозом спастичний парапарез призначено міорелаксант тизанідин за схемою поступового збільшення дози. Хворий порушив рекомендацію і вжив відразу добову дозу, після чого відчув загальну слабкість, запаморочення, зниження сили в ногах та на короткий час втратив свідомість. При фізикальному обстеженні артеріальний тиск - 75/55 мм рт.ст., пульс - 69/хв., температура тіла - 36,6°C, загальна м'язова гіпотонія. Який невідкладний стан найбільш імовірно виник у хворого?
Правильна відповідь	Синкопальний стан
В	Симпато-адреналовий криз
С	Ваго-інсулярний криз
Д	Панічна атака
Е	Транзиторна ішемічна атака
№	крок 2019
Тема	Епілепсія

Текст завдання	Жінка 35-ти років надійшла до відділен-ня інтенсивної терапії з нападами судом з періодичністю 2-3 хвилини, між якими не відбувається покращення свідомості, реакція зіниць на світло відсутня. З дитинства хворіє на епілепсію. Зазвичай напади ви-никають 1-2 рази на місяць у нічний час та супроводжуються мимовільним сечовиді-ленням та дефекацією. Почастішання на-падів та вищевказані ускладнення виникли на тлі перенесеного грипу. Який стан най-більш імовірно розвинувся у хворої?
Правильна відповідь	Епілептичний статус
B	Істеричний невроз
C	-
D	Епілептичний психоз
E	Гіпокальціємічний криз
№	крок 2019
Тема	Ішемічний інсульт, діагностика
Текст завдання	Жінка 65-ти років, вранці після сну від-мітила затерпність в правих кінцівках, за-паморочення, гикавку, зміну голосу, похлинання при вживанні рідини, затерпність та біль у лівій половині обличчя, хиткість хо-ди. Останні показники артеріального тиску - 160/100 мм рт.ст. У анамнезі гіпертонічна хвороба (систематично не лікується). При фізикальному обстеженні горизонтальний середньоамплітудний ністагм, більше ви-ражений вліво, синдром Горнера ліворуч, гіпестезія лівої половини обличчя за цибу-линним типом, правобічна гемігіпестезія, атаксія в позі Ромберга. Мова змінена - не-чітка артикуляція, проте зміст і розуміння мови не порушені. Пацієнтці важко вису-нути язик з рота. Парезів кінцівок немає. Який метод буде найбільш доречним у під-тверджені діагнозу цієї пацієнтки?
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія (КТ) головно-го мозку
B	Ангіографія
C	Електроенцефалографія
D	Реоенцефалографія
E	Магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку
№	крок 2019
Тема	Головний біль

Текст завдання	У дівчини 19-ти років скарги на головний біль пульсуючого характеру в лі-вій лобно-скронево-тім'яній ділянці, який турбує протягом п'яти років. Головний біль виникає нападopodobно і супроводжується нудотою, блюванням, фонофобією та фотобією. Тривалість нападу від кількох годин до 2-3 діб. Напад цефалгії часто виникає при перевтомі, емоційному перенавантаженні. Частота нападів 1-2 рази на місяць. Неврологічний статус без патологічних змін. Схожі головні болі були у матері хворої. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Мігрень
В	Кластерний головний біль
С	Лікворно-динамічний головний біль
D	Головний біль напруги
Е	Хронічна цервікокраніалгія
№	крок 2019
Тема	Екстрапірамідна система та синдроми її ураження
Текст завдання	Хворий 72-х років звернувся до лікаря зі скаргами на тремор рук, більше справа, загальну скутість, сповільнення ходи, мовлення, утруднення при виконанні звичайної домашньої роботи. При фізикальному обстеженні загальна брадикінезія, гіпомімія, емппростотонус, хода «човгаюча», ахейрокінез, тремор спокою в руках, D>S, підвищений м'язовий тонус за пластичним типом, феномен «зубчастого колеса», виражена постуральна нестійкість. Які ліки, насамперед, мають бути у схемі лікування цього хворого?
Правильна відповідь	Препарати, що містять леводопу
В	Препарати, що покращують мікроциркуляцію
С	Антихолінергічні препарати
D	Антидепресанти
Е	Холінолітики
№	крок 2019
Тема	Геморагічний інсульт
Текст завдання	60-річна жінка доставлена у відділення невідкладної допомоги зі скаргами на раптовий інтенсивний головний біль та нудоту. Останні півроку спостерігалася легка диплопія. Протягом багатьох років хворіє на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет II типу. Артеріальний тиск - 160/90 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 82/хв. Фізикальне обстеження виявило правосторонній птоз, легку анізокорію та ригідність потиличних м'язів. Атаксія не спостерігається. Який діагноз є найбільш імовірним?

Правильна відповідь	Субарахноїдальний крововилив
B	Невралгія трійчастого нерва
C	Метаболічна енцефалопатія
D	Іліома стовбура головного мозку
E	Лакунарний інсульт
№	крок 2020
Тема	Ішемічний інсульт, діагностика
Текст завдання	Хворий 52-х років скаржився на раптову слабкість і оніміння в лівих кінцівках, утруднення при ході. Об'єктивно відзначалися лівобічні гіпестезія і легкий геміпарез. Через 4 години стан хворого нормалізувався, вогнищева симптоматика регресувала, хворий зміг нормально ходити. АТ – 120/80 мм рт.ст. Якій найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Транзиторна ішемічна атака
B	Асоційована мігрень
C	Геморагічний інсульт
D	Ішемічний інсульт
E	Гіпертензивний криз
№	крок 2020
Тема	Ішемічний інсульт, діагностика
Текст завдання	Жінка 78-ми років, яка страждає на артеріальну гіпертензію, мало три епізоди раптової транзиторної втрати зору на ліве око. При аускультації сирних артерій в точках біфуркації з обох боків вислуховується шум. Яке додаткове дослідження найдільш доцільно призначити?
Правильна відповідь	Дуплексне сканування судин шиї
B	Люмбальна пункція
C	МРТ головного мозку
D	КТ головного мозку
E	Нейросонографія
№	крок 2020
Тема	Черепно-мозкові нерви

Текст завдання	Після тривалої їзди за кермом з відкритим вікном у хворого виникла асиметрія особи: не закривається праве око, згладжена права носогубних складка, відсутні мімічні рухи на правій половині обличчя, порушено сприйняття смаку на правій половині мови. Іншої патології в неврологічному статусі не знайдено. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Невропатія лицьового нерва
В	Невропатія окорухового нерва
С	Ішемічний інсульт
D	Гангліоніт трійчастого вузла
Е	Невропатія трійчастого нерва
№	крок 2020
Тема	Черепно-мозкові нерви
Текст завдання	Жінка 45-ти років скаржиться на приступообразную нестерпний біль з лівого боку особи, що триває по 1-2 хвилини. Напади провокуються жуванням. Захворіла 2 місяці тому після переохолодження. Об'єктивно: біль в точках виходу трійчастого нерва зліва. Дотик біля крила носа зліва викликає черговий напад з тонической судомою м'язів обличчя. Який з перерахованих діагнозів найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	Невралгія трійчастого нерва
В	Артрит нижньощелепного суглоба
С	Невралгія язикоглоткового нерва
D	Гайморит
Е	Лицьова мігрень
№	крок 2020 року
Тема	Хвороби периферичної нервової системи
Текст завдання	У 28-річного чоловіка, викладача, після емоційного стресу розвинулися хворобливі м'язові спазми в правій руці, що виникають під час письма; тепер він повинен тримати ручку між другим і третім пальцями. У нього не виникає проблем з набором тексту або написанням на дошці; інших рухових порушень або неврологічних патологій не виявлено. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	Писчий спазм
В	Нейропатія правого ліктьового нерва

С	Нейропатія правого променевого нерва
D	Коркова аграфія
E	Паркінсонізм
№	крок 2020 року
Тема	Черепно-мозкові нерви
Текст завдання	Після тривалої їзди з відкритим вікном у чоловіка з'явилася асиметрія обличчя; він не може закрити праве око, права носогубна складка згладжена, рухи виразу відсутні праворуч, порушується смакове відчуття язика праворуч. Інших неврологічних відхилень не виявлено. Яке захворювання в цьому випадку можна попередньо діагностувати?
Правильна відповідь	Невропатія лицьового нерва
В	Ішемічний інсульт
С	Невралгія трійчастого нерва
D	Нейропатія окорухового нерва
E	Нейропатія трійчастого нерва
№	крок 2020 року
Тема	Менінгіт, діагностика
Текст завдання	20-річний пацієнт скаржиться на сильний головний біль, подвійне бачення, слабкість, лихоманку, дратівливість. Об'єктивно: температура тіла 38,1 °С, хворий неохоче контактує, чутливий до подразників. Розрізняють птоз лівої повіки, екзотропію, анізокорію S> D та виражений менінгеальний синдром. При люмбальній пункції ліквор витікає під тиском 300 мм рт. ст. Рідина прозора, злегка опалесцентна. Через 24 години з'явилася фібринова плівка. Білок - 1,4 г / л, лімфоцити - 600 на мм <sup>3</sup> , глюкоза - 0,3 ммоль / л. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Туберкульозний менінгіт
В	Лімфоцитарний менінгіт (менінгіт Армстронга)
С	Сифілітичний менінгіт
D	Менінгіт внаслідок паротиту
E	Мінігококовий менінгіт