

№	крок 2017
Тема	Рак ободової і прямої кишки
Текст завдання	Хворий 63-х років скаржиться на біль у правій пахвинній ділянці, здуття живота, слабкість, стійкі закрепи більше 7 місяців. Об'єктивно: шкіра бліда, суха. В правій здухвинній ділянці пальпується утворення 5-7 см, малорухоме, неболюче. Аускультативно: підсилення кишкових шумів. У крові: еритроцити - $2,9 \cdot 10^{12}/л$ , Hb80 г/л, швидкість осідання еритроцитів - 32 мм/год. Кров у калі. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Рак сліпої кишки
B	Хвороба Крона
C	Поліп сліпої кишки
D	Рак правої нирки
E	Спастичний коліт
№	крок 2017, 2016, 2015, 2007
Тема	Рак легенів
Текст завдання	Хворий 67-ми років скаржиться на задишку, біль у грудях, загальну слабкість. Хворіє 5 місяців. Об'єктивно: температура тіла - $37,3^{\circ}C$ , пульс - 96/хв. Над правою легенею голосове тремтіння не визначається, перкуторний звук тупий, дихання не прослуховується. У харкотинні - домішки крові дифузно змішаної зі слизом. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Рак легенів
B	Великовогнищева пневмонія
C	Бронхоектатична хвороба
D	Вогнищевий туберкульоз легенів
E	Ексудативний плеврит
№	крок 2017, 2016, 2015
Тема	Рак стравоходу і шлунка
Текст завдання	У хворої 50-ти років впродовж півтора місяця спостерігається стабільне наростання жовтяниці, анемії з періодичними підйомами температури тіла. Під час пальпації виявлено збільшений і безболісний жовчний міхур. Розвиток якого захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Рак головки підшлункової залози
B	Рак жовчного міхура
C	Жовчнокам'яна хвороба
D	Ехінококоз печінки
E	Первинний склерозивний холангіт
№	крок 2017

Тема	Методи діагностики і принципи лікування злоякісних пухлин
Текст завдання	Хворий 62-х років випадково намацав у себе в лівій підключичній ямці щільний, розміром трохи більший за горошину, рухливий, не спаяний зі шкірою вузлик. При розпитуванні з'ясувалося, що за останні 6 місяців він схуд на 12 кг. Зазначає слабкість, зменшення працездатності, зниження апетиту. Яке дослідження є першочерговим для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	ЕФГДС
В	Пункція лімфатичного вузла
С	Стернальна пункція
D	Рентгенографія органів грудної клітки
Е	УЗД органів черевної порожнини
№	крок 2017
Тема	Рак молочної залози
Текст завдання	Хвора 52-х років впродовж 2-х років спостерігає збільшення правої молочної залози. Протягом останніх 3-х місяців з'явилося почервоніння шкіри цієї молочної залози. У правій аксілярній ділянці пальпується туго-еластичної консистенції лімфовузол розміром до 1,5 см. Права молочна залоза збільшена у розмірах, шкіра її гіперемована, симптом лимонної шкірки, сосок втягнутий. Яке захворювання найбільш імовірно у даному випадку?
Правильна відповідь	Рак молочної залози
В	Мастит
С	Фібroadенома молочної залози
D	Пахвовий лімфаденіт
Е	Мастопатія
№	крок 2010
Тема	Рак стравоходу і шлунка
Текст завдання	Хворий 58-ми років скаржиться на утруднене проходження твердої їжі по стравоходу, "кашель під час вживання їжі". Вважає себе хворим впродовж чотирьох місяців. Об'єктивно: у надключичних ділянках по одному щільному лімфовузлу до 0,7 см у діаметрі. Який діагноз найбільш імовірний у даному випадку?
Правильна відповідь	Рак стравоходу
В	Лімфогранулематоз
С	Трахеїт
D	Езофагіт
Е	Пухлина середостіння
№	крок 2010, 2009
Тема	Пухлини сечовивідної системи

Текст завдання	Хвора 68-ми років скаржиться на підвищення температури до 38, 3°C, гематурію. ШОЕ- 55 мм/год. Антибактеріальна терапія не ефективна. Який діагноз можливо припустити?
Правильна відповідь	Рак нирок
В	Полікістоз нирок
С	Амілоїдоз нирок
D	Сечокам'яна хвороба
Е	Хронічний гломерулонефрит
№	крок 2010
Тема	Рак молочної залози
Текст завдання	При обстеженні хворої 46-ти років встановлено діагноз: рак лівої молочної залози Т 2N 2M 0, кл. гр. II-а. Який план лікування цієї хворої?
Правильна відповідь	Променева терапія + операція + хіміотерапія
В	Тільки операція
С	Операція + променева терапія
D	Тільки променева терапія
Е	Тільки хіміотерапія
№	крок 2010, 2011
Тема	Рак молочної залози
Текст завдання	Хвора 68-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність пухлини у лівій молочної залозі. Об'єктивно: у верхньому внутрішньому квадранті лівої молочної залози наявне утворення діаметром до 2,5 см, щільне, горбисте, безболісне під час пальпації. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Рак
В	Кіста
С	Фібroadенома
D	Мастопатія
Е	Ліпома
№	крок 2010, 2011
Тема	Пухлини сечовивідної системи
Текст завдання	Хворий 65-ти років скаржиться на біль у поперековому відділі хребта, помірну дизурію. Хворіє близько півроку. Об'єм простати - 45 <sup>3</sup> (наявні гіпоехогенні вузли в обох частках, інвазія капсули). Простат-специфічний антиген 60 нг/мл. За даними біопсії простати аденокарцинома. Який з додаткових методів дослідження дозволить встановити стадію пухлинного процесу у цього хворого?
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія органів малого тазу

В	Рентгенографія поперекового відділу хребта
С	Екскреторна урографія
D	Скеннування кісток
Е	Рентгенографія органів грудної клітки
№	крок 2010, 2012
Тема	Пухлини голови і шиї
Текст завдання	Хворий 49-ти років оперується з приводу раку щитоподібної залози. При ревізії пухлини і проведенні експрес-діагностики встановлено: ступінь поширення процесу - Т3Nа M0, морфологічно - папілярна форма карциноми. Яким повинен бути обсяг радикального оперативного втручання?
Правильна відповідь	Тиреоїдектомія
В	Субтотальна резекція залози
С	Резекція ураженої частки
D	Енуклеація пухлини
Е	Резекція ураженої частки з перешийком
№	крок 2010, 2012, 2015
Тема	Пухлини кісток
Текст завдання	Юнак 20-ти років звернувся до лікарні зі скаргою на біль, який виникає в нижній третині стегнової кістки під час навантаження та у спокої. Травму заперечує. Об'єктивно: шкіра звичайного кольору, пастозність і біль під час глибокої пальпації, зменшення рухів у колінному суглобі. На рентгенограмі дистального метаепіфізу стегна - зона деструкції та спікули. У крові: незрілі форми клітин, ознаки запалення відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Остеогенна саркома
В	Гіперпаратиреоїдна дистрофія
С	Хронічний остеомієліт
D	Мієломна хвороба
Е	Мармурова хвороба
№	крок 2010
Тема	Рак стравоходу і шлунка
Текст завдання	Чоловік 55-ти років, хворий на рак шлунка, був прооперований 1,5 роки тому, проведена хіміотерапія. Впродовж 4-х місяців відмічає важкість у правому підребер'ї, нудоту, гіркий присмак у роті, іноді блювання з домішками жовчі, субфібрилітет ввечері. При УЗД виявлені множинні об'ємні утворення в печінці. Жовчний міхур та підшлункова залоза не змінені. Попередній діагноз: метастатичне ураження печінки. Визначення якої речовини радіоімунологічним аналізом може підтвердити цей діагноз?
Правильна відповідь	СА-19-9

В	$\beta_2$ мікроглобулін
С	Пролактин
D	Гастрин
Е	Інсулін
№	крок 2007
Тема	Пухлини жіночих статевих органів, пухлини органів черевної порожнини
Текст завдання	Жінка 45-ти років скаржиться на прогресуючу слабкість протягом останніх 6 тижнів, дискомфорт та здуття живота. Вагу не втрачала, але стала апатичною. Постійно вживає алкоголь. Об'єктивно: живіт збільшений у розмірах, напружений. Дефекація не порушена. УЗД органів черевної порожнини - невелика кількість асцитичної рідини; печінка, нирки, селезінка без змін, у лівому яєчнику декілька кіст, правий не візуалізується через утворення, пов'язане з сальником. У сечі - норма. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Карцинома яєчника
В	Лімфома товстого кишечника
С	Рак сигмоподібної кишки
D	Алкогольна хвороба печінки
Е	Хвороба Крона
№	крок 2007
Тема	Пухлини органів черевної порожнини
Текст завдання	Чоловік 65-ти років палить протягом 40 років. За останні місяці схуд на 10 кг. Скаржиться на біль у епігастральній ділянці після вживання їжі, діарею, жовтяницю. Об'єктивно: збільшений, безболісний жовчний міхур. Кал знебарвлений, глиноподібний. У крові: збільшення рівня загального та прямого білірубіну, лужної фосфатази і глутамінпіруваттрансферази. У сечі: позитивна реакція на білірубін і негативна на уробіліноген. Де розташований первинний процес, який призвів до зазначених змін?
Правильна відповідь	Підшлункова залоза
В	Загальна жовчна протока
С	Печінка
D	Дванадцятипала кишка
Е	Жовчний міхур
№	крок 2007
Тема	Рак молочної залози
Текст завдання	У жінки 42-х років виявлені зміни в молочній залозі. Які симптоми найбільш часто передують малігнізації?
Правильна відповідь	Ущільнення шкіри з втягнутим соском
В	Болісне рухливе ущільнення

С	Безболісне рухливе ущільнення
D	Кров'янисті виділення з соска
E	Чисті виділення з соска
№	крок 2007
Тема	Пухлини головного мозку
Текст завдання	Хвора 43-х років протягом п'яти місяців скаржиться на біль голови, переважно у ранковий час, блювання. За останній час біль посилювався при зміні положення голови. Об'єктивно: аностія, застій сосочків зорових нервів, атаксія, симптом Янішевського, зниження пам'яті та критики. Краніограма: ознаки гіпертензійно-лікворного синдрому. На ЕхоЕГ: зміщення серединних структур мозку в правий бік на 5 мм. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Пухлина лобної частки головного мозку
B	Абсцес потиличної частки головного мозку
С	Хронічна недостатність мозкового кровообігу
D	Пухлина лівої півкулі мозочка
E	Хвороба Альцгеймера
№	крок 2007
Тема	Пухлини жіночих статевих органів
Текст завдання	Жінці 54-х років виконана лапаротомія з приводу великого утворення у тазу, яке виявилось однобічною пухлиною яєчника з значними метастазами у сальник. Найбільш прийнятна інтраоперативна тактика передбачає:
Правильна відповідь	Видалення сальника, матки та обох яєчників з трубами
B	Біопсія сальника
С	Біопсія яєчника
D	Видалення яєчника та метастазів у сальнику
E	Видалення сальника та обох яєчників з трубами
№	крок 2007
Тема	Пухлини крові, лімфогранулематоз
Текст завдання	Хворий 20-ти років пройшов курс поліхіміотерапії за схемою ВАМП з приводу гострого лімфобластного лейкозу. Яка морфологічна картина крові може свідчити про настання ремісії?
Правильна відповідь	Вміст бластних клітин до 5%
B	Вміст бластних клітин до 15%
С	Вміст бластних клітин до 10%
D	Вміст бластних клітин до 1%
E	Відсутність бластних клітин
№	крок 2007

Тема	Пухлини сечовивідної системи
Текст завдання	У хворого скарги на никтурію, постійний ниючий біль у промежині та надлобковій ділянці, в'ялий струмінь сечі, почашене, утруднене та болісне сечовипускання. Хворіє протягом декількох місяців, коли поступово почало утруднюватися сечовипускання, з'явився біль у промежині. Під час ректального дослідження - простата збільшена в розмірах (більше за рахунок правої частки), щільна, асиметрична, центральна борозна згладжена, права частка кам'янистої щільності, неволуча, горбиста. Про яке захворювання слід думати?
Правильна відповідь	Рак простати
В	Склероз простати
С	Сечокам'яна хвороба, камінь правої частки простати
D	Туберкульоз простати
Е	Хронічний конгестивний простатит
№	крок 2007
Тема	Рак стравоходу і шлунка
Текст завдання	У 60-ти річного чоловіка розвинулась дисфагія, яка швидко прогресує протягом декількох тижнів. Відмічені втрата ваги, анемія. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Рак стравоходу
В	Сторонне тіло стравоходу
С	Ахалазія кардії
D	Дивертикул стравоходу
Е	Грижа стравохідного отвору діафрагми
№	крок 2007
Тема	Загальна онкологія
Текст завдання	У літніх людей підвищується частота виникнення пухлин. Одна з основних причин цього:
Правильна відповідь	Зниження активності клітинного імунітету
В	Зниження інтенсивності утворення антитіл
С	Зростання порушень мітозів
D	Підвищення активності клітинного імунітету
Е	Підвищення інтенсивності утворення антитіл
№	крок 2008
Тема	Пухлини жіночих статевих органів
Текст завдання	Аденокарцинома ендометрія, що проросла в серозну оболонку сечового міхура має бути класифікована як:
Правильна відповідь	III A
В	II A

C	<i>II B</i>
D	<i>IV AB</i>
E	
№	крок 2008
Тема	Рак молочної залози
Текст завдання	У жінки 40-ка років має місце щільне утворення в ділянці молочної залози. Який з перерахованих діагностичних методів буде найбільш інформативним у встановленні діагнозу?
Правильна відповідь	Гістологічне дослідження біоптату
B	Мамографія
C	Термографія
D	Ультразвукове дослідження
E	Аспіраційна біопсія з цитологією
№	крок 2008
Тема	Рак легені
Текст завдання	У хворого 62-х років, що палить і часто хворіє на "пневмонії", при оглядовій рентгенографії грудей в правій легені знайдено трикутної форми затемнення з вершиною, спрямованою до кореня легені, а також зсув тіні серця та середостіння в бік ураження. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Центральний рак легені
B	Абсцес легені
C	Кіста легені
D	Периферичний рак легені
E	Ателектаз легені
№	крок 2008
Тема	Рак ободової і прямої кишки
Текст завдання	Хвора 64-х років скаржиться на постійний тупий біль у правій здухвинній ділянці, схуднення на 20 кг за 6 місяців, стійкі закрепи, відсутність апетиту. Об'єктивно: шкіра землистого кольору, тургор її знижений. В правій здухвинній ділянці пальпується інфільтрат 6x8 см, щільний, мало рухливий, неболючий. Вільна рідина в черевній порожнині не визначається. При аускультатії - посилення кишкових шумів. В крові: Hb-80 г/л. Реакція Грегерсена - позитивна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Рак ободової кишки
B	Рак правої нирки
C	Апендикулярний інфільтрат
D	Заочеревинна пухлина



Е	Злоякісна пухлина тонкої кишки
№	крок 2008, 2009, 2011
Тема	Пухлини голови і шиї
Текст завдання	Хвора 39-ти років скаржиться на наявність пухлини на передній поверхні шиї. Захворіла 2 роки тому. Пухлина малорухома, збільшилася в розмірах, змінився тембр голосу, з'явилося відчуття тиску. Об'єктивно: в лівій частці щитоподібної залози пальпується вузол 3 см в діаметрі, підвищеної щільності, горбкуватий, неболючий. Збільшені лімфатичні вузли шиї. Функціональний стан щитоподібної залози не змінений. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Рак щитоподібної залози
В	Вузловий еутиреоїдний зоб
С	Вузловий гіпертиреоїдний зоб
Д	Хронічний лімфатозний тиреоїдит Хашимото
Е	Хронічний фіброзний тиреоїдит Ріделя
№	крок 2008
Тема	Пухлини жіночих статевих органів
Текст завдання	Хвора 15-ти років звернулася зі скаргами на періодичний біль внизу живота, більше праворуч. Менструальна функція не порушена. Статевим життям не живе. Ректоабдомінальне дослідження: матка не змінена, з лівого боку додатки не визначаються, з <b>лівого</b> боку пальпується утворення овоїдної форми, розміром 10x11см з гладенькою поверхнею, тугоеластичної консистенції, рухоме, безболісне. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Пухлина лівого яєчника
В	Хронічний сальпінгоофорит
С	Піовар зліва
Д	Рак яєчників
Е	Апендицит
№	крок 2009
Тема	Пухлини органів черевної порожнини
Текст завдання	Хворий 54-х років скаржиться на постійний тупий біль у мезогастральній ділянці, втрату ваги, домішки темної крові в калі, закрепи. Протягом року втрата ваги до 10 кг. В крові: ер.-3, $5 \cdot 10^{12}/л$ , Нь- 87 г/л, лейк.- $12, 6 \cdot 10^9/л$ , паличкоядерний зсув, ШОЕ- 43 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Рак поперечно-ободової кишки
В	Виразкова хвороба шлунка
С	Хронічний коліт
Д	Хронічний панкреатит
Е	Рак шлунку

№	крок 2009, 2011
Тема	Рак ободової і прямої кишки
Текст завдання	Хворий 72-х років скаржиться на біль та виділення крові під час дефекації. При ректальному пальцевому дослідженні виявлено пухлину анального каналу прямої кишки. Отримана верифікація - плоскоклітинний рак. Де слід в першу чергу шукати вторинну (метастатичну) пухлину?
Правильна відповідь	Легені
В	Печінка
С	Кістки тазу
D	Середостіння
Е	Головний мозок
№	крок 2011
Тема	Пухлини жіночих статевих органів
Текст завдання	Хвора 58-ми років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на кров'яністі виділення зі статевих шляхів типу "м'ясних помиїв". Постменопауза 12 років. Під час гінекологічного обстеження: зовнішні статеві органи і піхва з явищами вікової інволюції; шийка матки не змінена, з каналу шийки матки нерясні кров'яністі виділення; матка звичайних розмірів; придатки не визначаються; параметрії вільні. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Рак тіла матки
В	Атрофічний кольпіт
С	Порушення менструального циклу клімактеричного характеру
D	Рак шийки матки
Е	Гранульозоклітинна пухлина яєчника
№	крок 2011
Тема	Рак стравоходу і шлунка
Текст завдання	Хворий 49-ти років скаржиться на порушення ковтання, особливо твердої їжі, гикавку, осиплість голосу, нудоту, зригування, значне схуднення (15 кг за 2,5 місяці). Об'єктивно: маса тіла знижена. Шкірні покриви бліді, сухі. В легенях - дихання везикулярне, тони серця достатньої звучності, діяльність ритмічна. Живіт м'який, під час пальпації безболісний. Печінка не збільшена. Яке дослідження найбільш необхідне для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Езофагодуоденоскопія з біопсією
В	Клінічний аналіз крові
С	Рентгенографія органів травного тракту
D	Рентгенографія за Тренделенбургом
Е	Дослідження шлункової секреції
№	крок 2011, 2012

Тема	Пухлини сечовивідної системи
Текст завдання	У чоловіка 59-ти років раптово з'явились біль у попереку справа та макрогематурія, Подібне явище було декілька тижнів тому. Об'єктивно: $t^{\circ}$ -37, $7^{\circ}$ C, Ps- 88/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. З боку легень та серця змін не виявлено. Живіт м'який, безболісний. Печінка +1 см. Набряків нижніх кінцівок немає. Варикозне розширення вен сім'яного канатику справа. У крові: анемія, прискорення ШОЕ, гіпопротеїнемія. У сечі: протеїнурія, еритроцитурія. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Пухлина нирки
B	Хронічний гломерулонефрит
C	Сечокам'яна хвороба
D	Туберкульоз нирок
E	Хронічний гепатит
№	крок 2011
Тема	Пухлини кісток
Текст завдання	У пацієнта 17-ти років в зоні лівого колінного суглоба виник біль. М'які тканини стегна в зоні болю інфільтровані, функція суглоба обмежена. Рентгенологічно - в дистальному метаепіфізарному відділі лівої стегнової кістки вогнище деструкції з відшаруванням періосту та утворенням на межі дефекту в кірковому шарі кістки трикутника ("дашка") Кодмана. При рентгенологічному дослідженні органів грудної клітки виявлено множинні дрібново-гнищеві метастази. Яке лікування показано?
Правильна відповідь	Паліативний курс хіміотерапії
B	Радіоїодтерапія
C	Дистанційна гаматерапія
D	Екзартикуляція нижньої кінцівки
E	Ампутація нижньої кінцівки
№	крок 2012
Тема	Пухлини голови і шиї
Текст завдання	Хвора 32-х років відзначає на передній поверхні шиї пухлиноподібне утворення, яке з'явилося два роки тому. Останні три місяці пухлина швидко збільшується, з'явились перешкоди при ковтанні, розмові, відчуття тиску пухлиною. Об'єктивно: шкіра звичайної вологості, Ps- 80/хв., ритмічний, АТ- 130/80 мм рт.ст. В правій частці щитоподібної залози визначається вузол 3,0x3,5 см, щільний, горбистий, який зміщується під час ковтання. На сканограмі в щитоподібній залозі - "холодний вузол". Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Рак щитоподібної залози
B	Аденома щитоподібної залози
C	Кіста щитоподібної залози

D	Вузловий зоб
E	Аутоімунний тиреоїдит
№	крок 2012
Тема	Пухлини сечовивідної системи
Текст завдання	У хворої з підозрою на феохромоцитому у період між нападами артеріальний тиск в межах норми, відзначається тенденція до тахікардії. У сечі патології немає. Вирішено провести провокаційну пробу з гістаміном. Який препарат слід підготувати для надання екстреної допомоги при позитивному результаті проби?
Правильна відповідь	Фентоламін
B	Піпольфен
C	Ніфедипін
D	Мезатон
E	Преднізолон
№	крок 2012
Тема	Рак легені
Текст завдання	Чоловік 48-ми років скаржиться на болі в лівій половині грудної клітки, кашель, помірну задишку, які з'явилися після травми. Об'єктивно: зліва в 6-8 міжребер'ї болюча припухлість, ребра не ушкоджені. ЧСС - 85/хв. В легенях зліва від нижнього кута лопатки легеневий звук вкорочений, ослаблене дихання. Рентгенограма легень: гомогенне затемнення від кута лопатки. При пункції отримана геморагічна рідина. Рентгенографія після пункції - гомогенна, без чітких контурів, інфільтрація лівого кореня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Пухлина лівої легені
B	Травматичний плеврит
C	Лівобічна посттравматична пневмонія
D	Емболія легеневої артерії
E	Інфільтративний туберкульоз, туберкульозний плеврит
№	крок 2012
Тема	Загальна онкологія
Текст завдання	У хворої 58-ми років під час проведення курсу хіміотерапії з приводу онкологічного захворювання з'явився біль у горлі. При обстеженні у глотці на мигдаликах, слизовій оболонці виявлені ділянки некрозу. Багато каріозних зубів. В крові на фоні лейкопенії майже повністю відсутні нейтрофільні гранулоцити. Лейкоцити представлені в основному лімфоцитами та моноцитами. Про яке з перелічених захворювань слід думати?
Правильна відповідь	Ангіна агранулоцитарна
B	Ангіна лакуарна
C	Ангіна Венсана-Симановського

D	Ангіна сифілітична
E	Дифтерія
№	крок 2012
Тема	Пухлини жіночих статевих органів
Текст завдання	Хвора 64-х років надійшла в відділення з матковою кровотечею і анемією. Після 12-річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку появились серозно-водянисті виділення з піхви, потім серозно-кров'янисті, типу "м'ясних помиїв", з'явилися болі в низу живота. Яка патологія найбільш імовірна?
Правильна відповідь	Рак матки
B	Неповний аборт
C	Міхуровий занесок
D	Хоріонепітеліома
E	Внутрішній генітальний ендометріоз
№	крок 2012
Тема	Загальна онкологія
Текст завдання	У хворого на гостру лейкемію на тлі цитостатичного лікування виникли жовтяниця, диспептичні розлади. Виявлено помірне збільшення та болючість печінки, підвищення рівнів як прямого (40 мкмоль/л) так і непрямого (10 мкмоль/л) білірубіну, АлАТ- 2,1 ммоль/г·л, АсАТ- 2,2 ммоль/г·л. Реакція на антигени гепатитів В та С негативна. Яке ускладнення виникло у пацієнта?
Правильна відповідь	Токсичний гепатит
B	Вірусний гепатит
C	Гострий холецистит
D	Гострий панкреатит
E	Гемолітична анемія
№	крок 2012
Тема	Рак ободової і прямої кишки
Текст завдання	Хворий 63-х років скаржиться на біль у правій пахвинній ділянці, здуття живота, слабкість, стійкі закрепи більше 7-ми місяців. Об'єктивно: шкіра бліда, суха. В правій здухвинній ділянці пальпується утворення 5-7 см., малорухоме, безболісне. Аускультативно: підсилення кишкових шумів. У крові: ер.-2, $9 \cdot 10^{12}$ /л, Нь- 80 г/л, ШЗЕ- 32 мм/год. Кров у калі. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Рак сліпої кишки
B	Хвороба Крона
C	Поліп сліпої кишки
D	Рак правої нирки

Е	Спастичний коліт
№	крок 2012
Тема	Пухлини крові
Текст завдання	У хлопчика 5-ти років, хворого на гострий лімфобластний лейкоз, завершується фаза консолідації ремісії за протоколом поліхіміотерапії. У периферичній крові лейкоз.- 2, $9 \cdot 10^9$ /л, тромб.- $120 \cdot 10^9$ /л, нормохромна анемія I ст. У кістковому мозку 5% бластів. Яким хіміопрепаратом проводитиметься підтримуюча терапія?
Правильна відповідь	6-меркаптопурином
В	Циклофосфаном
С	Метотрексатом
Д	Преднізолоном
Е	Даунорубіцином
№	крок 2012
Тема	Пухлини жіночих статевих органів
Текст завдання	У хворої 32-х років при бімануальному дослідженні зліва від матки виявлене пухлинне утворення щільно-еластичної консистенції, діаметром до 10 см, рухоме, безболісне. Матка та придатки справа без особливостей. Менструальна та дітородна функції не порушені. Соматично здорова. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Пухлина лівого яєчника
В	Піосальпінкс
С	Гідросальпінкс
Д	Рак яєчника
Е	Позаматкова вагітність
№	крок 2012
Тема	Пухлини молочної залози
Текст завдання	Хвора 39-ти років під час самообстеження виявила пухлину в нижньому внутрішньому квадранті лівої молочної залози. При пальпації відзначається рухоме утворення до 2 см, із чіткими контурами, периферичні лімфатичні вузли не змінені. Яка подальша тактика?
Правильна відповідь	Ультразвукове дослідження молочних залоз, мамографія, тонкогolgкова аспіраційна біопсія
В	Протизапальна терапія, фізіотерапія
С	Радикальна мастектомія
Д	Ультразвуковий моніторинг геніталій протягом усього курсу терапії антиестрогенами, системної ензимотерапії, фітотерапії
Е	Динамічне спостереження
№	крок 2013

Тема	Лімфогранулематоз
Текст завдання	У хворого на лімфогранулематоз збільшені шийно-надключичні лімфатичні вузли справа. Загальний стан задовільний, пітливість немає, температура тіла 36, 7° С. Яке лікування треба призначити?
Правильна відповідь	Радіотерапія
В	Комбінована хіміотерапія
С	Комбінована хіміотерапія + радіотерапія
Д	Монохіміотерапія
Е	Монохіміотерапія + радіотерапія
№	крок 2013
Тема	Пухлини сечовивідної системи
Текст завдання	У хворої з підозрою на феохромоцитому, у період між нападами, артеріальний тиск в межах норми, відзначається тенденція до тахікардії. У сечі патології немає. Вирішено провести провокаційну пробу з гістаміном. Який препарат слід підготувати для надання екстреної допомоги при позитивному результаті проби?
Правильна відповідь	Фентоламін
В	Піпольфен
С	Ніфедипін
Д	Мезатон
Е	Преднізолон
№	крок 2013
Тема	Пухлини крові
Текст завдання	Чоловік 44-х років надійшов до інфекційного відділення з діагнозом: фолікулярна ангіна. Температура тіла - 38, 6° С, шкіра та слизові звичайного кольору. Рs- 102/хв., АТ- 130/70 мм рт.ст. У крові: ер.- $2,7 \cdot 10^{12}$ /л, Нь- 90 г/л, КП- 1,0; лейкоц.- $38 \cdot 10^9$ /л, бласти - 68%, п- 2%, с - 14%, л- 14%, м- 2%, ШЗЕ- 46 мм/год. Яке захворювання слід запідозрити у хворого?
Правильна відповідь	Гострий лейкоз
В	Лейкемоїдна реакція
С	Хронічний лімфолейкоз
Д	Хронічний мієлолейкоз
Е	Гострий агранулоцитоз
№	крок 2013
Тема	Пухлини жіночих статевих органів

Текст завдання	Хвора 51-го року скаржиться на постійні кров'яні виділення із статевих шляхів мажучого характеру протягом останніх 3-х місяців, контактні кровотечі. При бімануальному обстеженні: шийка матки збільшена, обмежена в рухомості, щільна на дотик. У дзеркалах: кратероподібна виразка по центру. Проба Хробака позитивна. Який з наступних діагнозів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Рак шийки матки
B	Ерозія шийки матки
C	Поліп шийки матки
D	Шийкова вагітність
E	Лейкоплакія шийки матки
№	крок 2013
Тема	Рак стравоходу і шлунка
Текст завдання	У хворої 64-х років діагностований рак шлунка, вона готується до радикальної операції. Має місце супутня патологія: посттромбофлебітичний синдром, набряклоболова форма. В анамнезі - тромбоемболія легеневої артерії 3 роки тому. Вкажіть найбільш ефективний метод профілактики розвитку у хворої повторної ТЕЛА у після-операційному періоді після радикальної операції на шлунку:
Правильна відповідь	Імплантація кавафільтру в передо-операційному періоді
B	Гепаринотерапія у післяопераційному періоді
C	Накладання цинк-желатинової пов'язки Унна у передопераційному періоді
D	Призначення непрямого антикоагулянту в перед- та післяопераційному періоді
E	Застосування еластичного бинтування кінцівок у післяопераційному періоді
№	крок 2013
Тема	Пухлини сечовивідної системи
Текст завдання	Хворий 64-х років звернувся до уролога зі скаргами на утруднене, млявим струменем, сечовипускання. При ректальному дослідженні виявлені зміни простати, що не дозволяють диференціювати аденому і рак. Яке дослідження треба провести для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	Дослідження крові на простатоспецифічний антиген
B	Загальний аналіз секрету простати
C	Визначення кількості залишкової сечі
D	Визначення рівня сечовини і креатиніну сироватки крові
E	Уретроцистографія
№	крок 2013
Тема	Пухлини сечовивідної системи



Текст завдання	Хворий 62-х років скаржиться на втрату 10 кг ваги за 2 місяці, появу сечі кольору "м'ясних помий", біль у поперековій ділянці, підвищення температури до 39° С. При пальпації лівої нирки скаржиться на біль. У крові: ер.-2, $8 \cdot 10^{12}$ /л, Нв- 90 г/л, лейк.- 8, $8 \cdot 10^9$ /л, ШОЕ- 42 мм/год. У сечі: питома вага - 1018, білок - 0,66 г/л, еритроцити на все поле зору. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Пухлина нирки
В	Карбункул нирки
С	Туберкульоз нирки
D	Гострий гломерулонефрит
Е	Сечокам'яна хвороба
№	крок 2013
Тема	Пухлини кісток
Текст завдання	Хворий 35-ти років скаржиться на біль у верхній третині плеча, який посилюється вночі. Об'єктивно: помірний набряк у верхній третині плеча, шкіра над ним підвищеної температури, болісність під час пальпації, обмеження рухів у плечовому суглобі. На рентгенограмах - ділянка деструкції плечової кістки у метадіафізарному відділі з явищами гомілкового періоститу (спікули) і відшаруванням окістя у вигляді "дашка". Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Остеогенна саркома
В	Остеома
С	Гемангіома
D	Хондробластома
Е	Хондрома
№	крок 2013
Тема	Рак легені
Текст завдання	У хворої 54-х років на оглядовій рентгенограмі органів грудної порожнини зліва паратрахеально виявлені множинні утворення розмірами від 2 до 4 см в діаметрі. Скарги на покашлювання та задишку при незначних фізичних навантаженнях. В анамнезі рак молочної залози після радикальної терапії 5 років тому. Діагноз: пролонгація хвороби, метастатичне ураження легень. Яку тактику терапії слід обрати?
Правильна відповідь	Паліативна хіміо- та променева терапія
В	Операційне втручання
С	Радикальна хіміотерапія
D	Протизапальна антибактеріальна терапія
Е	Радикальна променева терапія
№	крок 2013
Тема	Рак стравоходу і шлунка

Текст завдання	Хворий 38-ми років скаржиться на утрудненне ковтання твердої їжі, яке з'явилося біля місяця тому, а в останній час і напіврідкої. Відмічає також слабкість, погіршення загального стану, зниження апетиту, втрату маси тіла, підвищення температури. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, язик обкладений, інших відхилень не виявлено. У крові: гіпохромна анемія, підвищення ШОЕ. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Рак стравоходу
B	Гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба
C	Склеродермія
D	Рак шлунку
E	Езофагіт
№	крок 2014
Тема	Пухлини крові
Текст завдання	Хвора 19-ти років звернулася до лікаря у зв'язку з вираженою слабкістю, лихоманкою, прогресивним схудненням, запамороченням. Об'єктивно: зріст 165 см, вага 40 кг. Шкірні покриви сухі, лущаться, шкіра різко бліда з жовтуватим відтінком. У крові: ер.-1, $8 \cdot 10^{12}$ /л, Нв- 85 г/л, лейкоц.- $500 \cdot 10^9$ /л, мієо-бласти - 78%, нейтрофіли - 15%, лімфоцити - 7%. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий мієлобластний лейкоз
B	Гострий лімфобластний лейкоз
C	Хронічний лімфобластний лейкоз
D	Анемія
E	Лейкемоїдна реакція
№	крок 2014
Тема	Пухлини сечовивідної системи
Текст завдання	До приймального покою швидкою допомогою доставлено хворого 46-ти років зі скаргами на різкий, нападopodobний біль у правій поперековій ділянці, іррадіюючий у пахвинну ділянку, та на внутрішню поверхню стегна. Біль з'явився раптово кілька годин тому. Напередодні у хворого з'явилась профузна безбольова гематурія зі згустками крові черв'якоподібної форми. Раніше нічим не хворів. Про яке захворювання слід думати в першу чергу?
Правильна відповідь	Рак правої нирки
B	Пухлина сечового міхура
C	Некротичний папіліт
D	Гострий гломерулонефрит
E	Сечокам'яна хвороба, камінь правої нирки
№	крок 2014, 2015, 2016
Тема	Рак легені

Текст завдання	Чоловік 68-ми років скаржиться на кашель із виділенням харкотиння, який турбує його впродовж декількох років, осиплість голосу, загальну слабкість. Проживає поблизу заводу по переробці азбесту. Об'єктивно: в легенях справа - ослаблене дихання з подовженим видихом, сухі хрипи. На рентгенограмі: в області кореня і прикореневої зони справа неоднорідне, з нечіткими контурами затемнення, підвищена повітряність легень. ЛОР: парез правої голосової зв'язки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Центральний рак правої легені
B	Правобічна прикоренева пневмонія
C	Хронічний пиловий бронхіт
D	Азбестоз
E	Туберкульоз легень
№	крок 2014
Тема	Рак легені
Текст завдання	Хворий 48-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на утруднене ковтання їжі, осиплість голосу, схуднення. Вказані симптоми турбують хворого протягом останніх 3-х місяців, поступово прогресують. Об'єктивно: хворий виснажений, наявні збільшені надключичні лімфовузли. Під час езофагоскопії патології стравоходу не виявлено. Яке з перелічених досліджень є найдоцільнішим в даному випадку?
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини та середостіння
B	Рентгенографія легень
C	Поліпозиційна рентгеноскопія стравоходу
D	Радіоізотопне дослідження органів грудної порожнини та середостіння
E	Ультразвукове дослідження органів середостіння
№	крок 2014
Тема	Рак стравоходу і шлунка
Текст завдання	Хворий 77-ми років близько півроку скаржиться на утруднення при проходженні їжі, різке схуднення. Останній місяць їжа проходить вільно, але з'явилася охриплість голосу, а потім потужний кашель під час приймання їжі, особливо рідкої. Підвищилась температура тіла. Госпіталізований в тяжкому стані. При рентгеноскопії грудної клітки діагностована нижньочасткова пневмонія. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Рак стравоходу, стравохідно-бронхіальна нориця
B	Гіпостатична пневмонія
C	Рак легень з метастазами у лімфовузли середостіння
D	Рак стравоходу з розповсюдженням на зворотний нерв
E	Абсцедуюча нижньочасточкова пневмонія
№	крок 2014

Тема	Пухлини м'яких тканин
Текст завдання	У хворого 43-х років на передній поверхні правого плеча 3 місяці тому з'явилося округле утворення, незначно болюче щільноеластичної консистенції, малорухоме, розміром до 8 см в діаметрі. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Фібросаркома
B	Ліпома
C	Фіброма
D	Атерома
E	Гідроаденіт
№	крок 2014
Тема	Рак молочної залози
Текст завдання	Пацієнтка 34-х років скаржиться на біль і збільшення правої молочної залози. Страждає на безпліддя 15 років. Права молочна залоза збільшена у розмірах, шкіра її пастозна, гіперемована, пальпується інфільтрат тістоподібної консистенції без чітких контурів; симптом "лимонної кірки". Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Інфільтративний рак
B	Мастит
C	Вузлова мастопатія
D	Абсцес молочної залози
E	Фібroadенома молочної залози
№	крок 2016
Тема	Пухлини жіночих статевих органів
Текст завдання	Хвора 43-х років скаржиться на контактні кровотечі протягом останніх 6 місяців. Бімануально: шийка матки збільшена у розмірі, обмежена у рухливості. В дзеркалах - шийка матки у вигляді "цвітної капусти". Проби Хробака та Шиллера - позитивні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Рак шийки матки
B	Поліп шийки матки
C	Шийкова вагітність
D	Міоматозний вузол, що народжується
E	Лейкоплакія
№	крок 2016
Тема	Рак ободової і прямої кишки
Текст завдання	Хворий 58-ми років скаржиться на здуття кишечника, закрепи, різку слабкість, схуднення. Впродовж останнього місяця випорожнення лише після прийому послаблюючих. Під час пальпації живота спостерігається щільне утворення у лівій здухвинній ділянці. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	Рак сигмоподібної кишки
B	Рак сліпої кишки
C	Пухлина брижі товстої кишки
D	Пухлина заочеревинного простору зліва
E	Рак лівого сечоводу
№	крок 2016
Тема	Рак стравоходу і шлунка
Текст завдання	У 60-річного чоловіка розвинулася дисфагія, яка швидко прогресує протягом декількох тижнів. Спостерігається втрата ваги, анемія. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Рак стравоходу
B	Сторонне тіло стравоходу
C	Ахалазія кардії
D	Дивертикул стравоходу
E	Кила стравохідного отвору діафрагми
№	крок 2016
Тема	Рак молочної залози
Текст завдання	Хвора 68-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність пухлини у лівій молочній залозі. Під час огляду у верхньому внутрішньому квадранті лівої молочної залози наявне утворення діаметром до 2,5 см, щільне, горбисте, безболісне під час пальпації. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Рак
B	Кіста
C	Фібroadенома
D	Мастопатія
E	Ліпома
№	крок 2018 - 2019
Тема	Рак нирки
Текст завдання	До приймального покою швидкою до-помогою доставлено хворого 46-ти років зі скаргами на різкий, нападоподібний біль у правій поперековій ділянці, що іррадіює у пахвинну ділянку та на внутрішню поверхню стегна. Біль з'явився раптово кілька годин тому. Напередодні у хворого з'явилася профузна безболісна гематурія зі згустками крові черв'якоподібної форми. Раніше нічим не хворів. Яке захворювання можна припустити в першу чергу?
Правильна відповідь	Рак правої нирки
B	Пухлина сечового міхура

С	Некротичний папіліт
D	Гострий гломерулонефрит
E	Сечокам'яна хвороба, камінь правої нирки
№	крок 2018 - 19
Тема	Рак підшлункової залози
Текст завдання	Чоловік 58-ми років, скаржиться на постійний біль в епігастрії, що іррадіює в спину і посилюється після прийому жирної їжі. Пацієнт відмічає слабкість, за останні 2 місяці втратив у вазі до 9 кг Місяць тому з'явилась жовтяниця, що поступово зростає. Живіт м'який, печінка не збільшена. При лабораторному дослідженні крові гемоглобін - 68 г/л, лейкоцити - $9,0 \cdot 10^9$ /л, швидкість зідання еритроцитів - 36 мм/год. На УЗД: жовчний міхур великих розмірів, конкрементів не містить, холедох розширений, в головці підшлункової залози - округле утворення до 4 см в діаметрі з нечіткими контурами. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Рак головки підшлункової залози
B	Хронічний індуративний панкреатит
С	Виразкова хвороба дванадцятипалої ки-шки з пенетрацією в головку підшлункової залози
D	Рак шлунка з метастазами в печінку
E	Хронічний холецистопанкреатит
№	крок 2018 - 2019
Тема	Онкогематологія
Текст завдання	Жінка 56-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури до 38,5°C, підвищену пітливість вночі та збільшення лімфовузлів в лівій пахвовій та лівій надключичній ділянках. У сімейному анамнезі рак молочної залози у бабусі. При фізикальному обстеженні в зазначених ділянках пальпуються збільшені, безболісні, щільні лімфовузли. При рентгенологічному дослідженні органів грудної порожнини розширення тіні середостіння за рахунок збільшених лімфовузлів. Після ексцизійної біопсії лімфовузла надключичної ділянки, виявлені атипові багатоядерні клітини Рід-Штернберга. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Лімфома Ходжкіна
B	Туберкульоз
С	Бронхогенна карцинома
D	Інфекційний мононуклеоз
E	Метастази раку молочної залози
№	крок 2018 - 19
Тема	Пухлини щитоподібної залози

Текст завдання	Чоловік 45-ти років, звернувся до лікаря зі скаргами на дратівливість, підвищену втомленість, схуднення, серцебиття, перебої в роботі серця. При пальпації лівої долі щитоподібної залози пальпується утворення, щільно-еластичної консистенції, безболісне, яке при ковтанні зміщується разом з щитоподібною залозою. Позитивні очні симптоми, екзофтальм, порушення конвергенції. Артеріальний тиск - 135/80 мм рт.ст., пульс - 110/хв. При ультразвуку-ковому дослідженні щитоподібної залози у лівій долі візуалізується гіперехогенне округле утворення розмірами 2х3 см, з чіткими контурами, однорідної структури. Який висновок лікаря після проведеного обстеження буде найбільш коректним?
Правильна відповідь	Вузол щитоподібної залози
B	Рак щитоподібної залози
C	Дифузно-токсичний зоб Б.
D	Кіста щитоподібної залози
E	Гострий тиреоїдит
№	крок 2020
Тема	Онкогематологія
Текст завдання	Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на збільшення шийних та пахвових лімфовузлів, важкість у лівому підребер'ї. При пальпації лімфовузли м'які, безболісні, не спаяні. Спленомегалія. У крові: лейкоцити - 70 Г/л, лімфоцити - 80%, тіні Гумпрехта. Який імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний лімфолейкоз
B	Лімфогранулематоз
C	Неходжкінська лімфома
D	Гострий лейкоз
E	Лімфома Беркітта
№	крок 2020
Тема	Доброякісні пухлини молочної залози
Текст завдання	Пацієнтка 35-ти років пред'являє скарги на сукровичні виділення з соска лівої молочної залози. При огляді, пальпації - патології не виявлено. Для якого доброякісного захворювання є характерним даний симптом?
Правильна відповідь	Внутрішньопротокова папілома
B	Інфільтративний мастит
C	Масталгія
D	Фібroadенома молочної залози
E	Кіста молочної залози
№	крок 2020
Тема	Онкогематологія

Текст завдання	Жінка 56-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури до 38,5°C, підвищену пітливість вночі та збільшення лімфовузлів в лівій пахвовій та лівій надключичній ділянках. У сімейному анамнезі рак молочної залози у бабусі. При фізикальному обстеженні в зазначених ділянках пальпуються збільшені, безболісні, щільні лімфовузли. При рентгенологічному дослідженні органів грудної порожнини розширення тіні середостіння за рахунок збільшених лімфовузлів. Після ексцизійної біопсії лімфовузла надключичної ділянки, виявлені атипові багатоядерні клітини Рід-Штернберга. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Лімфома Ходжкіна
В	Туберкульоз
С	Бронхогенна карцинома
D	Інфекційний моноклеоз
Е	Метастази раку молочної залози
№	крок 2020
Тема	Рак передміхурової залози
Текст завдання	На прийом до уролога звернувся хворий 75-ти років зі скаргами на постійний, ниючий біль в промежині і надлобковій ділянці, в'ялий струмінь сечі, часте, болюче сечовипускання, ніктурію. Хворіє протягом декількох місяців, коли поступово почало утруднюватись сечовипускання, з'явився біль в промежині. При ректальному дослідженні - простата збільшена в розмірах (більше за рахунок правої долі), щільна, асиметрична, центральна борозна згладжена, права доля кам'янистої щільності, безболісна, бугриста. Яку патологію можна припустити у хворого?
Правильна відповідь	Рак передміхурової залози
В	Доброякісна гіперплазія парауретральних залоз
С	Рак сечового міхура
D	Хронічний простатит
Е	Рак прямої кишки
№	крок 2020
Тема	Рак шкіри
Текст завдання	Хвора 72-х років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність новоутворення на шкірі правої щоки, яке виявила самостійно близько 6 місяців тому. Об'єктивно: на шкірі правої щоки виразка неправильної форми з підритими краями та не чіткими контурами діаметром 1,5x2,0 см, багряно-червоного кольору, контактено кровить. Встановлено діагноз: підозра на рак шкіри правої щоки. Який метод верифікації діагнозу найбільш доцільний у даному випадку?
Правильна відповідь	Зішкріб пухлини
В	Інцизійна біопсія
С	Мазок-відбиток



D	Пункційна тонкогolkова аспіраційна біопсія
E	Трепан-біопсія
№	крок 2020
Тема	Рак головного мозку
Текст завдання	Хворому 65-ти років встановлено діагноз рак головного мозку IV стадії. Чоловік з вираженими епілептичними нападами та больовим синдромом. Який вид медичної допомоги необхідний для полегшення стану хворого?
Правильна відповідь	Паліативна медична допомога
B	Санаторно-курортна допомога
C	Первинна медична допомога
D	Вторинна медична допомога
E	Третинна медична допомога