

№	крок 2017
Тема	ПУХЛИНИ ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ.
Текст завдання	До приймального покою швидкою допомогою доставлено хворого 46-ти років зі скаргами на різкий, нападopodobний біль у правій поперековій ділянці, що іррадіює у пахвинну ділянку та на внутрішню поверхню стегна. Біль з'явився раптово кілька годин тому. Напередодні у хворого з'явилася профузна безболісна гематурія зі згустками крові черв'якоподібної форми. Раніше нічим не хворів. Яке захворювання можна припустити в першу чергу?
Правильна відповідь	Рак правої нирки
В	Пухлина сечового міхура
С	Некротичний папіліт
D	Гострий гломерулонефрит
Е	Сечокам'яна хвороба, камінь правої нирки
№	крок 2017
Тема	ДОБРОЯКІСНА ГІПЕРПЛАЗІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.
Текст завдання	Хворий 68-ми років звернувся до урологічної клініки зі скаргами на поклики до сечопуску, відсутність сечі протягом останніх 10 годин. Об'єктивно: над лобком пальпується болючий утвір, верхній край якого сягає пупка, в ході ректального дослідження передміхурова залоза збільшена, безболісна, щільної консистенції. Додаткове дослідження виявило рівень простатспецифічного антигену в крові - 3,2 нг/мл. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, гостра затримка сечі
В	Рак передміхурової залози, гостра затримка сечі
С	Хронічний парапроктит, гостра затримка сечі
D	Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, хронічна затримка сечі
Е	Склероз передміхурової залози, гостра затримка сечі
№	крок 2017
Тема	СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА.
Текст завдання	Хвора 52-х років скаржитися на періодичний нападopodobний біль у правій поперековій ділянці, який віддає у пахвинну ділянку і внутрішню поверхню правого стегна, порушення сечовиділення, яке супроводжується різями і домішками крові у сечі. У сечі: питома вага - 1014, білок - 0,078 г/л, еритроцити - 1/2 поля зору, лейкоцити - 5-7 в полі зору, велика кількість кристалів сечової кислоти. Вкажіть найбільш імовірний попередній діагноз:
Правильна відповідь	Сечокам'яна хвороба
В	Хронічний пієлонефрит
С	Гострий гломерулонефрит

D	Новоутворення нирки
E	Гострий цистит
№	крок 2017
Тема	АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ ТА ОРГАНІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ.
Текст завдання	У хворого в ході обстеження з приводу болю в поперековій ділянці, періодичного підвищення артеріального тиску виявлено: при УЗД права нирка - 7,3x3,2 см, товщина паренхіми - 0,6 см. Структура нирки не змінена. На екскреторних урограмах права нирка зменшена у розмірах, ЧМС не змінена, функція нирки не зменшена. Патологій з боку лівої нирки не знайдено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гіпоплазія правої нирки
B	Подвоєння правої нирки
C	Рак правої нирки
D	Солітарна кіста правої нирки
E	Аплазія правої нирки
№	крок 2017
Тема	ЦИСТИТ, ПРОСТАТИТ, УРЕТРИТ, ЕПІДІДИМІТ, КАВЕРНІТ. ЦИСТАЛГІЯ.
Текст завдання	У хворі 32-х років після переохолодження розвинулися біль у нижніх відділах живота, часте та болісне сечовипускання, субфебрильна температура тіла. В аналізі сечі: білок - 0,3 г/л, лейкоцити в полі зору, еритроцити - 12-15 в полі зору. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Гострий цистит
B	Гострий аднексит
C	Позаматкова вагітність
D	Гострий апендицит
E	Гострий пієлонефрит
№	крок 2010, 2011, 2016
Тема	ДОБРОЯКІСНА ГІПЕРПЛАЗІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.
Текст завдання	44-х років звернувся зі скаргами на утруднене сечовиділення, відчуття неповного спорожнення сечового міхура. Під час сонографічного дослідження сечового міхура біля входу в уретру визначається овальне гіперехогенне утворення з рівними контурами розміром 2x3 см, що переміщується під час дослідження. Який висновок можна зробити?
Правильна відповідь	Конкремент
B	Злоякісна пухлина сечового міхура
C	Поліп сечового міхура

D	Аденома передміхурової залози
E	Пухлина початкової частини сечоводу
№	крок 2010, 2009
Тема	ТРАВМАТИЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ ОРГАНІВ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ.
Текст завдання	Хворий 19-ти років добу тому отримав травму внаслідок падіння з висоти 1,5 метра - "сів верхи" на дерев'яний брус. Сечовиведення різко утруднене, макрогематурія, уретрорагія. На промежині та мошонці - гематома. Під час уретрографії виявлено затікання контрастної речовини у мембранозному відділі уретри. Якою повинна бути лікувальна тактика?
Правильна відповідь	Операція епіцистостомія
B	Катетеризація сечового міхура з метою виведення сечі
C	Бужування уретри
D	Холод на промежину, гемостатична терапія
E	Виконання первинного шва уретри
№	крок 2010
Тема	СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА.
Текст завдання	У хворого 45-ти років, який хворіє на сечокам'яну хворобу, виник напад ниркової кольки. Який механізм виникнення нападу?
Правильна відповідь	Порушення відтоку сечі з нирки
B	Підвищення відносної густини сечі
C	Перегини сечоводу
D	Пошкодження ниркових клубочків
E	Спазм ниркової артерії
№	крок 2007
Тема	НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ.
Текст завдання	У чоловіка 65-ти років з утрудненим сечовиділенням, у зв'язку з доброякісною аденомою передміхурової залози, виникли лихоманка з ознобом, гіпотензія, синусова тахікардія. Шкірні покриви теплі, сухі. У крові - абсолютна нейтропенія. Чим викликані такі гемодинамічні зміни?
Правильна відповідь	Ендотоксемія з активацією системи комплементу
B	Вторинна рефлекторна вазодилатація, у результаті зменшення серцевого викиду
C	Вторинна недостатність кровообігу зі збереженою систолічною функцією, у результаті периферичної вазоконстрикції
D	Рефлекторна вагусна стимуляція зі зменшенням серцевого викиду

Е	Вторинні ендотеліальні зміни, в результаті бактеріального ураження
№	крок 2007, 2008
Тема	ТРАВМАТИЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ ОРГАНІВ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ.
Текст завдання	Хвора 32-х років була збита автомобілем. Скарги на біль унизу живота над лобком з іррадіацією у промежину, пряму кишку, часте, утруднене та болісне сечовипускання малими порціями, домішок крові в сечі. Об'єктивно: визначається напруження над лобком, перкуторно - притуплення, що поширюється на здухвинну ділянку. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Позаочеревинний розрив сечового міхура
В	Розрив нирки
С	Розрив уретри
Д	Розрив сечоводу
Е	Забій нирки
№	крок 2007, 2008
Тема	СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА.
Текст завдання	Хвора 46-ти років скаржиться на нападоподібний біль у правій поперековій ділянці, що віддає в низ живота, нудоту. Раніше подібний біль не спостерігався. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини патологічних тіней не визначається. На ультразвуковій сонограмі, у збільшеній правій нирковій мисці, визначається гіперехогенне утворення діаметром близько 1,5 см, від якого відходить "ультразвукова доріжка". Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Камінь у нирці
В	Пухлина нирки доброякісна
С	Кіста у нирці
Д	Туберкульоз нирки
Е	Пухлина нирки злоякісна
№	крок 2008
Тема	ГОСТРА І ХРОНІЧНА НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ.
Текст завдання	Яка з перерахованих причин гострої ниркової недостатності відноситься до післяренальних?
Правильна відповідь	Сечокам'яна хвороба
В	Серцева недостатність
С	Септицемія
Д	Рабдоміоліз
Е	Гострий гломерулонефрит

№	крок 2008, 2009
Тема	СИМПТОМИ УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.
Текст завдання	У чоловіка 38-ми років, раніше здорового, раптово розвинувся напад гострого абдомінального болю з іррадіацією у ліву поперекову і пахвинні ділянки, що супроводжується нудотою, пітливістю і частим сечовипусканням. Хворий занепокоєний, метушиться по ліжку. Під час огляду патологічних змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Лівобічна ниркова колька
В	Herpes zoster
С	Дивертикуліт сигмоподібної кишки
D	Перекрут лівого яєчка
Е	Ретроперітонеальний крововилив
№	крок 2009
Тема	ГОСТРИЙ ПІЕЛОНЕФРИТ.
Текст завдання	У дівчини 15-ти років раптово виникли артралгія, головний біль, нудота, блювання, біль та напруження м'язів у ділянці попереку; підвищилася температура тіла до 38 – 39°C. Симптом Пастернацького - різко позитивний з правого боку. В сечі: бактеріурія, піурія. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий піелонефрит
В	Ниркова колька
С	Гострий гломерулонефрит
D	Паранефральний абсцес
Е	Цистит
№	крок 2009
Тема	ЦИСТИТ, ПРОСТАТИТ, УРЕТРИТ, ЕПІДІМІТ, КАВЕРНІТ. ЦИСТАЛГІЯ.
Текст завдання	Хвора 22-х років скаржиться на часте і болюче сечовипускання, поклики на сечопуск вночі, нетримання сечі, біль у надлобковій ділянці та у попереку. Часто сеча має колір пива. Місяць тому одружилася. Об'єктивно: загальний стан задовільний. В легенях - везикулярне дихання. Тони серця, ритмічні, ЧСС- 78/хв., АТ- 128/68 мм рт.ст. Живіт м'який, болючий у надлобковій ділянці. У сечі: ер.- 12-18 в полі зору, бактерій - 12-15 в полі зору. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Інфекція нижніх сечових шляхів - цистит
В	Сечокам'яна хвороба
С	Інфекція верхніх сечових шляхів - піелонефрит

D	Гонорея
E	Первинний сифіліс
№	крок 2011
Тема	СИМПТОМИ УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.
Текст завдання	У жінки 38-ми років нападаючі підвищується артеріальний тиск до 240/120 мм рт.ст., при цьому спостерігаються нудота, блювання, тахікардія, підвищене потовиділення, виявляється гіперглікемія. Після нападу рясне виділення сечі. Під час сонографії нирок виявлено додаткове утворення, що прилягає до верхнього полюсу правої нирки, можливо, відноситься до наднирника. Який лабораторний тест допоможе уточнити діагноз?
Правильна відповідь	Визначення екскреції катехоламінів і ванілілмигдалевої кислоти з сечею
B	Визначення інсуліну і С-пептиду в крові
C	Визначення швидкості клубочкової фільтрації за ендogenousним креатиніном
D	Визначення тироксину і тиреотропного гормону у крові
E	Визначення рівня реніну крові
№	крок 2012
Тема	ЦИСТИТ, ПРОСТАТИТ, УРЕТРИТ, ЕПІДІДИМІТ, КАВЕРНІТ. ЦИСТАЛГІЯ.
Текст завдання	Хворий 27-ми років надійшов до лікарні зі скаргами на різкий біль у правій половині калитки, збільшення її в розмірах, підвищення температури тіла до 39°С, пітливість, загальну слабкість. Захворів після переохолодження, коли з'явився і поступово посилювався біль у калитці, підвищилась температура, збільшилась права половина калитки. Травм не було. Об'єктивно: праве яєчко з додатком збільшені в розмірах, щільні, різко болючі під час пальпації, шкіра калитки гіперемована. У крові: лейкоцитоз зі зсувом формули вліво. Про яке захворювання слід думати?
Правильна відповідь	Гострий орхіепідидиміт
B	Гострий тромбоз вен сім'яного канатика
C	Гострий фунікуліт
D	Гострий орхіт
E	Гострий колікуліт
№	крок 2013
Тема	СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА.

Текст завдання	Чоловік 55-ти років надійшов до клініки в зв'язку з нападом ниркової кольки, яка періодично повторюється протягом року. Об'єктивно: в ділянці вушних раковин та правого ліктьового суглоба знаходяться вузликові утворення, вкриті тонкою блискучою шкірою. Рс- 88/хв. АТ- 170/100 мм рт.ст. Позитивний симптом Пастернацького з обох боків. Хворому призначено обстеження. Вивчення якого лабораторного показника найбільш доцільно для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Сечова кислота
В	Ревматоїдний фактор
С	ШЗЕ
Д	Осад сечі
Е	Молочна кислота
№	крок 2013
Тема	ТРАВМАТИЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ ОРГАНІВ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ.
Текст завдання	У хворого 38-ми років після автокатастрофи діагностовано перелом кісток тазу. Протягом 24-х годин турбує часте, болюче, малими порціями, з домішкою крові сечовипускання. На висхідній цистогамі, яку виконано в зв'язку з підозрою на розрив сечового міхура, - сечовий міхур у вигляді боксерської груші, променеподібне затікання контрастної речовини. Яку лікувальну тактику слід застосувати?
Правильна відповідь	Термінове хірургічне втручання
В	Антибактеріальна, гемостатична терапія
С	Встановлення постійного уретрального катетера
Д	Капілярна пункція сечового міхура
Е	Холод на надлобкову ділянку, спостереження
№	крок 2013
Тема	СИМПТОМИ УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.
Текст завдання	Хворий 81-го року скаржитися на постійне виділення сечі краплями, відчуття розпирання внизу живота. Об'єктивно: над лобком кулеподібне випинання, над яким перкуторно визначається притуплення, позитивний надлобковий поштовх. Який симптом спостерігається у хворого?
Правильна відповідь	Парадоксальна ішурія
В	Неутримання сечі
С	Дизурія
Д	Енурез
Е	Полакіурія

№	крок 2013
Тема	НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ.
Текст завдання	Хворому 78-ми років з аденомою передміхурової залози виконано грижосічення з приводу прямої пахвинної грижі. Після операції відсутнє сечовипускання. Над лоном визначається збільшений сечовий міхур. Що необхідно виконати?
Правильна відповідь	Катетеризація сечового міхура
В	Покласти на ділянку сечового міхура холод
С	Призначити УВЧ на післяопераційну рану
D	Призначити внутрішньом'язово прозерин
Е	Призначити підшкірно спазмолітики
№	крок 2013
Тема	СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ УРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ.
Текст завдання	При профілактичному ультразвуковому обстеженні органів черевної порожнини в середній школі у учениці 5-го класу (11 років) ліва нирка візуалізується на 3 см нижче за норму, нормальних розмірів, форми та структури, контрлатеральна нирка в типовому місті не виявлена. Попередній діагноз: уроджена аномалія розвитку нирок, дистопія лівої нирки, відсутність правої нирки або її тазова дистопія. Який метод променевої діагностики доцільно застосувати для встановлення остаточного діагнозу та визначення функціональної здатності обох нирок?
Правильна відповідь	Динамічна реносцинтиграфія
В	Радіоімунний аналіз
С	Радіонуклідна ренографія
D	Термографія
Е	Екскреторна урографія
№	крок 2013, 2014
Тема	СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА.
Текст завдання	Хворий 45-ти років висловлює скарги на інтенсивний різкий біль у правому боці, що іррадіює у праве стегно і промежину. Відзначає часті позиви до сечовипускання, сечу кольору "м'ясних помиїв". Подібний стан описує вперше. Позитивний симптом Пастернацького справа. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Сечокам'яна хвороба
В	Гострий апендицит
С	Гострий пієлонефрит
D	Гострий холецистит. Ниркова колька
Е	Гострий панкреатит

№	крок 2014
Тема	ЦИСТИТ, ПРОСТАТИТ, УРЕТРИТ, ЕПІДІМІТ, КАВЕРНІТ. ЦИСТАЛГІЯ.
Текст завдання	Хвора 36-ти років скаржиться на частий, болючий, утруднений сечопуск, постійні позиви до сечопуску, появу декількох крапель крові у сечі в кінці сечопуску. Захворіла раптово після переохолодження. При УЗД - в сечовому міхурі мало сечі, стінки сечового міхура набрякли, рівномірно потовщені. У сечі: лейкоцити - 30-40 в п/з, білок - 0,099 г/л, еритроцити незмінні - 5-7 в п/з. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий цистит
В	Гострий сальпінгоофорит
С	Уретероцеле
D	Пухлина сечового міхура
Е	Камінь сечового міхура
№	крок 2014, 2015
Тема	ДОБРОЯКІСНА ГІПЕРПЛАЗІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.
Текст завдання	Хворий 75-ти років скаржиться на неможливість помочитися, розпираючий біль над лоном. Захворів гостро 12 годин тому. Об'єктивно: над лоном пальпується наповнений сечовий міхур. Ректально: простата збільшена, щільно-еластична, з чіткими контурами, без вузлів. Міжчасткова борозенка виражена. При ультрасонографії - об'єм простати 120 см ³ , вона вдається в порожнину сечового міхура, паренхіма однорідна. Простатспецифічний антиген - 5 нг/мл. Яке найбільш імовірне захворювання викликало гостру затримку сечі?
Правильна відповідь	Гіперплазія простати
В	Рак простати
С	Склероз простати
D	Туберкульоз простати
Е	Гострий простатит
№	крок 2015, 2016
Тема	СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ УРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ.
Текст завдання	У хворі 37-ми років часті болісні сечовипускання, відчуття неповного спорожнення сечового міхура. Хворіє близько 15-ти років. У сечі: питома вага 1020, білок - 0,04 г/л, лейкоц.- 20-25 у п/з, ер.- 3-4 у п/з. При ультрасонографії - нирки без особливостей, об'єм сечового міхура 300 мл, його стінка потовщена до 0,5 см, трабекулярна у просвіті - ехозавис. Який метод додаткового дослідження необхідний цій пацієнтці у першу чергу для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	Цистоскопія
В	Бакпосів сечі

С	Екскреторна урографія
D	Оглядова урографія
Е	Проба Нечипоренка
№	крок 2016
Тема	ДОБРОЯКІСНА ГІПЕРПЛАЗІЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ.
Текст завдання	Чоловік 62-х років звернувся до уролога зі скаргами на часте сечовипускання в нічний час (5-6 разів), відчуття неповного звільнення сечового міхура, болі внизу живота, уповільнення швидкості сечовипускання. В анамнезі - гіпертонічна хвороба II стадії (максимальні цифри АТ- 160/100 мм рт.ст.). Пальпаторно передміхурова залоза збільшена до другого ступеня. PSA-2,2 нг/мл. Визначте препарат для тривалої терапії поєднаної патології у хворого:
Правильна відповідь	Доксазозин
В	Пропранолол
С	Індапамід
D	Амлодипін
Е	
№	крок 2015, 2016
Тема	СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ УРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ.
Текст завдання	Хворий 62-х років звернувся зі скаргами на періодичне відходження червоподібних кров'яних згустків із сечею. У правій половині живота під час пальпації визначається горбисте, безболісне, рухливе утворення. Який з перерахованих методів обстеження необхідно застосувати у першу чергу?
Правильна відповідь	УЗД нирок та заочеревинного простору
В	Хромоцистоскопію
С	Екскреторну урографію
D	Цистоскопію
Е	Комп'ютерну томографію тазу
№	крок 2019
Тема	ТРАВМАТИЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ ОРГАНІВ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ.
Текст завдання	Хворий 42 років, госпіталізований через 1,5 години після падіння і пошкодження краєм металевої арматури. Скаржить на затримку сечі, уретроррагію. Яке дослідження дозволить достовірно встановити локалізацію, ступінь і характер ймовірного пошкодження уретри?
Правильна відповідь	ретроградна уретрографія
В	рентгенограма кісток таза

С	загальний аналіз сечі
D	уретроскопія
E	катетеризація уретри
№	крок 2019
Тема	ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ПІСЛОНЕФРИТ
Текст завдання	В урологічне відділення терміново госпіталізована жінка 25 років з діагнозом: вагітність 36 тижнів. Гострий правобічний обструктивний післонефрит. Яке лікувальний захід має бути першочерговим?
Правильна відповідь	дренування правої нирки
B	патогенетична терапія
С	кесарів розтин
D	стимулювання розродження
E	атібактеріальна терапія
№	крок 2019
Тема	СЕЧОКАМ'ЯНА ХВОРОБА.
Текст завдання	Чоловік 47 років, поступив зі скаргами на приступообразную біль у правій поперекової області, які іррадіюють в праве стегно, нудоту, кількаразову блювоту, здуття живота. При об'єктивному дослідження - живіт роздутий, пальпацією відзначається напруження м'язів, болючість в правому підребер'ї і поперекової області. Яке дослідження найбільш інформативне для швидкої диференційної діагностики ниркової коліки і гострого холециститу?
Правильна відповідь	екскреторна урографія
B	загальний аналіз сечі і крові
С	УЗД органів черевної порожнини
D	комп'ютерна томографія
E	оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
№	крок 2020
Тема	ПУХЛИНИ ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ.
Текст завдання	На прийом уролога звернувся хворий 75 - ти років зі скаргами на постійний, ниючий біль в промежині і надлобковій ділянці, в'ялий струмінь сечі, часте, болюче сечовипускання, ніктурія. Хворіє протягом декількох місяців, коли поступово почало утруднюватись сечовипускання, з'явився біль в промежині. При ректальному дослідженні -протота збільшена в розмірах (більше за рахунок правої долі), щільна, асиметрична, центральна борозна сглажена, права доля кам'янистої щільності, безуюлісна, бугриста. Яку патологію можна припустити у хворого ?
Правильна відповідь	Рак передміхурової залози.

В	Доброякісна гіперплазія парауретральних залоз.
С	Рак сечового міхура.
D	Хронічний простатит.
Е	Рак прямої кишки.
№	крок 2020
Тема	ЦИСТИТ, ПРОСТАТИТ, УРЕТРИТ, ЕПІДІМІТ, КАВЕРНИТ. ЦИСТАЛГІЯ.
Текст завдання	Хворий скаржиться на гнійні виділення з пенісу вранці перед сечовиділенням, різі, полакіурію. Визначена піурія при проведенні трьохстаканної проби в першій порції сечі. Поставте Діагноз:
Правильна відповідь	Гострий уретрит
В	Хронічний простатит
С	Гострий баланопостит
D	Хронічний пієлонефрит
Е	Гострий цистит
№	крок 2020
Тема	ПУХЛИНИ ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ.
Текст завдання	Хворий 65-ти років скаржиться на біль у правій нирковій ділянці, кров при сечовипусканні протягом усього акту, відсутність апетиту та слабкість. Об'єктивно: шкіра звичайного кольору, суха. При пальпації живота в правій нирковій ділянці – еластичне утворення, що зміщується, безболісне. Аналіз сечі-макрогематурія, атипові клітини. Нв крові – 110г/л, ШОЕ-45 мм/год. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?
Правильна відповідь	Пухлина правої нирки
В	Гострий пієлонефрит
С	Пухлина товстої кишки
D	Апендикулярний інфільтрат
Е	Пухлина правого сечоводу .
№	крок 2020
Тема	СЕЧОКАМ'ЯНА-ХВОРОБА.

Текст задання	Чоловік 45-ти років доставлений у відділення невідкладної допомоги зі скаргами на раптовий інтенсивний біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовиділення, блювання. Температура тіла - 36,8 С, пульс - 82 в хв., артеріальний тиск - 130\80 ММ.РТ.СТ. При фізикальному обстеженні болісність при пальпації поперекової ділянки відсутня, позитивний симптом Пастернацького. При лабораторному дослідженні у загальному аналізі сечі білок - 0,06 г/л., реакція - слабо кисла, лейкоцити - 3-4 в полі зору, еритроцити - 30-40 в полі зору. Який діагноз є найбільш імовірним ?
Правильна відповідь	Сечокам'яна-хвороба.
В	Гострий пієлонефрит
С	Гострий гломерулонефрит
D	Гостра ниркова недостатність
E	Полікістоз нирок