

№	крок 2017, 2007
Тема	Диференційна діагностика екзантем
Текст завдання	Дитина хворіє 5-й день. Турбує підвищена до 39-40°C температура тіла, настирливий, частий, глибокий, малопродуктивний кашель, світлобоязнь, закладеність носа. Об'єктивно: одутлість обличчя, слизова оболонка рота пухка, геморагічна енантема на м'якому піднебінні, рештки плям Філатова-Копліка. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Кір
B	Скарлатина
C	Краснуха
D	Аденовірусна інфекція
E	Грип
№	крок 2010, 2011
Тема	Інфекційні ураження ЦНС
Текст завдання	На 21-й день після появи везикульозного висипу при вітряній віспі у дитини 7-ми років з'явилися атаксія, ністагм, інтенційний тремор, м'язова гіпотонія. У лікворі невисокий лімфоцитарний плеоцитоз, незначно збільшений рівень білку. Яке ускладнення розвинулось у даної дитини?
Правильна відповідь	Енцефаліт
B	Гнійний менінгіт
C	Пневмонія
D	Гострий неврит
E	Постгерпетична невралгія
№	крок 2010
Тема	Диференційна діагностика екзантем
Текст завдання	Дитині 4 роки, 5-й день хвороби. Скарги на кашель, висипку на шкірі, t°- 38, 2°C, одутлість обличчя, світлобоязнь, кон'юнктивіт. Об'єктивно: на обличчі, шиї, верхній половині грудної клітки яскрава плямисто-папульозна, місцями зливна висипка. Зів гіперемований. З носа - серозно-гнійні виділення. У легенях - сухі хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Кір
B	Аденовірусна інфекція
C	Скарлатина
D	Краснуха
E	Ентеровірусна екзантема

№	крок 2010
Тема	Гострі кишкові інфекції
Текст завдання	Дитині 10 місяців. Скарги на t° -39, 6°C , рідкі випорожнення. На 5-й день: t° - 38, 7°C , млява, бліда. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Тони серця приглушені. Живіт помірно здутий, урчання у ділянці пупка, відрізки тонкого і товстого кишечника чутливі під час пальпації. Випорожнення рідкі, 8 разів, темно-зеленого кольору, смердючий, с домішкою слизу. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Сальмонельоз
B	Дизентерія
C	Іерсиніоз
D	Ешеріхіоз
E	Ротавірусна інфекція
№	крок 2007, 2008
Тема	Інфекційні ураження ЦНС
Текст завдання	Дитина 8-ми років скаржить на головний біль, блювання. Хворіє 1 день. Об'єктивно: t° - 39, 3C , шкіра чиста, зів гіперемований, язик обкладений, кон'юнктивіт, склерит. Слабко виражена ригідність м'язів потилиці. Позитивний симптом Керніга з правого боку. Ліквор: цитоз - 340, лімф.- 87%, нейтроф.-13%, білок - 140 мг/л. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Серозний менінгіт
B	Арахноїдит
C	Нейротоксикоз
D	Пухлина мозку
E	Гнійний менінгіт
№	крок 2007
Тема	Поліомієліт. Діагностика
Текст завдання	Дитина 1,5 років захворіла гостро, температура тіла - 38, 5° , біль голови, слабкість. На п'ятий день хвороби температура знизилася. Вранці у правій нозі виникли біль у м'язах, відсутність рухів та сухожилкових рефлексів; чутливість збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Поліомієліт
B	Вірусний енцефаліт
C	Поліартропатія
D	Остеомієліт

Е	Артрит кульшового суглоба
№	крок 2007
Тема	Диференційна діагностика ГРВІ
Текст завдання	Дитина 3-х місяців захворіла гостро з підвищення температури до 37, 8 ⁰ С, покашлювання. На 3-й день кашель посилюється, приєдналася задишка. Перкуторно: над легеньми тимпанічний звук, аускультативно - з обох боків велика кількість дрібнопухирчастих вологих та свистячих хрипів під час видиху. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	ГРВІ, бронхіоліт
В	ГРВІ, бронхопневмонія
С	ГРВІ, бронхіт
Д	ГРВІ, бронхіт з астматичним компонентом
Е	ГРВІ, вогнищева пневмонія
№	крок 2008
Тема	Гострі кишкові інфекції
Текст завдання	Дівчина 12-ти років скаржиться на різку слабкість, нудоту, запаморочення, порушення зору. Напередодні їла в'ялену рибу, яловичину домашнього виготовлення. При огляді: блідість шкіри, подряпина лівого коліна, сухість слизових оболонок ротоглотки, двобічний птоз, зіниці розширені, не в змозі читати простий текст ("сітка", "туман" перед очима). Яка терапія буде найбільш адекватною в даному випадку?
Правильна відповідь	Парентеральне введення полівалентної протиботулінічної сироватки
В	Парентеральна дезинтоксикація
С	Парентеральне введення антибіотиків
Д	Промивання шлунка
Е	Парентеральне введення протиправцевої сироватки
№	крок 2008, 2009
Тема	Диференційна діагностика екзантем
Текст завдання	У дворічної дівчинки підвищена температура тіла до 37, 2 ⁰ С та висип на шкірі. Загальний стан дитини задовільний. На шкірі спини, розгинальних поверхнях кінцівок - макульозний висип рожевого кольору. Слизова піднебінних дужок дрібноплямиста, помірно гіперемована. Незначне слизове виділення з носу. Збільшені потиличні та задньошийні лімфовузли. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Краснуха
В	Скарлатина
С	Вітряна віспа

D	Ентеровірусна екзантема
E	Кір
№	крок 2008
Тема	Диференційна діагностика менінгітів
Текст завдання	Дитина 3-х років захворіла гостро, підвищилася температура тіла до $39, 5^{\circ}C$, стала млявою, повторне блювання, головний біль. При огляді виявлені позитивні менінгеальні симптоми, проведена люмбальна пункція. Спинномозкова рідина каламутна, витікає під тиском, вміст білка - 1,8 г/л; реакція Панді +++, цукор - 2,2 ммоль/л, хлориди - 123 ммоль/л, цитоз - $2350 \cdot 10^6$ (80% нейтрофілів, 20% лімфоцитів). Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гнійний менінгіт
B	Серозний менінгіт вірусний
C	Серозний менінгіт туберкульозний
D	Субарахноїдальний крововилив
E	Пухлина мозку
№	крок 2008
Тема	Інфекційні ураження ЦНС
Текст завдання	Лікар-педіатр 25-ти років захворів тиждень тому: підвищилася температура до $37, 6^{\circ}C$, з'явилася припухлість на шиї. Визначено діагноз: ГРЗ, шийний лімфаденіт. Призначено лікування: еритроміцин, зігріваючий компрес на шию. На фоні лікування підвищилася температура тіла до $39^{\circ}C$, з'явився головний біль, багаторазове блювання, менінгеальний синдром. Які дослідження слід провести для визначення остаточного діагнозу?
Правильна відповідь	Спинномозкова пункція
B	Пункція шийного лімфовузла
C	Загальний аналіз крові
D	Харкотиння на вторинну флору
E	Рентгенологічне дослідження легень
№	крок 2008, 2011
Тема	Поствакцинальні ускладнення. Невідкладна допомога
Текст завдання	У хлопчика 4-х місяців через 15 хвилин після другого щеплення вакциною АКДП були зафіксовані ознаки набряку Квінке. Який препарат слід використати для надання дитині невідкладної допомоги?
Правильна відповідь	Преднізолон
B	Гепарин
C	Адреналін

D	Фуросемід
E	Седуксен
№	крок 2009
Тема	Діагностика невідкладних станів при респіраторних інфекціях
Текст завдання	Хлопчик 3-х років раптово захворів. Голос став охриплим та осиплим, іноді - афонічним. З'явився грубий, гучний, сухий, непродуктивний кашель. Температура тіла 37, 4°C. Об'єктивно: дитина спокійна, положення в ліжку вимушене (з фіксованим плечовим поясом). Дихання стенотичне, добре чути на відстані. Чітко видно постійну роботу дихальної мускулатури. Аускультативно: дихання жорстке, рівномірно ослаблене, особливо в задніх та нижніх відділах легенів. Укажіть, який механізм домінує в патогенезі крупу?
Правильна відповідь	Набряк слизової оболонки гортані та трахеї
B	Спазм гладеньких м'язів гортані, трахеї та бронхів
C	Гіперсекреція залоз слизової оболонки гортані, трахеї і бронхів
D	Обструкція
E	Ларінгоспазм
№	крок 2009
Тема	Гострі кишкові інфекції
Текст завдання	Дитина 10-ти місяців після вживання некип'яченого молока хворіє 5-ту добу: температура 38 – 39°C, блювання, рідкі випорожнення. В'яла, бліда. Язик обкладений білими нашаруваннями. Тони серця приглушені. Живіт здутий, буркотіння в ділянці пупка, печінка +3 см. Випорожнення рідкі, до 5 разів за добу, темно-зеленого кольору, з домішкою слизу. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Сальмонельоз
B	Стафілококова кишкова інфекція
C	Ешерихіоз
D	Гострий шигельоз
E	Ротавірусна інфекція
№	крок 2009
Тема	Менінгококова інфекція
Текст завдання	Дитина 4-х місяців захворіла гостро: температура - 38, 5°C. Однократне блювання, в'ялість. Через 10 годин з'явилася висипка на сідницях та нижніх кінцівках у вигляді петехій, плям та папул. Деякі геморагічні елементи з некрозом у центрі. Яке захворювання найбільш вірогідне?
Правильна відповідь	Менінгококцемія

В	Краснуха
С	Грип
D	Геморагічний васкуліт
Е	Скарлатина
№	крок 2009
Тема	Диференційна діагностика крапельних інфекцій
Текст завдання	Дільничним педіатром оглянута дитина 4-х років. Скарги на біль під час жування та відкриванні рота, головний біль, підвищення температури тіла до 38, 9°C. Об-но: в ділянках привушних слинних залоз контурується припухлість, помірно болюча при пальпації, шкіра над нею не змінена. При огляді ротоглотки - отвір Стенової протоки гіперемований. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Епідемічний паротит
В	Дифтерія ротоглотки
С	Сіалоаденіт
D	Інфекційний мононуклеоз
Е	Шийний лімфаденіт
№	крок 2009
Тема	Вірусні гепатити. Діагностика
Текст завдання	У хлопчика 10-ти років хронічний вірусний гепатит В з максимальною активністю. Який з лабораторних тестів найбільш чітко характеризує ступінь цитолізу в хворого?
Правильна відповідь	Трансамінази
В	Проба Вельтмана
С	Проба Таката-Ара
D	Протромбін
Е	Загальний білок
№	крок 2007, 2008
Тема	Вірусні гепатити. Діагностика
Текст завдання	У дитини 3-х місяців після декількох днів занепокоєння, анорексії, субфебрилітету з'явилися жовтяниця, гепатоспленомегалія; сеча темно-жовтого кольору, знебарвлення калу. У віці 1 місяць були гемотрансфузії. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Вірусний гепатит В
В	Гемолітична анемія

C	Вірусний гепатит А
D	Атрезія біліарних шляхів
E	Кон'югаційна жовтяниця
№	крок 2011
Тема	Діагностика невідкладних станів при респіраторних інфекціях
Текст завдання	Дитині 2 роки. Скаржиться на хриплість голосу, задишку з утрудненням вдиху. Хворіє впродовж 3-х днів. Захворювання почалось з сухого кашлю і закладеності носа. Об'єктивно: загальний стан порушений, відмічається стридорозне дихання. Шкіра бліда. Температура тіла 37, 3° C. Піднебінні дужки гіперемовані, нальотів немає. Тони серця ритмічні. В легенях жорстке дихання, хрипів немає. У змиві з носоглотки виявлений вірус парагрипу. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
B	Епіглотит
C	Стороннє тіло
D	Дифтерія
E	Ларингоспазм
№	крок 2011
Тема	Інфекційні ураження ЦНС
Текст завдання	У дитини 9-ти місяців температура тіла 36, 7° C, шкіра бліда, волога, виражений біль у м'язах ніг. Рухи в нижніх кінцівках відсутні, чутливість збережена. Діагностовано поліомієліт. До якого роду належить збудник цієї хвороби?
Правильна відповідь	Пікорнавіруси
B	Параміксовіруси
C	Тоговіруси
D	Аденовіруси
E	Ротавіруси
№	крок 2011
Тема	Диференційна діагностика екзантем
Текст завдання	Дитина 5-ти років захворіла гостро з підвищення температури до 38, 5оС, нежиті, кашлю та кон'юнктивіту. На 4-й день хвороби з'явився плямисто-папульозний висип на обличчі, новий підйом температури до 39, 2оС. В наступні дні висип розповсюдився на тулуб і кінцівки. Слизова піднебіння гіперемована, на слизовій оболонці щік біля нижніх кутніх зубів - залишки дрібних білуватих нашарувань. Який найбільш імовірний попередній діагноз?
Правильна відповідь	Кір

В	ГРВІ
С	Іерсиніоз
D	Ентеровірусна інфекція
Е	Краснуха
№	крок 2012
Тема	Інфекційні ураження ЦНС
Текст завдання	У дитини 2,5 років на 15-у добу після контакту з хворим на поліомієліт з'явилися помірні катаральні прояви у вигляді нежиттю та сухого покашлювання. На 2-у добу захворювання приєдналися зниження апетиту, млявість, порушився сон. При огляді дитина вередлива, млява, м'язи потилиці ригідні, гіперестезії за ходом правого сідничного нерва, t° -38, 2° C. Який період розвитку паралітичної форми поліомієліту має місце в даній дитини?
Правильна відповідь	Препаралітичний
В	Паралітичний
С	Відновний
D	Резидуальний
Е	Інкубаційний
№	крок 2012
Тема	Вірусні гепатити. Лікування
Текст завдання	У дитини з жовтяницею, гепатоспленомегалією, підвищенням печінкових проб встановлена типова легка форма вірусного гепатиту А. Головним у лікуванні є:
Правильна відповідь	Дотримання режиму та дієти
В	Призначення гепатопротекторів
С	Призначення противірусних препаратів
D	Призначення глюкокортикоїдів
Е	Проведення інфузійної терапії
№	крок 2012
Тема	Диференційна діагностика екзантем
Текст завдання	Учениця 10-го класу не щеплена, раптово захворіла: підвищилась температура до 38° C, турбують головний біль, кашель, нежить, загальна слабкість та сльозотеча. Через 4 дні з'явилась плямистопапульозна висипка на шкірі обличчя. На м'якому піднебінні - енантема. Незначно збільшені шийні лімфовузли. Тахікардія, дихання жорстке, печінка і селезінка не збільшені. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Кір

В	Ентеровірусна інфекція
С	Скарлатина
Д	Краснуха
Е	Інфекційний мононуклеоз
№	крок 2013
Тема	Діагностика респіраторних інфекцій
Текст завдання	Дитина 3 років хворіє 3-й день: температура 38 – 38, 5° С, незначний біль при ковтанні, збільшені передньошийні лімфовузли. При огляді: піднебінні мигдалики набрякли, їх поверхня вкрита білувато-сірими нальотами з гладенькою поверхнею, які щільно зв'язані з прилеглими тканинами. Встановлено діагноз дифтерії. Який процес лежить в основі утворення дифтеритичних нальотів?
Правильна відповідь	Фібринозне запалення
В	Гнійне запалення
С	Катаральне запалення
Д	Некротичний процес
Е	Дистрофічний процес
№	крок 2013, 2014
Тема	Диференційна діагностика менінгітів
Текст завдання	Госпіталізовано дитину 8-ми років із скаргами на підвищення температури тіла до 39, 8° С, млявість, помірний головний біль, блювання. При огляді виявлені менінгеальні симптоми. Проведено люмбальну пункцію. Отримано рідину під підвищеним тиском, прозору, цитоз 450 клітин в 1 мкл (переважно лімфоцити – 90%), вміст глюкози 2,6 ммоль/л. Яким збудником може бути викликано захворювання у дитини?
Правильна відповідь	Ентеровірус
В	Менінгокок
С	Туберкульозна паличка
Д	Стафілокок
Е	Пневмокок
№	крок 2014
Тема	Профілактика інфекційних захворювань
Текст завдання	Хвору на кір дівчинку 7-ми місяців в перший день появи висипу було госпіталізовано. Її брат, якому 4 роки, на кір не хворів і проти цієї інфекції не щеплений у зв'язку з абсолютними протипоказаннями за станом здоров'я. За допомогою якого із перерахованих заходів можна попередити захворювання на кір у цієї дитини?

Правильна відповідь	Гама-глобулінопрофілактика
B	Вакцинація
C	Застосування антибіотиків
D	Застосування хіміопрепаратів
E	Фагопрофілактика
№	крок 2014
Тема	Диференційна діагностика гострих кишкових інфекцій
Текст завдання	Дитина 8-ми років захворіла гостро з підйому температури тіла до 39, 2° C, одноразового блювання. Скарги на переймоподібні болі в животі, тенезми, часті випорожнення - малокалові, з великою кількістю слизу, включенням гною та прожилок крові. Об'єктивно: ущільнена сигмоподібна кишка, болісна під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Шигельоз
B	Сальмонельоз
C	Гострий апендицит
D	Холера
E	Ротавірусна інфекція
№	крок 2014
Тема	Диференційна діагностика респіраторних інфекцій
Текст завдання	Хлопчику 5 років, щеплений з порушенням графіку вакцинації. Скарги на біль у горлі при ковтанні, головний біль, кволість, лихоманку. Об'єктивно: дитина бліда, збільшені передньошийні лімфовузли, набряк мигдаликів, їх ціанотична гіперемія, на мигдаликах наліт сіро-білий, не знімається, при насильному знятті - мигдалики кровлять. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Дифтерія ротоглотки
B	Лакунарна ангіна
C	Ангіна Сімановського-Венсана
D	Інфекційний мононуклеоз
E	Фолікулярна ангіна
№	крок 2014
Тема	Діагностика ускладнень при повітряно-крапельних інфекціях

Текст завдання	Дівчинка 10-ти років хворіє на скарлатину. Отримувала лікування: парацетамол, вітаміни. На 14-й день хвороби з'явилися млявість, зниження апетиту, блідість шкіри, пастозність та набряки обличчя, олігурія. У сечі: питома вага 1030, білок 1 г/л, еритроцити 60 в п/з, гіалінові циліндри. Яке ускладнення розвинулось у дівчинки?
Правильна відповідь	Гломерулонефрит
B	Пієлонефрит
C	Сечокам'яна хвороба
D	Пухлина сечового міхура
E	Поліпи уретри
№	крок 2014
Тема	Профілактика інфекційних захворювань
Текст завдання	При відвідуванні вдома дитини 2-х років лікар загальної практики встановив діагноз: кір. Дитина відвідує ясла, має сестру 5-ти років. Який документ необхідно заповнити лікареві для оперативного проведення протиепідемічних заходів на дільниці?
Правильна відповідь	Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (форма № 058/о)
B	Довідка по догляду за хворою дитиною
C	Історія розвитку дитини (облікова форма № 112/о)
D	Книга запису викликів лікарів додому (форма № 031/о)
E	Листок непрацездатності по догляду за дитиною
№	крок 2015
Тема	Диференційна діагностика респіраторних інфекцій
Текст завдання	Дворічна дитина кашляє близько місяця. Протягом останніх 3 тижнів кашель став нападopodobним. Після нападу кашлю - блювання. Об'єктивно: одутлість обличчя. Субкон'юнктивальний крововилив справа. На шкірі шиї та грудної клітки поодинокі петехії, виразка на вуздечці язика. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Коклюш
B	Туберкульозний бронхоаденіт
C	Спастичний бронхіт
D	Геморагічний васкуліт
E	РС-інфекція
№	крок 2016
Тема	Диференційна діагностика менінгітів

Текст завдання	Госпіталізовано дитину 7-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла до $39,8^{\circ}\text{C}$, млявість, помірний головний біль, блювання. Під час огляду виявлено менінгеальні симптоми. Проведено люмбальну пункцію. Отримано рідину під підвищеним тиском, прозору, цитоз 450 клітин в 1 мкл (переважно лімфоцити 90%), вміст глюкози - 2,6 ммоль/л. Яким збудником може бути викликане захворювання у дитини?
Правильна відповідь	Ентеровірус
B	Менінгокок
C	Туберкульозна паличка
D	Стафілокок
E	Пневмокок
№	крок 2016
Тема	Інфекційні ураження ЦНС
Текст завдання	Дівчинка 3-х років, не щеплена через відмову батьків від профілактичних щеплень, захворіла гостро: підвищилася температура тіла до 38°C , з'явилися слизові виділення з носа, покашлювання. Через 3 дні температура тіла знизилася до $36,6^{\circ}\text{C}$. Вранці дівчинка поскаржилася на біль у правій нозі, перестала ставати на ногу. В ході обстеження в стаціонарі виявлено обмеження рухів, зниження тону м'язів, відсутність сухожильних рефлексів на правій нозі; чутливість збережена. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Поліомієліт
B	Енцефаліт
C	Ентеровірусна інфекція
D	Полінейропатія при дифтерії
E	Гострий інфекційний мієліт
№	крок 2016
Тема	Профілактика інфекційних захворювань
Текст завдання	У дитини 5-ти років, яка відвідує дитячий садок, після 3-х днів помірної млявості з'явилася лихоманка до 39°C , плівчастий тонзиллофарингіт, шийна лімфаденопатія у поєднанні з гепатоспленомегалією. Педіатр діагностував інфекційний мононуклеоз, який підтвердив серологічними дослідженнями. Які карантинні заходи проводять в дитячому садку?
Правильна відповідь	Протиепідемічні заходи не проводять
B	Карантин на групу на 21 день
C	Вакцинація неімунних осіб
D	Введення контактним особам специфічного імуноглобуліну

Е	Призначення ацикловіру усім контактним особам
№	крок 2017
Тема	Вірусні гепатити. Діагностика
Текст завдання	У дівчинки 12-ти років хронічний вірусний гепатит С впродовж 7-ми років. Стан погіршився за останні 6 місяців. Схудла, з'явилася жовтяничність шкірних покривів і склер. Виражене свербіння шкіри, судинні "зірочки", носові кровотечі. Асцит. Печінка +4 см, селезінка на рівні пупкової лінії. З розвитком якого синдрому пов'язане виражене свербіння шкіри у хворої?
Правильна відповідь	Холестаза
В	Гіперспленізм
С	Набряково-асцитичний синдром
Д	Портальна гіпертензія
Е	Гепатоцелюлярна недостатність
№	крок 2017
Тема	Диференційна діагностика екзантем
Текст завдання	Дитина хворіє 5-й день. Турбує підвищена до 39-40° С температура тіла, настирливий, частий, глибокий, малопродуктивний кашель, світлобоязнь, закладеність носа. Об'єктивно: одутлість обличчя, слизова оболонка рота пухка, геморагічна енантема на м'якому піднебінні, рештки плям Філатова-Копліка. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Кір
В	Скарлатина
С	Краснуха
Д	Аденовірусна інфекція
Е	Грип
№	крок 2018
Тема	дифдіагноз менінгітів
Текст завдання	Дитині 8 років. Скарги на температуру тіла 39,3° С, головний біль, блювання. 1-й день захворювання. Шкіра чиста. Зів гіперемований. Язик обкладений. Кон'юнктивіт. Склерит. Слабко виражена ригідність потиличних м'язів. Позитивний симптом Керніга справа. Ліквор: цитоз - 340/мкл, лімфоцити - 87%, нейтрофіли - 13%, білок - 140 мг/л. Яким буде найімовірніший діагноз?
Правильна відповідь	Серозний менінгіт
В	Арахноїдит
С	Нейротоксикоз

D	Пухлина мозку
E	Гнійний менінгіт
№	крок 2018
Тема	ГРВІ, грип
Текст завдання	Хворий напередодні відчув легке незду-жання, незначний головний біль, слабкість. Сьогодні температура підвищилася до 38,5° C з остудою, значним головним болем, переважно в лобовій ділянці, вираженим болем при рухах очних яблук. Шкіра обличчя і кон'юнктива гіперемовані. Виник сухий надсадний кашель. Зів гіперемований, на м'якому піднебінні зерниста енантема, місцями точкові крововиливи. Над легеньми дихання з жорстким відтінком. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Грип
B	Висипний тиф
C	Черевний тиф
D	Гарячка Ку
E	Ентеровірусна інфекція
№	крок 2018
Тема	Вірусні гепатити
Текст завдання	У дівчинки 12-ти років хронічний вірусний гепатит С впродовж 7-ми років. Стан погіршився за останні 6 місяців. Схудла, з'явилася жовтяничність шкірних покривів і склер. Виражене свербіння шкіри, судинні "зірочки", носові кровотечі. Асцит. Печінка +4 см, селезінка на рівні пупкової лінії. З розвитком якого синдрому пов'язане виражене свербіння шкіри у хворої?
Правильна відповідь	Холестаза
B	Гіперспленізм
C	Набряково-асцитичний синдром
D	Портальна гіпертензія
E	Гепатоцелюлярна недостатність
№	крок 2018
Тема	Кір
Текст завдання	Дитина 3-х років хворіє 3 доби. Спостерігаються температура, кашель, нежить, кон'юнктивіт, світлобоязнь, білуватий крапковий висип на слизовій оболонці ясен та внутрішній поверхні щік і плямиста енантема твердого та м'якого піднебіння. Яке захворювання можна діагностувати?
Правильна відповідь	Кір

В	Гостра респіраторна вірусна інфекція
С	Герпетична інфекція
D	Ентеровірусна інфекція
Е	Інфекційний мононуклеоз
№	крок 2018
Тема	Дифдіагностика екзантем
Текст завдання	Дитині 3-х років у зв'язку із захворюван-ням на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) призначено: бісептол, парацетамол, назоферон. На третій день стан дитини по-гіршився: з'явилися біль у горлі, стоматит, кон'юнктивіт, гіперсалівація, болючі плями темно-червоного кольору на шиї, обличчі, грудях та кінцівках, потім на місці плям з'явились пухирі. Спостерігалось ураження слизових оболонок навколо рота та ануса. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Синдром Стівенса-Джонсона
В	Атопічний дерматит
С	Вітряна віспа
D	Сироваткова хвороба
Е	Бульозний дерматит
№	крок 2018
Тема	Вакцинація
Текст завдання	На прийом до педіатра звернулась ма-ти із 4-и місячною дитиною зі скаргами на підвищення температури до $37,5^{\circ}C$. Дитина народжена доношеною, 8-9 балів за шкалою Апгар. При аналізі медичної документації ви-явлено, що у дитини немає щеплення проти туберкульозу. В які часові терміни повинно було проведене щеплення проти туберкульозу?
Правильна відповідь	Доношена дитина, 3-5 доба життя
В	Доношена дитина, не пізніше 48 годин від народження
С	Протягом першого тижня життя
D	Протягом перших 24 годин життя
Е	Протягом перебування в пологовому бу-динку після попередньої проби Манту
№	крок 2018
Тема	Вакцинація
Текст завдання	Дитина 4-х років здорова та невакцинована проти кору. В регіоні, де вона мешкає зафіксований спалах кору. Лікар призначив першу дозу вакцини КПК (проти кору, паротиту та краснухи). Коли даній дитині потрібно ввести другу дозу вакцини?

Правильна відповідь	Через 1 місяць
B	Через 3 місяці
C	В 6 років життя
D	В 14 років життя
E	Через 6 місяців
№	крок 2018
Тема	Вакцинація
Текст завдання	До сімейного лікаря звернулася учениця 14-ти років зі скаргами на подряпини на обличчі, які наніс сусідський кіт 2 дні тому. При огляді подряпини поверхневі, вкриті струпом. Виконано первинну хірургічну обробку ран. Відомо що дитина отримала всі планові щеплення згідно з календарем. Якими будуть подальші дії?
Правильна відповідь	Спостереження за твариною
B	Введення антирабічної вакцини
C	Введення антирабічного імуноглобуліну
D	Введення антирабічної вакцини + антирабічного імуноглобуліну
E	Введення антирабічної вакцини + правцевий анатоксин
№	крок 2018
Тема	ВІЛ/СНІД у дітей
Текст завдання	Дівчинка народилася від I вагітності, I вагінальних пологів у терміні гестації 39 тижнів (маса 3350 г, довжина тіла 53 см). 17-річна мати дитини ВІЛ-позитивна. Стан дитини після народження задовільний. Коли можна провести вакцинацію БЦЖ даній дитині?
Правильна відповідь	Після уточнення ВІЛ-статусу дитини
B	Не щеплювати в жодному випадку
C	На 1-шу добу
D	На 3-тю добу
E	Після проби Манту
№	10) крок 2018
Тема	Вакцинація
Текст завдання	Новонароджена недоношена дитина народилася з масою 1900 г. Переведена у відділення патології новонароджених для подальшого лікування з діагнозом "перинатальна гіпоксична енцефалопатія". Щеплення БЦЖ в пологовому будинку не проводилося. Коли слід щеплювати дану дитину проти туберкульозу?
Правильна відповідь	По досягненні маси тіла 2500 г

В	Після усунення ознак неврологічної патології
С	У віці 6 місяців
D	В 1 рік життя
Е	Не щеплювати дитину взагалі
№	крок 2018
Тема	Вакцинація
Текст завдання	У хірургічний кабінет звернувся хлопець 17-ти років, зі скаргами на наявність рубаної рани правої стопи. Із анамнезу відомо, що травму отримав сокирою під час роботи по господарству. Всі щеплення отримував відповідно віку. Об'єктивно: температура тіла $36,8^{\circ}C$, пульс - 68/хв., артеріальний тиск - 120/75 мм рт.ст. Які дії лікаря?
Правильна відповідь	Динамічне спостереження
В	Ввести правцевий анатоксин
С	Ввести протиправцеву сироватку
D	Ввести правцевий анатоксин та протиправцевий імуноглобулін
Е	Ввести правцевий анатоксин з дифтерійним анатоксином
№	крок 2018
Тема	Вакцинація
Текст завдання	Дитина 6-ти місяців народжена ВІЛ-інфікованою матір'ю. ВІЛ-статус дитини не визначений. При огляді: стан задовільний. Фізичний та нервово-психічний розвиток від-повідає віку. Проведена вакцинація в 2 місяці та 4 місяці проти дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту. Згідно з календарем профіла-ктичних щеплень в Україні лікар призначив продовження вакцинації проти даних інфекцій. Яка вакцина ПРОТИПОКАЗАНА даній дитині?
Правильна відповідь	Оральна (жива) поліомієлітна вакцина
В	Інактивована вакцина проти поліомієліту
С	АКДП-вакцина
D	Вакцинація не проводиться до визначення ВІЛ-статусу
Е	-
№	крок 2018
Тема	Вакцинація
Текст завдання	Дівчина 15-ти років захворіла на кір. Відомо, що вона страждає на бронхіальну астму з високим рівнем загального IgE та на залізодефіцитну анемію: рівень Нв- 110 г/л, вміст сироваткового заліза 6,6 мкмоль/л (нормальний показник - 10,6-33,6 мкмоль/л). Щеплена вакциною проти кору, краснухи, паротиту одноразово в віці 1 року. Який фактор зумовив захворювання дитини?

Правильна відповідь	Неповна вакцинація
B	Атопія
C	Анемія
D	Пубертатний вік
E	Сидеропенія
№	крок 2019
Тема	вакцинація
Текст завдання	У хірургічний кабінет звернувся хлопець 17-ти років, зі скаргами на наявність руба-ної рани правої стопи. Із анамнезу відомо, що травму отримав сокирою під час роботи по господарству. Усі щеплення отримував відповідно до віку за Національним календарем профілактичних щеплень. Об'єктив-но: температура тіла - 36,8°C\ пульс - 68/хв., артеріальний тиск - 120/75 мм рт.ст. Який наступний крок лікаря буде найбільш доре-чними?
Правильна відповідь	Динамічне спостереження
B	Ввести правцевий анатоксин та проти-правцевий імуноглобулін
C	Ввести правцевий анатоксин з дифтерій-ним анатоксином
D	Ввести протиправцеву сироватку
E	
№	крок 2019
Тема	вакцинація
Текст завдання	Мати привела до лікаря хлопчика 7-ми років на плановий медичний огляд. Вона скаржиться, що дитина дуже багато часу проводить за гаджетами та дуже мало грає з однолітками на свіжому повітрі. Фізичний розвиток відповідає віку дитини. Згідно з карткою профілактичних щеплень до 6-ти років включно отримав усі щеплення, пе-редбачені Національним календарем. При фізикальному обстеженні температура тіла - 37Д°C, пульс - 88/хв., артеріальний тиск - 110/80 мм рт.ст., частота дихання - 16/хв. Які подальші дії по веденню хлопчика будуть найбільш доречними?
Правильна відповідь	Провести пробу Манту
B	Призначити вакцину БЦЖ
C	Призначити оральну поліомієлітну ва-кцину (ОПВ)
D	Призначити вакцину КПК
E	Провести бесіду щодо важливості актив-ного способу життя
№	крок 2019
Тема	епідемічний паротит

Текст завдання	Хлопчик 5-ти років прийшов з матір'ю на прийом до лікаря зі скаргами на припухлість обличчя, біль у вухах та підвищену температуру протягом останніх 5 днів. Через релігійні переконання матері вакцинація дитини неповна. Під час фізикального обстеження виявлено двосторонній, болючий набряк у ділянці жувального м'яза та гарячку 39,3. Що з перерахованого буде найбільш доцільно призначити цьому пацієнту?
Правильна відповідь	Парацетамол
B	Ацикловір
C	Пеніцилін
D	Імуноглобулін людини нормальний
E	Цефтриаксон
№	крок 2019
Тема	ботулізм
Текст завдання	У лікарню швидкої допомоги поступив хворий, що скаржиться на нудоту, багатора-зове блювання, пронос, розлади зору - поява сітки перед очима, нечітке бачення бли-жніх предметів. З анамнезу хворого з'ясува-лося, що напередодні ввечері він споживав м'ясну консерву домашнього приготування зі смаженою картоплею. Перші симптоми з'явилися вночі. Який діагноз найбільш імо-вірний?
Правильна відповідь	Ботулізм
B	Сальмонельоз
C	Шигельоз
D	Стафілококовий токсикоз
E	Дизентерія
№	крок 2019
Тема	вакцинація
Текст завдання	Мати хлопчика 6-ти місяців прийшла на прийом до педіатра стурбована тим, що її дитина не отримувала жодних щеплень. Скарги не мають. Об'єктивно: температура 37°C, частота дихання - 20/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зріст та вага відповідають діапазону між 50 та 75 перцентилем. Відповідно до нормативно-правових документів МОЗ, якої тактики має дотри-муватися лікар щодо імунізації цієї дитини?
Правильна відповідь	Провести пробу Манту та записати на прийом через 2 дні
B	Відкласти вакцинацію та записати на прийом через тиждень
C	-
D	Ввести вакцину БЦЖ
E	Е. Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС

№	крок 2019
Тема	іерсиніози
Текст завдання	Хлопчика 5-ти років привели на при-йом до лікаря зі скаргами на стрибкопо-дібне підвищення температури до 39,3°C протягом 12-ти днів. При фізикальному обстеженні виявлені: ін'єкція бульбарних кон'юнктив з обох сторін, потріскані черво-ні губи та ''малиновий'' язик, шийна лімфаденопатія та еритематозний папульозний висип промежини, набряклість рук та ніг. Що з перерахованого лікар має призначи-ти першочергово?
Правильна відповідь	Пеніцилін внутрішньовенно
B	Фуросемід перорально
C	Валацикловір перорально
D	Імуноглобулін людини нормальний вну-трішньовенно
E	Преднізолон внутрішньовенно
№	крок 2019
Тема	TORCH
Текст завдання	Дитина, що народилась 1 день тому, про-ходить огляд у зв'язку з виникненням висипу. Її мати на облік у жіночу консультацію не ставала. Після народження дитина оці-нена за шкалою Апгар у 7 та 9 балів на 1 та 5 хвилині відповідно. При фізикально-му обстеженні температура - 31°C, пульс - 145/хв., частота дихання - 33/хв. При ау-скультації серця вислуховується систоло-діастолічний шум у лівій підключичній ді-лянці. При огляді по всьому тілу розсіяні петехії. Який збудник найбільш імовірно викликав інфікування дитини?
Правильна відповідь	Краснуха
B	Сифіліс
C	Токсоплазмоз
D	Вірус простого герпесу
E	Цитомегаловірус
№	крок 2019
Тема	вірусні гепатити
Текст завдання	Дівчина 21-го року звернулася до ліка-ря з грипopodobною картиною захворюван-ня, субфебрильною температурою, незду-жанням та легкою жовтяницею протягом 2-х днів. Лабораторні показники сироватки крові: аспартатамінотрансфераза (АСТ) - 456 Од/л, аланінамінотрансфераза (АЛТ) - 745 Од/л, ІgМ до HAV - позитивний резуль-тат. Яка тактика по відношенню до конта-ктних осіб буде найбільш доречною?
Правильна відповідь	Вакцинація від гепатиту А протягом першого тижня
B	Профілактичний прийом софосбувіру/ледіпасвіру протягом 1 місяця

С	Введення імуноглобуліну людини нор-мального протягом 24 годин
D	Вакцинація від гепатиту В протягом першого тижня
Е	
№	крок 2019
Тема	вакцинація
Текст завдання	Мати прийшла на прийом до педіа-тра зробити своїй 2-місячній дитині пла-нові щеплення. Для зручності, вона бажає аби дитині було введено комбіновану 6- компонентну вакцину, що містить антиге-ни усіх збудників, проти <u>яких</u> рекомендо-вано вакцинуватися у цьому віці. Під час збору анамнезу вона зазначила, що іноді пі-сля пробудження її дитина починає рапто-во напружуватися, згинати голівку, ручки та ніжки. Зазвичай такі напади тривають не більше декількох секунд з інтервала-ми "спокою" у 10 секунд. Останній напад був декілька днів тому. Температура тіла - 37.2°C . частота дихання - 25/хв., пульс - 104/хв.. артеріальний тиск -100/70 мм рт.ст. Яке рішення має прийняти лікар щодо по-дальшої імунізації цієї дитини?
Правильна відповідь	Ввести комбіновану 6-компонентну ва-кцину
В	Провести вакцинацію за схемою АКДП+гепатит В+НіВ-інфекція
С	Провести вакцинацію за схемою гепатит В+НіВ-інфекція
D	Введення будь-яких вакцин на даний момент протипоказано
Е	Провести вакцинацію за схемою АДП+поліо+гепатит В+НіВ-інфекція
№	крок 2019
Тема	вакцинація
Текст завдання	Здорова дівчина 16-ти років прийшла на профілактичний медичний огляд. Під час збору анамнезу вона повідомила, що у 3 роки перехворіла на вітряну віспу. Ін-ших серйозних захворювань в анамнезі не-має. Батьки відмов від щеплень не писали, вакцинувалася у дитячому садочку та шко-лі відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. Фізикальне об-стеження без відхилень. Призначення яких вакцин буде найбільш доречним на даний момент?
Правильна відповідь	АДП-М, ВПЛ
В	КПК, АДП, ВПЛ
С	ІПВ, АаКДП
D	Гепатит В, АаКДП
Е	Гепатит В, АДП-М
№	крок 2019
Тема	вакцинація

Текст завдання	Дівчинку 7-ми років доставлено до від-ділення невідкладної допомоги у важкому стані. Зі слів матері дитина почала скаржитися на біль у спині та шиї, після чого згодом їй було дуже важко вимовляти слова та випити склянку' води. Об'єктивно: спастичність жувальних м'язів. Під час збору анамнезу лікар дізнався, що тиждень тому дитина гуляла надворі з друзями та уколо-ла палець дерев'яною палицею, після якої у шкірі залишилася скіпка. Матір про ін-цидент завчасно повідомлена не була і ви-далила стороннє тіло декілька днів тому, коли випадково його помітила. Дівчинка не отримала жодного щеплення через особи-сті переконання матері. Скільки доз вхо-дить у первинний вакцинальний комплекс від збудника, що найбільш імовірно викли-кав захворювання у дівчинки?
Правильна відповідь	Чотири
B	Три
C	Шість
D	Дві
E	П'ять
№	крок 2019
Тема	диф. діагностика менінгітів
Текст завдання	Дитині 8 років. Скарги на температуру тіла 39,3°C, головний біль, блювання. 1-й день захворювання. Шкіра чиста. Зів гіперемований. Язик обкладений. Кон'юнкти-віт. Склерит. Слабко виражена ригідність потиличних м'язів. Позитивний симптом Керніга справа. Ліквор: цитоз - 340/мкл, лімфоцити - 87%, нейтрофіли - 13%, білок - 140 мг/л. Яким буде найімовірніший діа-гноз?
Правильна відповідь	Серозний менінгіт
B	Нейротоксикоз
C	Пухлина мозку
D	Арахноїдит
E	Гнійний менінгіт
№	крок 2020
Тема	Імунопрофілактика
Текст завдання	Мати хлопчика 6-ти місяців прийшла на прийом до педіатра стурбована тим, що її дитина не отримувала жодних щеплень. Скарг не мають. Об'єктивно: температура - 37,1°C, частота дихання - 20/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зріст та вага відповідають діапазону між 50 та 75 перцентилем. Відповідно до нормативно-правових документів МОЗ, якої тактики має дотримуватися лікар щодо імунізації цієї дитини?
Правильна відповідь	Провести пробу Манту та записати на прийом через 2-3 дні
B	Відкласти вакцинацію та записати на прийом через тиждень

С	-
D	Ввести вакцину БЦЖ
E	Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС
№	крок 2020
Тема	Імунопрофілактика
Текст завдання	На прийом до педіатра звернулась мати із 4-місячною дитиною зі скаргами на підвищення температури до 37,5°C. Дитина народжена доношеною, 8-9 балів за шкалою Апгар. При аналізі медичної документації виявлено, що у дитини немає щеплення проти туберкульозу. В які часові терміни повинно було бути проведене щеплення проти туберкульозу?
Правильна відповідь	Доношена дитина, 3-5 доба життя
B	Протягом перебування в пологовому будинку після попередньої проби Манту
С	Протягом перших 24 годин життя
D	Доношена дитина, не пізніше 48 годин від народження
E	Протягом першого тижня життя
№	крок 2020
Тема	Поліомієліт
Текст завдання	Підліток госпіталізований зі скаргами на обмеженість рухів у нижніх кінцівках. Захворювання розпочалось 2 дні тому з підвищення температури тіла до 38,3°C, рідких випорожнень 3-4 рази на добу. Об'єктивно: температура тіла - 36,8°C, активні рухи в нижніх кінцівках відсутні, у зоні ураження - арефлексія, гіпотонія м'язів, чутливість збережена. Менінгеальні симптоми слабо позитивні. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Поліомієліт
B	Ботулізм
С	Травма поперекового відділу хребта
D	Герпетичний менінгоенцефаліт
E	Субарахноїдальний крововилив
№	крок 2020
Тема	Невідкладні стани при ураженні ЦНС
Текст завдання	З дому надійшла дитина 3-х років, у якої на тлі гіпертермічного синдрому, спричиненого грипом, протягом 50-ти хвилин тривають тоніко-клонічні генералізовані судоми. Терапія не проводилася. Для негайного лікування судомного синдрому необхідно:

Правильна відповідь	Ввести лоразепам внутрішньовенно
B	Призначити парацетамол у високих дозах
C	Ввести фенобарбітал внутрішньом'язово
D	Ввести кальцію глюконат внутрішньовенно
E	Терміново накласти дитині холодні компреси
№	крок 2020
Тема	Дифтерія
Текст завдання	У 10-річної дівчинки на тлі підвищеної до 37,5°C температури тіла спостерігаються помірне збільшення лімфовузлів шиї, сірувато-білі нашарування на мигдаликах у вигляді щільної плівки. Плівка важко знімається, поверхня під нею кровоточить. Набряку шиї немає. Попередній діагноз:
Правильна відповідь	Дифтерія мигдаликів
B	Скарлатина
C	Стрептококовий тонзилофарингіт
D	Інфекційний моноклеоз
E	Ангіна Симановського-Венсана
№	крок 2020
Тема	Малярія
Текст завдання	У пацієнта протягом тижня лихоманка, що супроводжується ознобами й вираженою пітливістю. Температура підвищується у вечірні години через день. Два тижні тому повернувся з Ефіопії. Яке лабораторне дослідження необхідно провести в першу чергу?
Правильна відповідь	Мікроскопія мазка й товстої краплі крові
B	Загальний аналіз сечі
C	Копроцитограму
D	Рентгенографію органів грудної клітки
E	Бактеріологічний посів калу
№	крок 2021
Тема	Дифдіагностика синдрому екзантеми
Текст завдання	До дерматолога звернулася мати з дівчинкою 6 років. Дитина хворіє 5 днів. У дитини на тлі нежиті з'явилася велика кількість гнійної висипки. Об'єктивно встановлено: на шкірі обличчя є численні фліктени, наповнені серозно-гнійним вмістом, на деяких сформовані золотисто-жовті кірки. Який імовірний діагноз?

Правильна відповідь	Стрептококове імпетиго
B	Фотодерматит
C	Атопічний дерматит
D	Дитяча екзема
E	Токсико-алергічний дерматит
№	крок 2021
Тема	Імунопрофілактика
Текст завдання	Дівчина 16 років прийшла на профілактичний медичний огляд. Під час збору анамнезу вона повідомила, що у 3 роки перехворіла на вітряну віспу. Інших серйозних захворювань в анамнезі немає. Батьки відмов від щеплень не писали, вакцинувалася у дитячому садочку та школі відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень. Фізикальне обстеження без відхилень. Призначення яких вакцин буде найбільш доречним зараз?
Правильна відповідь	АДП-М
B	Гепатит А
C	КПК
D	АаКДП
E	Гепатит В
№	крок 2021
Тема	ГРИП, ГРВІ. Невідкладні стани
Текст завдання	З дому надійшла дитина 3 років, у якої на тлі гіпертермічного синдрому, спричиненого грипом, протягом 50 хвилин тривають тоніко-клонічні генералізовані судоми. Терапія не проводилася. Для негайного лікування судомного синдрому треба:
Правильна відповідь	Увести лоразенам внутрішньовенно
B	Терміново накласти дитині холодні компреси
C	Призначити парацетамол у високих дозах
D	Увести фенобарбітал внутрішньом'язово
E	Увести кальцію глюконат внутрішньовенно
№	крок 2021
Тема	Дифдіагностика менінгітів
Текст завдання	У новонародженого терміном гестації 31 тиждень наростає млявість, м'язова гіпотонія та пригнічення свідомості. Аналіз ліквору встановлено: підвищена кількість еритроцитів, білка та підвищений вміст глюкози. Який найбільш вірогідний діагноз?

Правильна відповідь	Внутрішньочерепний крововилив
B	Сепсис
C	Анемія
D	Менінгіт
E	Внутрішньоутробна інфекції
№	крок 2021
Тема	Харчова токсико-інфекція
Текст завдання	У сім'ї вживались в їжу овочеві (зокрема грибні) та фруктові консерви домашнього приготування. За 8 днів після чергового прийманні їжі у двох членів сім'ї з'явилися скарги на слабкість, послаблення зору, двоїння в очах та косоокість. Трохи згодом виникло утруднення мови, порушення ковтання. Після звернення до лікарні пацієнтів госпіталізували. Яке харчове отруєння виникло у цьому разі?
Правильна відповідь	Ботулізм
B	Афлотоксикоз
C	Сальмонельоз
D	Стафілококовий токсикоз
E	Бактеріальна харчова токсикоінфекція
№	крок 2021
Тема	Імунопрофілактика
Текст завдання	Дівчинка народилася від I вагітності, I вагінальних пологів у терміні гестації 39 тижнів (маса - 3350 г, довжин: тіла - 53 см). 17-річна мати дитини ВІЛ позитивна. Стан дитини після народження задовільний. Коли можна провест вакцинацію БЦЖ цій дитині?
Правильна відповідь	Після уточнення ВІЛ-статусу дитини
B	На 3-тю добу
C	На 1-шу добу
D	Після проби Манту
E	Не щепити в жодному разі
№	крок 2021
Тема	TORCH-інфекція

Текст завдання	Дитина народилася на 8 місяці вагітності. У неї встановлено: мікроцефалію, катаракту, ваду серця. Мати дитини на 2-му місяці вагітності хворіла: було нетривале підвищення температури тіла до 37,5°C, збільшення лімфатичних вузлів та дрібноплямистий висип на обличчі, тулубі й кінцівках, який пройшов без залишкових явищ. Який найбільш імовірний попередній діагноз у дитини і матері?
Правильна відповідь	Краснуха
B	Цитомегаловірусна інфекція
C	Хламідійна інфекція
D	Герпетична інфекція
E	Токсоплазмоз
№	крок 2021
Тема	Поліомієліт
Текст завдання	Підліток госпіталізований зі скаргами на обмеженість рухів у нижніх кінцівках. Захворювання розпочалось 2 дні тому з підвищення температури тіла до 38,3°C, рідких випорожнень 3-4 рази на добу. Об'єктивно: температура тіла - 36,8°C, активні рухи в нижніх кінцівках відсутні, у зоні ураження - арефлексія, гіпотонія м'язів, чутливість збережена. Менінге-альні симптоми слабо позитивні. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Поліомієліт
B	Субарахноїдальний крововилив
C	Травма поперекового відділу хребта
D	Ботулізм
E	Герпетичний менінгоенцефаліт
№	крок 2021
Тема	Імунопрофілактика
Текст завдання	Мати хлопчика 6-ти місяців прий-шла на прийом до педіатра стурбована тим, що її дитина не отримувала жодних щеплень. Скарг не мають. Об'єктивно: температура - 37Д°C, частота дихання - 20/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Зріст та вага відповідають діапа-зону між 50 та 75 перцентилем. Відпові-дно до нормативно-правових документів МОЗ, якої тактики має дотримуватися лікар щодо імунізації цієї дитини?
Правильна відповідь	Провести пробу Манту та записати на прийом через 2-3 дні
B	-
C	Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС
D	Відкласти вакцинацію та записати на прийом через тиждень
E	Ввести вакцину БЦЖ

№	крок 2021
Тема	Імунопрофілактика
Текст завдання	На прийом до педіатра звернулась мати із 4-місячною дитиною зі скаргами на підвищення температури до 37,5°C. Дитина народжена доношеною, 8-9 балів за шкалою Апгар. При аналізі медичної документації виявлено, що у дитини немає щеплення проти туберкульозу. В які часові терміни повинно було бути проведене щеплення проти туберкульозу?
Правильна відповідь	Доношена дитина, 3-5 доба життя
В	Доношена дитина, не пізніше 48 годин від народження
С	Протягом першого тижня життя
D	Протягом перебування в пологовому будинку після попередньої проби Манту
Е	Протягом перших 24 годин життя
№	крок 2021
Тема	Дифдіагностика судомного синдрому
Текст завдання	Після прогулянки на вулиці в ясний сонячний день у дитини 8 місяців з проявами рахіту II ступеню, підгострого перебігу, періоду розпалу, з'явилися судоми у вигляді карпопедального спазму. Вони свідчать про наявність у дитини:
Правильна відповідь	Спазмофілії
В	Менінгіту
С	Черепно-мозкової травми
D	ГРВІ
Е	Епілепсії
№	крок 2021
Тема	Дифдіагностика синдрому ангіни
Текст завдання	У 10-річної дівчинки на тлі підвищеної до 37,5°C температури тіла спостерігаються помірне збільшення лімфовузлів ший, сірувато-білі нашарування на мигдаликах у вигляді щільної плівки. Плівка важко знімається, поверхня під нею кровоточить. Набряку ший немає. Попередній діагноз:
Правильна відповідь	Дифтерія мигдаликів
В	Скарлатина
С	Ангіна Симановського-Венсана
D	Інфекційний моноклеоз
Е	Стерптококовий тонзилофарингіт