

| | |
|---------------------|---|
| № | крок 2017 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ, ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ |
| Текст завдання | Хворий 60-ти років після перенесеної операції знаходиться на постільному режимі. Після тривалої терапії корою крушини, проносний ефект препарату зменшився. Яке явища обумовило цей процес? |
| Правильна відповідь | Звикання |
| В | Тахіфілаксія |
| С | Індивідуальна чутливість |
| D | Синдром рикошету |
| Е | Синдром відміни |
| № | крок 2016, 2011, 2017 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Поясніть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом: |
| Правильна відповідь | Фенобарбітал активує мітосомальні ферменти печінки |
| В | Фенобарбітал інгібує мітосомальні ферменти печінки |
| С | Розвивається алергія до синкумару |
| D | Проявляється антагонізм цих препаратів |
| Е | Відбувається взаємна інактивація |
| № | крок 2017 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено антихелікобактерну терапію. На 3-ю добу хворий відмітив появу калових мас чорного кольору. Який лікарський засіб є причиною цього? |
| Правильна відповідь | Вісмуту субцитрат |
| В | Омепразол |
| С | Метронідазол |
| D | Тетрациклін |
| Е | Тинідазол |
| № | крок 2017 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | У хворого ревматоїдним артритом виявлена гіперглікемія. Лікування яким препаратом могло призвести до цього? |
| Правильна відповідь | Преднізолон |

| | |
|---------------------|--|
| В | Гідроксихлорохін |
| С | Ацетилсаліцилова кислота |
| D | Диклофенак натрію |
| Е | Кальцемін |
| № | крок 2017 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Найбільш ефективним лікарським засобом для профілактики НПЗЗ-асоційованої гастропатії є: |
| Правильна відповідь | Омепразол |
| В | Целекоксиб |
| С | Папаверин |
| D | Дротаверин |
| Е | Цефтріаксон |
| № | крок 2017, 2016, 2012 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | При одночасному застосуванні гентаміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик: |
| Правильна відповідь | Нефротоксичності |
| В | Гепатотоксичності |
| С | Кардіотоксичності |
| D | Нейротоксичності |
| Е | Імовірності алергічних реакцій |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ СЕЧОГІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Який з наведених діуретичних лікарських засобів НЕ БАЖАНО призначати хворому зі зниженою функцією слуху? |
| Правильна відповідь | Фуросемід |
| В | Спіронолактон |
| С | Клопамід |
| D | Індапамід |
| Е | Хлорталідон |
| № | крок 2017, 2016, 2014, 2013, 2012 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ЗАСОБІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЦНС |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | Хворій 25-ти років для лікування нападів мігрені лікар призначив суматриптан. Вкажіть механізм дії даного препарату: |
| Правильна відповідь | Селективний агоніст 5-Н T1-серотонінових рецепторів |
| B | Селективний антагоніст 5-Н T1-серотонінових рецепторів |
| C | Неселективний α -адреноблокатор |
| D | Стимулятор β -адренорецепторів |
| E | Селективний α -адреноблокатор |
| № | крок 2016, 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРЕПАРАТІВ ІНСУЛІНУ |
| Текст завдання | У вагітної жінки 38-ми років, хворої на цукровий діабет II типу (інсулінонезалежний), препаратом вибору є: |
| Правильна відповідь | Інсулін |
| B | Глібенкламід |
| C | Метформін |
| D | Толбутамід |
| E | Буформін |
| № | крок 2016, 2012, 2011, 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Який з нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми? |
| Правильна відповідь | Кромолін-натрій |
| B | Сальбутамол |
| C | Дротаверин |
| D | Димедрол |
| E | Амброксол |
| № | крок 2016 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СТЕРОЇДНИХ ПРЕПАРАТІВ |
| Текст завдання | Вкажіть лікарську речовину, що належить до стероїдних андрогенних засобів та є похідною андростану: |
| Правильна відповідь | Метилтестостерон |
| B | Прегнін |
| C | Етинілестрадіол |

| | |
|---------------------|---|
| D | Преднізолон |
| E | Кортизон |
| № | крок 2016 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРЕПАРАТІВ |
| Текст завдання | Виберіть лікарський засіб, що селективно інгібує ЦОГ-2: |
| Правильна відповідь | Целекоксиб |
| B | Диклофенак натрію |
| C | Ацетилсаліцилова кислота |
| D | Парацетамол |
| E | Індометацин |
| № | крок 2015 |
| Тема | ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ БІОФАРМАЦІЇ |
| Текст завдання | Вкажіть спосіб застосування oribletiae-таблеток: |
| Правильна відповідь | Перорально |
| B | Сублінгвально |
| C | Для імплантацій |
| D | Вагінально |
| E | Для приготування розчинів |
| № | крок 2015, 2014, 2013, 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ БАЗИСНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | З метою лікування важкої форми ревматоїдного артрити пацієнту 43-х років призначено препарат для базової терапії. Вкажіть його: |
| Правильна відповідь | Метотрексат |
| B | Диклофенак-натрію |
| C | Німесулід |
| D | Преднізолон |
| E | Метилпреднізолон |
| № | крок 2015, 2013 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | При одночасному застосуванні доксицикліну гідрохлориду та перорального контрацептиву спостерігається: |
| Правильна відповідь | Зниження ефективності пероральних контрацептивів |

| | |
|---------------------|---|
| В | Збільшення ефективності пероральних контрацептивів |
| С | Збільшення антибактеріального ефекту доксицикліну |
| D | Зменшення антибактеріального ефекту доксицикліну |
| Е | Е |
| № | крок 2015 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | При одночасному застосуванні метронідазолу та пероральних антикоагулянтів кумаринового ряду пацієнта необхідно попередити про наступний побічний ефект: |
| Правильна відповідь | Посилення дії антикоагулянтів та ризик виникнення кровотечі |
| В | Зниження дії антикоагулянтів |
| С | Посилення ефекту метронідазолу |
| D | Зниження ефекту метронідазолу |
| Е | Посилення нейротоксичності |
| № | крок 2015 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРЕПАРАТІВ ІНСУЛІНУ |
| Текст завдання | Вагітна жінка 27-ми років хворіє на цукровий діабет II типу (інсуліннезалежний). Який лікарський засіб є препаратом вибору? |
| Правильна відповідь | Інсулін |
| В | Глібенкламід |
| С | Метформін |
| D | Буформін |
| Е | Лікування діабету протипоказане |
| № | крок 2015 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НЕСТЕРОЇДНИХ ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Який жарознижувальний засіб можна використовувати для дитини 3-х місяців? |
| Правильна відповідь | Парацетамол |
| В | Диклофенак натрію |
| С | Індометацин |
| D | Ацетилсаліцилова кислота |
| Е | Німесулід |

| | |
|---------------------|--|
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ В АНЕСТЕЗІОЛГІЇ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ |
| Текст завдання | Який місцевий анестетик краще придбати в аптеці для знеболення при екстракції зуба? |
| Правильна відповідь | Лідокаїн |
| В | Дикаїн |
| С | Анестезин |
| Д | Совкаїн |
| Е | Кокаїн |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ МУКОЛІТИЧНИХ, АНТИГІСТАМІННИХ, ПРОТИКАШЛЬОВИХ ПРЕПАРАТІВ |
| Текст завдання | Проконсультуйте лікаря, яким найбільш близьким за дією препаратом можна замінити відсутній в аптеці ацетилцистеїн: |
| Правильна відповідь | Амброксол |
| В | Натрію хлорид |
| С | Кодеїну фосфат |
| Д | Лібексин |
| Е | Натрію гідрокарбонат |
| № | крок 2014, 2010 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |
| Текст завдання | В аптеку звернулася мама 2-х місячної дитини з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат слід порекомендувати? |
| Правильна відповідь | Парацетамол |
| В | Німесулід |
| С | Ацетилсаліцилова кислота |
| Д | Індометацин |
| Е | Диклофенак натрію |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СЕЧОГІННИХ |
| Текст завдання | Хворому на епілепсію призначили діуретичний препарат. Визначте цей препарат: |
| Правильна відповідь | Діакарб |

| | |
|---------------------|--|
| B | Верошпірон |
| C | Фуросемід |
| D | Гіпотіазид |
| E | Манніт |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ГОРМОНАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Який з наведених лікарських засобів належить до препаратів задньої долі гіпофізу? |
| Правильна відповідь | Окситоцин |
| B | Інсулін |
| C | Преднізолон |
| D | Тиреоїдин |
| E | Естрон |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПЕРОРАЛЬНИХ ЦУКРОЗНИЖУВАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Гіпоглікемічна дія якого препарату зумовлена стимуляцією β -клітин підшлункової залози? |
| Правильна відповідь | Глібенкламід |
| B | Преднізолон |
| C | Адреналіну гідрохлорид |
| D | Ретаболіл |
| E | Гепарин |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |
| Текст завдання | Хворому 45-ти років з діагнозом: ревматоїдний артрит та пептична виразка шлунку, необхідно призначити нестероїдний протизапальний засіб. Який препарат є найбільш доцільним? |
| Правильна відповідь | Целекоксиб |
| B | Диклофенак натрію |
| C | Ацетилсаліцилова кислота |
| D | Індометацин |
| E | Піроксикам |
| № | крок 2014 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ ФУНКЦІЮ ЦНС |
| Текст завдання | Чоловік 55-ти років скаржиться на безсоння, дратівливість, загальну слабкість. Який з вказаних нижче препаратів доцільно призначити в даному випадку? |
| Правильна відповідь | Нітразепам |
| B | Аміназин |
| C | Трифтазин |
| D | Дроперидол |
| E | Амітриптилін |
| № | крок 2014 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Проконсультуйте лікаря-інтерна, чому одночасно з препаратами заліза не доцільно застосовувати антацидні засоби? |
| Правильна відповідь | Погіршується всмоктування препаратів заліза |
| B | Збільшується зв'язування з білками крові |
| C | Порушується депонування заліза в організмі |
| D | Підсилюється інтоксикація препаратами заліза |
| E | Прискорюється елімінація препаратів заліза |
| № | крок 2014 |
| Тема | ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | На аптечний склад надійшли анальгетики. Вкажіть, до якого із цих засобів може розвинути медикаментозна залежність? |
| Правильна відповідь | Промедол |
| B | Кислота ацетилсаліцилова |
| C | Налоксон |
| D | Диклофенак-натрій |
| E | Парацетамол |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |
| Текст завдання | Для зняття запалення та больового синдрому лікар призначив лікарський засіб, що належить до групи нестероїдних протизапальних засобів. Вкажіть цей засіб: |
| Правильна відповідь | Диклофенак натрію |

| | |
|---------------------|---|
| В | Глібенкламід |
| С | Лоратадин |
| D | Преднізолон |
| Е | Кальцію хлорид |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМОКОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Які патологічні стани організму сприяють кумуляції ліків? |
| Правильна відповідь | Захворювання печінки і нирок |
| В | Захворювання дихальних шляхів |
| С | Захворювання центральної нервової системи |
| D | Захворювання сполучної тканини |
| Е | Захворювання опорно-рухового апарату |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАНЕМІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | У хворого гіперхромна В12-дефіцитна анемія. Який препарат йому необхідно призначити? |
| Правильна відповідь | Ціанокобаламін |
| В | Рибофлавін |
| С | Вікасол |
| D | Тіаміну хлорид |
| Е | Ретинолу ацетат |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |
| Текст завдання | Який препарат можна порекомендувати для симптоматичного лікування м'язового болю у дитини 5-ти років? |
| Правильна відповідь | Парацетамол |
| В | Ацетилсаліцилова кислота |
| С | Диклофенак натрію |
| D | Індометацин |
| Е | Целекоксиб |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ ФУНКЦІЮ ЦНС |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Завдяки якому фармакологічному ефекту діазепам застосовується для лікування неврозів? |
| Правильна відповідь | Анксиолітичний |
| B | Анальгетичний |
| C | Діуретичний |
| D | Жарознижуючий |
| E | Антидепресивний |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Хворому з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат? |
| Правильна відповідь | Антихолінергічний зворотної дії |
| B | M-холіноблокатор |
| C | N-холіноміметик |
| D | β -адреноблокатор |
| E | β -адреноміметик |
| № | крок 2013 |
| Тема | ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕЧОКАМ'ЯНОЇ ХВОРОБИ |
| Текст завдання | Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи M-холіноблокаторів, а саме: |
| Правильна відповідь | Атропін |
| B | Прозерин |
| C | Галантамін |
| D | Дитилін |
| E | Бензогексоній |
| № | крок 2013 |
| Тема | ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | Для індивідуальної профілактики малярії було призначено препарат: |
| Правильна відповідь | Хінгамін |
| B | Рифампіцин |
| C | Ампіцилін |
| D | Гентаміцин |
| E | Бісептол (Ко-тримаксазол) |

| | |
|---------------------|--|
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворій для лікування алергічного дерматиту призначено лоратадин. Який механізм протиалергічної дії препарату? |
| Правильна відповідь | Пригнічення H1-гістамінових рецепторів |
| B | Пригнічення H2-гістамінових рецепторів |
| C | Блокада D4-лейкотрієнових рецепторів |
| D | Зменшення вивільнення лейкотрієну |
| E | Антисеротонінова активність |
| № | крок 2013, 2010, 2009, 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але за цих умов препарат став неефективним. Яке явище є причиною цього? |
| Правильна відповідь | Тахіфілаксія |
| B | Лікарська залежність |
| C | Ідіосинкразія |
| D | Алергія |
| E | Кумуляція |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ГЕМОСТАТИКІВ |
| Текст завдання | Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме? |
| Правильна відповідь | Вікасол |
| B | Інсулін |
| C | Метопролол |
| D | Гепарин |
| E | Дихлотіазид |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СЕЧОГІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Для лікування набряку мозку необхідно призначити сечогінний засіб. Який препарат необхідно ввести хворому? |
| Правильна відповідь | Фуросемід |
| B | Гідрохлортіазид |

| | |
|---------------------|---|
| С | Кофеїн-бензоат натрію |
| D | Діакарб |
| Е | Спіронолактон |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ |
| Текст завдання | Хворому після видалення щитоподібної залози був призначений L-тироксин. Який вид фармакотерапії забезпечує L-тироксин? |
| Правильна відповідь | Замісна |
| В | Патогенетична |
| С | Етіотропна |
| D | Стимулююча |
| Е | Профілактична |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнту, який довгий час приймав препарат диклофенак-натрій, сімейний лікар замість нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату? |
| Правильна відповідь | Пептична виразка шлунка |
| В | Бронхіальна астма |
| С | Сечокам'яна хвороба |
| D | Артеріальна гіпертензія |
| Е | Хронічний гепатит |
| № | крок 2013, 2010, 2009, 2008 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | При тривалому застосуванні фенобарбіталу в хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища? |
| Правильна відповідь | Прискорення біотрансформації |
| В | Послаблення процесу всмоктування |
| С | Підвищення чутливості рецепторів |
| D | Пригнічення біотрансформації |
| Е | Накопичення речовини в організмі |

| | |
|---------------------|---|
| № | крок 2013, 2008 |
| Тема | ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ЦНС |
| Текст завдання | Пацієнт отримує леводопу у зв'язку з хворобою Паркінсона. Який механізм дії цього засобу? |
| Правильна відповідь | Є попередником дофаміну |
| В | Є попередником стероїдних гормонів |
| С | Блокує деградацію дофаміну |
| D | Є попередником ацетилхоліну |
| Е | Є симпатолітиком |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРЕПАРАТІВ ІНСУЛІНУ |
| Текст завдання | Хвора 17-ти років скаржиться на постійну спрагу, сухість у роті, часте сечовиділення, підвищення апетиту. Глюкоза крові - 11 ммоль/л. Лікар діагностував цукровий діабет I типу. Який препарат показаний для лікування? |
| Правильна відповідь | Інсулін |
| В | Манініл |
| С | Глібенкламід |
| D | Акарбоза |
| Е | Аспаркам |
| № | крок 2013 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | При одночасному застосуванні парацетамолу та ацетилцистеїну відбувається: |
| Правильна відповідь | Зниження гепатотоксичної дії парацетамолу |
| В | Зменшення протизапальної дії парацетамолу |
| С | Гальмування всмоктування парацетамолу |
| D | Збільшення муколітичної дії ацетилцистеїну |
| Е | Збільшення нефротоксичності парацетамолу |
| № | крок 2013 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | При одночасному застосуванні гентаміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик: |
| Правильна відповідь | Нефротоксичності |

| | |
|---------------------|--|
| B | Гепатотоксичності |
| C | Кардіотоксичності |
| D | Нейротоксичності |
| E | Імовірності алергічних реакцій |
| № | крок 2013 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | При одночасному застосуванні метронідазолу та пероральних антикоагулянтів кумаринового ряду пацієнта необхідно попередити про наступний побічний ефект: |
| Правильна відповідь | Посилення дії антикоагулянтів та ризик кровотечі |
| B | Зниження дії антикоагулянтів |
| C | Посилення ефекту метронідазолу |
| D | Зниження ефекту метронідазолу |
| E | Посилення нейротоксичності |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАНЕМІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | При проведенні біохімічного дослідження крові у хворого виявлено пониженою кількість сироваткового заліза крові. Для якого захворювання характерні такі зміни? |
| Правильна відповідь | Залізодефіцитна анемія |
| B | Гострий бронхіт |
| C | Бронхіальна астма |
| D | Пневмонія |
| E | Бронхоектатична хвороба |
| № | крок 2012 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Спільне застосування фуросеміду з антибіотиками групи аміноглікозидів викликає: |
| Правильна відповідь | Ототоксичність |
| B | Підвищення артеріального тиску |
| C | Коліки |
| D | Пітливість |
| E | Підвищення внутрішньоочного тиску |

| | |
|---------------------|---|
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ ФУНКЦІЮ ЦНС |
| Текст завдання | Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату? |
| Правильна відповідь | Інгібування дофамінергічних процесів у ЦНС |
| B | Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів у ЦНС |
| C | Стимуляція холінергічних процесів у ЦНС |
| D | Інгібування холінергічних процесів у ЦНС |
| E | Інгібування адренергічних процесів у ЦНС |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРЕПАРАТІВ ІНСУЛІНУ |
| Текст завдання | У хворого 15-ти років вперше виявлено цукровий діабет I типу. Який цукрознижуючий засіб необхідно призначити? |
| Правильна відповідь | Інсулін |
| B | Метформін |
| C | Діабетон |
| D | Глюренорм |
| E | Глібенкламід |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НПЗ |
| Текст завдання | До провізора в аптеці звернулась жінка з проханням відпустити жарознижуючий засіб для дитини 8-ми місяців. Який препарат слід порадити? |
| Правильна відповідь | Парацетамол |
| B | Ацетилсаліцилова кислота |
| C | Індометацин |
| D | Диклофенак-натрій |
| E | Піроксикам |
| № | крок 2012 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Як називається явище, коли один препарат послаблює дію іншого? |

| | |
|---------------------|--|
| Правильна відповідь | Антагонізм |
| B | Звикання |
| C | Сенсибілізація |
| D | Потенціювання |
| E | Тахіфілаксія |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Як називається здатність ліків накопичуватися в організмі хворого? |
| Правильна відповідь | Кумуляція |
| B | Антагонізм |
| C | Синергізм |
| D | Звикання |
| E | Алергія |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ ПРИ СЕЧОКАМ'ЯНІЙ ХВОРОБІ |
| Текст завдання | Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи M -холіноблокаторів, а саме: |
| Правильна відповідь | Атропін |
| B | Прозерин |
| C | Галантамін |
| D | Дитилін |
| E | Бензогексоній |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У пацієнтки розвинувся алергічний дерматит після вживання citrusових. Порекомендуйте лікарський засіб з групи блокаторів H1-гістамінорецепторів: |
| Правильна відповідь | Лоратадин |
| B | Кислота ацетилсаліцилова |
| C | Вікасол |
| D | Диклофенак-натрій |
| E | Ретинолу ацетат |
| № | крок 2012 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НПЛЗ |
| Текст завдання | Після підйому вантажу у хворого виник різкий біль у попереку, який посилюється при рухах, іррадіює в ліву ногу. Діагностовано поперековокрижовий радикуліт. Який засіб можна порекомендувати хворому? |
| Правильна відповідь | Диклофенак-натрій |
| В | Дротаверин |
| С | Платифілін |
| Д | Тіаміну бромід |
| Е | Ціанокобаламін |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Для лікування кропив'янки з метою усунення сверблячої висипки на шкірі хворому призначений димедрол. Який механізм забезпечує його дію? |
| Правильна відповідь | Конкурентна блокада H1-гістамінових рецепторів |
| В | Пригнічення синтезу гістаміну |
| С | Пригнічення вивільнення гістаміну |
| Д | Прискорення руйнування гістаміну |
| Е | Неконкурентний антагонізм із гістаміном |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ВІТАМІНІВ |
| Текст завдання | У хворого відзначаються сухість слизових оболонок і порушення сутінкового зору. Недостатність якого вітаміну призводить до виникнення таких симптомів? |
| Правильна відповідь | А |
| В | Р |
| С | Е |
| Д | С |
| Е | Д |
| № | крок 2012 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Як називається явище, коли один препарат посилює дію іншого? |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Синергізм |
| B | Антагонізм |
| C | Сенсибілізація |
| D | Абстиненція |
| E | Тахіфілаксія |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Який препарат з групи М-холіноміметиків необхідно призначити хворому з глаукомою? |
| Правильна відповідь | Пілокарпін |
| B | Лідокаїн |
| C | Атропіну сульфат |
| D | Добутамін |
| E | Нітразепам |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛІЗ, ЯКІ ПРИОНІЧУЮТЬ ЦНС |
| Текст завдання | У чоловіка діагностовано хворобу Паркінсона. Який засіб доцільно призначити хворому? |
| Правильна відповідь | Леводопа |
| B | Нітразепам |
| C | Парацетамол |
| D | Аміназин |
| E | Анаприлін |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛІЗ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ |
| Текст завдання | Хворому з гіпотиреозом лікар призначив препарат, який проявляє замісну дію. Який із перелічених препаратів призначив лікар? |
| Правильна відповідь | L-тироксин |
| B | Адреналін |
| C | Мерказоліл |
| D | Аміодарон |
| E | Парацетамол |
| № | крок 2011, 2009, 2007 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ, ЯКІ ПРИОНІЧУЮТЬ ЦНС |
| Текст завдання | Хворому для купірування судомного синдрому був призначений препарат з групи бензодіазепіну. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Діазепам |
| B | Кофеїн бензоат натрію |
| C | Налоксон |
| D | Леводопа |
| E | Суксаметоній хлорид |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ В АНЕСТЕЗІОЛГІЇ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ |
| Текст завдання | При проведенні місцевої анестезії до розчину новокаїну додається розчин адреналіну гідрохлориду. З якою метою це проводиться? |
| Правильна відповідь | Для звуження судин |
| B | Для розширення судин |
| C | Для підвищення тонуусу гладенької мускулатури |
| D | Для зниження тонуусу гладенької мускулатури |
| E | Для зменшення больової чутливості |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на алергічний дерматит був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат? |
| Правильна відповідь | Блокатори 1-гістамінових рецепторів |
| B | Глюкокортикостероїди |
| C | Інгібітори дегрануляції тучних клітин |
| D | Антагоністи лейкотрієнових рецепторів |
| E | Блокатори 2-гістамінових рецепторів |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ ЦНС |
| Текст завдання | Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Амітриптилін |
| B | Феназепам |

| | |
|---------------------|---|
| С | Дроперидол |
| D | Аміналон |
| Е | Кофеїн |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Що відображає такий фармакокінетичний параметр лікарських засобів як період напіввиведення ($T_{1/2}$)? |
| Правильна відповідь | Проміжок часу, за який концентрація препарату в плазмі крові зменшується на 50% |
| В | Об'єм плазми крові, який звільняється від препарату за одиницю часу |
| С | Час повного виведення препарату з організму |
| D | Швидкість виведення препарату через нирки |
| Е | Співвідношення між швидкістю виведення препарату та його концентрацією у плазмі крові |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |
| Текст завдання | Якому із перелічених нестероїдних протизапальних засобів притаманний найслабший пошкоджуючий вплив на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту? |
| Правильна відповідь | Німесулід |
| В | Диклофенак |
| С | Індометацин |
| D | Піроксикам |
| Е | Ацетилсаліцилова кислота |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається: |
| Правильна відповідь | Біодоступність |
| В | Період напівадсорбції |
| С | Період напіввиведення |
| D | Об'єм розподілу |
| Е | Період напівелімінації |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Жінка у III триместрі вагітності захворіла на ГРВІ з підвищенням температури тіла до 39оС . Який лікарський засіб доцільно їй запропонувати? |
| Правильна відповідь | Парацетамол |
| B | Целекоксиб |
| C | Індометацин |
| D | Ацетилсаліцилова кислота |
| E | Диклофенак натрію |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ В АНЕСТЕЗІОЛГІЇ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ |
| Текст завдання | Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболювання пологів? |
| Правильна відповідь | Промедол |
| B | Парацетамол |
| C | Кодеїну фосфат |
| D | Фентаніл |
| E | Анальгін |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ ПРИ СЕЧОКАМ'ЯНІЙ ХВОРОБІ |
| Текст завдання | Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи M-холіноблокаторів, а саме: |
| Правильна відповідь | Атропін |
| B | Прозерин |
| C | Галантамін |
| D | Дитилін |
| E | Бензогексоній |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ ЦНС |
| Текст завдання | Хворому 30-ти років із розладом сну і неврівноваженістю психоемоційної сфери лікар призначив діазепам. Чим обумовлений психоседативний ефект препарату? |
| Правильна відповідь | Активация ГАМК-ергічної системи |
| B | Гальмування лімбічної системи |
| C | Гальмування ретикулярної формації |
| D | Зменшення кількості норадреналіну в ЦНС |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Гальмування опіоїдних рецепторів |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ГОРМОНАЛЬНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У жінки затяжний період пологової діяльності. Із перелічених препаратів виберіть той, що стимулює пологову діяльність, завдяки фізіологічній дії: |
| Правильна відповідь | Окситоцин |
| В | Прозерин |
| С | Пахикарпін |
| Д | Прогестерон |
| Е | Естрон |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СЕЧОГІННИХ ЛЗ |
| Текст завдання | З наведених сечогінних препаратів виберіть петльовий діуретик екстреної, сильної і короткотривалої дії: |
| Правильна відповідь | Фуросемід |
| В | Клопамід |
| С | Діакарб |
| Д | Спіронолактон |
| Е | Тріамтерен |
| № | крок 2011, 2009, 2008, 2007 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Лікарю-анестезіологу необхідно провести операцію, використовуючи нейролептаналгезію. Яке із перерахованих нижче поєднань лікарських засобів доцільно використовувати у даному випадку? |
| Правильна відповідь | Фентаніл з дроперидолом |
| В | Дроперидол з преднізолоном |
| С | Фентаніл з діазепамом |
| Д | Діазепам з аміназином |
| Е | Промедол з амітриптиліном |
| № | крок 2010 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Хворому, який тривалий час приймає фенобарбітал, лікар призначив диклофенак натрію. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявився слабшим від очікуваного внаслідок фармакокінетичної взаємодії цих препаратів. Результатом яких процесів могла бути така взаємодія препаратів? |
| Правильна відповідь | Збільшення швидкості метаболізму препарату в печінці |
| B | Зниження швидкості метаболізму препарату в печінці |
| C | Зниження концентрації білку в плазмі |
| D | Зміни чутливості рецептора |
| E | Збільшення дози лікарських засобів |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Одним з головних показників елімінації лікарських засобів з організму людини є: |
| Правильна відповідь | Період напіввиведення |
| B | Об'єм розподілу |
| C | Біодоступність |
| D | Біоеквівалентність |
| E | Максимальна концентрація у крові |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ВІТАМІНІВ |
| Текст завдання | Хворий звернувся до офтальмолога із скаргами на зниження нічного зору, сухість рогівки. Який препарат призначив лікар? |
| Правильна відповідь | Ретинол |
| B | Піридоксин |
| C | Токоферол |
| D | Аскорбінова кислота |
| E | Кокарбоксілаза |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ЦНС |
| Текст завдання | Хворому після перенесеної черепно-мозкової травми лікар призначив пірацетам. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат? |
| Правильна відповідь | Ноотропні препарати |
| B | Ненаркотичні анальгетики |

| | |
|---------------------|---|
| C | Транквілізатори |
| D | Засоби для наркозу |
| E | Нейролептики |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку? |
| Правильна відповідь | Целекоксиб |
| B | Ацетилсаліцилова кислота |
| C | Парацетамол |
| D | Анальгін |
| E | Диклофенак натрію |
| № | крок 2010, 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |
| Текст завдання | Який знеболювальний протизапальний препарат, що найменше шкодить шлунку, може порадити хворому з загостренням ревматоїдного артриту провізор-інформатор аптеки? |
| Правильна відповідь | Целекоксиб |
| B | Диклофенак-натрій |
| C | Кислота ацетилсаліцилова |
| D | Ібупрофен |
| E | Індометацин |
| № | крок 2010, 2008 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом: |
| Правильна відповідь | Фармакокінетичної несумісності |
| B | Фармацевтичної несумісності |
| C | Фармакодинамічної несумісності |
| D | Синергізму препаратів |
| E | Функціонального антагонізму препаратів |

| | |
|---------------------|---|
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ В АНЕСТЕЗІОЛГІЇ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ |
| Текст завдання | До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міорелаксантів депольаризуючого типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено? |
| Правильна відповідь | Дитилін |
| В | Нікотин |
| С | Атропіну сульфат |
| Д | Метацин |
| Е | Гігроній |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НПЛЗ |
| Текст завдання | До аптеки надійшов препарат нового покоління не стероїдних протизапальних засобів "мелоксикам", який є переважно блокатором циклооксигенази-2. Вкажіть, які переваги має цей препарат у порівнянні з іншими нестероїдними протизапальними засобами: |
| Правильна відповідь | Мінімальна побічна дія на травний канал |
| В | Виразний міоспазмолітичний ефект |
| С | Наявність інтерферогенних властивостей |
| Д | Мінімальна побічна дія на кровотворення |
| Е | Значне пригнічення активності протеаз |
| № | 88 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НПЛЗ |
| Текст завдання | Ви співробітник аптечного складу. Під час внесення препаратів, що надійшли, в комп'ютерну базу даних вкажіть, до якої фармакологічної групи відноситься парацетамол: |
| Правильна відповідь | Ненаркотичний анальгетик |
| В | Снодійний засіб |
| С | Діуретичний засіб |
| Д | Гіпотензивний засіб |
| Е | Антиангінальний засіб |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | При тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується. Яку назву має це явище? |

| | |
|---------------------|--|
| Правильна відповідь | Звикання |
| B | Сенсибілізація |
| C | Кумуляція |
| D | Залежність |
| E | Тахіфілаксія |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | В аптеку звернувся чоловік з проханням порадити лікарський засіб для усунення алергічного риніту, який виникає у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна запропонувати? |
| Правильна відповідь | Лоратадин |
| B | Адреналін |
| C | Анаприлін |
| D | Амброксол |
| E | Лозартан |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НПЛЗ |
| Текст завдання | Вагітна жінка 26-ти років (III триместр вагітності) скаржиться на підвищення температури тіла до 39оС. Який жарознижуючий лікарський засіб можна запропонувати в даній ситуації? |
| Правильна відповідь | Парацетамол |
| B | Аспірин |
| C | Диклофенак натрію |
| D | Анальгін |
| E | Індометацин |
| № | крок 2009, 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НПЛЗ |
| Текст завдання | Хворій 57-ми років встановлено діагноз ревматоїдного артрити, в анамнезі виразкова хвороба. Що з групи нестероїдних протизапальних препаратів можна рекомендувати даній хворій? |
| Правильна відповідь | Целекоксиб |
| B | Диклофенак натрію |
| C | Аспірин |
| D | Індометацин |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Мефенамова кислота |
| № | крок 2009, 2008, 2007 |
| Тема | ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ БІОФАРМАЦІЇ |
| Текст завдання | Під час відпуску безрецептурного препарату для симптоматичного лікування риніту хворому з артеріальною гіпертензією для максимального зниження вірогідності розвитку небажаної системної судинозвужувальної дії слід рекомендувати таку лікарську форму: |
| Правильна відповідь | Мазь |
| В | Гель |
| С | Краплі |
| Д | Аерозоль |
| Е | Таблетки |
| № | крок 2009, 2007 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворому 56-ти років для лікування гіпертонічної хвороби призначені інгібітор АПФ (іАПФ) та калійзберігаючий діуретик. Така комбінація: |
| Правильна відповідь | Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку гіперкаліємії |
| В | Раціональна, оскільки зменшується ризик розвитку гіпокаліємії |
| С | Раціональна, оскільки потенціюється гіпотензивна дія іАПФ |
| Д | Нераціональна, оскільки знижується гіпотензивна дія іАПФ |
| Е | Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку ортостатичного колапсу |
| № | крок 2008, 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Лікарю-стоматологу необхідно під час операції зменшити салівацію у хворого. Препарат якої фармакологічної групи він використав для цього? |
| Правильна відповідь | М -холіноблокатори |
| В | М -холіноміметики |
| С | Адреноміметики |
| Д | Адреноблокатори |
| Е | М, Н -холіноміметики |
| № | крок 2008 |
| Тема | ПОБІЧНА ДІЯ ЛЗ |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | М-холіноблокатори мають вельми широке застосування в сучасній практичній медицині. У якому випадку М-холіноблокатори протипоказані? |
| Правильна відповідь | Атонія кишечника |
| B | Ниркова колька |
| C | Бронхіальна астма |
| D | Печінкова колька |
| E | Виразкова хвороба шлунку |
| № | крок 2008, 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Хвора із сезонним вазомоторним ринітом, яка працює диспетчером на залізниці, звернулася в аптеку за порадою: котрий із антигістамінних лікарських засобів не має пригнічувальної дії на ЦНС? |
| Правильна відповідь | Лоратадин |
| B | Клемастин |
| C | Дипразин |
| D | Дифенгідрамін |
| E | Піпольфен |
| № | крок 2008 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ДИХАННЯ |
| Текст завдання | Який найбільш раціональний препарат можна порекомендувати для лікування риніту при ГРВІ для дитини у віці 7-ми місяців? |
| Правильна відповідь | 0,9% розчин повареної солі у теплій воді |
| B | Нафтизин |
| C | Галазолін |
| D | Піносол |
| E | Мазь "Бороментол" |
| № | крок 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ГОРМОНАЛЬНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У зв'язку зі слабкістю пологової діяльності лікар призначив роділлі гормональний препарат для стимуляції пологів. Назвіть препарат: |
| Правильна відповідь | Окситоцин |
| B | Глібенкламід |

| | |
|---------------------|---|
| С | Преднізолон |
| D | Інсулін |
| Е | L-тироксин |
| № | крок 2008, 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛІЗ |
| Текст завдання | Хворому 45-ти років з діагнозом ревматоїдний артрит та пептична виразка шлунка, необхідно призначити нестероїдні протизапальні засоби. Який препарат є найбільш доцільним? |
| Правильна відповідь | Целекоксиб |
| В | Диклофенак натрію |
| С | Ацетилсаліцилова кислота |
| D | Індометацин |
| Е | Піроксикам |
| № | крок 2008 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Під час відпуску лікарських засобів в аптеці провізор звернув увагу хворого на недоцільність одночасного застосування ціанокобаламіну та тіаміну хлориду. Як називають тип взаємодії цих ліків? |
| Правильна відповідь | Фармацевтичний |
| В | Фармакодинамічний |
| С | Фармакокінетичний |
| D | Синергізм |
| Е | Антагонізм |
| № | крок 2008 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Лікарю-анестезіологу необхідно провести операцію, використовуючи нейролептанальгезію. Яке із перерахованих нижче поєднань лікарських засобів доцільно використовувати у даному випадку? |
| Правильна відповідь | Фентаніл з дроперидолом |
| В | Дроперидол з преднізолоном |
| С | Фентаніл з діазепамом |
| D | Діазепам з аміназином |
| Е | Промедол з амітриптиліном |
| № | крок 2008 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Роділлі з зтяжними пологами необхідно усунути больовий симптом. Який з перелічених нижче препаратів необхідно застосувати? |
| Правильна відповідь | Промедол |
| B | Морфіну гідрохлорид |
| C | Анальгін |
| D | Диклофенак-натрію |
| E | Фентаніл |
| № | крок 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ В АНЕСТЕЗІОЛГІЇ І РЕАНІМАТОЛОГІЯ |
| Текст завдання | Хворому на інсулінонезалежний цукровий діабет було призначено синтетичний протидіабетичний препарат з групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть препарат: |
| Правильна відповідь | Глібенкламід |
| B | Інсулін |
| C | Анаприлін |
| D | Преднізолон |
| E | Фуросемід |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Для дослідження очного дна хворому закапали в кон'юнктивальну щілину мідріатик, що не порушує акомодацию. Визначте препарат: |
| Правильна відповідь | Адреналіну гідрохлорид |
| B | Сульфацил-натрій |
| C | Цинку сульфат |
| D | Кислота борна |
| E | Левоміцетин |
| № | крок 2007 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Відпускаючи з аптеки препарат заліза для приймання всередину - фероплекс, слід попередити хворого, що цей препарат не можна запивати молоком і вживати разом з ним молочні продукти, оскільки при цьому: |
| Правильна відповідь | Утворюються поганорозчинні хелатні комплекси |

| | |
|---------------------|--|
| В | Пролонгується дія препаратів заліза |
| С | Підсилюється активність препарату |
| D | Швидше всмоктується препарат |
| Е | Прискорюється виведення препарату |
| № | крок 2007 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | На фоні прийому алкоголю в хворого, який отримує аміназин для лікування психозу, виникло різке пригнічення центральної нервової системи. З чим це може бути пов'язане? |
| Правильна відповідь | Потенціювання ефектів |
| В | Звикання |
| С | Тератогенна дія |
| D | Алергія |
| Е | Ідіосинкразія |
| № | крок 2007 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Під час відпуску антигістамінного препарату дипразину, який призначений хворому з метою симптоматичного лікування алергії, провізор повинен попередити пацієнта, що під час застосування вказаного препарату не можна вживати алкоголь, тому що: |
| Правильна відповідь | Потенціюється пригнічуюча дія на ЦНС |
| В | Потенціюється подразлива дія препарату на слизову шлунка |
| С | Можливе різке підвищення артеріального тиску |
| D | Можливий розвиток гепатотоксичного ефекту |
| Е | Можливе посилення симптомів алергії |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СЕЧОГІННИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Ви - співробітник аптечного складу. При внесенні в комп'ютер діуретичних препаратів, що надійшли, вкажіть, до якої групи відноситься препарат гідрохлортіазид? |
| Правильна відповідь | Тіазидні |
| В | Інгібітори карбоангідази |
| С | Калійзберігаючі |
| D | Петльові |

| | |
|---------------------|---|
| Е | Осмотичні |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ. ПРИНЦИПИ. ПОЛОЖЕННЯ |
| Текст завдання | Для дослідження очного дна необхідно розширити зіницю. Який препарат для цього використовується в клініці? |
| Правильна відповідь | Атропіну сульфат |
| В | Пілокарпіну гідрохлорид |
| С | Пірензепін |
| Д | Прозерин |
| Е | Анаприлін |
| № | крок 2007 |
| Тема | ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ БІОФАРМАЦІЇ |
| Текст завдання | В анотації на магнію сульфат вказано, що цей препарат призначають як протисудомний засіб. Який шлях введення необхідно обрати для отримання даного фармакологічного ефекту? |
| Правильна відповідь | Внутрішньом'язевий |
| В | Сублінгвальний |
| С | Пероральний |
| Д | Ректальний |
| Е | Інгаляційний |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Порадьте медичній сестрі, який з наведених препаратів можна застосовувати для лікування алергії? |
| Правильна відповідь | Лоратадин |
| В | Нафтизин |
| С | Левамізол |
| Д | Глібенкламід |
| Е | Аскорутин |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НІЛЗ |
| Текст завдання | Дитині 10-ти років з респіраторним захворюванням призначили парацетамол для зменшення лихоманки. До якого виду фармакотерапії слід віднести таке лікування? |
| Правильна відповідь | Симптоматична |

| | |
|---------------------|--|
| В | Етіотропна |
| С | Патогенетична |
| D | Адаптаційна |
| Е | Замісна |
| № | крок 2007 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Для продовження і посилення місцевоанестезуючої активності новокаїну, а також для зменшення вірогідності кровотечі під час проведення операції видалення зуба, лікар-стоматолог застосував препарат з групи адреноміметиків. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Адреналіну гідрохлорид |
| В | Сальбутамол |
| С | Ізадрин |
| D | Прозерин |
| Е | Анаприлін |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ ЦНС |
| Текст завдання | У хворого безсоння, яке викликане емоційними розладами. Лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Яке снодійне було призначено пацієнту? |
| Правильна відповідь | Нітразепам |
| В | Фенобарбітал |
| С | Хлоралгідрат |
| D | Етамінал-натрій |
| Е | Бромізовал |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ НПЛЗ |
| Текст завдання | В аптеку звернулася жінка похилого віку з проханням відпустити їй лікарський засіб для зняття болю в суглобах, в анамнезі - пептична виразка шлунка. Який з наведених засобів найбільш безпечний у даному випадку? |
| Правильна відповідь | Целекоксиб |
| В | Ацетилсаліцилова кислота |
| С | Індометацин |
| D | Диклофенак натрію |

| | |
|---------------------|---|
| Е | Піроксикам |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ПРЕПАРАТІВ МЕТАБОЛІЧНОГО ТИПУ ДІЇ |
| Текст завдання | Який з наведених препаратів показаний хворому на подагру з гіперурикемією в амбулаторному періоді лікування? |
| Правильна відповідь | Алопуринол |
| В | Гіпотіазид |
| С | Аскорутин |
| Д | Дипіридамол |
| Е | Фуросемід |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ПРЕПАРАТІВ МЕТАБОЛІЧНОГО ТИПУ ДІЇ |
| Текст завдання | Лікар призначив хворій з остеопорозом у складі комплексної терапії препарат, який регулює обмін кальцію та фосфору. Назвіть препарат: |
| Правильна відповідь | Кальцитонін |
| В | Пангамат кальцію |
| С | Аскорбінова кислота |
| Д | Кверцетин |
| Е | Глобірон |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ |
| Текст завдання | Хворий 47-ми років з діагнозом: дифузний токсичний зоб, потребує антитиреоїдної терапії. Оберіть препарат для даного пацієнта: |
| Правильна відповідь | Мерказоліл |
| В | Левотироксин натрію |
| С | Тиротропін альфа |
| Д | Калію йодид |
| Е | Трийодтиронін |
| № | крок 2017 |
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | Дитині 4-х років з метою лікування ангіни був призначений антибактеріальний засіб. Через 2 тижні після проведеного лікування з'явилося жовте забарвлення зубів, що не знімається зубною пастою. Який антибіотик міг спричинити такий побічний ефект? |
| Правильна відповідь | Тетрациклін |
| B | Азитроміцин |
| C | Метронідазол |
| D | Цефтріаксон |
| E | Амікацин |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ПРОТИВІРУСНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | До провізора звернулася жінка із проханням порекомендувати лікарський засіб для профілактики грипу у її дитини віком 2 роки у вигляді крапель у ніс. Таким засобом є: |
| Правильна відповідь | Інтерферон |
| B | Оксолін |
| C | Ремантадин |
| D | Ацикловір |
| E | Парацетамол |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Пацієнту з хелікобактер асоційованою пептичною виразкою призначено курс лікування. Який з наведених засобів призначено в якості етіотропної фармакотерапії? |
| Правильна відповідь | Кларитроміцин |
| B | Сукральфат |
| C | Фамотидин |
| D | Ранітидин |
| E | Алюмінію гідроксид |
| № | крок 2017 |
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | Хворий скаржиться на набряк обличчя і шиї, осиплість голосу, нежить, утруднення дихання. За годину до цього прийняв таблетку ампіциліну. Яка побічна дія виникла? |
| Правильна відповідь | Набряк Квінке |

| | |
|---------------------|---|
| В | Кропив'янка |
| С | Поліноз |
| D | Анафілактичний шок |
| Е | Атопічний дерматит |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ПРОТИВІРУСНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з'явилися герпетичні висипання. Який препарат можна порекомендувати пацієнту? |
| Правильна відповідь | Ацикловір |
| В | Клотримазол |
| С | Азитроміцин |
| D | Дексаметазон |
| Е | Амоксицилін |
| № | крок 2015, 2014, 2017 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СУЛЬФАНІАМІДІВ |
| Текст завдання | Який з вказаних антибактеріальних препаратів НЕРАЦІОНАЛЬНО призначати хворому 56-ти років з цукровим діабетом II типу, що отримує глібенкламід? |
| Правильна відповідь | Бісептол |
| В | Мідекаміцин |
| С | Гентаміцин |
| D | Бензилпеніцилін |
| Е | Доксициклін |
| № | крок 2016 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИВОВІРУСНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Якій з наведених груп лікарських засобів притаманний "сезонний" вид життєвого циклу? |
| Правильна відповідь | Противірусні |
| В | Антикоагулянти |
| С | Антидіабетичні |
| D | Анаболічні |
| Е | Антибластомні |
| № | крок 2016, 2012, 2011 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | У чоловіка, який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації? |
| Правильна відповідь | Амоксицилін |
| B | Тетрациклін |
| C | Бісептол |
| D | Рифампіцин |
| E | Ванкоміцин |
| № | крок 2016, 2014, 2012 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Хворому 30-ти років з діагнозом гострого остеомієліту призначили антибіотик, який добре проникає в кісткову тканину. Який засіб було обрано? |
| Правильна відповідь | Лінкоміцин |
| B | Біцилін-3 |
| C | Бензилпеніцилін |
| D | Поліміксин-М |
| E | Ампіцилін |
| № | крок 2015 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Вагітна жінка захворіла на пневмонію тяжкого перебігу. Який з названих антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити? |
| Правильна відповідь | Цефотаксим |
| B | Гентаміцину сульфат |
| C | Тетрацикліну гідрохлорид |
| D | Офлоксацин |
| E | Бісептол |
| № | крок 2015 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Під час відпуску доксицикліну провізор порадив пацієнту утриматися від вживання молочних продуктів. Провізор дав таку рекомендацію, оскільки молочні продукти: |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Сповільнюють всмоктування антибіотика |
| B | Збільшують токсичність антибіотика |
| C | Збільшують ризик дисбактеріозу |
| D | Погіршують процес травлення їжі |
| E | Не засвоюються при прийомі антибіотика |
| № | крок 2015 |
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | У хворого 27-ми років при лікуванні ангіни препаратами амінопеніцилінів розвинулась алергічна реакція. З якої групи доцільно обрати антибіотик для лікування цього хворого, щоб зменшити імовірність розвитку алергічної реакції? |
| Правильна відповідь | Макроліди |
| B | Напівсинтетичні пеніциліни |
| C | Цефалоспорини |
| D | міпенеми |
| E | Захищені амінопеніциліни |
| № | крок 2015 |
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | Хлопчику 8-ми років з приводу пневмонії був призначений антибіотик. Після лікування він втратив слух. Яка група антибіотиків могла викликати дане ускладнення? |
| Правильна відповідь | Аміноглікозиди |
| B | Цефалоспорини |
| C | Пеніциліни природні |
| D | Макроліди |
| E | Пеніциліни напівсинтетичні |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Вагітна жінка захворіла на пневмонію тяжкого перебігу. Який з названих антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити? |
| Правильна відповідь | Цефотаксим |
| B | Гентаміцину сульфат |
| C | Тетрацикліну гідрохлорид |

| | |
|---------------------|--|
| D | Офлоксацин |
| E | Бісептол |
| № | крок 2014, 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИВОВІРУСНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | На лікарській конференції запрошений клінічний фармацевт проінформував про противірусний препарат ацикловір. Який механізм його дії? |
| Правильна відповідь | Пригнічує синтез нуклеїнових кислот |
| B | Блокує синтез клітинної стінки |
| C | Підвищує проникність клітинної мембрани |
| D | Виявляє антагонізм з ПАБК |
| E | Пригнічує синтез білків |
| № | крок 2014 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Під час відпуску доксицикліну провізор порадив пацієнту утриматися від вживання молочних продуктів. Чому він дав таку рекомендацію? |
| Правильна відповідь | Сповільнюється всмоктування антибіотика |
| B | Зростає токсичність антибіотика |
| C | Збільшується ризик дизбактеріозу |
| D | Порушується процес травлення їжі |
| E | Не засвоюються молочні продукти |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | У вагітної жінки винила гостра стрептококова пневмонія. Який з наведених антибактеріальних засобів можна призначати в період вагітності? |
| Правильна відповідь | Бензилпеніциліну натрієва сіль |
| B | Гентаміцин |
| C | Стрептоміцин |
| D | Тетрациклін |
| E | Ципрофлоксацин |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | Назвіть препарат з групи тетрациклінів, який призначили хворому для лікування бронхіту: |
| Правильна відповідь | Доксицикліну гідрохлорид |
| B | Бензилпеніциліну натрієва сіль |
| C | Ацикловір |
| D | Ізоніазид |
| E | Хінгамін |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Який антибіотик є препаратом вибору для лікування сифілісу? |
| Правильна відповідь | Бензилпеніциліну натрієва сіль |
| B | Лінкоміцину гідрохлорид |
| C | Леворину натрієва сіль |
| D | Стрептоміцину сульфат |
| E | Поліміксину М сульфат |
| № | крок 2013 |
| Тема | ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ. СПЕКТРИ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ |
| Текст завдання | Який препарат синтетичного походження з групи гідразидів призначають при туберкульозі легень? |
| Правильна відповідь | Ізоніазид |
| B | Рифампіцин |
| C | Ацикловір |
| D | Метронідазол |
| E | Доксицикліну гідрохлорид |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Вагітна (12 тижнів) госпіталізована у лікарню з симптомами гострого циститу. Який з перерахованих антибіотиків можна рекомендувати в даному випадку? |
| Правильна відповідь | Амоксицилін |
| B | Ципрофлоксацин |
| C | Гентаміцин |
| D | Метронідазол |
| E | Тетрациклін |

| | |
|---------------------|--|
| № | крок 2012, 2011, 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду? |
| Правильна відповідь | Бензилпеніцилін |
| B | Гентаміцин |
| C | Сульфален |
| D | Левоміцетин |
| E | Офлоксацин |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | При лікуванні якого з наведених захворювань застосування бензатин бензилпеніциліну є правильним? |
| Правильна відповідь | Сифіліс |
| B | Кишкова інфекція |
| C | Пневмонія |
| D | Ангіна |
| E | Фурункульоз |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Хворій у I триместрі вагітності встановлено діагноз гострого пієлонефриту. Який антибіотик є препаратом вибору для лікування даної пацієнтки? |
| Правильна відповідь | Амоксицилін |
| B | Норфлораксацин |
| C | Гентаміцин |
| D | Хлорамфенікол |
| E | Амікацин |
| № | крок 2012, 2011 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ НІТРОФУРАНІВ |
| Текст завдання | Для лікування інфекції сечовидільних шляхів лікар-інтерн призначив хворому препарат з групи нітрофуранів - ніфуроксазид. Лікарем допущена помилка, оскільки препарат: |
| Правильна відповідь | Не всмоктується з травного каналу |

| | |
|---------------------|---|
| В | Виводиться з сечею в неактивному стані |
| С | Має нефротоксичний ефект |
| D | Має бактеріостатичний ефект |
| Е | Повільно виводиться з організму |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Пацієнтці 20-ти років призначили біцилінопрофілактику ревматизму. Вкажіть періодичність введення біциліну-5: |
| Правильна відповідь | 1 раз на 3 тижні |
| В | 1 раз на тиждень |
| С | 1 раз на 3 дні |
| D | 1 раз на місяць |
| Е | 1 раз на день |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИВОВІРУСНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | В аптеку звернулась жінка 35-ти років з метою придбання препарату для профілактики грипу. Який з перерахованих лікарських засобів можна їй порекомендувати? |
| Правильна відповідь | Ремантадин |
| В | Ацикловір |
| С | Рибавірин |
| D | Ганцикловір |
| Е | Ламівудин |
| № | крок 2011, 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Препаратом вибору для терапії гострого пієлонефриту у вагітної жінки у I триместрі є: |
| Правильна відповідь | Амоксицилін |
| В | Норфлуксацин |
| С | Бісептол |
| D | Гентаміцин |
| Е | Хлорамфенікол |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИВОВІРУСНИХ ЛЗ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Із запропонованих хіміотерапевтичних засобів оберіть препарат для лікування хворого, що страждає на простий герпес: |
| Правильна відповідь | Ацикловір |
| B | Рифампіцин |
| C | Доксицикліну гідрохлорид |
| D | Хінгамін |
| E | Метронідазол |
| № | крок 2010 |
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | Дитина 6-ти років захворіла на пневмонію, з приводу якої був призначений антибіотик. Після лікування дитина втратила слух. Яка група антибіотиків могла викликати це ускладнення? |
| Правильна відповідь | Аміноглікозиди |
| B | Цефалоспорини |
| C | Макроліди |
| D | Пеніциліни природні |
| E | Пеніциліни напівсинтетичні |
| № | крок 2010, 2009 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Оберіть оптимальний антибактеріальний препарат для лікування мікоплазмової пневмонії: |
| Правильна відповідь | Роваміцин |
| B | Гентаміцин |
| C | Пеніцилін |
| D | Ампіцилін |
| E | Амоксиклав |
| № | крок 2010 |
| Тема | ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ. СПЕКТРИ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ |
| Текст завдання | Який з антисептичних препаратів свою бактерицидну дію проявляє за рахунок утворення атомарного кисню? |
| Правильна відповідь | Калію перманганат |
| B | Хлорамін |
| C | Фурацилін |
| D | Етоній |

| | |
|---------------------|---|
| Е | Срібла нітрат |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | У хворої 26-ти років діагностовано позагоспітальну пневмонію, спричинену мікоплазмою. Виберіть необхідний протимікробний лікарський засіб для лікування хворої: |
| Правильна відповідь | Роваміцин |
| В | Амоксицилін |
| С | Гентаміцин |
| Д | Бензілпеніцилін |
| Е | Амоксиклав |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ |
| Текст завдання | Який з вказаних антибактеріальних препаратів НЕ ДОЦІЛЬНО призначати хворому на цукровий діабет II типу, який отримує глібенкламід? |
| Правильна відповідь | Бісептол |
| В | Мідекаміцин |
| С | Гентаміцин |
| Д | Бензилпеніцилін |
| Е | Доксициклін |
| № | крок 2010 |
| Тема | ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ. СПЕКТРИ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ |
| Текст завдання | Бензилпеніциліну натрієву сіль НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ перорально, оскільки цей препарат: |
| Правильна відповідь | Руйнується НСІ шлунка |
| В | Погано всмоктується в кишечнику |
| С | Подразнює слизову оболонку шлунка |
| Д | Зменшує утворення НСІ шлунка |
| Е | Руйнується пеніциліназою |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Хворому на пневмонію середньоважкого перебігу лікар призначив цефтріаксон 1 раз на добу. Призначення препарату 1 раз на добу пов'язане з тим, що препарат: |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Повільно виводиться з організму |
| B | Має бактерицидний ефект |
| C | Має широкий спектр дії |
| D | Здатний накопичуватись у легенях |
| E | Погано всмоктується з місця введення |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ |
| Текст завдання | В аптеку для реалізації надійшов сульфаніламідний препарат бісептол. Які хімічні сполуки є основними складовими частинами цього препарату? |
| Правильна відповідь | Сульфаметоксазол, триметоприм |
| B | Сульфазин, салазодиметоксин |
| C | Сульгін, норсульфазол |
| D | Фталазол, сульфадимезин |
| E | Уросульфан, сульфапіридазин |
| № | крок 2010, 2008 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ |
| Текст завдання | Хворому, що знаходиться в інфекційному відділенні з приводу дизентерії, призначили фталазол. Чим пояснити, що фталазол використовують тільки для лікування кишкових інфекцій? |
| Правильна відповідь | Препарат не всмоктується із ШКТ |
| B | Високий ступінь реабсорбції в нирках |
| C | Повільно виводиться з організму |
| D | Швидко всмоктується в ШКТ |
| E | Швидко виводиться в незміненому вигляді |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ НІТРОІМІДАЗОЛІВ |
| Текст завдання | У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки, легень. Який препарат слід призначити? |
| Правильна відповідь | Метронідазол |
| B | Хініфон |
| C | Тетрациклін |
| D | Хінгамін |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Фталазол |
| № | крок 2009 |
| Тема | ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ. СПЕКТРИ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ |
| Текст завдання | Виберіть антисептик із групи галогеновмісних сполук, який можна покласти до аптечки для дитини, що збирається у літній табір: |
| Правильна відповідь | Розчин йоду спиртовий |
| В | Розчин діамантового зеленого |
| С | Розчин сульфату міді |
| Д | Розчин метиленового синього |
| Е | Розчин формальдегіду |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛІЗ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ ЦНС |
| Текст завдання | Хворому, який страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання? |
| Правильна відповідь | Анксиолітичний |
| В | Протиаритмічний |
| С | Протизапальний |
| Д | Гіпотензивний |
| Е | Антиангінальний |
| № | крок 2009 |
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | Хвора 25-ти років впродовж 7-ми днів отримувала антибіотикотерапію, яка ускладнилась розвитком дисбактеріозу кишечника. Препарат із якої групи лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення? |
| Правильна відповідь | Пробіотики |
| В | Спазмолітики |
| С | Жовчогінні |
| Д | Антациди |
| Е | Адаптогени |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ НІТРОФУРАНІВ |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | Для лікування інфекції сечовидільних шляхів лікар-інтерн призначив хворому препарат з групи нітрофуранів - ніфуроксазид. Лікарем допущена помилка, оскільки препарат: |
| Правильна відповідь | Не всмоктується з травного каналу |
| B | Виводиться з сечею в неактивному стані |
| C | Має нефротоксичний ефект |
| D | Має бактеріостатичний ефект |
| E | Повільно виводиться з організму |
| № | крок 2008, 2007 |
| Тема | ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ. СПЕКТРИ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ |
| Текст завдання | Проконсультуйте медичну сестру, що тільки розпочинає професійну діяльність, який шлях введення НЕ є характерним для бензилпеніциліну натрієвої солі: |
| Правильна відповідь | Пероральний |
| B | Внутрішньовенний |
| C | Внутрішньом'язовий |
| D | У спинномозковий канал |
| E | У зовнішній слуховий прохід |
| № | крок 2008, 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ |
| Текст завдання | Який з перерахованих антибактеріальних препаратів нераціонально призначати хворому 56-ти років з цукровим діабетом II типу, який отримує глібенкламід? |
| Правильна відповідь | Бісептол |
| B | Мідекаміцин |
| C | Гентаміцин |
| D | Бензилпеніцилін |
| E | Доксициклін |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | У хворі 36-ти років виявлено атипову позагоспітальну пневмонію, яка викликана хламідійною інфекцією. Який антибактеріальний засіб доцільно рекомендувати в даному випадку? |
| Правильна відповідь | Рокситроміцин |
| B | Ампіцилін |

| | |
|---------------------|---|
| C | Пеніцилін |
| D | Цефуроксим |
| E | Ванкоміцин |
| № | крок 2007 |
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | У хворого похилого віку діагностовано госпітальну пневмонію. Лікується гентаміцином. Яка побічна дія найбільш часто зустрічається при використанні антибіотиків цієї групи? |
| Правильна відповідь | Ототоксична дія |
| B | Гематотоксична дія |
| C | Псевдомембранозний коліт |
| D | Ураження печінки |
| E | Тромбофлебіт |
| № | крок 2007 |
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |
| Текст завдання | У хворого 30-ти років розвинувся гострий пієлонефрит. Який з наведених препаратів має нефротоксичну дію? |
| Правильна відповідь | Гентаміцин |
| B | Еритроміцин |
| C | Ампіцилін |
| D | Роваміцин |
| E | Пеніцилін |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ПРОТИВОВІРУСНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У пацієнта після переохолодження на нижній губі з'явилися герпетичні висипання. Який препарат можна порекомендувати? |
| Правильна відповідь | Ацикловір |
| B | Ітраконазол |
| C | Амоксицилін |
| D | Преднізолон |
| E | Азидотимідин |
| № | крок 2007 |
| Тема | УСКЛАДНЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Під час відпуску в аптеці антибактеріальних препаратів для лікування позашпитальної пневмонії, дайте додаткові рекомендації хворому з приводу профілактики у нього можливого кишкового дисбактеріозу: |
| Правильна відповідь | Лінекс |
| B | Тавегіл |
| C | Амброксол |
| D | Карсіл |
| E | Котримоксазол |
| № | крок 2017, 2016, 2015 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворий, яка страждає на бронхіальну астму, встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? |
| Правильна відповідь | Анаприлін |
| B | Каптоприл |
| C | Амлодипін |
| D | Гіпотіазид |
| E | Верапаміл |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ СЕЧОГІННИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого, який приймає фуросемід впродовж тривалого часу, спостерігається зменшення набряків, посилення діурезу, однак при цьому з'явилась слабкість у м'язах, втрата апетиту, болі в серці. Чим можна пояснити розвиток названих симптомів? |
| Правильна відповідь | Гіпокаліємія |
| B | Гіпермагніємія |
| C | Гіпокальціємія |
| D | Гіперкальціємія |
| E | Гіперкаліємія |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИАНГІНАЛЬНИХ ЛЗ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Яка побічна дія часто спостерігається у хворих на стенокардію, які приймають анаприлін? |
| Правильна відповідь | Брадикардія |
| B | Тахікардія |

| | |
|---------------------|--|
| С | Пронос |
| D | Закреп |
| Е | Здуття живота |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У медикаментозному лікуванні хворого 63-х років, який має серцево-судинну патологію, використовується еналаприл. До якої групи належить цей препарат? |
| Правильна відповідь | Інгібітор АПФ |
| В | β -блокатор |
| С | α -блокатор |
| D | Сечогінний препарат |
| Е | Антагоніст кальцію |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛЗ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому 45-ти років з діагнозом артеріальної гіпертензії призначено в комплексній терапії еналаприл, амлодипін, гідрохлортіазид, аторвастатин, ацетилсаліцилову кислоту. На 5 добу лікування з'явилися набряки нижніх кінцівок. Який препарат міг спричинити такий побічний ефект? |
| Правильна відповідь | Амлодипін |
| В | Еналаприл |
| С | Гідрохлортіазид |
| D | Аторвастатин |
| Е | Ацетилсаліцилова кислота |
| № | крок 2016, 2015, 2012, 2011 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА |
| Текст завдання | Який лікарський засіб застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії? |
| Правильна відповідь | Альтеплаза |
| В | Ацетилсаліцилова кислота |
| С | Гепарин |
| D | Пентоксифілін |
| Е | Фраксипарин |
| № | крок 2016, 2011, 2010 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому? |
| Правильна відповідь | Доксазозин |
| B | Еналаприл |
| C | Пропранолол |
| D | Дилтіазем |
| E | Лозартан |
| № | крок 2016 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Найбільший нефропротекторний вплив у хворих на цукровий діабет II типу мають: |
| Правильна відповідь | Блокатори рецепторів ангіотензину II |
| B | Антагоністи кальцію |
| C | Діуретики |
| D | β -адреноблокатори |
| E | Стимулятори імідазолінових рецепторів |
| № | крок 2016 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПРИСТУПІВ СТЕНОКАРДІЇ |
| Текст завдання | У хворого в анамнезі ІХС, стенокардія напруги. Під час фізичного навантаження з'явилися стискаючі пекучі болі за грудниною з іррадіацією в ліву руку. З чого необхідно почати надання невідкладної допомоги? |
| Правильна відповідь | Таблетки нітрогліцерину під язик |
| B | Введення анальгіну в/м |
| C | Введення димедролу в/м |
| D | Введення промедолу в/м |
| E | Подача зволоженого кисню |
| № | крок 2016 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Яка група гіпотензивних препаратів протипоказана хворим на гіпертонічну хворобу з гіперурікемією? |
| Правильна відповідь | Тіазидні діуретики |
| B | α -адреноблокатори |
| C | Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту |

| | |
|---------------------|--|
| D | Антагоністи кальцію |
| E | β-адреноблокатори |
| № | крок 2016 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТАЦИДІВ |
| Текст завдання | Про який найбільш частий побічний ефект необхідно інформувати пацієнтів при відпуску антацидних засобів на основі сполук алюмінію? |
| Правильна відповідь | Закреп |
| B | Діарея |
| C | Печія |
| D | Дисбактеріоз |
| E | Утруднення сечовиділення |
| № | крок 2015, 2014 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Яка з вказаних фармакологічних груп препаратів антигіпертензивної дії протипоказана для хворих з бронхіальною астмою? |
| Правильна відповідь | β-адреноблокатори |
| B | Інгібітори АПФ |
| C | Антагоністи кальцію |
| D | Блокатори ангіотензинових рецепторів |
| E | Діуретики |
| № | крок 2015, 2011, 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАГРЕГАНТІВ |
| Текст завдання | До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти як антиагреганта. Яку добову дозу у грамах слід рекомендувати для постійного прийому? |
| Правильна відповідь | 0,1-0,3 |
| B | 0,5-1,0 |
| C | 1,0-2,0 |
| D | 2,0-3,0 |
| E | Більше 4,0 |
| № | крок 2015, 2013 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Пацієнтку 49-ти років турбують періодичний стискаючий біль голови в потиличній ділянці, запаморочення, підвищення артеріального тиску. В анамнезі цукровий діабет II типу. Який діуретичний засіб НЕ ВПЛИВАЄ на рівень глюкози крові? |
| Правильна відповідь | Індапамід |
| B | Фросемід |
| C | Гіпотіазид |
| D | Етакринова кислота |
| E | Сечовина |
| № | крок 2015 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому 35-ти років з приводу тахікардії був призначений пропранолол. Яка з нижче перерахованих побічних реакцій може виникнути при вживанні β -адреноблокатору? |
| Правильна відповідь | Бронхоспазм |
| B | Лікарська залежність |
| C | Кумуляція |
| D | Підвищення артеріального тиску |
| E | Закрепи |
| № | крок 2015 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому з артеріальною гіпертензією призначено інгібітори АПФ. Про який можливий побічний ефект необхідно попередити хворого? |
| Правильна відповідь | Кашель |
| B | Слиноотеча |
| C | Нетримання сечі |
| D | Пронози |
| E | Набряки нижніх кінцівок |
| № | крок 2015 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛЗ |
| Текст завдання | Чоловік 59-ти років тривалий час застосовує фуросемід для лікування серцевої недостатності. Який лікарський засіб для профілактики гіпокаліємії необхідно застосувати в даному випадку? |
| Правильна відповідь | Панангін |

| | |
|---------------------|--|
| B | Тіотриазолін |
| C | Ацетилсаліцилова кислота |
| D | Триметазидин |
| E | Еналаприл |
| № | крок 2015 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПРИСТУПІВ СТЕНОКАРДІЇ |
| Текст завдання | Жінка 53-х років хворіє на ішемічну хворобу серця, стенокардію. Який лікарський засіб слід використовувати для зняття нападу стенокардії? |
| Правильна відповідь | Нітрогліцерин |
| B | Дротаверину гідрохлорид |
| C | Пропранолол |
| D | Дипіридамол |
| E | Ацетилсаліцилова кислота |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАНГІНАЛЬНИХ ТА АНТИШЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого на ІХС через 6 місяців лікування розвинулась толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський засіб з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку? |
| Правильна відповідь | Молсидомін |
| B | Ніфедипін |
| C | Празозин |
| D | Верапаміл |
| E | Метопролол |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАНГІНАЛЬНИХ ТА АНТИШЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Жінка 48-ми років поступила у кардіологічне відділення з діагнозом: ІСХ, стенокардія. Напади виникають 1-2 рази на день. Який препарат найбільш доцільно рекомендувати для лікування? |
| Правильна відповідь | Ізосорбїду динітрат |
| B | Еуфілін |
| C | Но-шпа |
| D | Папаверин |
| E | Дипіридамол |

| | |
|---------------------|--|
| № | крок 2014 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату? |
| Правильна відповідь | A. Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту |
| B | B. Блокада β -адренорецепторів |
| C | C. Блокада α -адренорецепторів |
| D | D. Блокада рецепторів ангіотензину II |
| E | E. Блокада повільних кальцієвих каналів |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ЛЗ, ЯКІ ПРИГНІЧУЮТЬ ЦНС |
| Текст завдання | Жінка, яка страждає на невроз, погано спить. Якому з перерахованих засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння? |
| Правильна відповідь | Нітразепам |
| B | Фенобарбітал |
| C | Етамінал-натрій |
| D | Бромізовал |
| E | Настоянка валеріани |
| № | крок 2014 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛЗ |
| Текст завдання | З якою групою діуретиків НЕ МОЖНА одночасно призначати гіпотензивні засоби, що відносяться до групи інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту? |
| Правильна відповідь | Калійзберігаючі |
| B | Тіазидні |
| C | Петльові |
| D | Ксантини |
| E | Осмотичні |
| № | крок 2014 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | До лікаря звернувся хворий 70-ти років з приводу підвищеного артеріального тиску. В анамнезі: доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому? |
| Правильна відповідь | Доксазозин |

| | |
|---------------------|--|
| В | Еналаприл |
| С | Пропранолол |
| Д | Дилтіазем |
| Е | Лозартан |
| № | крок 2014, 2013, 2012, 2009 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПОЗИТИВНИХ КАРДІОТОНІКІВ |
| Текст завдання | Хворому з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату? |
| Правильна відповідь | Стимуляція β_1 -адренорецепторів |
| В | Стимуляція α_1 -адренорецепторів |
| С | Блокада K^+ -, Na^+ -АТФ-ази |
| Д | Пригнічення активності фосфодіестерази |
| Е | Стимуляція М -холінорецепторів |
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАГРЕГАНТІВ |
| Текст завдання | Лікар прописав хворому антиагрегантний засіб, який впливає на утворення тромбоксану в тромбоцитах. Вкажіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Кислота ацетилсаліцилова |
| В | Вікасол |
| С | Адреналіну гідрохлорид |
| Д | Кальцію хлорид |
| Е | Преднізолон |
| № | крок 2014 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Лікар призначив пацієнту лікарський препарат метопролол, який допоміг зменшити підвищений артеріальний тиск. До якої фармакологічної групи належить цей засіб? |
| Правильна відповідь | β -адреноблокатори |
| В | α -адреноблокатори |
| С | М-холінолітики |
| Д | Н-холінолітики |
| Е | Симпатолітики |

| | |
|---------------------|---|
| № | крок 2014 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СЕРЦЕВИХ ГЛІКОЗИДІВ |
| Текст завдання | Хворому із гострою серцевою недостатністю ввели коргліккон. З якою дією цього препарату пов'язують покращення стану пацієнта? |
| Правильна відповідь | Збільшення сили серцевих скорочень |
| В | Зниження сили серцевих скорочень |
| С | Розширення коронарних судин |
| D | Підвищення частоти серцевих скорочень |
| Е | Зниження потреби міокарда в кисні |
| № | крок 2014, 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ГІПОЛІПІДЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Яку вірну відповідь дав клінічний провізор-інтерн на лікарняній п'ятихвилинці щодо механізму протиатеросклеротичної дії клофібрату (фенофібрату)? |
| Правильна відповідь | Знижує рівень тригліцеридів |
| В | Пригнічує всмоктування холестерину |
| С | Зв'язує жовчні кислоти в тонкій кишці |
| D | Має антиоксидантну дію |
| Е | Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини |
| № | крок 2013, 2010, 2009 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАНГІНАЛЬНИХ ТА АНТИШЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого на ІХС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський препарат з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку? |
| Правильна відповідь | Молсидомін |
| В | Ніфедипін |
| С | Празозин |
| D | Верапаміл |
| Е | Метопролол |
| № | крок 2013 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | При артеріальній гіпертензії прийом лозартану протипоказаний при наступних станах: |
| Правильна відповідь | Вагітність |

| | |
|---------------------|--|
| В | Гіперглікемія |
| С | Сечокислий діатез |
| D | Гіперліпідемія |
| Е | Гіпокаліємія |
| № | крок 2013 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Який з наведених антигіпертензивних препаратів має калійзберігаючу дію? |
| Правильна відповідь | Триамтерен |
| В | Фуросемід |
| С | Празозин |
| D | Метопролол |
| Е | Дилтіазем |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАНГІНАЛЬНИХ ТА АНТИШЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому 56-ти років, який хворіє на ІХС, було призначено метопролол. Який механізм дії його при ІХС? |
| Правильна відповідь | Зменшує потребу міокарда в кисні |
| В | Збільшує потребу міокарда в кисні |
| С | Розширює коронарні судини |
| D | Зменшує тонус периферичних судин |
| Е | Звужує коронарні судини |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИКОАГУЛЯНТІВ |
| Текст завдання | Хворому на інфаркт міокарду вводили внутрішньовенно антикоагулянт прямої дії: |
| Правильна відповідь | Гепарин |
| В | Неодикумарин |
| С | Вікасол |
| D | Тромбін |
| Е | Кальцію глюконат |
| № | крок 2013 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПРИСТУПІВ СТЕНОКАРДІЇ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Пацієнту 55-ти років з гострим нападом стенокардії для його швидкого усунення було призначено препарат з групи органічних нітратів. Визначте цей препарат: |
| Правильна відповідь | Нітрогліцерин |
| B | Октадин |
| C | Ніфедипін |
| D | Празозин |
| E | Лабеталол |
| № | крок 2012 |
| Тема | ПРИЦИПИ ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА |
| Текст завдання | При інфаркті міокарду була проведена нейролептаналгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом? |
| Правильна відповідь | Дроперидол |
| B | Етаперазин |
| C | Левомепромазин |
| D | Клозапін |
| E | Сульпірид |
| № | крок 2012 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Чим обумовлена поява сухого кашлю у хворої, яка тривалий час для лікування гіпертонічної хвороби приймала лізиноприл? |
| Правильна відповідь | Підвищенням концентрації брадикініну |
| B | Виснаженням запасів норадреналіну |
| C | Накопиченням ангіотензину II |
| D | Пригніченням ангіотензинових рецепторів |
| E | Зниженням концентрації реніну |
| № | крок 2011 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск у хворого нормалізувався, однак його почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію? |
| Правильна відповідь | Еналаприлу малеат |

| | |
|---------------------|---|
| В | Анаприлін |
| С | Клофелін |
| D | Фуросемід |
| Е | Ніфедипін |
| № | крок 2011 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПРИСТУПІВ СТЕНОКАРДІЇ |
| Текст завдання | У хворого 60-ти років після емоційного перенапруження з'явився біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку. Назвіть лікарський засіб, який тамає больовий синдром у даному випадку: |
| Правильна відповідь | Нітрогліцерин |
| В | Ніфедипин |
| С | Дилтіазем |
| D | Пропранолол |
| Е | Метопролол |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ГІПОЛІПІДЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Вкажіть який цей препарат: |
| Правильна відповідь | Фенофібрат |
| В | Аскорбінова кислота |
| С | Пірацетам |
| D | Дексаметазон |
| Е | Бутадіон |
| № | крок 2011 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Який препарат вибору при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію та аденому передміхурової залози? |
| Правильна відповідь | Доксазозин |
| В | Еналаприл |
| С | Каптоприл |
| D | Верошпірон |
| Е | Верапаміл |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАНГІНАЛЬНИХ ТА АНТИШЕМІЧНИХ ЛЗ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Після довготривалого прийому ізосорбїду для профілактики нападів стенокардії хворий відмітив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало місце у хворого? |
| Правильна відповідь | Толерантність |
| B | Кумуляція |
| C | Фізична залежність |
| D | Алергія |
| E | Потенціювання |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАГРЕГАНТІВ |
| Текст завдання | Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів. Що це за лікарський засіб? |
| Правильна відповідь | Кислота ацетилсаліцилова |
| B | Ібупрофен |
| C | Піроксикам |
| D | Кислота мефенамова |
| E | Індометацин |
| № | крок 2011 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворій, яка страждає на бронхіальну астму встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? |
| Правильна відповідь | Анаприлін |
| B | Каптоприл |
| C | Амлодипін |
| D | Гіпотіазид |
| E | Верапаміл |
| № | крок 2011 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено обструктивний бронхіт. Який із зазначених гіпотензивних препаратів йому протипоказаний? |
| Правильна відповідь | Анаприлін |
| B | Гіпотіазид |

| | |
|---------------------|---|
| С | Допегіт |
| D | Раунатин |
| Е | Клофелін |
| № | крок 2010 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який антигіпертензивний препарат вона використовувала? |
| Правильна відповідь | Лізиноприл |
| В | Атенолол |
| С | Ніфедипін |
| D | Фуросемід |
| Е | Дихлотіазид |
| № | крок 2010 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Яка з вказаних фармакологічних груп препаратів антигіпертензивної дії протипоказана хворим з бронхіальною астмою? |
| Правильна відповідь | β -адреноблокатори |
| В | Інгібітори АПФ |
| С | Блокатори кальцієвих каналів |
| D | Блокатори ангіотензинових рецепторів |
| Е | Діуретики |
| № | крок 2010, 2007 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПРИСТУПІВ СТЕНОКАРДІЇ |
| Текст завдання | Для усунення нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату? |
| Правильна відповідь | Сублінгвальний |
| В | Пероральний |
| С | Ректальний |
| D | Інгаляційний |
| Е | Підшкірний |
| № | крок 2010 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ |
| Текст завдання | Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату? |
| Правильна відповідь | Блокада β -адренорецепторів |
| В | Блокада α -адренорецепторів |
| С | Непряма адреноміметична дія |
| D | Спазмолітична дія |
| Е | Блокада ангіотензинових рецепторів |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИКОАГУЛЯНТІВ |
| Текст завдання | Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Гепарин |
| В | Фенілін |
| С | Синкумар |
| D | Неодикумарин |
| Е | Вікасол |
| № | крок 2010, 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ |
| Текст завдання | Хворий 24-х років страждає на цукровий діабет I типу впродовж 8-ми років. На ґрунті діабетичної нефропатії розвинулася симптоматична артеріальна гіпертензія. Який з наведених препаратів показаний для тривалої терапії? |
| Правильна відповідь | Еналаприл |
| В | Пропранолол |
| С | Клофелін |
| D | Дибазол |
| Е | Дихлотиазид |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАГРЕГАНТІВ |
| Текст завдання | Хвора 52-х років перенесла інфаркт міокарда і виписана додому після стаціонарного лікування. Яку добову дозу ацетилсаліцилової кислоти їй необхідно призначити з метою профілактики тромбоутворення? |
| Правильна відповідь | 100 мг |
| В | 500 мг |

| | |
|---------------------|--|
| С | 1000 мг |
| D | 200 мг |
| E | 50 мг |
| № | крок 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворої 52-х років підвищений артеріальний тиск протягом місяця. З анамнезу відомо, що останні 5 років хворіє на бронхіальну астму. Яка група гіпотензивних препаратів НЕБАЖАНА для хворої? |
| Правильна відповідь | Блокатори β -адренорецепторів |
| B | Блокатори кальцієвих каналів |
| С | Транквілізатори |
| D | Блокатори ангіотензинових рецепторів |
| E | Діуретики |
| № | крок 2009, 2008, 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СЕЧОГІННИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Для лікування гіпертонічної хвороби призначають діуретики. Який діуретик НЕ ВИМАГАЄ поєднання з препаратами калію? |
| Правильна відповідь | Триамтерен |
| B | Клопамід |
| С | Дихлотіазид |
| D | Фуросемід |
| E | Етакринова кислота |
| № | крок 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАНГІНАЛЬНИХ ТА АНТИШЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Жінка 48-м років надійшла до кардіологічного відділення з діагнозом: ІХС, стенокардія. Напади виникають 1-2 рази на день. Який препарат найбільш доцільно рекомендувати для лікування? |
| Правильна відповідь | Ізосорбїду динітрат |
| B | Еуфілін |
| С | Но-шпа |
| D | Папаверин |
| E | Дипіридамо́л |
| № | крок 2008 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ПРИСТУПІВ СТЕНОКАРДІЇ |
| Текст завдання | Хвору 53-х років після фізичного навантаження почав турбувати біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку. Який препарат слід призначити для усунення больового нападу? |
| Правильна відповідь | Нітрогліцерин |
| В | Ізосорбїду 5-мононітрат |
| С | Ніфедипін |
| D | Метопролол |
| Е | Дилтіазем |
| № | крок 2008 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Після тижневої фармакотерапії артеріальної гіпертензії лізиноприлом в дозі 10 мг 2 рази на добу у хворого з'явилися періодично виникаючі напади сухого кашлю. Чим це може бути зумовлене? |
| Правильна відповідь | Накопичення в крові залишку брадикініну |
| В | Підвищення тонуусу кашльового центру |
| С | Загострення супутньої патології |
| D | Пригнічення синтезу альдостерону |
| Е | Зменшення вмісту в крові адреналіну |
| № | крок 2008, 2007 |
| Тема | ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТЕНЗИВНИХ КРИЗІВ |
| Текст завдання | Хвора доставлена до стаціонару із гіпертензивним кризом. Який препарат слід їй призначити для його усунення? |
| Правильна відповідь | Магнію сульфат |
| В | Дигоксин |
| С | Нітрогліцерин |
| D | Спіронолактон |
| Е | Промедол |
| № | крок 2008 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛЗ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю регулярно приймає фуросемід по 40 мг натщесерце 3 рази на тиждень. У зв'язку з позалікарняною пневмонією лікар призначив комбіновану фармакотерапію. Через 3 доби хворий почав втрачати слух. Назвіть лікарський засіб, який при взаємодії з фуросемідом викликає глухоту: |
| Правильна відповідь | Амікацин |

| | |
|---------------------|--|
| В | Лінекс |
| С | Тавегіл |
| Д | Ністатин |
| Е | Розчин йодистого калію |
| № | крок 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАГРЕГАНТІВ |
| Текст завдання | Хворий 59-ти років переніс інфаркт міокарда. Для попередження тромбоутворення призначена ацетилсаліцилова кислота. Визначте раціональну добову дозу: |
| Правильна відповідь | 100 мг |
| В | 500 мг |
| С | 1000 мг |
| Д | 2000 мг |
| Е | 3000 мг |
| № | крок 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАГРЕГАНТІВ |
| Текст завдання | Для лікування атеросклерозу хворий в аптеці придбав гіполіпідемічний препарат з групи фібратів. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Фенофібрат |
| В | Дротаверину гідрохлорид |
| С | Бісакодил |
| Д | Спіронолактон |
| Е | Силібор |
| № | крок 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ |
| Текст завдання | Хворий 50-ти років протягом 20-ти років хворіє на гіпертонічну хворобу з набряками та зменшенням діурезу. Який препарат необхідно призначити хворому для зниження артеріального тиску і усунення набряків? |
| Правильна відповідь | Фуросемід |
| В | Резерпін |
| С | Еналаприл |

| | |
|---------------------|---|
| D | Празозин |
| E | Метилдофа |
| № | крок 2007 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат, який раптово припинив вживати. Після цього стан хворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить ця побічна дія? |
| Правильна відповідь | Синдром відміни |
| B | Кумуляція |
| C | Толерантність |
| D | Сенсибілізація |
| E | Залежність |
| № | крок 2007 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий придбав в аптеці нітрогліцерин. Про який найбільш поширений побічний ефект даного препарату повинен попередити провізор хворого? |
| Правильна відповідь | Головний біль |
| B | Гіпертензія |
| C | Дизурія |
| D | Сухість у роті |
| E | Гіперглікемія |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ |
| Текст завдання | Хворому на гіпертонічну хворобу було призначено лізиноприл. Вкажіть механізм гіпотензивної дії цього препарату: |
| Правильна відповідь | Інгібування ангіотензинперетворюючого ферменту |
| B | Блокування α_1 -адренорецепторів |
| C | Пряма міотропна дія |
| D | Збудження β_2 -адренорецепторів ЦНС |
| E | Блокада кальцієвих каналів |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | У хворого на гіпертонічну хворобу підвищений рівень реніну в плазмі крові. Якій з перерахованих фармакологічних груп треба віддати перевагу для лікування даного хворого? |
| Правильна відповідь | Інгібітори АПФ |
| B | Симпатолітики |
| C | Блокатори кальцієвих каналів |
| D | α -адреноблокатори |
| E | Діуретики |
| № | крок 2007 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | У жінки 50-ти років симптоматична гіпертензія та супутнє хронічне обструктивне захворювання легенів. Приймання якої групи лікарських засобів у хворі буде обмежено? |
| Правильна відповідь | β -адреноблокатори |
| B | Блокатори кальцієвих каналів |
| C | Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту |
| D | Блокатори ангіотензинових рецепторів |
| E | Діуретики |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ СЕРЦЕВИХ ГЛІКОЗИДІВ |
| Текст завдання | Після екстракції зуба в хворого розвинулася гостра серцева недостатність. Який з нижченаведених препаратів доцільно ввести хворому? |
| Правильна відповідь | Корглікон |
| B | Бемегрід |
| C | Етімізол |
| D | Кавінтон |
| E | Пірацетам |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАНГІНАЛЬНИХ ТА АНТИШЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому, який страждає на напади стенокардії, показано застосування нітратів тривалої дії. Вкажіть цей препарат серед перелічених: |
| Правильна відповідь | Ізосорбїду мононітрат |
| B | Діазепам |

| | |
|---------------------|--|
| С | Аміназин |
| D | Леводопа |
| Е | Прозерин |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ АНТИАНГІНАЛЬНИХ ТА АНТИШЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому з серцевою недостатністю, пов'язаною з тривалим порушенням серцевої діяльності і станом коронарних судин, можна рекомендувати препарат з наступної рослинної сировини: |
| Правильна відповідь | Плоди глоду |
| В | Квітки календули |
| С | Корені женьшеню |
| D | Корені аралії |
| Е | Корені барбарису |
| № | крок 2017 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ, КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИКОАГУЛЯНТІВ |
| Текст завдання | У хворої на варикозну хворобу нижніх кінцівок спостерігаються ознаки передозування гепарину. Який препарат доцільно використати як антидот? |
| Правильна відповідь | Протаміну сульфат |
| В | Аскорбінова кислота |
| С | Дипіридамол |
| D | Пентоксифілін |
| Е | Ацетилсаліцилова кислота |
| № | крок 2017 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛЗ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнт, що отримує непрямий антикоагулянт варфарин, у зв'язку з підвищенням температури тіла застосував ацетилсаліцилову кислоту. Така комбінація є небезпечною, бо підвищується ризик: |
| Правильна відповідь | Кровотечі |
| В | Остеопорозу |
| С | Нейротоксичності |
| D | Кардіотоксичності |
| Е | Дизбактеріозу |
| № | крок 2017 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛЗ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | В аптеку звернувся пацієнт зі скаргами, що після застосування антигістамінного засобу у нього виникли сонливість, втома, втрата уваги. Який лікарський засіб міг викликати такі симптоми? |
| Правильна відповідь | Клемастин |
| В | Дезлоратидин |
| С | Лоратадин |
| D | Цитеризин |
| Е | Фексофенадин |
| № | крок 2016, 2010 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Який препарат є специфічним антидотом під час отруєння препаратами заліза? |
| Правильна відповідь | Дефероксамін |
| В | Протаміну сульфат |
| С | Бемегрид |
| D | Атропіну сульфат |
| Е | Пеніциламін |
| № | крок 2016, 2011, 2010 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Хвора 60-ти років страждає на гіпертонічну хворобу II стадії, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення? |
| Правильна відповідь | Пропранолол |
| В | Ніфедипін |
| С | Еуфілін |
| D | Мукалтин |
| Е | Сальбутамол |
| № | крок 2016, 2011 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникли брадикардія, нудота, блювання, погіршення зору. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку? |
| Правильна відповідь | Унітіол |
| В | Тетацин-кальцій |

| | |
|---------------------|--|
| С | Дипіроксам |
| D | Амільнітрил |
| Е | Атропіну сульфат |
| № | крок 2016 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на артеріальну гіпертензію призначили діуретик гіпотіазид по 0,025 двічі на добу в першу половину дня. Через тиждень хворий почав відчувати біль в ділянці серця, м'язову слабкість та тремор кінцівок. Яка побічна дія препарату спостерігається? |
| Правильна відповідь | Гіпокаліємія |
| В | Артеріальна гіпотензія |
| С | Гіперкаліємія |
| D | Гіперкальціємія |
| Е | Гіпомагніємія |
| № | крок 2016 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛЗ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому 74-х років призначено тривалий прийом фуросеміду з метою лікування хронічної серцевої недостатності. Який препарат доцільно призначити йому з метою запобігання гіпокаліємії? |
| Правильна відповідь | Аспаркам |
| В | Триметазидин |
| С | Ніфедипін |
| D | Корвалтаб |
| Е | Веропаміл |
| № | крок 2016 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Який лікарський засіб призначають при передозуванні препаратів заліза? |
| Правильна відповідь | Дисферал |
| В | Вікасол |
| С | Етамзилат |
| D | Налоксон |
| Е | Атропіну сульфат |
| № | крок 2016 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | До лікарні звернулася жінка з дитиною 4-х років, яка випила флакон очних крапель. Через 30 хвилин після цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, хрипота, розширення зіниць, гіпертермія. Який із препаратів міг спричинити описані прояви? |
| Правильна відповідь | Атропін |
| B | Новокаїн |
| C | Мезатон |
| D | Лідокаїн |
| E | Адреналін |
| № | крок 2016 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Сухий кашель, який виникає на тлі прийому лізиноприлу, пов'язаний з: |
| Правильна відповідь | Накопиченням брадикініну |
| B | Зниженням артеріального тиску |
| C | Підвищенням рівня кальцію в крові |
| D | Зменшенням ремодуляції лівого шлуночка |
| E | Нефропротекторною дією |
| № | крок 2015, 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого з артеріальною гіпертензією та хронічним бронхітом раптово виник сухий кашель, задишка; температура тіла не змінилась. Відомо, що хворий приймає каптоприл. Цей феномен можна пояснити збільшенням утворенням: |
| Правильна відповідь | Брадикініну |
| B | Ангіотензину I |
| C | Реніну |
| D | Альдостерону |
| E | Na-уретичного пептиду |
| № | крок 2015 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хвора 25-ти років протягом 7-ми днів отримувала антибіотикотерапію, яка ускладнилася розвитком дисбактеріозу кишечника. Яку з груп лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення? |
| Правильна відповідь | Пробіотики |

| | |
|---------------------|--|
| B | Спазмолітики |
| C | Жовчогінні |
| D | Антациди |
| E | Адаптогени |
| № | крок 2015, 2014, 2013 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Який препарат показаний при передозуванні міорелаксантами деполяризуючого типу дії? |
| Правильна відповідь | Прозерин |
| B | Метопролол |
| C | Налоксон |
| D | Магнію сульфат |
| E | Унітіол |
| № | крок 2015, 2014 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | При виникненні симптомів інтоксикації парацетамолом, як антидот слід використовувати: |
| Правильна відповідь | Ацетилцистеїн |
| B | Глюкозу |
| C | Хлористий натрій |
| D | Фуросемід |
| E | Реополіглюкін |
| № | крок 2015 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на гіпертонічну хворобу в рамках комплексної терапії було призначено діуретичний засіб, що викликав гіпокаліємію. Визначте цей препарат: |
| Правильна відповідь | Гідрохлортіазид |
| B | Амілорид |
| C | Спіронолактон |
| D | Алопуринол |
| E | Тріамтерен |
| № | крок 2015, 2013 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий 70-ти років зі стенокардією прийшов з претензією в аптеку, що йому відпустили засіб, який спричинив сильний розпираючий біль голови, хоча напад стенокардії був усунений. Для якого антиангінального засобу характерний такий побічний ефект? |
| Правильна відповідь | Нітросорбід |
| В | Амлодипін |
| С | Ніфедипін |
| Д | Триметазидин |
| Е | Метопролол |
| № | крок 2015 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Хворий 20 років. Після укусу оси розвинувся набряк Квінке, на тулубі з'явився висип у вигляді пухирів, папул. Невідкладну допомогу треба починати з препарату: |
| Правильна відповідь | Преднізолон |
| В | Пеніцилін |
| С | Свіжозаморожена плазма |
| Д | Реополіглокін |
| Е | Гемодез |
| № | крок 2014 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | При лікуванні еналаприлом можливі наступні побічні ефекти: |
| Правильна відповідь | Кашель |
| В | Слиноотеча |
| С | Гіпокаліємія |
| Д | Закрепи |
| Е | Набряки гомілок |
| № | крок 2014 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Який із наведених препаратів повинен входити в якості антидоту до аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш'яку, ртуті, хрому, вісмуту? |
| Правильна відповідь | Унітіол |

| | |
|---------------------|---|
| В | Адреналін |
| С | Атропіну сульфат |
| D | Морфін |
| Е | Дроперидол |
| № | крок 2014, 2008 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Під час оперативного втручання, яке здійснювалось під місцевою анестезією 0,25% розчином новокаїну, пацієнт зненацька покрився червоними плямами, виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, набряк слизової носа, бронхоспазм. Яка причина цього ускладнення? |
| Правильна відповідь | Алергічна реакція негайного типу |
| В | Алергічна реакція сповільненого типу |
| С | Тахіфілаксія |
| D | Синдром віддачі |
| Е | Синдром відміни |
| № | крок 2014 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на гіпертонічну хворобу у комплексній терапії було призначено діуретичний засіб, що викликав гіпокаліємію. Визначте цей препарат: |
| Правильна відповідь | Гідрохлортіазид |
| В | Амілорид |
| С | Спіронолактон |
| D | Алопуринол |
| Е | Тріамтерен |
| № | крок 2014 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | При застосуванні ацетилсаліцилової кислоти у пацієнта з'явилась кровоточивість слизових оболонок. Таке явище пов'язане з: |
| Правильна відповідь | Гальмуванням синтезу протромбіну |
| В | Збільшенням всмоктування в шлунково-кишковому тракті |
| С | Зменшенням всмоктування в шлунково-кишковому тракті |

| | |
|---------------------|---|
| D | Порушенням зв'язування з білками |
| E | Зміною обсягу розподілу |
| № | крок 2013 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Який препарат являється специфічним антидотом при отруєнні препаратами заліза? |
| Правильна відповідь | Дефероксамін |
| B | Протаміну сульфат |
| C | Бемегрид |
| D | Атропін |
| E | Пеніциламін |
| № | крок 2013, 2010 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує дигоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з наступним препаратом: |
| Правильна відповідь | Панангін |
| B | Глюконат кальцію |
| C | Еуфілін |
| D | Дихлотіазид |
| E | Кальцію хлорид |
| № | крок 2013, 2010, 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищового туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію? |
| Правильна відповідь | Стрептоміцин |
| B | Ізоніазид |
| C | Етамбутол |
| D | Рифампіцин |
| E | Етіонамід |
| № | крок 2013 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Хворий 65-ти років звернувся зі скаргами на нудоту, блювання, загальмованість, появу жовтих кіл перед очима. Приймає щоденно дигоксин 0,25 мг, аспекард 100 мг, метопролол 50 мг. Для якого патологічного стану характерний такий симптомокомплекс? |
| Правильна відповідь | Глікозидна інтоксикація |
| B | Харчове отруєння |
| C | Синдром відміни |
| D | Тахіфілаксія |
| E | Реакція гіперчутливості |
| № | крок 2013 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Назвіть препарат першого вибору при передозуванні наркотичними анальгетиками: |
| Правильна відповідь | Налоксон |
| B | Кофеїн-бензоат натрію |
| C | Діазепам |
| D | Унітіол |
| E | Кальцію хлорид |
| № | крок 2013 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому 35-ти років з приводу тахікардії був призначений пропранолол. Яка з нижче перерахованих побічних реакцій може виникнути при вживанні β -адреноблокатору? |
| Правильна відповідь | Бронхоспазм |
| B | Лікарська залежність |
| C | Кумуляція |
| D | Підвищення артеріального тиску |
| E | Закрепи |
| № | крок 2013, 2012 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Який з наведених діуретичних лікарських засобів НЕ БАЖАНО призначати хворому зі зниженою функцією слуху? |
| Правильна відповідь | Фуросемід |
| B | Спіронолактон |
| C | Клопамід |

| | |
|---------------------|---|
| D | Індапамід |
| E | Хлорталідон |
| № | крок 2013 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | При застосуванні ацетилсаліцилової кислоти у пацієнта з'явилась кровоточивість слизових оболонок. З чим пов'язане таке явище? |
| Правильна відповідь | Гальмування синтезу протромбіну |
| B | Збільшення всмоктування в ШКТ |
| C | Зменшення всмоктування в ШКТ |
| D | Порушення зв'язування з білками |
| E | Зміна обсягу розподілу |
| № | крок 2013 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий, який отримує лікування з приводу гіпертонічної хвороби, скаржиться на покашлювання. При обстеженні пацієнта ніяких змін з боку легень не виявлено. Який з наведених засобів міг викликати кашель? |
| Правильна відповідь | Каптоприл |
| B | Амлодипін |
| C | Гіпотіазид |
| D | Небіволол |
| E | Клофелін |
| № | крок 2012, 2011, 2010 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов'язана із зменшенням активності такого ферменту: |
| Правильна відповідь | Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) |
| B | Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) |
| C | Ліпооксигеназа (ЛОГ) |
| D | Тромбоксансинтетаза |
| E | Простациклінсинтетаза |
| № | крок 2012 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичний біль у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до складу патогенетичної терапії? |
| Правильна відповідь | Атропіну сульфат та дипіроксим |
| В | Тіосульфат натрію та бемеGRID |
| С | Тетацин-кальцій та унітіол |
| D | Налорфіну гідрохлорид та бемеGRID |
| Е | Глюкоза та бемеGRID |
| № | крок 2012, 2011, 2010 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | При проведенні оперативного втручання було застосовано міорелаксант тубокурарину хлорид. Який засібантагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання? |
| Правильна відповідь | Прозерин |
| В | Дитилін |
| С | Цитітон |
| D | Етимізол |
| Е | Бензогексоній |
| № | крок 2012, 2011 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого? |
| Правильна відповідь | Зниження артеріального тиску |
| В | Збудження центральної нервової системи |
| С | Порушення серцевого ритму |
| D | Підвищення внутрішньоочного тиску |
| Е | Алергічні висипи на шкірі |
| № | крок 2012 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Що з наведеного може використати лікар для зупинки кровотечі, обумовленої тривалим застосуванням неодикумарину, як антагоніст? |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Вікасол |
| B | Кислота амінокапронова |
| C | Етамзилат |
| D | Фібриноген |
| E | Кислота аскорбінова |
| № | крок 2012 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | До приймального відділення надійшов хворий з симптомами отруєння ртуттю. Який антидот показаний в даному випадку? |
| Правильна відповідь | Унітіол |
| B | Атропіну сульфат |
| C | Прозерин |
| D | Налоксон |
| E | Кальцію хлорид |
| № | крок 2012 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | В аптеку звернулася жінка зі скаргами на зміну забарвлення сечі на червоне. Який протитуберкульозний препарат спричинив цю зміну? |
| Правильна відповідь | Рифампіцин |
| B | Ізоніазид |
| C | Стрептоміцин |
| D | Доксицикліну гідрохлорид |
| E | Хінгамін |
| № | крок 2012 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на гіпертонічну хворобу у комплексній терапії було призначено діуретичний засіб, що викликав гіпокаліємію. Визначте цей препарат: |
| Правильна відповідь | Гідрохлортіазид |
| B | Амілорид |
| C | Спіронолактон |
| D | Алопуринол |

| | |
|---------------------|---|
| Е | Тріамтерен |
| № | крок 2012 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Після чергової ін'єкції інсуліну в хворого на цукровий діабет стан погіршився: з'явився неспокій, холодний піт, тремор кінцівок, загальна слабкість. Оберіть засіб для невідкладної допомоги: |
| Правильна відповідь | Глюкоза |
| В | Гідрокортизон |
| С | Бутамід |
| Д | Норадреналін |
| Е | Глібутид |
| № | крок 2012 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Оберіть серед ліків, що надійшли до аптеки, ті, при отруєнні якими у якості антидоту застосовується унітіол: |
| Правильна відповідь | Серцеві гікозиди |
| В | Аміноглікозиди |
| С | Атропіну сульфат |
| Д | Сальбугамол |
| Е | Глібенкламід |
| № | крок 2011 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | У хворої 45-ти років, яка впродовж двох тижнів приймає неодикумарин з приводу тромбофлебіту, при черговому обстеженні у крові виявлено зниження вмісту протромбіну, в сечі - мікрогематурію. Який лікарський засіб необхідно застосувати як антагоніст неодикумарину? |
| Правильна відповідь | Вікасол |
| В | Протаміну сульфат |
| С | Натрію цитрат |
| Д | Гепарин |
| Е | Кислота амінокапронова |
| № | крок 2011 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, фотофобію та порушення зору. Об'єктивно: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами белладонни. Який з лікарських засобів доцільно застосувати як антидот? |
| Правильна відповідь | Прозерин |
| B | Ацеклідин |
| C | Пілокарпін |
| D | Армін |
| E | Дипіроксим |
| № | крок 2011, 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Прийом якого препарату може викликати розвиток закрепи в хворого, який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії? |
| Правильна відповідь | Верапаміл |
| B | Фуросемід |
| C | Триметазідін |
| D | Панангін |
| E | Ацетилсаліцилова кислота у малих дозах |
| № | крок 2011 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести як антидот? |
| Правильна відповідь | Налоксон |
| B | Лобеліну гідрохлорид |
| C | Бемегрид |
| D | Атропіну сульфат |
| | Унітіол |
| № | крок 2011 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | У наркологічне відділення надійшов хворий з діагнозом: морфінізм. Лікар відзначив у хворого зниження фармакологічної активності морфіну. Яке явище є причиною зміни активності препарату? |
| Правильна відповідь | Звикання |
| B | Матеріальна кумуляція |

| | |
|---------------------|---|
| С | Функціональна кумуляція |
| D | Антагонізм |
| Е | Сумація |
| № | крок 2010 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ |
| Текст завдання | Дитина випадково випила із флакона розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпіну гідрохлорид. Який лікарський засіб можна застосувати як антидот? |
| Правильна відповідь | Атропіну сульфат |
| В | Карбахолін |
| С | Ацеклідін |
| D | Бензогексоній |
| Е | Пентамін |
| № | крок 2010 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Який із наведених препаратів повинен входити як антидот до складу аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш'яку, ртуті, хрому, вісмуту? |
| Правильна відповідь | Унітіол |
| В | Адреналін |
| С | Атропін |
| D | Морфін |
| Е | Дроперидол |
| № | крок 2010, 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Який із препаратів міг її спричинити? |
| Правильна відповідь | Дексаметазон |
| В | Диклофенак натрію |
| С | Ібупрофен |
| D | Делагіл |
| Е | Левамізол |
| № | крок 2010 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАЛЕРГІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Чоловіка 34-х років вжалила бджола. Розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану? |
| Правильна відповідь | Адреналіну гідрохлорид |
| B | Натрію хлорид |
| C | Платифіліну гідротартрат |
| D | Атропіну сульфат |
| E | Анаприлін |
| № | крок 2010 |
| Тема | ВЗАЄМОДІЯ ЛЗ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хвора 68-ми років тривалий час застосовує фуросемід для лікування серцевої недостатності. Вкажіть лікарський засіб для профілактики гіпокаліємії при прийомі фуросемиду: |
| Правильна відповідь | Панангін |
| B | АТФ-лонг |
| C | Мілдронат |
| D | Триметазидин |
| E | Сустанк-форте |
| № | крок 2010 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | У процесі фармакотерапії бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища? |
| Правильна відповідь | Доксициклін |
| B | Парацетамол |
| C | Кислота аскорбінова |
| D | Ацетилцистеїн |
| E | Кодеїну фосфат |
| № | крок 2010 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Жінці 25-ти років з явищами гострої інтоксикації морфіном було введено налоксон, що викликало швидке поліпшення її стану. Механізм дії цього препарату полягає у блокаді таких рецепторів: |
| Правильна відповідь | Опіоїдних |

| | |
|---------------------|--|
| B | ГАМК-рецепторів |
| C | Серотонінових |
| D | Дофамінових |
| E | Бензодіазепінових |
| № | крок 2010, 2008 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Провізор-консультант розповів хворій про можливу побічну дію метронідазолу, яка проявляється на тлі вживання алкоголю. Вкажіть механізм цього явища: |
| Правильна відповідь | Блокування ферменту алкогольдегідрогенази |
| B | Активація ферменту алкогольдегідрогенази |
| C | Блокування ферменту ацетилхолінестерази |
| D | Активація ферменту ацетилхолінестерази |
| E | Активація ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази |
| № | крок 2010, 2008 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому з гіпертонічним кризом був введений гангліоблокатор - бензогексоній. Прояву якої побічної дії слід стерегтися після введення препарату? |
| Правильна відповідь | Ортостатична гіпотензія |
| B | Синдром відміни |
| C | Пригнічуюча дія на центральну нервову систему |
| D | Порушення смакових відчуттів |
| E | Діарея |
| № | крок 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий 32-х років приймає протитуберкульозні препарати. Через деякий час він помітив, що сеча набула червоно-помаранчевого кольору. Прийом якого препарату є причиною цього? |
| Правильна відповідь | Рифампіцин |
| B | Ізоніазид |
| C | Піразінамід |
| D | Етамбутол |

| | |
|---------------------|---|
| Е | Стрептоміцину сульфат |
| № | крок 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Жінка 33-х років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора? |
| Правильна відповідь | Преднізолон |
| В | Індометацин |
| С | Бутадіон |
| Д | Синафлан |
| Е | Диклофенак натрію |
| № | крок 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому для знеболення ввели 0,25% розчин новокаїну. Раптом пацієнт вкрився червоними плямами, у нього виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, бронхоспазм, набряк слизової оболонки носа. Яка причина цього ускладнення? |
| Правильна відповідь | Алергічна реакція негайного типу |
| В | Алергічна реакція сповільненого типу |
| С | Місцевоподразнююча дія |
| Д | Тахіфілаксія |
| Е | Синдром відміни |
| № | крок 2009 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигітоксеном у хворого з'явилися ознаки інтоксикації цим препаратом. Лікар призначив унітіол. Поясніть, в чому полягає механізм дії унітіолу в цьому випадку? |
| Правильна відповідь | Відновлення активності K^+-Na^+-ATP -ази |
| В | Зв'язування іонів кальцію |
| С | Підвищення рівня натрію у кардіоміоцитах |
| Д | Підвищення проникливості для калію у кардіоміоцитах |
| Е | Зв'язування глікозиду у комплексну сполуку |
| № | крок 2009 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | До лікарні доставлено дитину з ознаками отруєння алкалоїдами беладони. Який препарат необхідно застосувати в якості антидоту? |
| Правильна відповідь | Прозерин |
| B | Сульфат магнію |
| C | Кофеїн-бензоат натрію |
| D | Парацетамол |
| E | Вальпроат натрію |
| № | крок 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворого попередили, що при застосуванні препарату, який йому призначили, може виникнути кашель. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Лізиноприл |
| B | Клофелін |
| C | Фенігідин |
| D | Дихлотіазид |
| E | Метопролол |
| № | крок 2009, 2008 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | Помилково пацієнт прийняв сіль, що містить барій. Яка з наведених солей НЕ ПРОЯВЛЯЄ токсичної дії на організм людини? |
| Правильна відповідь | Сульфат барію |
| B | Карбонат барію |
| C | Нітрат барію |
| D | Ацетат барію |
| E | Хлорид барію |
| № | крок 2009 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | При проведенні проби на чутливість до бензилпеніциліну у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Яким препаратом слід обколоти місце введення антибіотика? |
| Правильна відповідь | Адреналіну гідрохлорид |

| | |
|---------------------|--|
| В | Норадреналіну гідротартрат |
| С | Атропіну сульфат |
| Д | Пропранолол |
| Е | Цефтріаксон |
| № | крок 2009, 2008 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | До аптеки звернувся хворий, який впродовж місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи це тим, що він без феназепаму погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, яка розвинулася в хворого? |
| Правильна відповідь | Лікарська залежність |
| В | Ідіосинкразія |
| С | Синдром післядії |
| Д | Кумуляція |
| Е | Звикання |
| № | крок 2008 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИЦИПИ ВИБОРУ ГЕМОСТАТИКІВ |
| Текст завдання | Після масивної крововтрати під час операції в хворого розвинувся гострий фібриноліз. Назвіть препарат з групи засобів, що підвищують згортання крові, який показаний у цьому випадку: |
| Правильна відповідь | Амінокапронова кислота |
| В | Вікасол |
| С | Тромбін |
| Д | Фібриноген |
| Е | Аскорбінова кислота |
| № | крок 2008 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | У хворого на тромбофлебіт нижніх кінцівок виникли ознаки передозування гепарину. В цій ситуації показано введення: |
| Правильна відповідь | Протаміну сульфату |
| В | Феніліну |
| С | Вікасолу |
| Д | Пентоксифіліну |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Дипіридамолу |
| № | крок 2008 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого 55-ти років на 4-й день лікування диклофенаком натрію виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов'язана ульцерогенна дія препарату? |
| Правильна відповідь | Зменшення утворення простагландину E2 |
| В | Зменшення утворення лейкотрієнів |
| С | Блокування ферменту фосфодієстерази |
| D | Зменшення утворення еритроцитів |
| Е | Зменшення утворення лейкоцитів |
| № | крок 2008 |
| Тема | ПОБІЧНІ ДІЇ ЛЗ |
| Текст завдання | У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс? |
| Правильна відповідь | Абстинентний синдром |
| В | Ідіосинкразія |
| С | Сенсибілізація |
| D | Кумуляція |
| Е | Толерантність |
| № | крок 2008 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Блокування холінестерази фосфорорганічними пестицидами проходить у дві стадії. У другій стадії відбувається хімічна взаємодія ФОП з ферментом, тобто фосфорилування холінестерази. У такому випадку потрібно проводити антидотну терапію реактиваторами холінестерази, а саме: |
| Правильна відповідь | Дипіроксим та ізонітрозин |
| В | Левоміцетин |
| С | Амільнітрат і нітрит натрію |
| D | Налофін |
| Е | Дубінол |
| № | крок 2008, 2007 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Хворий надійшов до приймального відділення в коматозному стані. Рівень цукру в крові 25 ммоль/л. Який лікарський засіб є препаратом вибору при наданні невідкладної допомоги? |
| Правильна відповідь | Інсулін |
| B | Хумулін ультраленте |
| C | 40% розчин глюкози |
| D | Розчин Рінгера |
| E | 10% розчин глюкози |
| № | крок 2008 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на хронічну серцеву недостатність та хронічну ниркову недостатність призначено дигоксин. Через тиждень виникли брадикардія, екстрасистолія, погіршення гостроти зору, порушення колірного сприймання. Як Ви трактуватимете зміни у клінічній картині? |
| Правильна відповідь | Дигіталісна інтоксикація |
| B | Ускладнення хронічної серцевої недостатності |
| C | Ускладнення хронічної ниркової недостатності |
| D | Артеріальна гіпотензія |
| E | Іпохондричний синдром |
| № | крок 2008 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | В результаті безконтрольного прийому вітамінного препарату при гемералопії у дитини виникли анорексія, нудота, блювання, пронос, гіпертермія. Який препарат приймала дитина? |
| Правильна відповідь | Ретинолу ацетат |
| B | Нікотинамід |
| C | Соматотропін |
| D | Рутин |
| E | Ергокальциферол |
| № | крок 2007 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | "Сірий синдром" новонароджених (падіння температури нижче нормальної, ацидоз, дихальні розлади, сіре забарвлення шкіри, колапс) розвивається при застосуванні антибіотика: |
| Правильна відповідь | Левоміцетин |

| | |
|---------------------|---|
| B | Тетрациклін |
| C | Гентаміцин |
| D | Ципрофлоксацин |
| E | Еритроміцин |
| № | крок 2007 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | При отруєнні фосфорорганічними сполуками було застосовано атропіну сульфат. Яке явище лежить в основі антидотної дії? |
| Правильна відповідь | Антагонізм |
| B | Синергізм |
| C | Звикання |
| D | Хімічна несумісність |
| E | Потенціювання |
| № | крок 2007 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на ревматоїдний артрит лікар призначив препарат, при застосуванні якого можливі наступні побічні ефекти: розвиток "стероїдного діабету", набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Преднізолон |
| B | Дихлотіазид |
| C | Мезатон |
| D | Бутадіон |
| E | Строфантин |
| № | крок 2007 |
| Тема | ОТРУЄННЯ ЛЗ, АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | Хворий 74-х років тривалий час застосовує для лікування серцевої недостатності дигоксин. З'явилися скарги на нудоту, блювання, пронос, погіршення зору. Лікар подумав про можливу інтоксикацію препаратом. Який антидот слід рекомендувати для призначення? |
| Правильна відповідь | Унітіол |
| B | Кальцію хлорид |
| C | Протаміну сульфат |
| D | Прозерин |

| | |
|---------------------|---|
| Е | Атропіну сульфат |
| № | крок 2007 |
| Тема | АНТИДОТНА ТЕРАПІЯ |
| Текст завдання | До токсикологічного відділення доставлено хворого з отруєнням ртуттю. Який препарат слід призначити в даній ситуації як антидот? |
| Правильна відповідь | Унітіол |
| В | Ізонітрозин |
| С | Налоксон |
| Д | Активоване вугілля |
| Е | Ентеросорбент СКН |
| № | крок 2007 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий на гострий інфаркт міокарда в складі комплексної терапії отримував препарат-антикоагулянт. Через деякий час з'явилась гематурія. Для усунення цього ускладнення призначили протаміну сульфат. Який антикоагулянт отримував хворий? |
| Правильна відповідь | Гепарин |
| В | Амінокапронова кислота |
| С | Тромбін |
| Д | Фібриноген |
| Е | Вікасол |
| № | крок 2007 |
| Тема | ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий звернувся в аптеку з проханням поради, які препарати йому необхідно приймати для попередження побічної дії фуросеміду: |
| Правильна відповідь | Калію |
| В | Натрію |
| С | Магнію |
| Д | Заліза |
| Е | Кальцію |
| № | крок 2017, 2016 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |

| | |
|---------------------|---|
| Текст завдання | Порекомендуйте пацієнту, хворому на бронхіальну астму, інгаляційний агоніст β_2 -адренорецепторів пролонгованої дії: |
| Правильна відповідь | Сальметерол |
| B | Клемастин |
| C | Теофілін |
| D | Кромолін-натрій |
| E | Іпратропію бромід |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий в комплексній терапії бронхіальної астми отримує сальбутамол. Які побічні ефекти можуть розвинути на тлі прийому цього лікарського засобу? |
| Правильна відповідь | Тремор |
| B | Дизбактеріоз |
| C | Гіпертермія |
| D | Нефротоксичність |
| E | Гепатотоксичність |
| № | крок 2016, 2012, 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТИБІОТИКІВ, СПЕКТРИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ДІЇ |
| Текст завдання | Вагітна захворіла на пневмонію з важким перебігом. Який з названих антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити? |
| Правильна відповідь | Цефотаксим |
| B | Гентаміцину сульфат |
| C | Тетрацикліну гідрохлорид |
| D | Офлоксацин |
| E | Бісептол |
| № | крок 2016 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДІВ |
| Текст завдання | У хворого діагностували астматичний статус. Який засіб показаний в першу чергу? |
| Правильна відповідь | Преднізолон |
| B | Амброксол |
| C | Папаверин |

| | |
|---------------------|--|
| D | Мукалтин |
| E | Супрастин |
| № | крок 2014, 2009 |
| Тема | ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ. СПЕКТРИ ПРОТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ |
| Текст завдання | У хворого 18-ти років діагностовано дисемінований туберкульоз легень. Який лікарський засіб необхідний для етіотропної фармакотерапії? |
| Правильна відповідь | Ізоніазид |
| B | Бензилпеніциліну натрієва сіль |
| C | Триметоприм |
| D | Лінкоміцин |
| E | Метронідазол |
| № | крок 2014, 2013 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Які лікарські засоби використовують для усунення бронхоспазму? |
| Правильна відповідь | β -адреноміметики |
| B | β -адреноблокатори |
| C | α -адреноміметики |
| D | Інгібітори холінестерази |
| E | M-холіноміметики |
| № | крок 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворий 40-ка років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? |
| Правильна відповідь | M-холіноблокатори |
| B | β -адреноблокатори |
| C | M-холіноміметики |
| D | Антихолінестеразні засоби |
| E | Міорелаксанти |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | З чого найбільш доцільно починати лікування хворого, у якого вперше розвинувся напад бронхіальної астми? |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Інгаляції β 2-адреноміметика |
| B | Інгаляції глюкокортикостероїдів |
| C | Адреноміметики парентеральном |
| D | M -холінолітики |
| E | 2-гістаміноблокатори |
| № | крок 2013 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Бронхорозширюючий ефект при призначенні β 2-агоністу короткої дії - сальбутамолу розвивається через: |
| Правильна відповідь | 5-10 хвилин |
| B | 20-30 хвилин |
| C | 45-60 хвилин |
| D | 2-3 годин |
| E | 4-6 годин |
| № | крок 2013, 2012 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИКАШЛЬОВИХ ЛЗ |
| Текст завдання | Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі? |
| Правильна відповідь | Глауцин |
| B | Кодеїн |
| C | Ацетилцистеїн |
| D | Амброксол |
| E | Мукалтин |
| № | крок 2012 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Назвіть блокатор H2-гістамінорецепторів, що використовують при лікуванні виразкової хвороби шлунка з підвищеною секреторною функцією: |
| Правильна відповідь | Фамотидин |
| B | Атропіну сульфат |
| C | Прозерин |
| D | Добутамін |
| E | Лоратадин |
| № | крок 2011 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Порадьте хворому з гострим бронхітом муколітичний препарат, який полегшує відхаркування: |
| Правильна відповідь | Ацетилцистеїн |
| В | Глауцин |
| С | Лоратадин |
| D | Диклофенак натрію |
| Е | Дротаверину гідрохлорид |
| № | крок 2011 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворому для лікування бронхіальної астми лікар призначив препарат з групи β -адреноміметиків. Вкажіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Сальбутамол |
| В | Діазепам |
| С | Доксицикліну гідрохлорид |
| D | Нітрогліцерин |
| Е | Дигоксин |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Яким препаратом із групи бронхоселективних β_2 -адреноміметиків можна замінити фенотерол в інгаляціях за відсутності його в аптеці? |
| Правильна відповідь | Сальбутамол |
| В | Ізадрин |
| С | Метацин |
| D | Ефедрин |
| Е | Еуфілін |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворому на бронхіальну астму було призначено сальбутамол. Застосування цього препарату усунуло симптоми бронхоспазму. Це пов'язано із стимуляцією: |
| Правильна відповідь | β_2 -адренорецепторів |
| В | α_1 -адренорецепторів |

| | |
|---------------------|---|
| C | M -холінорецепторів |
| D | Синтезу ацетилхоліну |
| E | β 1-адренорецепторів |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Чоловік 46-ти років, хворий на хронічний бронхіт, звернувся в аптеку. Який лікарський засіб можна порекомендувати йому для полегшення відходження густого та в'язкого харкотиння? |
| Правильна відповідь | Амброксол |
| B | Фалімінт |
| C | Лібексин |
| D | Глаувент |
| E | Сальбутамол |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворий 48-ми років для зняття важкого нападу бронхіальної астми внутрішньовенно ввели розчин преднізолону. До якої групи гормональних препаратів належить преднізолон? |
| Правильна відповідь | Глюкокортикоїди |
| B | Гестагенні препарати |
| C | Естрогени |
| D | Мінералокортикоїди |
| E | Анаболічні стероїди |
| № | крок 2009, 2008, 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | У хворої 67-ми років, яка лікується з приводу бронхіальної астми, виникли тремор кінцівок, біль голови, безсоння, екстрасистоля. Який засіб міг зумовити такі симптоми? |
| Правильна відповідь | Теофілін |
| B | Преднізолон |
| C | Тавегіл |
| D | Інтал |
| E | Ацетилцистеїн |
| № | крок 2008, 2007 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | В аптеку звернувся хворий із сильним сухим кашлем. Який лікарський засіб Ви порекомендуєте вжити хворому з метою пригнічення непродуктивного кашльового рефлексу? |
| Правильна відповідь | Лібексин |
| B | Трипсин |
| C | Ацетилцистеїн |
| D | Калію йодид |
| E | Натрію гідрокарбонат |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворий на бронхіальну астму приймає препарат з групи β -адреноміметиків. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Сальбутамол |
| B | Доксозазин |
| C | Ацеклідин |
| D | Атропіну сульфат |
| E | Метопролол |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | З якою метою хворому, що страждає на бронхіальну астму, призначається інтал (кромолін-натрій)? |
| Правильна відповідь | Для попередження розвитку нападу бронхіальної астми |
| B | Для усунення астматичного статусу |
| C | Для усунення нападу бронхіальної астми |
| D | Для поліпшення відходження харкотиння |
| E | Для придушення кашлю |
| № | крок 2008 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворому з бронхіальною астмою призначений у вигляді аерозолі М-холіноблокатор, що погано всмоктується зі слизової оболонки бронхів. Вкажіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Іпратропію бромід |
| B | Атропіну сульфат |
| C | Гоматропін |

| | |
|---------------------|--|
| D | Скополамін |
| E | Фізостигмін |
| № | крок 2008 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ |
| Текст завдання | Хворому на гострий бронхіт призначили муколітичний засіб. Назвіть препарат: |
| Правильна відповідь | Ацетилцистеїн |
| B | Глауцин |
| C | Кодеїну фосфат |
| D | Етимізол |
| E | Бемегрид |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТАЦИДІВ |
| Текст завдання | Виберіть препарат для симптоматичного лікування печії: |
| Правильна відповідь | Антациди |
| B | Анальгетики |
| C | Спазмолітики |
| D | Блокатори протонної помпи |
| E | Жовчогінні |
| № | крок 2017 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ |
| Текст завдання | Препарати якої групи використовують для зв'язування у кишечнику газів, токсинів та бактеріальних клітин? |
| Правильна відповідь | Ентеросорбенти |
| B | Антибіотики |
| C | Спазмолітики |
| D | Антисекреторні |
| E | Ферментні |
| № | крок 2017 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ХОЛЕРЕТИКІВ І ХОЛЕКІНЕТИКІВ |
| Текст завдання | Хворій з дискінезією жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом призначено препарат, що стимулює жовчоутворення. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Алохол |

| | |
|---------------------|---|
| В | Есенціале |
| С | Мебеверин |
| Д | Папаверин |
| Е | Дротаверин |
| № | крок 2016 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | Хворий отримує фармакотерапію з приводу пептичної виразки шлунка. Призначення якого лікарського засобу зумовлює забарвлення стільця в чорний колір? |
| Правильна відповідь | Вісмуту субцитрат |
| В | Омепразол |
| С | Маалокс |
| Д | Фамотидин |
| Е | Панкреатин |
| № | крок 2016 |
| Тема | КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРУ ПРОТИАНЕМІЧНИХ ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого 46-ти років після часткової резекції шлунка виникли скарги на загальну слабкість, погіршення апетиту, затерпність та біль у кінцівках, відчуття "повзання мурашок", відчуття печіння в язиці. Діагностовано 12-дефіцитну анемію. Який препарат доцільно призначити хворому? |
| Правильна відповідь | Ціанокобаламін |
| В | Сорбіфер-дурулес |
| С | Еритропоетин |
| Д | Преднізолон |
| Е | Вінбластин |
| № | крок 2015, 2014 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | У хворого на виразкову хворобу під час комбінованої фармакотерапії випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну: |
| Правильна відповідь | Вісмуту субцитрат |
| В | Омепразол |
| С | Актовегін |
| Д | Метронідазол |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Ранітидин |
| № | крок 2015 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | Хворій 57-ми років встановлено діагноз ревматоїдного артрити, в анамнезі виразкова хвороба. Який препарат із групи НПЗП можна рекомендувати даній хворій? |
| Правильна відповідь | Целекоксиб |
| В | Диклофенак |
| С | Аспірин |
| Д | Індометацин |
| Е | Мефенамова кислота |
| № | крок 2015 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТАЦИДІВ |
| Текст завдання | Хворому призначено антацидний засіб, що містить алюмінію гідроокис. Про яку небажану реакцію, що виникає найчастіше, необхідно попередити хворого? |
| Правильна відповідь | Закреп |
| В | Метеоризм |
| С | Діарея |
| Д | Зниження апетиту |
| Е | Нудота |
| № | крок 2014 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | Дайте відповідь на питання провізора-інтерна: "Який послаблюючий препарат підвищує тонус матки?" |
| Правильна відповідь | Рицинова олія |
| В | Вазелінова олія |
| С | Оливкова олія |
| Д | Гліцерин |
| Е | Соняшникова олія |
| № | крок 2014, 2010 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | До Вас звернулася хвора на хронічний панкреатит з вираженими проявами недостатності зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Який з наведених лікарських засобів найдоцільніше призначати в даному випадку? |

| | |
|---------------------|--|
| Правильна відповідь | Панкреатин |
| B | Дротаверин |
| C | Де-нол |
| D | Омепразол |
| E | Ацидин-пепсин |
| № | крок 2014, 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТАЦИДІВ |
| Текст завдання | Хворому 54-х років, який кілька років страждає на хронічний гіперацидний гастрит, призначений альмагель. Які ускладнення фармакотерапії з боку органів травлення можуть виникнути перш за все? |
| Правильна відповідь | Закреп |
| B | Нудота |
| C | Анорексія |
| D | Блювання |
| E | Діарея |
| № | крок 2014, 2008, 2007 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | Провізор порадив хворому противиразковий препарат, який блокує гістамінові H ₂ -рецептори слизової шлунка. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Фамотидин |
| B | Омепразол |
| C | Альмагель |
| D | Атропіну сульфат |
| E | Пірензепін |
| № | крок 2014 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | У похилого хворого розвинулася післяопераційна атонія кишечника. Який антихолінестеразний препарат показаний йому? |
| Правильна відповідь | Прозерин |
| B | Дитилін |
| C | Пілокарпіну гідрохлорид |
| D | Атропіну сульфат |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Метопролол |
| № | крок 2014, 2011 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ХОЛЕРЕТИКІВ І ХОЛЕКІНЕТИКІВ |
| Текст завдання | Відповідаючи на запитання лікаря-хірурга про можливість тривалого консервативного лікування та розсмоктування холестеринових каменів у жовчному міхурі, призначте рекомендований лікарський засіб: |
| Правильна відповідь | Урсодеоксихолієва кислота |
| В | Хофітол |
| С | Алохол |
| Д | Ліобіл |
| Е | Легалон |
| № | крок 2012 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | Який послаблюючий препарат підвищує тонус матки? |
| Правильна відповідь | Касторова олія |
| В | Вазелінова олія |
| С | Оливкова олія |
| Д | Гліцерин |
| Е | Соняшникова олія |
| № | крок 2012 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | У хворого 44-х років з ревматоїдним поліартритом виникло загострення пептичної виразки шлунка. Який з перерахованих засобів необхідно виключити з комплексної терапії? |
| Правильна відповідь | Індометацин |
| В | Димедрол |
| С | Уродан |
| Д | Анаприлін |
| Е | Атропін |
| № | крок 2011 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | У хворого хронічний гастрит типу А зі зниженою секреторною функцією, перніціозна анемія. Який з препаратів показаний хворому? |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Ціанокобаламін |
| B | Адреналін |
| C | Дифенгідрамін |
| D | Вікалін |
| E | Дротаверин |
| № | крок 2011 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | У хворого встановлено діагноз - виразкова хвороба шлунка. Препарат якої з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати в комплексній терапії пацієнта? |
| Правильна відповідь | Блокатори 2 гістамінорецепторів |
| B | Блокатори 1 гістамінорецепторів |
| C | α-адреноблокатори |
| D | β-адреноблокатори |
| E | α- β-адреноміметики |
| № | крок 2011 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | У хворого на виразкову хворобу шлунка під час комбінованої фармакотерапії випороження набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну: |
| Правильна відповідь | Вісмуту субцитрат |
| B | Омепразол |
| C | Актовегін |
| D | Метронідазол |
| E | Ранітидин |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТАЦИДІВ |
| Текст завдання | Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилася. Який механізм лежить у основі дії даного препарату? |
| Правильна відповідь | Блокада H2-гістамінових рецепторів |
| B | Блокада H1-гістамінових рецепторів |
| C | Блокада M -холінорецепторів |
| D | Пригнічення активності H +K+ATФ-ази |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Блокада Н -холінорецепторів вегетативних гангліїв |
| № | крок 2010 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ХОЛЕРЕТИКІВ І ХОЛЕКІНЕТИКІВ |
| Текст завдання | Хворому з жовчнокам'яною хворобою для розчинення холестеринових жовчних каменів призначена така кислота: |
| Правильна відповідь | Урсодезоксихолева |
| В | Гама-аміномасляна |
| С | Ацетилсаліцилова |
| Д | Лимонна |
| Е | Мефенамова |
| № | крок 2010 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | У хворого, який тривалий час страждає на захворювання шлунка, виявлена гіперхромна анемія. Який з перерахованих засобів застосовується для лікування цієї патології? |
| Правильна відповідь | Ціанокобаламін |
| В | Аскорбінова кислота |
| С | Унітіол |
| Д | Ферум Лек |
| Е | Оксиферискорбон |
| № | крок 2009 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТАЦИДІВ |
| Текст завдання | Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології? |
| Правильна відповідь | Нейтралізація Н С І |
| В | Місцевоанестезуюча дія |
| С | Блокада Н ₂ -гістамінорецепторів |
| Д | Блокада М -холінорецепторів |
| Е | Протизапальна дія |
| № | крок 2009 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив фамотидин. Поясніть, який механізм лежить в основі дії даного препарату? |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Блокада H2-гістамінових рецепторів |
| B | Блокада H1-гістамінових рецепторів |
| C | Блокада M -холінорецепторів |
| D | Пригнічення активності H ⁺ -K ⁺ --ази |
| E | Блокада холінорецепторів симпатичних гангліїв |
| № | крок 2009, 2008 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | Який препарат, що відноситься до групи послаблюючих, НЕ МОЖНА призначати при отруєннях засобами, що пригнічують ЦНС? |
| Правильна відповідь | Магнію сульфат |
| B | Натрію сульфат |
| C | Вазелінова олія |
| D | Бісакодил |
| E | Гуталакс |
| № | крок 2009, 2008 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | Хворому, що страждає на виразкову хворобу шлунка, був призначений противиразковий препарат, що має здатність одночасно знижувати секрецію соляної кислоти і пригнічувати мікроорганізм хелікобактер пілорі. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Омепразол |
| B | Гастроцепін |
| C | Маалокс |
| D | Фамотидин |
| E | Альмагель |
| № | крок 2008, 2007 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | Для лікування пацієнта з пептичною виразкою шлунка показане застосування препарату з гастроцитопротекторною активністю. Оберіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Сукральфат |
| B | Альмагель |
| C | Ранітидин |

| | |
|---------------------|---|
| D | Метоклопрамід |
| E | Дротаверину гідрохлорид |
| № | крок 2008 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкової хвороби шлунка у фазі загострення. Який препарат знизить функцію залоз шлунка за рахунок блокади H ₂ -рецепторів? |
| Правильна відповідь | Фамотидин |
| B | Екстракт беладони сухий |
| C | Метацин |
| D | Атропіну сульфат |
| E | Платифіліну гідротартрат |
| № | крок 2007 |
| Тема | КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ АНТАЦИДІВ |
| Текст завдання | При тривалому прийомі антацидів, що містять алюміній, відзначається: |
| Правильна відповідь | Ураження кісткової тканини |
| B | Зниження слуху |
| C | Поліурія |
| D | Слиноотеча |
| E | Гіперхолестеринемія |
| № | крок 2007 |
| Тема | ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТТРАКТУ |
| Текст завдання | Для лікування виразкової хвороби шлунка хворому призначено фамотидин. Вкажіть механізм дії препарату: |
| Правильна відповідь | Блокує H ₂ -гістамінові рецептори |
| B | Стимулює H ₂ -гістамінові рецептори |
| C | Стимулює α-адренорецептори |
| D | Блокує β-адренорецептори |
| E | Стимулює M -холіноорецептори |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Взаємодія ЛЗ |
| Текст завдання | Поясніть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом: |

| | |
|---------------------|--|
| Правильна відповідь | Фенобарбітал активує мікросомальні ферменти печінки |
| B | Фенобарбітал інгібує мікросомальні ферменти печінки |
| C | Розвивається алергія до синкумару |
| D | Проявляється антагонізм цих препаратів |
| E | Відбувається взаємна інактивація |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія сульфаніламідів, взаємодія ЛЗ |
| Текст завдання | Який з вказаних антибактеріальних препаратів НЕРАЦІОНАЛЬНО призначати хворому 56-ти років з цукровим діабетом II типу, що отримує глібенкламід? |
| Правильна відповідь | Бісептол |
| B | Мідекаміцин |
| C | Гентаміцин |
| D | Бензилпеніцилін |
| E | Доксициклін |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія антигіпертензивних ЛЗ |
| Текст завдання | Хворій, яка страждає на бронхіальну астму, встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? |
| Правильна відповідь | Анаприлін |
| B | Каптоприл |
| C | Амлодипін |
| D | Гіпотіазид |
| E | Верапаміл |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія ЛЗ, стимулюючих функції ЦНС |
| Текст завдання | Хворій 25-ти років для лікування нападів мігрені лікар призначив суматриптан. Вкажіть механізм дії даного препарату: |
| Правильна відповідь | Селективний агоніст 5-НТ ₁ -серотонінових рецепторів |
| B | Селективний антагоніст 5-НТ ₁ -серотонінових рецепторів |
| C | Неселективний α -адреноблокатор |
| D | Стимулятор β -адренорецепторів |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Селективний α -адреноблокатор |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Ускладнення антибактеріальної терапії |
| Текст завдання | Дитині 4-х років з метою лікування ангіни був призначений антибактеріальний засіб. Через 2 тижні після проведеного лікування з'явилося жовте забарвлення зубів, що не знімається зубною пастою. Який антибіотик міг спричинити такий побічний ефект? |
| Правильна відповідь | Тетрациклін |
| В | Азитроміцин |
| С | Метронідазол |
| Д | Цефтріаксон |
| Е | Амікацин |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія діуретиків |
| Текст завдання | Який з наведених діуретичних лікарських засобів НЕ БАЖАНО призначати хворому зі зниженою функцією слуху? |
| Правильна відповідь | Фуросемід |
| В | Спіронолактон |
| С | Клопамід |
| Д | Індапамід |
| Е | Хлорталідон |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Принципи лікування нападу стенокардії, гострого інфаркту міокарда |
| Текст завдання | Відвідувач аптеки поскаржився на стискаючий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, страх смерті. Відомо, що біль виник раптово після фізичного навантаження. Назвіть засіб невідкладної допомоги: |
| Правильна відповідь | Нітрогліцерин |
| В | Метациклін |
| С | Нафтизин |
| Д | Панангін |
| Е | Рибоксин |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Взаємодія ЛЗ |
| Текст завдання | При одночасному застосуванні гентаміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик: |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Нефротоксичності |
| B | Гепатотоксичності |
| C | Кардіотоксичності |
| D | Нейротоксичності |
| E | Імовірності алергічних реакцій |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клініко-біоармацевтичні принципи вибору антибіотиків |
| Текст завдання | У хворої 27-ми років діагностовано позашпитальну пневмонію. Раніше у хворої спостерігалась алергічна реакція на ампіцилін. Який антибактеріальний засіб доцільно їй призначити? |
| Правильна відповідь | Азитроміцин |
| B | Пеніцилін |
| C | Цефобід |
| D | Цефазолін |
| E | Цефтріаксон |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Побічні ефекти протизапальних ЛЗ, їх профілактика і лікування |
| Текст завдання | Найбільш ефективним лікарським засобом для профілактики НПЗЗ-асоційованої гастропатії є: |
| Правильна відповідь | Омепразол |
| B | Целекоксиб |
| C | Папаверин |
| D | Дротаверин |
| E | Цефтріаксон |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Фармацевтична опіка при захворюваннях ШКТ, клінічна фармакологія антацидів |
| Текст завдання | Виберіть препарат для симптоматичного лікування печії: |
| Правильна відповідь | Антациди |
| B | Анальгетики |
| C | Спазмолітики |
| D | Блокатори протонної помпи |
| E | Жовчогінні |
| № | крок 2017-2018 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | Клінічна фармакологія бронхолітиків |
| Текст завдання | Порекомендуйте пацієнту, хворому на бронхіальну астму, інгаляційний агоніст β_2 -адренорецепторів пролонгованої дії: |
| Правильна відповідь | Сальметерол |
| B | Клемастин |
| C | Теофілін |
| D | Кромолін-натрій |
| E | Іпратропію бромід |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія антиангінальних ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого 63-х років з ішемічною хворобою серця діагностовано закритокутову глаукому. Яка з наведених груп препаратів ПРОТИПОКАЗАНА в даному випадку? |
| Правильна відповідь | Нітрати |
| B | β -адреноблокатори |
| C | Антагоністи кальцію |
| D | Антикоагулянти |
| E | Статини |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клініко-біофармацевтичні принципи вибору антибіотиків |
| Текст завдання | Який з наведених препаратів є препаратом вибору для лікування гострого пієлонефриту у вагітних? |
| Правильна відповідь | Ампіцилін |
| B | Тетрациклін |
| C | Стрептоміцин |
| D | Левоміцетин |
| E | Гентаміцин |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Ускладнення антибактеріальної терапії |
| Текст завдання | Дитині 4-х років з метою лікування ангіни був призначений антибактеріальний препарат. Через тиждень після проведеного лікування дитина поскаржилась на шум у вухах, погіршення слуху. Який антибіотик міг спричинити такий побічний ефект? |
| Правильна відповідь | Гентаміцин |

| | |
|---------------------|--|
| В | Азитроміцин |
| С | Метронідазол |
| D | Цефтриаксон |
| Е | Ампіцилін |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Побічні ефекти протизапальних ЛЗ, їх профілактика і лікування |
| Текст завдання | У хворого ревматоїдним артритом виявлена гіперглікемія. Лікування яким препаратом могло призвести до цього? |
| Правильна відповідь | Преднізолон |
| В | Гідроксихлорохін |
| С | Ацетилсаліцилова кислота |
| D | Диклофенак натрію |
| Е | Кальцемін |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія антигіпертензивних ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого на фоні фармакотерапії артеріальної гіпертензії виник сухий кашель. Для якої групи лікарських засобів характерна така побічна дія? |
| Правильна відповідь | Інгібітори АПФ |
| В | Антагоністи кальцію |
| С | Нейролептики |
| D | Транквілізатори |
| Е | Антациди |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія бронхолітиків |
| Текст завдання | Хворому на бронхіальну астму при нападі ядухи було доведено введено препарат, після чого у нього виникли нудота, біль голови, збудження та серцебиття. Який з перелічених препаратів міг викликати таку реакцію? |
| Правильна відповідь | Еуфілін |
| В | Преднізолон |
| С | Амброксол |
| D | Супрастин |
| Е | Папаверину гідрохлорид |
| № | крок 2017-2018 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено антихелікобактерну терапію. На 3-ю добу хворий відмітив появу стільця чорного кольору. Який лікарський засіб є причиною цього? |
| Правильна відповідь | Вісмуту субцитрат |
| B | Омепразол |
| C | Метронідазол |
| D | Тетрациклін |
| E | Тинідазол |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія муколітиків, фармацевтична опіка при захворюваннях дихальної системи |
| Текст завдання | Відвідувач аптеки 46-ти років, хворий на хронічний бронхіт, звернувся з приводу придбання препарату для полегшення відходження густого в'язкого харкотиння. Який лікарський засіб показаний у даному випадку? |
| Правильна відповідь | Амброксол |
| B | Окселадин |
| C | Сальбутамол |
| D | Бутамірат |
| E | Кодеїну фосфат |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія антиагрегантів |
| Текст завдання | Хворому 60-ти років після перенесеного інфаркту міокарда призначили ацетилсаліцилову кислоту як антиагрегант. Вкажіть оптимальну добову антиагрегантну дозу ацетилсаліцилової кислоти: |
| Правильна відповідь | 100 мг |
| B | 200 мг |
| C | 300 мг |
| D | 400 мг |
| E | 500 мг |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ |
| Текст завдання | У вагітної 25-ти років у третьому триместрі вагітності при черговому УЗД обстеженні встановлено вад розвитку дитини. З анамнезу відомо, що жінка без призначення лікаря приймала впродовж строку вагітності у великих дозах діазепам. Який вид побічної дії має місце? |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Тератогенний |
| B | Ембріотоксичний |
| C | Фетотоксичний |
| D | Канцерогенний |
| E | Мутагенний |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія антигіпертензивних ЛЗ, інгібітори АПФ |
| Текст завдання | У медикаментозному лікуванні хворого 63-х років, який має серцево-судинну патологію, використовується еналаприл. До якої групи належить цей препарат? |
| Правильна відповідь | Інгібітор АПФ |
| B | β -блокатор |
| C | α -блокатор |
| D | Сечогінний препарат |
| E | Антагоніст кальцію |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Антидотна терапія, клінічна фармакологія антикоагулянтів |
| Текст завдання | У хворої на варикозну хворобу нижніх кінцівок спостерігаються ознаки передозування гепарину. Який препарат доцільно використати як антидот? |
| Правильна відповідь | Протаміну сульфат |
| B | Аскорбінова кислота |
| C | Дипіридамол |
| D | Пентоксифілін |
| E | Ацетилсаліцилова кислота |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія ЛЗ метаболічного типу дії |
| Текст завдання | Який з наведених препаратів показаний хворому на подагру з гіперурикемією в амбулаторному періоді лікування? |
| Правильна відповідь | Алопуринол |
| B | Гіпотіазид |
| C | Аскорутин |
| D | Дипіридамол |
| E | Фуросемід |

| | |
|---------------------|---|
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія антибактеріальних ЛЗ, спектри антибактеріальної активності |
| Текст завдання | На стаціонарному лікуванні в протитуберкульозному диспансері знаходиться жінка з відкритою формою туберкульозу. Який засіб призначив лікар для етіотропного лікування? |
| Правильна відповідь | Ізоніазид |
| В | Ацикловір |
| С | Метронідазол |
| Д | Доксицикліну гідрохлорид |
| Е | Бензилпеніцилін |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому було проведено курс паліативної терапії морфіном гідрохлоридом протягом тижня, після чого він став вимагати й надалі вводити препарат. Про яке явище в даному випадку йдеться? |
| Правильна відповідь | Залежність |
| В | Толерантність |
| С | Кумуляція |
| Д | Потенціювання |
| Е | Сумація |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий 60-ти років після перенесеної операції знаходиться на постільному режимі. Після тривалої терапії корою крушини, проносний ефект препарату зменшився. Яке явища обумовило цей процес? |
| Правильна відповідь | Звикання |
| В | Тахіфілаксія |
| С | Індивідуальна чутливість |
| Д | Синдром рикошету |
| Е | Синдром відміни |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія противірусних ЛЗ |
| Текст завдання | У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з'явилися герпетичні висипання. Який препарат можна порекомендувати пацієнту? |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Ацикловір |
| B | Клотримазол |
| C | Азитроміцин |
| D | Дексаметазон |
| E | Амоксицилін |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Ускладнення антибактеріальної терапії |
| Текст завдання | Хворий скаржиться на набряк обличчя і шиї, осиплість голосу, нежить, утруднення дихання. За годину до цього прийняв таблетку ампіциліну. Яка побічна дія виникла? |
| Правильна відповідь | Набряк Квінке |
| B | Кропив'янка |
| C | Поліноз |
| D | Анафілактичний шок |
| E | Атопічний дерматит |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія холеретиків, холекінетиків |
| Текст завдання | Хворий з дискінезією жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом призначено препарат, що стимулює жовчоутворення. Назвіть цей препарат: |
| Правильна відповідь | Алохол |
| B | Есенціале |
| C | Мебеверин |
| D | Папаверин |
| E | Дротаверин |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ |
| Текст завдання | При проведенні антихелікобактерної квадротерапії у хворого з'явився кал чорного кольору. Який препарат міг спричинити такий побічний ефект? |
| Правильна відповідь | Вісмуту субцитрат |
| B | Омепразол |
| C | Амоксицилін |
| D | Кларитроміцин |

| | |
|---------------------|---|
| Е | Метронідазол |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Антидотна терапія, клінічна фармакологія антикоагулянтів |
| Текст завдання | Хворий отримує гепарин з приводу гострого інфаркту міокарда. На 3-й день з'явилася гематурія, підшкірні гематоми. Який препарат потрібно призначити хворому в якості антидоту? |
| Правильна відповідь | Протаміну сульфат |
| В | Вікасол |
| С | Стрептокіназа |
| Д | Клопідогрель |
| Е | Ацетилсаліцилова кислота |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ, клінічна фармакологія протиалергічних ЛЗ |
| Текст завдання | В аптеку звернувся пацієнт зі скаргами, що після застосування антигістамінного засобу у нього виникли сонливість, втома, втрата уваги. Який лікарський засіб міг викликати такі симптоми? |
| Правильна відповідь | Клемастин |
| В | Дезлоратидин |
| С | Лоратадин |
| Д | Цитеризин |
| Е | Фексофенадин |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клініко-біофармацевтичні принципи вибору антибіотиків, спектри антимікробної активності |
| Текст завдання | Пацієнту з хелікобактер-асоційованою пептичною виразкою призначено курс лікування. Який з наведених засобів призначено в якості етіотропної фармакотерапії? |
| Правильна відповідь | Кларитроміцин |
| В | Сукральфат |
| С | Фамотидин |
| Д | Ранітидин |
| Е | Алюмінію гідроксид |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Ускладнення антибактеріальної терапії, їх профілактика і лікування |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | В аптеку звернувся чоловік 74-х років, якому з приводу дизентерійного гастроентероколіту призначено антибіотикотерапію ампіциліном. Оберіть групу лікарських засобів для попередження дисбактеріозу: |
| Правильна відповідь | Пробіотики |
| B | Антацидні засоби |
| C | Ферментні засоби |
| D | Сорбенти |
| E | Імуносупресори |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія антацидів |
| Текст завдання | Який антацидний лікарський засіб при тривалому застосуванні може провокувати розвиток закрепи, остеопорозу, енцефалопатії? |
| Правильна відповідь | Алюмінію гідроксид |
| B | Натрію гідрокарбонат |
| C | Кальцію карбонат |
| D | Альгінат натрію |
| E | Магнію оксид |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Фармацевтична опіка хворих при патології дихальної системи |
| Текст завдання | До провізора звернулась жінка із проханням порекомендувати лікарський засіб для профілактики грипу у її дитини віком 2 роки у вигляді крапель у ніс. Таким засобом є: |
| Правильна відповідь | Інтерферон |
| B | Оксолін |
| C | Ремантадин |
| D | Ацикловір |
| E | Парацетамол |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Взаємодія ЛЗ, клінічна фармакологія антигіпертензивних ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнту з артеріальною гіпертензією, що отримує каптоприл, призначено калійзберігаючий сечогінний засіб спиронолактон. До якого ускладнення терапії може призвести така комбінація? |
| Правильна відповідь | Гіперкаліємія |
| B | Гіпокальціємія |

| | |
|---------------------|--|
| С | Гіпонатріємія |
| D | Гіпоглікемія |
| Е | Гіпернатріємія |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Взаємодія ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнт, що отримує непрямий антикоагулянт варфарин, у зв'язку з підвищенням температури тіла застосував ацетилсаліцилову кислоту. Така комбінація є небезпечною, бо підвищується ризик: |
| Правильна відповідь | Кровотечі |
| В | Остеопорозу |
| С | Нейротоксичності |
| D | Кардіотоксичності |
| Е | Дизбактеріозу |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія ЛЗ метаболічного типу дії |
| Текст завдання | Лікар призначив хворій на остеопороз у складі комплексної терапії препарат, який регулює обмін кальцію та фосфору. Назвіть препарат: |
| Правильна відповідь | Кальцитонін |
| В | Пангамат кальцію |
| С | Аскорбінова кислота |
| D | Кверцетин |
| Е | Глобірон |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клініко-біофармацевтичні принципи вибору антибіотиків |
| Текст завдання | Для етіотропного лікування вогнищевої пневмонії у хворої 63-х років із супутньою діабетичною нефропатією з порушенням функції нирок ПРОТИПОКАЗАНЕ призначення: |
| Правильна відповідь | Аміноглікозидів |
| В | Природних пеніцилінів |
| С | Синтетичних пеніцилінів |
| D | Макролідів |
| Е | Захищених пеніцилінів |
| № | крок 2017-2018 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | Фармацевтична опіка хворих при патології ШКТ |
| Текст завдання | Препарати якої групи використовують для зв'язування у кишечнику газів, токсинів та бактеріальних клітин? |
| Правильна відповідь | Ентеросорбенти |
| B | Антибіотики |
| C | Спазмолітики |
| D | Антисекреторні |
| E | Ферментні |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія антиангінальних ЛЗ, бета-адреноблокатори |
| Текст завдання | Яка побічна дія часто спостерігається у хворих на стенокардію, які приймають анаприлін? |
| Правильна відповідь | Брадикардія |
| B | Тахікардія |
| C | Пронос |
| D | Закреп |
| E | Здуття живота |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Побічні ефекти протизапальних ЛЗ, їх профілактика і лікування |
| Текст завдання | Побічна дія у вигляді синдрому Рея (енцефалопатія, ураження печінки у вигляді жирової дистрофії) виникає у дітей на тлі лихоманки вірусного походження при прийомі такого препарату: |
| Правильна відповідь | Ацетилсаліцилова кислота |
| B | Целекоксиб |
| C | Ібупрофен |
| D | Метамізол натрію |
| E | Парацетамол |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія бронхолітиків |
| Текст завдання | Хворий в комплексній терапії бронхіальної астми отримує сальбутамол. Які побічні ефекти можуть розвинути на тлі прийому цього лікарського засобу? |
| Правильна відповідь | Тремор |
| B | Дизбактеріоз |
| C | Гіпертермія |

| | |
|---------------------|---|
| D | Нефротоксичність |
| E | Гепатотоксичність |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія ЛЗ, що застосовуються при патології щитовидної залози |
| Текст завдання | Хворий 47-ми років з діагнозом дифузний токсичний зоб, потребує анти tireoїдної терапії. Оберіть препарат для даного пацієнта: |
| Правильна відповідь | Мерказоліл |
| B | Левотироксин натрію |
| C | Тиротропін альфа |
| D | Калію йодид |
| E | Трийодтиронін |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія діуретиків |
| Текст завдання | У хворого, який приймає фуросемід впродовж тривалого часу, спостерігається зменшення набряків, посилення діурезу, однак при цьому з'явилась слабкість у м'язах, втрата апетиту, болі в серці. Чим можна пояснити розвиток названих симптомів? |
| Правильна відповідь | Гіпокаліємія |
| B | Гіпермагніємія |
| C | Гіпокальціємія |
| D | Гіперкальціємія |
| E | Гіперкаліємія |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія антигіпертензивних ЛЗ |
| Текст завдання | При лікуванні артеріальної гіпертензії з метою збільшення виведення натрію та води доцільно застосовувати препарати такої групи: |
| Правильна відповідь | Діуретики |
| B | Агоністи β_2 -адренорецепторів |
| C | Симпатолітики |
| D | Селективні α_1 -адреноблокатори |
| E | Прямі вазодилататори |
| № | крок 2017-2018 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | Клінічна фармакологія антигіпертензивних ЛЗ, бета-адреноблокатори |
| Текст завдання | У пацієнта 54-х років, який страждає на гіпертонічну хворобу, на тлі фармакотерапії виникло явище бронхоспазму. Лікар розцінив це як ускладнення терапії. Назвіть засіб, що викликав препарат такої групи: |
| Правильна відповідь | β -адреноблокатори |
| B | Антагоністи кальцію |
| C | α -адреноблокатори |
| D | Гангліоблокатори |
| E | Діуретики |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Антидотна терапія, клінічна фармакологія серцевих глікозидів |
| Текст завдання | У хворого з хронічною серцевою недостатністю на тлі застосування серцевих глікозидів виникли ознаки глікозидної інтоксикації. Який антидот доцільно застосовувати? |
| Правильна відповідь | Унітіол |
| B | Вікасол |
| C | Протамін |
| D | Налоксон |
| E | Метіонін |
| № | крок 2017-2018 |
| Тема | Клінічна фармакологія нітрофуранів |
| Текст завдання | Жінці 36-ти років для лікування кишкової інфекції було призначене похідне нітрофуранів, яке погано всмоктується в кишечнику та здійснює дію по ходу кишечника. Визначте ЛЗ: |
| Правильна відповідь | Ніфуроксазид |
| B | Фурацилін |
| C | Нітроксолін |
| D | Фурадонін |
| E | Налідиксова кислота |
| № | крок 2019 |
| Тема | Побічна дія ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого на туберкульоз після по-чатку лікування виникло почервоніння сечі, слини, слізної рідини. Який препа-рат міг викликати такі явища? |
| Правильна відповідь | Рифампіцин |

| | |
|---------------------|--|
| В | Ізоніазид |
| С | Ципрофлоксацин |
| D | Бензилпеніциліну натрієва сіль |
| Е | Розчин йоду спиртовий |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія противірусних ЛЗ |
| Текст завдання | Оберіть для пацієнта з герпетичним ураженням губ противірусний засіб для місцевого застосування: |
| Правильна відповідь | Ацикловір |
| В | Афлубін |
| С | Анаферон |
| D | Арбідол |
| Е | Амізон |
| № | крок 2019 |
| Тема | Побічна дія ЛЗ |
| Текст завдання | Побічна дія у вигляді синдрому Рея (енцефалопатія, ураження печінки у вигляді жирової дистрофії) виникає у дітей на тлі лихоманки вірусного походження при прийомі такого препарату: |
| Правильна відповідь | Ацетилсаліцилова кислота |
| В | Метамізол натрію |
| С | Ібупрофен |
| D | Парацетамол |
| Е | Целекоксиб |
| № | крок 2019 |
| Тема | Принципи вибору протимікробних ЛЗ. Спектри протимікробної активності. |
| Текст завдання | Пацієнту з хелікобактер-асоційованою пептичною виразкою призначено курс лікування. Який з наведених засобів призначено в якості етіотропної фар-макотерапії? |
| Правильна відповідь | Кларитроміцин |
| В | Сукральфат |
| С | Фамотидин |
| D | Алюмінію гідроксид та магнію гідро-ксид |
| Е | Ранітидин |
| № | крок 2019 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | Клінічна фармакодинаміка |
| Текст завдання | Жінка поступила у пологовий бу-динок. У зв'язку із слабкістю пологової діяльності лікар вирішив стимулювати пологи. Який гормональний препарат він використав для цього? |
| Правильна відповідь | Окситоцин |
| B | L-тироксин |
| C | Преднізолон |
| D | Інсулін |
| E | Глібенкламід |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія препаратів інсуліну |
| Текст завдання | Хвора 18-ти років госпіталізована в клініку зі скаргами на спрагу, поліу-рію, сухість шкіри, схуднення, загальну слабкість. Встановлено діагноз: цукро-вий діабет I типу, вперше виявлений. З якого лікарського засобу варто розпо-чати лікування хворої? |
| Правильна відповідь | Інсулін |
| B | Метформін |
| C | Ексенатид |
| D | Арфазетин |
| E | Глібенкламід |
| № | крок 2019 |
| Тема | Фармацевтична опіка хворих з патологією дихальної системи |
| Текст завдання | В аптеку звернулась вагітна жінка з симптомами гострого риніту. Поре-комендуйте найбільш безпечний засіб для симптоматичного лікування риніту: |
| Правильна відповідь | Сольові розчини на основі ізо- та гіпертонічних розчинів натрію хлориду |
| B | Препарати беклометазону |
| C | Препарати кромогліцієвої кислоти |
| D | Препарати ксилометазоліну |
| E | Препарати на основі ефірних олій |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія нітрофуранів |
| Текст завдання | Юнак 17-ти років захворів на гостру кишкову інфекцію. Оберіть антибакте-ріальний препарат, який НЕ ВСМО-КТУЄТЬСЯ в кишківнику: |

| | |
|---------------------|--|
| Правильна відповідь | Ніфуроксазид |
| B | Сульфадиметоксин |
| C | Сульфацил натрію |
| D | Фталазол |
| E | Ко-тримоксазол |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія діуретиків |
| Текст завдання | У пацієнта з серцевою недостатністю на тлі застосування діуретика фуросеміда розвинулось наступне порушення складу електролітів: |
| Правильна відповідь | Гіпокаліємія |
| B | Гіпермагніємія |
| C | Гіпернатріємія |
| D | Гіпокальціємія |
| E | Гіперкаліємія |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія антигіпертензивних ЛЗ |
| Текст завдання | До лікаря звернулася вагітна жінка зі скаргами на підвищення артеріального тиску до 160/100 мм рт.ст. Який гіпотензивний препарат можна виокремити? |
| Правильна відповідь | Метилдопа |
| B | Резерпін |
| C | Еналаприл |
| D | Бісопролол |
| E | Лозартан |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія муколітиків та відхаркувальних ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого на фоні прийому відхаркувального засобу з'явилися скарги на гіперсалівацію, нежить, шкірні висипи та свербіж (явища йодизму). Вкажіть, який засіб викликав дані побічні реакції: |
| Правильна відповідь | Калію йодид |
| B | Амонію хлорид |
| C | Мукалтин |
| D | Настій трави термопсису |

| | |
|---------------------|---|
| Е | Сироп амброксолу |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія протиалергічних ЛЗ, клінічна фармакологія глюкокортикостероїдів |
| Текст завдання | Вкажіть препарат, який першочергово застосовується при лікуванні анафілактичного шоку: |
| Правильна відповідь | Преднізолон |
| В | Фексофенадин |
| С | Еуфілін |
| Д | Дибазол (<i>Bendazol</i>) |
| Е | Лоратадин |
| № | крок 2019 |
| Тема | Фармацевтична опіка при захворюваннях дихальної системи |
| Текст завдання | Який термін застосування судино-звужуючих засобів для симптоматичного лікування риніту? |
| Правильна відповідь | 5-7 днів |
| В | 1 місяць |
| С | 5 тижнів |
| Д | 3 тижні |
| Е | 2 тижні |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія діуретиків, побічна дія ЛЗ |
| Текст завдання | У хворого на ішемічну хворобу серця із хронічною недостатністю кро-вообігу після тривалого застосування одного з наведених лікарських засобів виникла гіпокаліємія, що призвело до порушення серцевого ритму та м'язо-вої слабкості. Побічною дією якого з препаратів є це ускладнення? |
| Правильна відповідь | Фуросемід |
| В | Ніфедипін |
| С | Лізиноприл |
| Д | Пропранолол |
| Е | Спіронолактон |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія діуретиків |
| Текст завдання | Для пацієнта 35-ти років лікар призначив калійзберігаючий діуретик. Який з названих препаратів відноситься до цієї групи? |

| | |
|---------------------|--|
| Правильна відповідь | Триамтерен |
| B | Фуросемід |
| C | Бісопролол |
| D | Дилтіазем |
| E | Празозин |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних ЛЗ, фармацевтична опіка при захворюваннях дихальної системи |
| Текст завдання | Вкажіть препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який можливо застосовувати при гіпертермічному синдромі у дітей та вагітних: |
| Правильна відповідь | Парацетамол |
| B | Рофекоксиб |
| C | Ацетилсаліцилова кислота |
| D | Німесулід |
| E | Диклофенак натрію |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія антиангінальних ЛЗ, принципи лікування приступу стенокардії |
| Текст завдання | Відвідувач аптеки звернувся до фармацевта зі скаргами на стискаючий, часом пекучий біль за грудиною з іррадіацією у ліву руку та шию три-валістю 5-10 хвилин. Виберіть засіб для надання невідкладної допомоги хворо-му: |
| Правильна відповідь | Нітрогліцерин |
| B | Ізосорбїду динїтрат |
| C | Ніфедипін |
| D | Бісопролол |
| E | Дигоксин |
| № | крок 2019 |
| Тема | Фармакотерапія діабетичних ком |
| Текст завдання | Хвора на цукровий діабет ввела со-бі 30 ОД інсуліну, після чого в неї виникла слабкість. Хвора зайшла в аптеку і звернулась по допомогу. В аптеці зне-притомніла, виникли судоми. Що слід увести хворій? |
| Правильна відповідь | Глюкозу |
| B | Глібенкламід |
| C | Метформін |

| | |
|---------------------|--|
| D | Бутамід |
| E | Інсулін |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія бронхолітиків |
| Текст завдання | Порекомендуйте пацієнту, хворо-му на бронхіальну астму, інгаляційний агоніст бета ₂ -адренорецепторів пролонго-ваної дії: |
| Правильна відповідь | Сальметерол |
| B | Теофілін |
| C | Іпратропію бромід |
| D | Кромолін-натрій |
| E | Клемастин |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клініко-біофармацевтичні принципи вибору антибіотиків |
| Текст завдання | Хворий 28-ми років, вагітна (8- 9 тижнів), після проведеного клініко-лабораторного дослідження встановле-но діагноз гострого пієлонефриту. Ви-беріть оптимальну емпіричну антиба-ктеріальну терапію: |
| Правильна відповідь | Амоксицилін |
| B | Норфлуксацин |
| C | Гентаміцин |
| D | Тетрациклін |
| E | Хлорамфенікол |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія анти секреторних ЛЗ, схеми лікування виразкової хвороби |
| Текст завдання | Хворий 48-ми років, діагноз: пепти-чна виразка шлунка. Оберіть обов'яз-ковий компонент комбінованої тера-пії, що використовується для ерадикації <i>H. pylori</i> : |
| Правильна відповідь | Омепразол |
| B | Папаверину гідрохлорид |
| C | Алюмінію гідрохлорид |
| D | Активоване вугілля |
| E | Кальцію карбонат |
| № | крок 2019 |
| Тема | Фармацевтична опіка: загальні принципи та положення |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | Хто несе відповідальність за здо-ров'я пацієнта у практиці самолікуван-ня? |
| Правильна відповідь | Пацієнт |
| B | Фармацевт |
| C | Компанія-виробник препарату |
| D | Керівник підприємницької структу-ри, що має роздрібну точку реалізації цих препаратів |
| E | Лікар |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія антиангінальних ЛЗ, побічна дія ЛЗ |
| Текст завдання | Яка побічна дія часто спостерігає-ться у хворих на стенокардію, які приймають анаприлін? |
| Правильна відповідь | Брадикардія |
| B | Тахікардія |
| C | Здуття живота |
| D | Зниження слуху |
| E | Зниження зору |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія вітамінів |
| Текст завдання | Який з перелічених лікарських за-собів НЕ НАЛЕЖИТЬ до групи віта-мінів? |
| Правильна відповідь | Кальцію глюконат |
| B | Ергокальциферол |
| C | Кальцію пантотенат |
| D | Кислота ніотинова |
| E | Кальцію пангамат |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія муколітиків та відхаркувальних ЛЗ, взаємодія ЛЗ |
| Текст завдання | З препаратами якої фармакологі-чної групи ЗАБОРОНЕНО поєднува-ти відхаркувальні засоби? |
| Правильна відповідь | Протикашльові препарати |
| B | Деконгестанти |
| C | Антибактеріальні препарати |
| D | Муколітики |
| E | Полівітаміни |
| № | крок 2019 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | Клінічна фармакологія антигіпертензивних ЛЗ |
| Текст завдання | Яка група гіпотензивних препара-тів протипоказана хворим на гіпертоні-чну хворобу з гіперурікемією? |
| Правильна відповідь | Тіазидні діуретики |
| B | Антагоністи кальцію |
| C | Альфа-адреноблокатори |
| D | Бета-адреноблокатори |
| E | Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клініко-біофармацевтичні принципи вибору антибіотиків |
| Текст завдання | У хворої 27-ми років діагностовано позашпитальну пневмонію. Раніше у хворої спостерігалась алергічна реакція на ампіцилін. Який антибактеріальний засіб доцільно їй призначити? |
| Правильна відповідь | Азитроміцин |
| B | Пеніцилін |
| C | Цефтриаксон |
| D | Цефобід |
| E | Цефазолін |
| № | крок 2019 |
| Тема | Ускладнення антибактеріальної терапії, їх профілактика і лікування |
| Текст завдання | Чоловіку 42-х років з позашпитальною пневмонією було призначено тривале лікування антибіотиками. Які препарати слід призначити хворому з метою профілактики дисбактеріозу? |
| Правильна відповідь | Пробіотики |
| B | Муколітики |
| C | Відхаркувальні |
| D | Спазмолітики |
| E | Протикашлеві |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія препаратів інсуліну |
| Текст завдання | У пацієнтки, яка хворіє на цукровий діабет, після передозування інсу-ліну виникла гіпоглікемія. Які дії при перших ознаках гіпоглікемії? |
| Правильна відповідь | Дати хворій з'їсти грудочку цукру, випити теплого солодкого чаю |
| B | Ввести кофеїн внутрішньом'язово |

| | |
|---------------------|--|
| С | Сублінгвально нітрогліцерин |
| D | Виконати ін'єкцію інсуліну |
| E | Ввести 0,1% розчин адреналіну під-шкірно |
| № | крок 2019 |
| Тема | Ускладнення антибактеріальної терапії, їх профілактика і лікування |
| Текст завдання | Дитині 4-х років з метою лікуван-ня ангіни був призначений антибакте-ріальний препарат. Через тиждень пі-сля проведеного лікування дитина по-скаржилась на шум у вухах, погіршення слуху. Який антибіотик міг спричинити такий побічний ефект? |
| Правильна відповідь | Гентаміцин |
| B | Ампіцилін |
| С | Азитроміцин |
| D | Метронідазол |
| E | Цефтриаксон |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія ЛЗ, які застосовуються при захворюваннях щитовидної залози |
| Текст завдання | Оберіть препарат для лікування гі-пертиреозу: |
| Правильна відповідь | Мерказоліл (<i>Thiamazole</i>) |
| B | Преднізолон |
| С | Інсулін |
| D | Окситоцин |
| E | Метформін |
| № | крок 2019 |
| Тема | Клінічна фармакологія муколітиків та відхаркувальних ЛЗ |
| Текст завдання | Хворий 45-ти років, скаржиться на вологий кашель. Страждає на хроні-чний бронхіт понад 20 років. Палить. Порадьте муколітичний препарат, який би сприяв покращенню виведення хар-котиння та утворенню сурфактанту: |
| Правильна відповідь | Амброксол |
| B | Калію йодид |
| С | Препарати термопсису |
| D | Корінь солодки |
| E | Протеолітичні ферменти |
| № | крок 2020 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | Клінічна фармація ЛЗ, що нормалізують обмінні процеси |
| Текст завдання | Лікар призначив хворій з остеопорозом у складі комплексної терапії препарат, який регулює обмін кальцію та фосфору. Назвіть препарат: |
| Правильна відповідь | Кальцитонін |
| B | Пангамат кальцію |
| C | Аскорбінова кислота |
| D | Кверцетин |
| E | Глобірон |
| № | крок 2020 |
| Тема | Клінічна фармація противірусних ЛЗ |
| Текст завдання | До провізора звернувся хворий з проханням порекомендувати йому препарат для місцевого лікування губ при ураженні герпетичною інфекцією. Який лікарський засіб показаний хворому? |
| Правильна відповідь | Ацикловір |
| B | Ампіцилін |
| C | Диклофенак натрію |
| D | Парацетамол |
| E | Пропранолол |
| № | крок 2020 |
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнту після встановлення діагнозу виразка шлунка була призначена комбінована фармакотерапія. Через кілька днів випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг це спричинити: |
| Правильна відповідь | Вісмуту субцитрат |
| B | Лансопразол |
| C | Фамотидин |
| D | Омепразол |
| E | Ранітидин |
| № | крок 2020 |
| Тема | Фармацевтична опіка при захворюваннях дихальної системи |
| Текст завдання | До провізора звернулась жінка із проханням порекомендувати лікарський засіб у вигляді крапель у ніс для профілактики грипу у її дворічної дитини. Таким засобом є: |
| Правильна відповідь | Інтерферон |

| | |
|---------------------|--|
| B | Ремантадин |
| C | Оксолін |
| D | Парацетамол |
| E | Ацикловір |
| № | крок 2020 |
| Тема | Фармацевтична опіка при захворюваннях дихальної системи |
| Текст завдання | До провізора звернувся хворий 46-ти років зі скаргами на сильний сухий непродуктивний кашель. Який протикашльовий засіб можна порекомендувати? |
| Правильна відповідь | Окселадин |
| B | Натрію гідрокарбонат |
| C | Трипсин |
| D | Ацетилцистеїн |
| E | Бромгексин |
| № | крок 2020 |
| Тема | Принципи лікування приступу стенокардії |
| Текст завдання | Пацієнт, який лікується від ІХС, після фізичного навантаження відчув гострий біль в ділянці серця. Який препарат можна призначити для швидкого усунення больового синдрому? |
| Правильна відповідь | Нітрогліцерин |
| B | Еналаприл |
| C | Каптоприл |
| D | Корглікон |
| E | Празозин |
| № | крок 2020 |
| Тема | Побічні ефекти антибактеріальних ЛХ, їх профілактика та лікування |
| Текст завдання | У процесі фармакотерапії загострення хронічного бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища? |
| Правильна відповідь | Доксициклін |
| B | Ацетилцистеїн |
| C | Кодеїну фосфат |
| D | Кислота аскорбінова |
| E | Амброксол |

| | |
|---------------------|--|
| № | крок 2020 |
| Тема | Антидотна терапія |
| Текст завдання | Який з наведених засобів повинен в якості антидоту входити до аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш'яку, ртуті, хрому, вісмуту? |
| Правильна відповідь | Унітіол |
| B | Дроперидол |
| C | Морфін |
| D | Адреналін |
| E | Атропін |
| № | крок 2020 |
| Тема | Побічні ефекти антибактеріальних ЛЗ, їх профілактика та лікування |
| Текст завдання | Хворій на хронічний бронхіт було призначено азитроміцин. Через деякий час з'явились скарги на біль та здуття живота, діарею, нудоту, блювання. Який побічний ефект розвинувся? |
| Правильна відповідь | Дисбактеріоз |
| B | Хондротоксичність |
| C | Фотосенсибілізація |
| D | Алергічна реакція |
| E | Нефротоксичність |
| № | крок 2020 |
| Тема | Клінічна фармація муколітичних та відхаркувальних засобів, фармацевтична опіка при патології дихальної системи |
| Текст завдання | У пацієнта 24-х років загострення хронічного бронхіту супроводжується кашлем з виділенням невеликої кількості в'язкого харкотиння. Який препарат показаний для полегшення відхаркування? |
| Правильна відповідь | Ацетилцистеїн |
| B | Окселадин |
| C | Будесонід |
| D | Фенотерол |
| E | Іпратропію бромід |
| № | крок 2020 |
| Тема | Клінічна фармація нітратів |
| Текст завдання | Вкажіть імовірну причину неефективності ізосорбїду мононітрату, яка розвинулася у пацієнта зі стенокардією напруги після 2-місяців перорального застосування: |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Толерантність |
| B | Кумуляція |
| C | Фізична залежність |
| D | Психічна залежність |
| E | Сенсибілізація |
| № | крок 2020 |
| Тема | Клінічна фармація нітратів, побічні ефекти |
| Текст завдання | У жінки раптово почався напад стенокардії. Для зняття нападу вона застосувала препарат, після прийому якого у неї виникли сильний головний біль, почервоніння обличчя, тахікардія. Для якої групи засобів характерні такі побічні ефекти? |
| Правильна відповідь | Нітрати |
| B | Блокатори кальцієвих каналів |
| C | Діуретики |
| D | Бета-адреноблокатори |
| E | Альфа-адреноблокатори |
| № | крок 2020 |
| Тема | Фармацевтична опіка при захворюваннях дихальної системи |
| Текст завдання | До провізора звернувся хворий із скаргами на закладеність носа, втомлюваність, головний біль. Який препарат необхідно запропонувати хворому від закладеності носа? |
| Правильна відповідь | Ксилометазолін |
| B | Лактулоза |
| C | Дексаметазон |
| D | Парацетамол |
| E | Ацикловір |
| № | крок 2020 |
| Тема | Принципи вибору антибактеріальних ЛЗ |
| Текст завдання | У хворої 27-ми років діагностовано негоспітальну пневмонію. Раніше у хворої спостерігалась алергічна реакція на ампіцилін. Який антибактеріальний засіб доцільно їй призначити? |
| Правильна відповідь | Азитроміцин |
| B | Цефтріаксон |
| C | Пеніцилін |

| | |
|---------------------|--|
| D | Цефобід |
| E | Цефазолін |
| № | крок 2020 |
| Тема | Спектри антибактеріальної активності, принципи вибору антибактеріальних ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнту з хелікобактер-асоційованою пептичною виразкою призначено курс лікування. Який з наведених засобів призначено в якості етіотропної фармакотерапії? |
| Правильна відповідь | Кларитроміцин |
| B | Ранітидин |
| C | Сукральфат |
| D | Фамотидин |
| E | Алюмінію гідроксид |
| № | крок 2020 |
| Тема | Клінічна фармація ЛЗ, що нормалізують обмінні процеси |
| Текст завдання | Який з наведених препаратів показаний хворому на подагру з гіперурікемією в амбулаторному періоді лікування? |
| Правильна відповідь | Алопуринол |
| B | Фуросемід |
| C | Аскорутин |
| D | Дипіридамол |
| E | Гіпотіазид |
| № | крок 2020 |
| Тема | Клінічна фармація антисекреторних ЛЗ |
| Текст завдання | Хворому 44-х років встановлено діагноз хронічний гастрит з підвищеною кислотоутворювальною функцією. Препарати якої фармакологічної групи найбільш доцільно використовувати в цьому випадку? |
| Правильна відповідь | Інгібітори протонної помпи |
| B | Блокатори бета-рецепторів |
| C | Інгібітори протеолітичних ферментів |
| D | Глюкокортикостероїди |
| E | Блокатори альфа-рецепторів |
| № | крок 2020 |
| Тема | Клінічна фармація препаратів інсуліну |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | У хворого 24-х років після ретельного обстеження вперше виявлено цукровий діабет 1-го типу. Який цукрознижувальний препарат доцільно призначити у цьому випадку? |
| Правильна відповідь | Інсулін |
| B | Етакринова кислота |
| C | Глібенкламід |
| D | Сечовина |
| E | Метформін |
| № | крок 2020 |
| Тема | Побічні ефекти антибактеріальних ЛЗ, їх профілактика та лікування |
| Текст завдання | Дитині 4-х років з метою лікування ангіни був призначений антибактеріальний препарат. Через тиждень після проведеного лікування дитина поскаржилася на шум у вухах, погіршення слуху. Який антибіотик міг спричинити такий побічний ефект? |
| Правильна відповідь | Гентаміцин |
| B | Цефтріаксон |
| C | Метронідазол |
| D | Азитроміцин |
| E | Ампіцилін |
| № | крок 2020 |
| Тема | Клінічна фармація протианемічних ЛЗ |
| Текст завдання | Хворій на залізодефіцитну анемію було призначено заліза сульфат. Який побічний ефект характерний для препаратів заліза? |
| Правильна відповідь | Закреп |
| B | Підвищення артеріального тиску |
| C | Остеопороз |
| D | Брадикардія |
| E | Дисбактеріоз |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація антигіпертензивних ЛЗ, вибір засобів |
| Текст завдання | Який із наведених препаратів є препаратом вибору для лікування артеріальної гіпертензії під час вагітності? |
| Правильна відповідь | Альфа-метилдофа |
| B | Фуросемід |

| | |
|---------------------|--|
| C | Нітропрусид натрію |
| D | Пропранолол |
| E | Каптоприл |
| № | крок 2021 |
| Тема | Фармакотерапія діабетичних ком |
| Текст завдання | У пацієнтки, яка хворіє на цукро-вий діабет, після передозування інсуліну виникла гіпоглікемія. Які дії слід вчинити за перших ознак гіпоглікемії? |
| Правильна відповідь | Дати хворій з'їсти грудочку цукру або випити теплою солодкою чаю |
| B | Виконати ін'єкцію інсуліну |
| C | Сублінгвально нітрогліцерин |
| D | Увести 0,1 % розчин адреналіну підшкірно |
| E | Увести кофеїн внутрішньом'язово |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація проталергічних ЛЗ |
| Текст завдання | Укажіть препарат, який найперше застосовується під час лікування анафілактичного шоку: |
| Правильна відповідь | Преднізолон |
| B | Еуфілін |
| C | Дибазол (Bendazol) |
| D | Фексофенадин |
| E | Лоратадин |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація антибіотиків, принципи вибору |
| Текст завдання | У пацієнтки 48 років, яка тривало лікується від хронічного гепатиту, діагностовано пневмонію. Який антибактеріальний засіб слід призначити у цьому разі, |
| Правильна відповідь | Амоксицилін |
| B | Тетрациклін |
| C | Бісептол |
| D | Рифампіцин |
| E | Стрептоміцин |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація вітамінів |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | Пацієнт звернувся до офтальмолога зі скаргами на поганий зір у темряві. Після збору анамнезу лікар припустив, що ці симптоми можуть бути пов'язані з недостатністю певного вітаміну. Який саме вітамін має на увазі лікар, |
| Правильна відповідь | Ретинол |
| B | Філохінон |
| C | Ергокальциферол |
| D | Холекальциферол |
| E | Токоферол |
| № | крок 2021 |
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнту в післяопераційному періоді тривалий час вводили промедол. Після відміни препарату у пацієнта виникли психічні та соматичні порушення. Яке явище спостерігається? |
| Правильна відповідь | Абстинентний синдром |
| B | Синдром обкрадання |
| C | Синдром рикошету |
| D | Ідіосинкразія |
| E | Тахіфілаксія |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація муколітиків та відхаркувальних засобів, побічні ефекти |
| Текст завдання | У пацієнта на тлі застосування відхаркувального засобу з'явилися скарги на гіперсалівацію, нежить, шкірні висипи та свербіння (явища йодизму). Укажіть, який засіб викликав ці побічні реакції: |
| Правильна відповідь | Калію йодид |
| B | Сироп амброксолу |
| C | Настій трави термопсису |
| D | Мукалтин |
| E | Амонію хлорид |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація антигіпертензивних ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнту, хворому на артеріальну гіпертензію, для підвищення антигіпертензивної дії діуретика лікар порадив: |
| Правильна відповідь | Зменшення вживання кухонної солі |
| B | Збільшення вживання рідини |
| C | Збільшення вживання кухонної солі |

| | |
|---------------------|---|
| D | Збільшення фізичного навантаження |
| E | Зменшення фізичного навантаження |
| № | крок 2021 |
| Тема | Побічна дія ЛЗ |
| Текст завдання | У вагітної 25 років у третьому триместрі вагітності під час чергового УЗД встановлено ваду розвитку дитини. З анамнезу відомо, що жінка без призначення лікаря приймала упродовж строку вагітності у великих дозах діазепам. Який вид побічної дії має місце? |
| Правильна відповідь | Тератогенний |
| B | Ембріотоксичний |
| C | Фетотоксичний |
| D | Мутагенний |
| E | Канцерогенний |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація антисекреторних ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнту 44 років поставлено діагноз: хронічний гастрит з підвищеною кислотоутворювальною функцією. Препарати якої фармакологічної групи найбільш доцільно використовувати у цьому разі? |
| Правильна відповідь | Інгібітори протонної помпи |
| B | Блокатори бета-рецепторів |
| C | Блокатори альфа-рецепторів |
| D | Глюкокортикостероїди |
| E | Інгібітори протеолітичних ферментів |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармакокінетика |
| Текст завдання | Одним із типів покриття таблеток є ентросолюбільні оболонки. Укажіть місце їх розчинення: |
| Правильна відповідь | У кишечнику |
| B | У ротовій порожнині |
| C | У прямій кишці |
| D | У шлунку |
| E | У стравоході |
| № | крок 2021 |
| Тема | Побічна дія ЛЗ |

| | |
|---------------------|--|
| Текст завдання | Пацієнт, який страждає на артеріальну гіпертензію, тривалий час приймав бета-адреноблокатор (бісопролол). У зв'язку з поліпшенням стану він раптово припинив застосування препарату, що викликало різке підвищення артеріального тиску. Як називається таке ускладнення терапії? |
| Правильна відповідь | Синдром відміни |
| B | Бронхоспазм |
| C | Знижена чутливість |
| D | Брадикардія |
| E | Дисбактеріоз |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація антигіпертензивних ЛЗ, вибір засобів |
| Текст завдання | У пацієнта, хворого на артеріальну гіпертензію (АТ-160/100 мм рт.ст., ЧСС-64/хв) є ознаки затримки рідини (пастозність гомілок, задуха та ін.). Який з гіпотензивних засобів є препаратом вибору в разі наявності набрякового синдрому? |
| Правильна відповідь | Гідрохлортіазид |
| B | Амлодипін |
| C | Еналаприл |
| D | Лозартан |
| E | Метопролол |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація антибіотиків, спектри протимікробної активності |
| Текст завдання | Який антибактеріальний засіб міститься у схемі ерадикаційної терапії <i>H.pylori</i> під час лікування пептичної виразки шлунка? |
| Правильна відповідь | Кларитроміцин |
| B | Цефтріаксон |
| C | Меропенем |
| D | Бісептол |
| E | Гентаміцин |
| № | крок 2021 |
| Тема | Побічні ефекти антибіотиків |
| Текст завдання | У 6-річному віці дитина захворіла пневмонією, через що був призначений антибіотик. Після лікування у дитини погіршився слух. Який засіб міг викликати це ускладнення? |

| | |
|---------------------|---|
| Правильна відповідь | Гентаміцин |
| B | Ампіцилін |
| C | Пеніцилін |
| D | Цефтриаксон |
| E | Азитроміцин |
| № | крок 2021 |
| Тема | Взаємодія ЛЗ |
| Текст завдання | Під час проведення комбінованої терапії включення до її складу активованого вугілля викликає таку зміну сорбції інших препаратів: |
| Правильна відповідь | Зменшення |
| B | Збільшення |
| C | Активацію |
| D | Прискорення |
| E | Не впливає |
| № | крок 2021 |
| Тема | Фармацевтична опіка при міалгії |
| Текст завдання | До аптеки звернулася мама із проханням відпустити їй протизапальний засіб для 10-річного хлопчика для полегшення м'язового болю. Який лікарський засіб Ви можете їй порадити? |
| Правильна відповідь | Ібупрофен |
| B | Ацетилсаліцилова кислота |
| C | Німесулід |
| D | Диклофенак натрію |
| E | Напроксен |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація нітратів, побічні ефекти |
| Текст завдання | Пацієнт, який придбав у аптеці нітрогліцерин для сублінгвального застосування, цікавиться, яка побічна дія може розвинутись після застосування цього засобу? |
| Правильна відповідь | Головний біль |
| B | Затримка сечовипускання |
| C | Сонливість |
| D | Сухий кашель |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Підвищення артеріального тиску |
| № | крок 2021 |
| Тема | Побічні ефекти нестероїдних протизапальних ЛЗ |
| Текст завдання | Гастроуденопатії є одними з найчастіших ускладнень фармакотерапії нестероїдними протизапальними лікарськими засобами. Яке із вказаних нижче тверджень правильно пояснює причини їх виникнення? |
| Правильна відповідь | Гальмування синтезу простагландинів у слизовій оболонці |
| В | Порушення проведення больового імпульсу |
| С | Гальмування адгезії і агрегації тромбоцитів |
| Д | Гальмування агрегації нейтрофілів |
| Е | Гальмування перекисного окислення ліпідів |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація нітрофуранів |
| Текст завдання | Жінці 36 років для лікування кишкової інфекції було призначене похідне нітрофуранів, яке погано всмоктується в кишечнику та здійснює дію за ходом кишечника. Визначте ЛЗ: |
| Правильна відповідь | Ніфуроксазид |
| В | Фурацилін |
| С | Фурадонін |
| Д | Нітроксолін |
| Е | Налідиксова кислота |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація гормональних засобів |
| Текст завдання | Укажіть лікарську речовину, що належить до естрогенів нестроїдної будови: |
| Правильна відповідь | Синестрол |
| В | Ретаболіл |
| С | Адреналін |
| Д | Преднізолон |
| Е | Прогестерон |
| № | крок 2021 |
| Тема | Фармацевтична опіка лихоманки |
| Текст завдання | До провізора в аптеці звернулась жінка за порадою щодо вибору жарознижувального засобу для 4-місячної дитини для домашньої аптечки. Який препарат і в якій формі Ви порадите? |

| | |
|---------------------|--|
| Правильна відповідь | Парацетамол у ректальних свічках |
| B | Ібупрофен у таблетках |
| C | Ацетилсаліцилова кислота у порошку |
| D | Ацетилсаліцилова кислота у таблетках |
| E | Диклофенак натрію у таблетках |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація антигіпертензивних ЛЗ, взаємодія ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнту з артеріальною гіпертензією, що приймає каптоприл, призначено сечогінний засіб спіронолактон. До якого ускладнення терапії може призвести така комбінація? |
| Правильна відповідь | Гіперкаліємія |
| B | Гіпоглікемія |
| C | Гіпернатріємія |
| D | Гіпонатріємія |
| E | Гіпокальціємія |
| № | крок 2021 |
| Тема | Реімбурсація |
| Текст завдання | Аптека здійснює лікарське забезпечення хворих на пільгових та безоплатних засадах. Укажіть, у разі якого захворювання під час амбулаторного лікування дозволяється відпускати ліки безоплатно: |
| Правильна відповідь | Цукровий діабет |
| B | Застуда |
| C | Біль у м'язах |
| D | Порізи та садна |
| E | Головний біль |
| № | крок 2021 |
| Тема | Побічна дія антибіотиків |
| Текст завдання | У хворого на туберкульоз після початку лікування виникло почервоніння сечі, слини, слізної рідини. Який препарат міг викликати такі явища? |
| Правильна відповідь | Рифампіцин |
| B | Розчин йоду спиртовий |
| C | Ізоніазид |
| D | Ципрофлоксацин |

| | |
|---------------------|--|
| Е | Бензилпеніциліну натрієва сіль |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація препаратів метаболічного типу дії |
| Текст завдання | Який із наведених препаратів призначено хворому на подагру з гіперурикемією в амбулаторному періоді лікування? |
| Правильна відповідь | Алопуринол |
| В | Фуросемід |
| С | Дипіридамол |
| Д | Аскорутин |
| Е | Гіпотіазид |
| № | крок 2021 |
| Тема | Принципи етіотропного лікування виразкової хвороби |
| Текст завдання | Пацієнту з хелікобактер-асоційованою пепетичною виразкою призначено курс лікування. Який із наведених засобів призначено як етіотропна фармакотерапія? |
| Правильна відповідь | Кларитроміцин |
| В | Сукральфат |
| С | Алюмінію гідроксид |
| Д | Фамотидин |
| Е | Ранітидин |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація вітамінів |
| Текст завдання | До аптеки звернувся чоловік 60 років зі скаргами на погіршення сутінкового зору, сухість склер, тріщини шкіри та її лущення. Провізор припустив прояв гіповітамінозу і запропонував пацієнту після консультації з лікарем використати: |
| Правильна відповідь | Ретинолу ацетат |
| В | Токоферолу ацетат |
| С | Препарати кальцію |
| Д | Аскорбінову кислоту |
| Е | Ергокальциферол |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація антацидів, побічна дія |
| Текст завдання | До аптеки звернулась жінка 28 років зі скаргами на закреп після застосування антацидного засобу. Підкажіть, який лікарський засіб міг викликати таку побічну дію? |

| | |
|---------------------|--|
| Правильна відповідь | Засіб, що містить алюміній |
| B | Засіб, що містить магній |
| C | Ранітидин |
| D | Кальцію карбонат |
| E | Симетикон |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація нітратів, побічна дія |
| Текст завдання | Проконсультуйте хворого на стенокардію, який приймає нітрати пролонгованої дії. Яка побічна дія найбільш характерна для цих засобів? |
| Правильна відповідь | Головний біль |
| B | Блювання |
| C | Нудота |
| D | Пронос |
| E | Закреп |
| № | крок 2021 |
| Тема | Ознаки клінічних станів |
| Текст завдання | До аптеки зайшла жінка 43 років зі скаргами на різкий головний біль у потиличній ділянці, серцебиття, миготіння "мушок" перед очима, нудоту. Рівень АТ - 180/110 мм рт.ст. Якому стану відповідають ці симптоми? |
| Правильна відповідь | Гіпертонічний криз |
| B | Остеохондроз шийних хребців |
| C | Напад стенокардії напруги |
| D | Напад мігрені |
| E | Гострий кон'юктивіт |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація антибіотиків |
| Текст завдання | У хворої 27 років діагностовано позашпитальну пневмонію. Раніше у хворої спостерігалась алергічна реакція на ампіцилін. Який антибактеріальний засіб доцільно їй призначити? |
| Правильна відповідь | Азитроміцин |
| B | Цефобід |
| C | Пеніцилін |
| D | Цефазолін |

| | |
|---------------------|---|
| Е | Цефтріаксон |
| № | крок 2021 |
| Тема | Клінічна фармація муколітиків, фармацевтична опіка при кашлі |
| Текст завдання | У пацієнта 24 років загострення хронічного бронхіту супроводжується кашлем із виділенням невеликої кількості в'язкого харкотиння. Який препарат показаний для полегшення відхаркування? |
| Правильна відповідь | Ацетилцистеїн |
| В | Фенотерол |
| С | Окселадин |
| Д | Будесонід |
| Е | Іпратропію бромід |
| № | крок 2022 |
| Тема | Клінічна фармація глюкокортикостероїдів, побічні ефекти протизапальних ЛЗ |
| Текст завдання | Який патологічний стан може виникнути під час тривалого лікування преднізолоном? |
| Правильна відповідь | Шлунково-кишкова кровотеча |
| В | Міокардит |
| С | Пієлонефрит |
| Д | Пневмонія |
| Е | Слюнотеча |
| № | крок 2022 |
| Тема | Побічні ефекти протизапальних ЛЗ, їх профілактика і лікування |
| Текст завдання | Який ЛЗ може спричинити у дитини розвиток синдрому Рея під час лікування лихоманки вірусного походження? |
| Правильна відповідь | Ацетилсаліцилова кислота |
| В | Ібупрофен |
| С | Метамізол натрію |
| Д | Целекоксиб |
| Е | Парацетамол |
| № | крок 2022 |
| Тема | Принципи лікування гострих отруєнь ЛЗ, антидотна терапія |
| Текст завдання | Внаслідок передозування гепарином у пацієнта розвинулася кровотеча. Який ЛЗ необхідно застосувати як антидот? |
| Правильна відповідь | Протаміну сульфат |
| В | Метіонін |

| | |
|---------------------|--|
| С | Унітіол |
| D | Тіосульфат |
| Е | Налоксон |
| № | крок 2022 |
| Тема | Клінічна фармакокінетика |
| Текст завдання | Який спосіб застосування ректальних мазей? |
| Правильна відповідь | Наносять на уражену ділянку заднього проходу |
| В | Наносять на слизову кон'юктиви |
| С | Наносять на слизову носа |
| D | Наносять на шкіру |
| Е | Наносять на зовнішні статеві органи |
| № | крок 2022 |
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ |
| Текст завдання | У пацієнта віком 25 років під час проведення ерадикаційної квадротерапії <i>H.pylori</i> після випорожнення спостерігається кал чорного кольору. Приймання якого ЛЗ спровокувало таку побічну дію? |
| Правильна відповідь | Вісмуту субцитрат |
| В | Метронідазол |
| С | Амоксицилін |
| D | Тетрациклін |
| Е | Омепразол |
| № | крок 2022 |
| Тема | Клінічна фармація антибіотиків, побічні ефекти, лікування і профілактика |
| Текст завдання | Чотирирічній дитині для лікування ангіни призначено антибактеріальний препарат. Через тиждень після проведеного лікування дитина поскаржилася на шум у вухах та погіршення слуху. Який антибіотик міг спричинити такий побічний ефект? |
| Правильна відповідь | Гентаміцин |
| В | Цефтриаксон |
| С | Ампіцилін |
| D | Метронідазол |
| Е | Азитроміцин |
| № | крок 2022 |

| | |
|---------------------|--|
| Тема | Клінічна фармація антибіотиків, побічні ефекти, лікування і профілактика |
| Текст завдання | У жінки віком 27 років діагностовано негоспітальну пневмонію. Раніше у пацієнтки спостерігалася алергічна реакція на пеніцилін. Який антибактеріальний засіб доцільно їй призначити? |
| Правильна відповідь | Азитроміцин |
| B | Цефазолін |
| C | Цефтріаксон |
| D | Цефобід |
| E | Пеніцилін |
| № | крок 2022 |
| Тема | Клінічна фармакодинаміка |
| Текст завдання | Який з наведених препаратів має протиблювотну активність? |
| Правильна відповідь | Метоклопрамід |
| B | Лоперамід |
| C | Алюмінію фосфат |
| D | Натрію гідрокарбонат |
| E | Кларитроміцин |
| № | крок 2022 |
| Тема | Побічні ефекти ЛЗ |
| Текст завдання | Пацієнт із діагнозом гострий риніт застосовував краплі ксилометазоліну. Через 7 днів лікування він помітив, що ефект лікарського засобу зменшився і після збільшення дози препарату - не відновився. Назвіть медичний термін, що характеризує раптове зниження чутливості до лікарського засобу. |
| Правильна відповідь | Толерантність |
| B | Синергізм |
| C | Антагонізм |
| D | Тахіфілаксія |
| E | Феномен "рикошету" |
| № | крок 2022 |
| Тема | Клінічна фармація антибіотиків |
| Текст завдання | Яка група антибактеріальних ЛЗ використовується як препарати першої лінії для лікування неускладненої негоспітальної пневмонії у осіб молодого віку? |
| Правильна відповідь | Напівсинтетичні пеніциліни |

| | |
|---------------------|--|
| В | Аміноглікозиди |
| С | Нітрофурани |
| Д | Оксихіноліни |
| Е | Тетрацикліни |
| № | крок 2022 |
| Тема | Взаємодія ЛЗ |
| Текст завдання | Яка дія відбувається на тлі сукупного застосування алюмінієво-магнієвих антацидів і препаратів заліза? |
| Правильна відповідь | Знижується ефективність препаратів заліза |
| В | Підвищується артеріальний тиск |
| С | Знижується артеріальний тиск |
| Д | Підвищується ризик гепатотоксичності |
| Е | Підвищується ефективність антацидів |
| № | крок 2022 |
| Тема | Фармацевтична опіка при лихоманці |
| Текст завдання | Який ЛЗ із наведених найдоцільніше рекомендувати вагітній жінці із симптомами ГРВЗ для зниження температури тіла? |
| Правильна відповідь | Парацетамол |
| В | Ацетилсаліцилова кислота |
| С | Індометацин |
| Д | Німесулід |
| Е | Диклофенак натрію |
| № | крок 2022 |
| Тема | Взаємодія ЛЗ |
| Текст завдання | Яку зміну сорбції інших препаратів може викликати активоване вугілля, якщо його включити до складу комбінованої терапії? |
| Правильна відповідь | Зменшення |
| В | Збільшення |
| С | Прискорення |
| Д | Активація |
| Е | Не впливає |
| № | крок 2022 |

| | |
|---------------------|---|
| Тема | Клінічна фармація антибіотиків |
| Текст завдання | До якої групи антибіотиків за своєю хімічною будовою належить еритроміцин? |
| Правильна відповідь | Макроліди |
| B | Поліпептиди |
| C | Бета-лактами |
| D | Полієни |
| E | Антибіотики ароматичної будови |
| № | крок 2022 |
| Тема | Клінічна фармація ферментних препаратів, клінічна фармакокінетика |
| Текст завдання | Яка особливість застосування таблетованої форми ферментного препарату панкреатину? |
| Правильна відповідь | Під час приймання їжі |
| B | Незалежно від приймання їжі |
| C | За 2 години до приймання їжі |
| D | За 1 годину до приймання їжі |
| E | Через 1 годину після приймання їжі |
| № | крок 2022 |
| Тема | Клінічна фармація бронхолітиків |
| Текст завдання | Шестирічна дівчинка хворіє на бронхіальну астму протягом 3 років. Для припинення нападів педіатр призначив бета-2-адреноміметик короткої дії. Який препарат з наведених призначив лікар? |
| Правильна відповідь | Сальбутамол |
| B | Іпратропію бромід |
| C | Тіотропію бромід |
| D | Флутіказон |
| E | Будесонід |
| № | крок 2022 |
| Тема | Клінічна фармація нітратів, побічна дія |
| Текст завдання | Пацієнт віком 65 років впродовж 2 місяців безперервно приймає нітрогліцерин. Останнім часом він відзначає поступове зниження клінічного ефекту. Яку назву має поняття, яке описує це явище? |
| Правильна відповідь | Толерантність |
| B | Ідіосинкразія |
| C | Синдром відміни |

| | |
|---------------------|---|
| D | Анафілактична реакція |
| E | Синдром Рея |
| № | крок 2022 |
| Тема | Клінічна фармація антацидів |
| Текст завдання | Який з наведених препаратів має антацидну дію? |
| Правильна відповідь | Алюмінію фосфат |
| B | Омепразол |
| C | Ранітидин |
| D | Фамотидин |
| E | Пірензепин |
| № | крок 2022 |
| Тема | Фармацевтична опіка при метеоризмі |
| Текст завдання | Який ЛЗ із наведених застосовують для симптоматичного лікування метеоризму? |
| Правильна відповідь | Симетикон |
| B | Папаверин |
| C | Альмагель |
| D | Дротаверин |
| E | Платифілін |