

№	Крок 2021
Тема	Новоутворення
Текст завдання	У жінки 63 років на бічній поверх-ні шиї виявлене новоутворення оваль-ної форми з гладенькою поверхнею та розмірами близько 3 см. При пальпації новоутворення має м'яку тістоподібну консистенцію, рухоме, безболісне. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Бічна кіста шиї
B	Фіброма
C	Аденома
D	Лімфома
E	Ліпома
№	Крок 2021
Тема	Новоутворення
Текст завдання	На рентгенограмі нижньої щелепи у хлопчика 14 років було виявлено гомо-генне просвітлення округлої форми з чіткими межами. Новоутворення розташовується в товщі тіла нижньої щелепи в ділянці видаленого 7 місяців тому 36-го зуба. Під час пункції утворення отрима-но жовтувату рідину з кристалами холе-стерину. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Резидуальна кіста
B	Парадентальна кіста
C	Фолікулярна кіста
D	Цементома
E	Радикулярна кіста
№	Крок 2021
Тема	Невідкладний стан
Текст завдання	Пацієнт 62 років звернувся до стома-толога для видалення 44-го зуба. Під час огляду пацієнт раптово втратив свідо-мість. Дихання і пульс повільні. Їлова нахилена, руки зігнуті в ліктях і зап'яс-тках, ноги витягнуті, щелепи стиснені. Розпочалися клонічні судоми, пінисте слиновиділення. Зіниці не реагують на світло, широкі. За 1,5 хвилини відбулося розслаблення м'язів. Свідомість сплута-на. Поставте імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Епілептичний напад
B	Приступ пароксизмальної тахікардії
C	Гіпертонічний криз
D	Непритомність
E	Гостре порушення мозкового крово-обігу

№	Крок 2021
Тема	Знеболення
Текст завдання	Пацієнту 33 років проводять лікування 15-го зуба з приводу гострого середнього карієсу. Який ефективний метод знеболення є найдоцільнішим?
Правильна відповідь	Інфільтраційна анестезія
В	Провідникова анестезія
С	Інгаляційний наркоз
Д	Неінгаляційний наркоз
Е	Аплікаційна анестезія
№	Крок 2021
Тема	Видалення зубів
Текст завдання	Чоловікові 37 років показано видалення 25-го зуба під місцевим знеболенням. Де повинен бути лікар щодо хворого під час видалення 25-го зуба?
Правильна відповідь	Попереду та праворуч від хворого
В	Попереду та ліворуч від хворого
С	Прямо перед хворим
Д	Позаду та ліворуч від хворого
Е	Позаду та праворуч від хворого
№	Крок 2021
Тема	Знеболення
Текст завдання	Жінка 37 років звернулася до лікаря-стоматолога з метою видалення 25 зуба. Який метод знеболення треба застосувати?
Правильна відповідь	дностороння туберальна, інфраорбітальна, палатинальна анестезія
В	Одностороння туберальна і палатинальна анестезія
С	Двостороння центральна анестезія
Д	Одностороння інфраорбітальна і різцева анестезія
Е	Одностороння інфраорбітальна і палатинальна анестезія
№	Крок 2021
Тема	Запальні процеси

Текст завдання	Хлопчик 8 років скаржиться на гострий біль у ділянці нижньої щелепи зліва, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,6°C, утруднене відкривання рота і ковтання. Об'єктивно встановлено: обличчя асиметричне через набряк у нижній третині лівої щоки та підщелепної ділянки. Спостерігається набряк слизової в ділянці 73-го, 74-го та 75-го зубів з обох боків альвеолярного відростка, зуби рухомі, перкусія позитивна, наявний симптом Венсана. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Гострий одонтогенний остеомиєліт
В	Загострення хронічного періодонтиту
С	Одонтогенна флегмона піднижньощелепної ділянки
Д	Неодонтогенний гострий гнійний лімфаденіт
Е	Запальний інфільтрат лівої щоки
№	Крок 2021
Тема	Травма
Текст завдання	До відділення щелепно-лицевої хірургії направлено хворого чоловіка 34 років із відмороженням шкіри обличчя. Під час огляду шкіра в місці ураження набрякла, гіперемована, з ціанотичним відтінком. Некроз тканин відсутній. Уста-новіть ступінь обмороження:
Правильна відповідь	II ступінь
В	III ступінь
С	-I ступінь
Д	I ступінь
Е	
№	Крок 2021
Тема	Знеболення
Текст завдання	У хворого під час проведення ту-беральної анестезії внутрішньоротовим шляхом з'явився набряк тканин лівої щоки, що швидко наростав і поширився в скроневу ділянку. Яке ускладнення, імовірно, розвинулося в цій клінічній картині?
Правильна відповідь	Гематома
В	Ішемія
С	Емфізема
Д	Абсцес
Е	Набряк Квінке
№	Крок 2021
Тема	Вроджені вади

Текст завдання	Дитині, яка народилася з розщели-ною піднебіння, показане виготовлення obturатора. Який оптимальний вік дити-ни для виготовлення obturатора у разі розщелини піднебіння?
Правильна відповідь	1 рік
B	1,5
C	5-6 років
D	3—4 роки
E	Перші дні після народження
№	Крок 2021
Тема	Новоутворення
Текст завдання	Хворий чоловік 38 років має скарги на наявність новоутворення розміром до 1 см на яснах у ділянці 14-го зуба. Но-воутворення яскраво-червоного кольо-ру, м'якої консистенції, округлої форми, кровоточить, якщо доторкнутися. Якому захворюванню відповідає така клінічна картина?
Правильна відповідь	Ангіоматозний епулід
B	Еозинофільна гранульома
C	Мігруюча гранульома
D	Фіброзний епулід
E	Фіброма
№	Крок 2021
Тема	травма
Текст завдання	Пацієнт 45 років скаржиться на біль у ділянці верхньої щелепи. З анамнезу відомо: 2 дні тому отримав травму. Об'є-ктивно встановлено: порушення прикусу. Під час пальпації альвеолярний відро-сток верхньої щелепи рухомий. Постав-те попередній діагноз:
Правильна відповідь	Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I
B	Перелом виличної кістки
C	Забій верхньої щелепи
D	Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II
E	Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III
№	Крок 2021
Тема	Знеболення
Текст завдання	Пацієнтці 31 року виготовляється ме-талокерамічний мостоподібний протез з опорою на вітальні 33-й, 36-й, 37-й зу-би. Планується препарування зубів під анестезією. Який вид анестезії буде най-ефективнішим у цій клінічній ситуації?

Правильна відповідь	Провідникова (торусальна)
B	Інфільтраційна
C	Інтралігаментарна
D	Аплікаційна
E	
№	Крок 2021
Тема	травма
Текст завдання	До травм пункту доставлено чоловіка з приводу виробничої травми правої по-ловини обличчя. Травму отримав близько 3 годин тому, свідомість не втрачав. Об'єктивно встановлено: у ділянці пра-вої щоки визначається рана 5x3 см, не-правильної форми, з нерівними краями. Якщо розвести краї рани видно нерухомі зуби. З боку порожнини рота - розрив слизової оболонки щоки. Прикус не по-рушено. Який вид хірургічної обробки потрібно провести у цього хворого?
Правильна відповідь	Первинна пізня хірургічна обробка
B	Первинна рання хірургічна обробка
C	Первинна відтермінована хірургічна обробка
D	Вторинна хірургічна обробка
E	
№	Крок 2021
Тема	травма
Текст завдання	Дитина 2 років отримала травму зу-бів. Об'єктивно встановлено: коронки 51-го і 61-го зубів коротші від сусідніх на 1/3. Слизова оболонка в ділянці 51-го і 61-го зубів гіперемована, набрякла. Нарентгенограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів 51-го і 61-го зубів відсутня. Яка лікувальна тактика буде оптимальною?
Правильна відповідь	Диспансерне спостереження
B	Лігатурне шинування
C	Реплантація
D	Видалення 51-го, 61-го зубів
E	Репозиція 51-го, 61-го зубів
№	Крок 2021
Тема	травма
Текст завдання	Чоловіку 65 років діагностовано дво-бічний неускладнений перелом нижньої щелепи в ментальних відділах. Пацієнт користується повними знімними протезами. Оберіть метод постійного шину-вання:
Правильна відповідь	Протези пацієнта

В	Шина Вебера
С	Шина Ванкевич
Д	Шина Васильєва
Е	Шина Васильєва
№	Крок 2021
Тема	травма
Текст завдання	У хворого після травми виникли скарги на зміну положення 32-го зуба та біль, що посилюється під час відкушування їжі. Під час огляду відзначено набряк нижньої губи, гематому слизової оболонки в ділянці 32-го зуба, рухомість зуба І ступеня, невелике зміщення 32-го зуба в сагітальному напрямку. На рентгенограмі виявлено: розширення періодонтальної щілини. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Неповний вивих 32-го зуба
В	Забій 32-го зуба
С	Повний вивих 32-го зуба
Д	Перелом кореня 32-го зуба
Е	Вбитий вивих 32-го зуба
№	Крок 2021
Тема	травма
Текст завдання	У чоловіка 35 років відкритий одно-сторонній перелом тіла нижньої щелепи зліва без зміщення. Лінія перелому проходить між відсутніми 33-м і 34-м зубами. Планується іммобілізація відламків. Яку шину доцільно використати?
Правильна відповідь	Двощелenna шина із зачіпними петля-ми
В	Шина з похилою площиною
С	Шина Тігерштедта з розпірковим вигином
Д	Шина Порта
Е	
№	Крок 2021
Тема	Знеболення
Текст завдання	Дитина 6 років направлена для вида-лення нижніх молочних центральних різ-ців з приводу зміни прикусу. Зуби рухомі ІІІ ступеня. Виберіть оптимальний вид знеболення:
Правильна відповідь	Аплікаційне знеболення
В	Внутрішньокісткове знеболення
С	Провідникове знеболення
Д	Інфільтраційне знеболення

Е	Інгаляційний наркоз
№	Крок 2021
Тема	травма
Текст завдання	Хворий 26 років звернувся по допомогу до стоматологічної клініки. Було встановлено діагноз: перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи без зміщення в ділянці 14-го, 15-го зубів. Безперервність зубного ряду збережена. Усі зуби стійкі. Яку шину необхідно застосувати в цьому разі?
Правильна відповідь	Піаденька шина-скоба
В	Шина Тігерштедта з розпіркою
С	Шина Тігерштедта з похилою площиною
Д	Шина Тігерштедта із зачіпними петлями
Е	Шина Васильєва ,
№	Крок 2021
Тема	Запальні процеси
Текст завдання	Хвора 34 років звернулася зі скаргами на біль у лівій половині нижньої щелепи. 2 місяці тому були видалені 35-й, 36-й, 37-й зуби. Об'єктивно встановлено: визначається муфтоподібне потовщення лівої половини нижньої щелепи. На рентгенограмі спостерігається наявність секвестру. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Хронічний одонтогенний остеомієліт
В	Гострий гнійний періостит
С	Саркома нижньої щелепи
Д	Амелобластома
Е	Гострий серозний альвеоліт
№	Крок 2021
Тема	Запальні процеси
Текст завдання	Чоловік 47 років має скарги на біль, припухлість у піднижньощелепній ділянці ліворуч та біль під час вживання їжі. Об'єктивно встановлено: рот відкриває вільно у повному обсязі, слизова оболонка лівого під'язикового валика гіперемована, з вивідного протоку піднижньощелепної слинної залози виділяється каламутна слина у невеликій кількості. На рентгенограмі дна порожнини рота є тінь овальної форми до 1 см. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Слинокам'яна хвороба
В	Ліпома піднижньощелепної ділянки
С	Лімфаденіт піднижньощелепної ділянки
Д	Остеома нижньої щелепи
Е	

№	Крок 2021
Тема	Захворювання суглобів
Текст завдання	Чоловік 21 року звернувся зі скаргами на утруднене відкривання рота, зміну зовнішнього вигляду обличчя протягом останніх 2 років. В анамнезі вказано: травма обличчя декілька років тому. Об'єктивно вказано: сплюснення правої половини обличчя, зміщення підборіддя вліво. Під час пальпації відзначається зменшення екскурсії суглобової голівки нижньої щелепи зліва. Обмеження відкривання рота до 1
Правильна відповідь	анкілоз лівого СНЩС
В	Гострий артрит лівого СНЩС
С	Передній вивих нижньої щелепи
Д	Артроз лівого СНЩС
Е	Загострення хронічного артрити СНЩС зліва
№	Крок 2021
Тема	Видалення зубів
Текст завдання	Хворий 44 років скаржиться на постійний ниючий біль, що посилюється під час вживання їжі, у ділянці видаленого 2 дні тому 37-го зуба. Об'єктивно встановлено: лунка видаленого зуба вкрита сірим налітом. Слизова оболонка навколо лунки гіперемована, набрякла, болісна під час пальпації. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Гострий серозний альвеоліт
В	Гострий серозний періостит
С	Гострий одонтогенний остеомієліт
Д	Перикоронарит
Е	Хронічний деструктивний остеомієліт
№	Крок 2021
Тема	видання зубів
Текст завдання	Чоловік 40 років звернувся до хірурга-стоматолога для видалення 16-го зуба. Коронка 16-го зуба збережена. Які щипці слід вибрати для видалення 16-го зуба?
Правильна відповідь	S-подібні праві
В	S-подібні ліві
С	Прямі
Д	Багнетоподібні коронкові
Е	S-подібні
№	Крок 2021
Тема	Невідкладний стан

Текст завдання	Жінка 27 років звернулася до сто-матолога з приводу санації порожнини рота. Після проведення анестезії хвора поскаржилася на запаморочення, дзвін у вухах, потемніння в очах, загальну слаб-кість. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, укрита холодним потом. Пульс - 94/хв., слабого наповнення і напружен-ня, артеріальний тиск - 96/60 мм рт. ст. Спостерігалась короточасна втрата сві-домості на 30 секунд. Який невідкладний стан розвинувся у хворой?
Правильна відповідь	Непритомність
B	Колапс
C	Гіпертонічний криз
D	Гостра серцева недостатність
E	
№	Крок 2021
Тема	Новоутворення
Текст завдання	Жінка 37 років скаржиться на наяв-ність пухлини на нижній губі з боку по-рожнини рота, яка з'вилась близько 2 ти-жнів тому, збільшувалась, заважала під час рухів губи. Об'єктивно встановлено: у товщі нижньої губи наявне обмежене еластичне безболісне ущільнення округлої форми, спаяне зі слизовою оболон-кою. Слизова над ущільненням прозора, навколо не змінена. Регіонарні лімфа-тичні вузли не збільшені. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Ретенційна кіста губи
B	Ліпома губи
C	Фіброма губи
D	Папілома губи
E	Абсцес губи
№	Крок 2021
Тема	травма
Текст завдання	Чоловік 32 років надійшов до клініки, до щелепно-лицевого відділення, з діа-гнозом відкритий двосторонній перелом нижньої щелепи в ділянці кутів зі змі-щенням уламків. Рентгенологічно вияв-лено: великий діастаз між фрагментами, інтерпозиція м'язів. Який основний ме-тод лікування слід застосувати для цього пацієнта?
Правильна відповідь	Двосторонній остеосинтез нижньої щелепи
B	Накладання шини із зачіпними петля-ми на нижню щелепу
C	Виготовити шину Ванксович для фікса-ції нижньої щелепи
D	Накладання гладенької шини-скоби
E	Виготовити шину Порта для фіксації нижньої щелепи
№	Крок 2020
Тема	невідкладні стани

Текст завдання	Хворий 42-х років звернувся до хірургастоматолога з метою санації порожнини рота. Після проведення анестезії у хворого раптово з'явилася нудота, різка слабкість, відчуття тиснення за грудиною, біль у серці. Шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, з'явилося блювання. Хворий втратив свідомість, з'явилися судоми. Зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Який діагноз у хворого?
Правильна відповідь	Анафілактичний шок
B	Непритомність
C	Епілептичний напад
D	Травматичний шок
E	Колапс
№	Крок 2020
Тема	захворювання суглобів
Текст завдання	Хворий 32-х років скаржиться на помірний, періодичний, тупий, ниючий біль у лівому СНЩС, відзначає скутість лівого СНЩС, обмеження відкривання рота в кінці дня. Рентгенологічно – звуження суглобової щілини лівого СНЩС. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Артроз лівого СНЩС
B	Больова дисфункція лівого СНЩС
C	Анкілоз лівого СНЩС
D	Хронічний артрит лівого СНЩС
E	Гострий артрит лівого СНЩС
№	Крок 2020
Тема	травма
Текст завдання	Хворий 21-го року три години тому отримав ножове поранення в ділянці правої щоки; була кровотеча, яка на момент огляду припинилася. Об'єктивно: в ділянці правої щоки наявна рана з рівними краями, яка не проникає в порожнину рота, розміром 4x1 см, заповнена згустком. Накладання яких швів показане хворому?
Правильна відповідь	Первинні глухі
B	Пізні вторинні
C	Ранні вторинні
D	Первинні направляючі
E	Первинні зближуючі
№	Крок 2020
Тема	невідкладні стани

Текст завдання	Під час препарування зубів під ортопедичну конструкцію пацієнтка 65-ти років нерозбірливо поскаржилася на різкий головний біль, відчуття жару, нудоту, оніміння кінцівок. Обличчя асиметричне за рахунок зглаженості носо-губної складки з однієї сторони. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гостре порушення мозкового кровообігу
B	Стенокардія
C	Інфаркт міокарда
D	Непритомність
E	Пневмоторакс
№	Крок 2020
Тема	травма
Текст завдання	Хворий 27-ми років отримав травму нижньої щелепи. Після проведення рентгенологічного обстеження діагностований односторонній відкритий перелом нижньої щелепи на рівні ментального отвору зі зміщенням. У хворого є всі зуби. Лінія перелому проходить між 34-35 зубами. Яку шину доцільно використати?
Правильна відповідь	Двощелепна шина із зачіпними петлями
B	Двощелепна шина з розпірковим вигином
C	Гладка шина-скоба
D	Шина з коригувальною петлею
E	Шина з похилою площиною
№	Крок 2020
Тема	травма
Текст завдання	Хворий 28-ми років отримав удар в підборіддя. Скаржить на біль в боковій ділянці обличчя справа. При огляді відзначається асиметрія обличчя за рахунок набряку тканин верхньої частини правої привушної ділянки, відкривання рота болісне, обмежене, зміщення щелепи в правий бік, косий правобічний прикус. Який попередній діагноз у хворого?
Правильна відповідь	Травматичний однобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків
B	Травматичний ментальний перелом нижньої щелепи зі зміщенням відламків
C	Травматичний подвійний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків
D	Травматичний однобічний перелом шийки суглобового відростку нижньої щелепи зі зміщенням відламків
E	Травматичний подвійний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків
№	Крок 2020

Тема	знеболення
Текст завдання	Дитина 6-ти років направлена для видалення нижніх молочних центральних різців з приводу зміни прикусу. Зуби рухомі III ступеня. Виберіть оптимальний вид знеболення:
Правильна відповідь	Аплікаційне знеболення
B	Внутрішньокісткове знеболення
C	Інфільтраційне знеболення
D	Провідникове знеболення
E	Інгаляційний наркоз
№	Крок 2020
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Хворого 21-го року доставлено в щелепно-лицеве відділення з фурункулум обличчя. Фурункули та карбункули якої локалізації найчастіше ускладнюються тромбофлебітом кутової вени обличчя?
Правильна відповідь	Верхньої губи, підочної ділянки
B	Щоки, привушно-жувальної ділянки
C	Нижньої губи та кута щелепи
D	Носа та зовнішнього кута ока
E	Нижньої губи та підборіддя
№	Крок 2020
Тема	новоутворення
Текст завдання	Пацієнт скаржиться на новоутворення, що повільно збільшується, у лівій половині лобної ділянки. Новоутворення рухоме, безболісне, спаяне зі шкірою, на його поверхні визначається крапкова втягнутість шкіри. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Атерома лобної ділянки
B	Кератоакантома лобної ділянки
C	Ліпома лобної ділянки
D	Фіброма лобної ділянки
E	Екзофітна форма раку шкіри
№	Крок 2020
Тема	видалення зубів

Текст завдання	Хлопчик 14-ти років після невдалого лікування у стоматолога-терапевта з приводу хронічного гранулематозного періодонтиту зуба 46 з'явився для його видалення. Ваш вибір інструментарію для видалення:
Правильна відповідь	Дзьобоподібні щипці зі щічками, які мають шипи
В	Прямі коронкові
С	Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині
D	8-подібні коронкові
Е	Байонетні кореневі
№	Крок 2020
Тема	невідкладні стани
Текст завдання	Під час проведення провідникової анестезії у дитини 15-ти років з'явилися скарги на осиплість голосу, тяжке дихання та збільшення губ та язика. Об'єктивно: набряк тканин губ та язика, який зміщений дозад, дихання часте та утруднене, голос осиплий. Визначте імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Набряк Квінке
В	Непритомність
С	Запаморочення
D	Колапс
Е	Анафілактичний шок
№	Крок 2020
Тема	невідкладні стани
Текст завдання	У пацієнта 42-х років на прийомі у стоматолога після застосування анестетика розвинувся анафілактичний шок. Який лікувальний засіб першої лінії невідкладної допомоги слід застосувати?
Правильна відповідь	Адреналін
В	Кисень
С	Супрастин
D	Сальбутамол
Е	Преднізолон
№	Крок 2020
Тема	новоутворення

Текст завдання	Хворий 48-ми років скаржиться на пухлиноподібне утворення на твердому піднебінні. Під час обстеження в передньому відділі піднебіння виявлено напівкулясте випинання з чіткими межами. 11, 21 зуби інтактні. Рентгенологічно наявне вогнище гомогенного розрідження кісткової тканини з чіткими межами, розмірами 3,5x2,5 см. На тлі розрідження кісткової тканини проєктуються корені інтактних 11, 21 зубів, періодонтальна щілина простежується. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Кіста носо-піднебінного каналу
B	Радикулярна кіста верхньої щелепи
C	Амелобластома верхньої щелепи
D	Остеобластокластома верхньої щелепи
E	Фолікулярна кіста верхньої щелепи
№	Крок 2020
Тема	травма
Текст завдання	Пацієнт годину тому отримав травму тупим предметом у середню зону обличчя. Після проведення рентгенографії встановлено лінію порушення цілісності кісткової тканини, яка проходить в ділянці кореня носа, медіальній стінці очниці, через крилоподібні відростки основної кістки та виличну дугу. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
B	Перелом виличних кісток
C	Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I
D	Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III
E	Перелом носових та виличних кісток
№	Крок 2020
Тема	видалення зубів
Текст завдання	Хворий 47-ми років після безуспішного лікування у терапевта-стоматолога з приводу хронічного гранулематозного періодонтиту 15 зуба з'явився для його видалення. Який щипці доцільно використати для видалення зуба?
Правильна відповідь	8-подібні коронкові
B	8-подібні праві
C	Прямі коронкові
D	Багнетоподібні
E	-
№	Крок 2020
Тема	запальні процеси

Текст завдання	Хвора 20-ти років має скарги на біль у ділянці 38 зуба, який посилюється при ковтанні та широкому відкриванні рота. Об'єктивно: коронка 38 зуба частково вкрита слизовою оболонкою, з-під якої виділяється гнійний екссудат, пальпація болісна, слизова оболонка над 38 зубом гіперемована, набрякла. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий гнійний перикоронарит
В	Гострий гнійний періостит
С	Гострий катаральний перикоронарит
Д	Гострий серозний періостит
Е	Гострий виразковий перикоронарит
№	Крок 2020
Тема	знеболення
Текст завдання	Хвора 25-ти років звернулася до хірурга-стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об'єктивно: коронка 37 зуба зруйнована на 2/3. Слизова оболонка ясен у ділянці 37 зуба не змінена. Який вид анестезії слід застосувати хірургу-стоматологу для видалення 37 зуба А. Туберальна
Правильна відповідь	Мандибулярна та щічна
В	Ментальна
С	Внутрішньоротова інфраорбітальна
Д	Мандибулярна
Е	Туберальна
№	Крок 2020
Тема	новоутворення
Текст завдання	Хворий віком 27-ми років скаржиться на періодично виникаючий біль у фронтальному відділі верхньої щелепи. На рентгенограмі верхньої щелепи виявляється осередок деструкції кісткової тканини округлої форми біля верхівки кореня 12 зуба діаметром до 0,5 см. Кореневий канал 12 зуба запломбований до верхівки. Діагноз: хронічний гранулематозний періодонтит 12 зуба. Який метод хірургічного лікування?
Правильна відповідь	Резекція верхівки кореня 12 зуба
В	Реплантація 12 зуба
С	Періостотомія
Д	Кістектомія
Е	Видалення 12 зуба
№	Крок 2020
Тема	травма

Текст завдання	ацієнт звернувся зі скаргами на асиметрію обличчя, втрату чутливості у лівій підочномковій ділянці, які з'явилися після травми три дні тому. Об'єктивно: западіння тканин лівої виличної ділянки, при пальпації відзначається симптом сходинки по вилицево-щелепному шву. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Перелом виличної кістки зі зміщенням
В	Вивих нижньої щелепи
С	Перелом лівої верхньої щелепи
D	Перелом виличної дуги
Е	Перелом виличної кістки без зміщення
№	Крок 2020
Тема	вроджені вади
Текст завдання	Після проведеного обстеження хворого 6-ти місяців йому був встановлений діагноз: повне незрощення верхньої губи. Яку пластичну операцію усунення дефекту слід провести в даному випадку?
Правильна відповідь	Хейлопластика
В	Френулоектомія
С	Френулотомія
D	Ураностафілопластика
Е	Уранопластика
№	Крок 2020
Тема	травма
Текст завдання	Хлопчик 12-ти років скаржиться на біль і пошкодження тканин щоки справа. Травму отримав в автомобільній аварії. Через 22 годин після травми звернувся по допомогу до лікаря. Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, асиметрія обличчя через набряк і порушення цілісності шкірних покривів щоки розміром 2,5x1,5x1 см, з рівними краями, що зяють і вкриті сіро-білим нальотом. Поставлено діагноз: різана рана щоки справа. Який вид хірургічної обробки необхідно провести в даному випадку?
Правильна відповідь	Первинно-пізню
В	Вторинну
С	Первинно-відкладену
D	Первинно-ранню
Е	Первинно-відкладену
№	Крок 2020

Тема	невідкладні стани
Текст завдання	Пацієнт, що хворіє на ГХС, стенокардію напруги, скаржить на раптовий сильний стискаючий біль за грудиною більше 30 хвилин з іррадіацією в ліву руку, який виник при фізичному навантаженні. Напад болю не зник після прийому 3 пігулок нітрогліцерину. При огляді: шкіра блідо-сірого кольору, волога, холодна на дотик, загострені риси обличчя, акроціаноз, пульс - 102/хв., аритмічний, АТ- 90/40 мм рт.ст. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий інфаркт міокарда
В	Напад стенокардії
С	Кардіалгія
Д	Стабільна стенокардія
Е	Гіпотонія
№	Крок 2020
Тема	новоутворення
Текст завдання	У хворого на верхній губі пухлина 1,5x2,0 см синюшного кольору. Позитивний симптом "стиснення-наповнення". Який імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гемангіома
В	Фіброма
С	Епуліс
Д	Пігментна пляма
Е	Гематома
№	Крок 2020
Тема	знеболення
Текст завдання	Хворому 32-х років поставлений діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 27 зуба. Планується проведення лікування методом вітальної екстирпації з використанням анестетика амідного ряду для туберальної та піднебінної анестезії. Виберіть розчин для анестезії:
Правильна відповідь	Мепівастезин 3%
В	Лідокаїн 10%
С	Новокаїн 2%
Д	Дикаїн 2%
Е	Анестезин 5%
№	Крок 2020
Тема	запальні процеси

Текст завдання	В хірургічне відділення стоматологічної поліклініки звернувся пацієнт 29-ти років зі скаргами на болісну припухлість обличчя справа, що з'явилась 1,5-2 місяці тому і поступово збільшувалась. Об'єктивно: відкриття рота вільне, обличчя асиметричне за рахунок припухлості в правій привушно-жувальній ділянці. Шкіра над припухлістю гіперемована, набрякла, пальпаторно визначається болісний інфільтрат розміром до 3 см. При масуванні із вивідної протоки правої привушної слинної залози виділяється прозора слина. Яке захворювання можна припустити у пацієнта?
Правильна відповідь	Хронічний інтерстиціальний паротит справа
В	Гострий гнійний паротит справа
С	Хронічний гнійний лімфаденіт правої привушно-жувальної ділянки
Д	Фурункул правої привушно-жувальної ділянки
Е	Субмасетеріальний абсцес справа
№	Крок 2020
Тема	невідкладні стани
Текст завдання	На прийом до стоматолога прийшов пацієнт з приводу різкого болу в зубі. Напередодні у нього з'явився нежить, у зв'язку з чим перед відвідуванням стоматолога він прийняв парацетамол. В кабінеті стоматолога у нього розвинувся набряк губ, повік, обличчя, голос став хрипким, з'явився "гавкаючий кашель" наростаюча задишка. Який загрозовий стан розвивається у пацієнта на фоні набряку Квінке?
Правильна відповідь	Набряк гортані
В	Істра серцева недостатність
С	Бронхообструктивний синдром
Д	Анафілактичний шок
Е	Кропив'янка
№	Крок 2020
Тема	новоутворення
Текст завдання	Хвора 66-ти років скаржиться на ниючий біль в лівій привушно-жувальній ділянці, наростання асиметрії обличчя, яку помітила 2-3 місяці тому. Об'єктивно: хвора зниженого харчування, бліда, відзначається парез м'язів обличчя зліва. Попереду мочки вуха наявний горбистий інфільтрат без чітких меж, розміром 4x5 см, спаяний з навколишніми тканинами, помірно болісний. З протоки лівої привушної слинної залози слини отримати не вдалося. Піднижньощелепні і шийні лімфовузли зліва збільшені. На оглядовій рентгенограмі нижньої щелепи порушень структури кісткової тканини не відзначається. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Аденокарцинома
В	Псевдопаротит Іерценберга

С	Загострення хронічного паротиту
D	Актиномікоз лівої привушно-жувальної ділянки
Е	Змішана пухлина лівої привушної слинної залози
№	Крок 2020
Тема	знеболення
Текст завдання	Чоловік 49-ти років з'явився через 2 дні після видалення 38 зуба. Скаржиться на біль та утруднене відкривання рота. Об'єктивно: температура тіла - 38°C, загальний стан задовільний, незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку м'яких тканин під кутом нижньої щелепи зліва. Запальна контрактура III ступеня. Лунка 38 зуба вповнена гниліснонекротичними масами сірого кольору з неприємним запахом. Для виконання кюретажу лунки зуба лікар застосував анестезію за Берше. Метою проведення цієї анестезії у даного хворого є блокада:
Правильна відповідь	Нижньокоміркового нерва
В	Рухових волокон трійчастого нерва
С	Щічного та нижньокоміркового нервів
D	Язикового та нижньокоміркового нерві
Е	Язикового, щічного та нижньокоміркового нервів
№	Крок 2020
Тема	запальні процеси
Текст завдання	До відділення щелепно-лицевої хірургії звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на раптове підвищення температури тіла, виникнення яскраво-червоної плями на шкірі щоки, яка швидко поширюється. Об'єктивно вона має нерівні, наче язички полум'я, але чіткі межі з валиком. Уражена шкіра набрякла, напружена, гаряча на дотик, помірно болюча по периферії. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Бешиха обличчя
В	Синдром Лаелла
С	Флегмона щічної ділянки
D	Червоний вовчак
Е	Набряк Квінке
№	Крок 2020
Тема	запальні процеси

Текст завдання	ворий 25-ти років має скарги на біль в ділянці 16 зуба, відчуття важкості та розпирання у правій верхній щелепі, головний біль. Температура тіла - 38°C. Об'єктивно: припухлість правої щоки, пальпація альвеолярного паростка верхньої щелепі викликає біль, перкусія 16 зуба болісна. При передній рчасться гіперемія і набг оболонки правого носового хода. У середньому носовому ході слизово-гнійні виділення. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Іострий одонтогенний гайморит
B	Іострий періостит верхньої щелепі
C	Хронічний одонтогенний гайморит
D	Іострий одонтогенний остеомиєліт
E	Іострий риногенний гайморит
№	Крок 2020
Тема	невідкладні стани
Текст завдання	Пацієнт звернувся до стоматолога для санації. Хворий страждає на цукровий діабет. За 30 хв. до відвідування лікаря йому ввели інсулін, після чого він з'їв яблуко. Під час огляду у пацієнта з'явилось почуття неспокою і голоду, тремтіння в тілі, двоїння в очах, блідість, великі краплі поту, язик вологий, запах ацетону з рота відсутній, очні яблука в гіпертонусі. Пульс частий, напружений, АТ- 130-90 мм рт.ст. Тони серця звучні, дихання рівне. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гіпоглікемічна кома
B	Колапс
C	Непритомність
D	Анафілактичний шок
E	Гіперглікемічна кома
№	Крок 2020
Тема	видалення зубів
Текст завдання	Хворий 42-х років скаржитись на періодичний біль у 48 зубі. Під час огляду: 48 зуб частково прорізався своїми медіальними горбиками, слизова оболонка блідо-рожева, безболісна при пальпації, відкривання рота в повному обсязі. На рентгенограмі: 48 зуб знаходиться в медіальному положенні стосовно 47 зуба. Виберіть хірургічний метод лікування:
Правильна відповідь	Атипове видалення 48 зуба
B	Розтин каптура
C	Типове видалення 48 зуба
D	Коронаро-радикулярна сепарація
E	Висічення каптура
№	Крок 2020
Тема	невідкладні стани

Текст завдання	Пацієнт 62-х років звернувся до стоматолога для видалення 44 зуба. Під час огляду пацієнт раптово втратив свідомість. Дихання і пульс повільні. Голова нахилена, руки зігнуті в ліктях і зап'ястях, ноги витягнуті, щелепи судорожно стискаються, потім розпочалися клонічні судоми, посилене слиновиділення. Зіниці не реагують на світло, широкі. Через 1,5 хвилини судом відбулося розслаблення м'язів. Свідомість сплутана. <u>Діагноз:</u>
Правильна відповідь	епілепсія
B	Гостре порушення мозкового кровообігу
C	Непритомність
D	Гіпертонічний криз
E	Напад пароксизмальної тахікардії
№	Крок 2020
Тема	новоутворення
Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на наявність утворення розмірами до 4 см у підпідборідній ділянці. Пальпаторно новоутворення однорідної м'яко-еластичної тістоподібної консистенції, не спаяне з оточуючими тканинами та шкірою. Відзначається повільний ріст протягом 3-х років. Якому захворюванню відповідає клінічна картина?
Правильна відповідь	Ліпома
B	Серединна кіста
C	Фіброма
D	Мігруюча гранулема
E	Фіброміома
№	Крок 2020
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Пацієнт 52-х років скаржиться на появу осередків запалення та набряк м'яких тканин правої половини обличчя, температуру до 37,8°C. Об'єктивно: шкіра правої щічної ділянки інфільтрована, гіперемована, набрякла, спаяна з підлеглими тканинами, визначається некротичний "стрижень". Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Фурункул правої щічної ділянки
B	Карбункул правої щічної ділянки
C	Сибірка правої щічної ділянки
D	Нагноєна атерома правої щічної ділянки
E	Абсцес правої щічної ділянки
№	Крок 2020
Тема	видалення зубів

Текст завдання	У хворого 29-ти років через 3 дні після видалення 46 зуба є скарги на ниючий біль в ділянці альвеоли 46 зуба. Виявлено гіперемію і набряк слизової в ділянці альвеоли, кров'яний згусток відсутній, є залишки їжі. Вкажіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий серозний альвеоліт
В	Гострий гнійний альвеоліт
С	Хронічний обмежений остеомиєліт
Д	Гострий гнійно-некротичний альвеоліт
Е	Гострий гнійний альвеоліт
№	Крок 2020
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Пацієнт 43-х років скаржиться на інтенсивний, нестерпний біль у ділянці верхньої щелепи, порушення загального стану протягом 5 діб . Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку щічної та виличної ділянок. В порожнині рота зруйнований 26 зуб , слизова оболонка альвеолярної кістки гіперемована, набрякла, муфтоподібне потовщення альвеолярної кістки у ділянці 25, 26, 27 зубів, рухомість 25, 26, 27 зубів Г ступеня. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий одонтогенний остеомиєліт верхньої щелепи
В	Одонтогенний абсцес виличної ділянки
С	Одонтогенний абсцес піднебіння
Д	Гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи
Е	Одонтогенний абсцес щічної ділянки
№	Крок 2020
Тема	травма
Текст завдання	Потерпілий доставлений у приймальне відділення після ДТП у непритомному стані у положенні на спині. Відзначається синюшність шкірних покривів, вкрай утруднене дихання, блідість слизових оболонок, у порожнині рота згустки крові. Встановлено діагноз: двобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням фрагментів. Як потрібно транспортувати потерпілого?
Правильна відповідь	Лежачи на боці на твердих ношах
В	Сидячи з запрокинутою головою
С	Лежачи на животі на твердих ношах
Д	Лежачи на боці на м'яких ношах
Е	Сидячи з повітровою трубкою у верхніх дихальних шляхах
№	Крок 2020

Тема	запальні процеси
Текст завдання	Хвора 42-х років скаржиться на припухлість і гноетечу з нориці в лівій привушній ділянці, обмеження викривання рота. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок інфільтрату в лівій привушній ділянці синюшного кольору дерев'янистої щільності, наявні нориці: з яких виділяється крихтоподібний гній жовтуватого кольору. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Актиномікоз
В	Аденофлегмона
С	ПаротитІерценберга
Д	Туберкульоз
Е	Одонтогенна підшкірна гранульома
№	Крок 2020
Тема	травма
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулися батьки 7-річної дівчинки зі скаргами на травму після удару гойдалкою в обличчя. Клінічно було виявлено забій верхньої губи та зміщення 21 зуба орально. Дитину було скеровано на прицільну рентгенографію в ділянці 21 зуба. На рентгенограмі визначається нерівномірне розширення періодонтальної щілини. Який імовірний попередній діагноз?
Правильна відповідь	Неповний вивих 21 зуба
В	Перелом коронки 21 зуба
С	Перелом кореня 21 зуба
Д	Вколочений вивих 21 зуба
Е	Повний вивих 21 зуба
№	крок 2019
Тема	травма
Текст завдання	У хворого 59-ти років внаслідок виробничої травми стався перелом нижньої щелепи. Раніше користувався знімними протезами (частковими пластинковими для верхньої щелепи і повними для нижньої щелепи). Що можна використовувати для транспортної іммобілізації перелому?
Правильна відповідь	Протези пацієнта з підборідною працею Ентіна
В	Шину Ентіна
С	Шину Васильєва
Д	Шину Тігерштедта
Е	Апарат Збаржа
№	крок 2019

Тема	травма
Текст завдання	Хворій 42-х років після обстеження було поставлено діагноз: закритий серединний перелом нижньої щелепи в ділянці 31. 41 зубів, без зміщення. Коронкові частини решти зубів інтактні. Також діагностований хронічний генералізований пародонтит середнього ступеня тяжкості. Яка найраціональніша шина для лікування перелому у даної пацієнтки?
Правильна відповідь	Шина Тігерштедта
В	Зл'бо-ясенна шина Вебера
С	Шина Тігерштедта із зачіпними гачками
D	Наясенна шина Порта
Е	Зубо-ясенна шина Ванкевич
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	У пацієнта 37-ми років діагностовано: гострий остеомієліт нижньої щелепи справа в ділянці 45, 46, 47 зубів. При обстеженні виявлено симптом Венсана. Вкажіть ознаки цього симптому:
Правильна відповідь	Відчуття оніміння м'яких тканин нижньої губи і підборіддя
В	Рухомість причинного і сусідніх зубів
С	Біль при перкусії причинного і сусідніх зубів
D	Інтенсивний біль в ділянці причинного зуба
Е	Наявність інфільтрату з обох боків альвеолярного відростку
№	крок 2019
Тема	видалення зуба
Текст завдання	У пацієнта після операції видалення зуба діагностовано кровотечу із лунки видаленого зуба. Виберіть раціональну лікувальну тактику:
Правильна відповідь	Внутрішньом'язове введення розчину вікасолу
В	Внутрішньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцію хлориду
С	Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню
D	Накладання швів на м'які тканини
Е	Туға тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлі
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	У дівчинки 11-ти років діагностовано хронічний паренхіматозний паротит. Назвіть рентгенологічну ознаку цього захворювання:
Правильна відповідь	Симптом "грона винограду"

B	Симптом роси
C	C Симптом "сухого дерева”
D	Симптом дефекту наповнення
E	Симптом флюктуації
№	крок 2019
Тема	захво-рювання слинних залоз
Текст завдання	Хворому 50-ти років було встановлено діагноз: рецидив слинокам'яної хвороби з локалізацією каменя в товщі підщелепної слинної залози. Виберіть лікувальну такти-ку:
Правильна відповідь	Видалення підщелепної слинної залози
B	Видалення каменя із збереженням залози
C	Променева терапія
D	Медикаментозне консервативне лікуван-ня
E	Склерозуюча терапія
№	крок 2019
Тема	травма
Текст завдання	Хворого 57-ми років із шизофренією в стадії загострення, направлено до щелепно-лицьового стаціонару з діагнозом: перелом нижньої щелепи в ділянці 34-35 зубів зі змі-щенням відламків. Який метод лікування йому показаний?
Правильна відповідь	Остеосинтез
B	Шина Ванкевич
C	Однощелепна гладенька шина-скоба
D	Шина Вебера
E	Двощелепнаназубна шина
№	крок 2019
Тема	травма
Текст завдання	Хворий 25-ти років доставлений у від-ділення для надання спеціалізованої допо-моги через 48 годин після отримання улам-кового поранення щелепно-лицьової ділян-ки. При огляді велика зяюча рана м'яких тканин обличчя неправильної форми, краї інфіковані, набряклі. Який вид хірургічної обробки рани проводиться на даному етапі?
Правильна відповідь	Пізня первинна
B	Вторинна
C	Відтермінована первинна
D	-
E	Рання первинна

№	крок 2019
Тема	новоутворення
Текст завдання	У хворого діагностовано амелобластому нижньої щелепи. Який вид хірургічного лікування показаний цьому хворому?
Правильна відповідь	Резекція нижньої щелепи, відступивши 1,5 см від вогнища ураження
В	Кріодеструкція пухлини
С	Проводиться тільки консервативне лікування
Д	Цистектомія
Е	Вишкрібання пухлини в межах здорових тканин
№	крок 2019
Тема	невідкладні стани
Текст завдання	Хворий 45-ти років звернувся до ортопедичного відділення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин інтактних зубів проведено інфільтраційне знеболювання 0,5% розчином лідокаїну. Через декілька хвилин з'явилося пригнічення свідомості, падіння АТ, судоми, самовільне сечовипускання. Який невідкладний стан розвинувся?
Правильна відповідь	Анафілактичний шок
В	Серцева недостатність
С	Колапс
Д	Больовий шок
Е	Зомління
№	крок 2019
Тема	знеболення
Текст завдання	На прийом до лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка 28-ми років з метою санації порожнини рота. Поставлений діагноз: гострий глибокий карієс 24 зуба. В анамнезі: сезонний алергічний риніт і медикаментозна алергія, яка проявляється висипом на шкірі і набряком Квінке. Чи проводилося раніше місцеве знеболення у стоматолога, пацієнтка не пам'ятає. Якою має бути тактика лікаря-стоматолога при проведенні анестезії в даному випадку?
Правильна відповідь	Проведення внутрішньошкірної проби на анестетик в стоматологічному кріслі безпосередньо перед анестезією
В	Виконати анестезію анестетиком ефірно-го ряду
С	Виконати анестезію анестетикомамідного ряду
Д	Проведення скарифікаційної проби на анестетик в стоматологічному кріслі безпосередньо перед анестезією
Е	Направлення до лікаря-алерголога для консультації і проведення алергологічних проб на анестетики
№	крок 2019
Тема	запальні процеси

Текст завдання	Чоловік 35-ти років знаходиться на лікуванні у хірурга-стоматолога з приводу гострого одонтогенного остеомиєліту нижньої щелепи. З метою контролю якості лікування і визначення подальшої тактики планується проведення контрольного рентгенологічного дослідження. У які терміни від початку захворювання необхідно виконувати вказане дослідження цьому хворому для виявлення ознак деструкції кісткової тканини?
Правильна відповідь	Через місяць
B	Через тиждень
C	До кінця 2-го тижня
D	Через 2-3 дні
E	Через 4-5 днів
№	крок 2019
Тема	аномалії розвитку
Текст завдання	Хвора 18-ти років у дитинстві була оперована з приводу двобічного повного незрощення верхньої губи. При огляді на значно сплюсненій верхній губі спостерігаються множинні рубці, виразної асиметрії не відзначається, але є порушення форми верхньої губи. Широкі основи крил носа симетрично зміщені у бік та дозад, перетинка носа вкорочена, роздвоєний кінчик носу підтягнутий до верхньої губи, спинка носу має дугоподібну форму. Які зміни здійснюються з кістками щелеп?
Правильна відповідь	Верхня та нижня щелепи внаслідок зменшення функціонального навантаження недорозвинені, сплюснені у фронтальній ділянці
B	Верхні щелепи недорозвинені у фронтальній ділянці, у бічних відділах не змінені
C	Нижня щелепа внаслідок зменшення жувального навантаження відстає у рості, сплюснюються верхні щелепи
D	Верхня та нижня щелепи внаслідок порушення носового дихання сплюснені у бічних відділах та сплюснені
E	Верхні щелепи відстають у рості, міжщелепна кістка внаслідок порушення безперервності м'язового шару губи просувається допереду
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Пацієнт 38-ми років звернувся до лікаря. Після збору анамнезу і проведення обстеження виявлено загострення генералізованого пародонтиту II ступеня, глибина пародонтальних кишень - 3-5 мм. Після усунення місцевих факторів, а також після проведення протизапального лікування необхідно перейти до усунення пародонтальних кишень. Який метод слід застосувати?
Правильна відповідь	Кюретаж
B	Клаптикова операція
C	Гінгівектомія

D	Пластика передсінка
E	Гінгівотомія
№	крок 2019
Тема	видалення зубів
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулася хво-ра 28-років зі скаргами на ниючий біль при накушуванні в 16 зубі. Після обстеження поставлений діагноз: загострення хронічного періодонтиту. Показано видалення 16-го зу-ба. Який вид щипців доцільно використати для видалення?
Правильна відповідь	S-подібної форми праві
B	Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині
C	S-подібної форми ліві
D	Дзьобоподібні щипці з щічками, що не сходяться
E	Прямі щипці
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Хвора 66-ти років скаржиться на ниючий біль в лівій привушно-жувальній ділянці, на-ростання асиметрії обличчя, яку помітила 2-3 місяці тому. Об'єктивно: хвора зниже-ного харчування, бліда, відзначається парез м'язів обличчя зліва. Попереду мо-чки вуха наявний горбистий інфільтрат без чітких меж, розміром 4x5 см. спаяний з нав-колишніми тканинами, помірно болісний. З протоки лівої привушної слинної залози слини отримати не вдалося. Піднижньоще-лепні і шийні лімфовузли зліва збільшені. На оглядовій рентгенограмі нижньої щеле-пи порушень структури кісткової тканини не відзначається. Вкажіть найбільш імовір-ний діагноз:
Правильна відповідь	Аденокарцинома
B	Загострення хронічного паротиту
C	Актиномікоз лівої привушно-жувальної ділянки
D	Псевдопаротит Герценберга
E	Змішана пухлина лівої привушної слинної залози
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Хворий 42-х років надійшов до клініки в тяжкому стані: млявий, температура тіла - 39,1 ⁰ С, різко болючий інфільтрат дна поро-жнини рота та підщелепної ділянки справа. Шкіра над інфільтратом напружена, синю-шого кольору. Під час пальпації під шкі-рою відчувається крепітація. Який діагноз можна поставити у даному випадку?
Правильна відповідь	Гнилісно-некротична флегмона дна порожнини рота

В	Одонтогенна флегмона дна порожнини рота
С	Актиномікоз дна порожнини рота
Д	Аденофлегмона дна порожнини рота
Е	Злоякісна пухлина дна порожнини рота
№	крок 2019
Тема	травма
Текст завдання	Чоловікові 29-ти років поставлено діагноз: перелом верхньої щелепи за середнім типом. Лінія розлому симетрична з обох боків. В яких межах може бути порушена чу-тливість зубів та слизової оболонки?
Правильна відповідь	Від 13 до 23 зуба
В	Від 15 до 25 зуба
С	-
Д	Від 18 до 28 зуба 1
Е	Від 11 до 21 зуба
№	крок 2019
Тема	невідкладні стани
Текст завдання	Потерпілий доставлений у приймальне відділення після ДТП у непритомному стані у положенні на спині. Відзначається синю-шність шкірних покривів, утруднене дихання, блідість слизових оболонок. Встановлено діагноз: двобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням фрагментів. Яка асфіксія виникла у потерпілого?
Правильна відповідь	Дислокаційна
В	Стенотична
С	Клапанна
Д	Аспіраційна
Е	Обтураційна
№	крок 2019
Тема	новоутворення
Текст завдання	Хворий 28-ми років звернувся у відділення ЩЛХ зі скаргами на наявність новоутворення на шкірі в підщелепній ділянці справа, що з'явилося приблизно 2 роки тому. Досить часто під час гоління відбувалось травмування новоутворення. Встановлено діагноз: папілома. Під час огляду ділянки новоутворення виявлено наявність виразки на тлі гіперемованої шкіри. Яка повинна бути тактика хірурга-стоматолога?
Правильна відповідь	Протизапальна терапія, після чого видалення папіломи
В	Видалення папіломи. Післяопераційна променева терапія
С	Виключення малігнізації папіломи. Видалення папіломи

D	Протизапальна терапія з наступним спо-стереженням
E	Антибактеріальна, протизапальна тера-пія, спостереження
№	крок 2019
Тема	новоутворення
Текст завдання	У пацієнта діагностовано фібропапілому шкіри обличчя. Який метод лікування необ-хідно застосувати?
Правильна відповідь	Фізіотерапевтичний
B	Хірургічний
C	Медикаментозний
D	Променевий
E	Комбінований
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Чоловік 49-ти років з'явився через 2 днів після видалення 38 зуба. Скаржиться на біль та утруднене відкривання рота. Об'єктив-но: температура - 38°C, загальний стан за-довільний, незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку м'яких тканин під кутом нижньої щелепи зліва. Запальна контра-ктура III ступеня. Лунка 38 зуба виповнена гнилісно-некротичними масами сірого ко-льору з неприємним запахом. Для виконан-ня кюретажу лунки зуба лікар застосував анестезію за Берше. Метою проведення цієї анестезії у даного хворого є блокада:
Правильна відповідь	Язикового та нижньокоміркового нервів
B	Щічного та нижньокоміркового нервів
C	Язикового, щічного та нижньокомірково-го нервів
D	Рухових волокон трійчастого нерва
E	Нижньокоміркового нерва
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	До відділення хірургічної стоматології надійшла хвора з скаргами на припухлість правої половини обличчя, погане самопо-чуття. З анамнезу відомо: тиждень тому на правій половині обличчя відчула свербін-ня шкіри і помітила невеликий щільний ву-злик. Почала прикладати різні мазі. При-пухлість стала наростати, з'явився біль, ли-хоманка. Об'єктивно: загальний стан сере-дньої важкості, температура тіла до 39°C. Щічна ділянка справа набрякла, шкіра гіпе-ремована, в центрі набряк овальної форми, припіднятий над поверхнею оточуючих тка-нин, на верхівці якого помітна чорна кіро-чка. При пальпації: болючий інфільтрат діа-метром 3,5 см, піднижньощелепні лімфати-чні вузли збільшені та болючі. Відкривання рота дещо обмежене, порожнина рота сано-вана. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Фурункул

B	Флебiт лицевої вени
C	Гострий лимфаденiт
D	Гострий лимфангоїт
E	Карбункул
№	крок 2019
Тема	новоутворення
Текст завдання	Хворий 48-ми років скаржитися на пу-хлиноподібне утворення на твердому під-небінні. Під час обстеження в передньому відділі піднебіння виявлено напівкулясте ви-пинання з чіткими межами. 11, 21 зуби ін-тактні. Рентгенологічно наявне вогнище гомогенного розрідження кісткової тканини з чіткими межами, розмірами 3,5x2,5 см. На тлі розрідження кісткової тканини проекту-ються корені інтактних 11, 21 зубів, періодонтальна щілина простежується. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Кіста носо-піднебінного каналу
B	Радикулярна кіста верхньої щелепи
C	Фолікулярна кіста верхньої щелепи
D	Остеобластокластома верхньої щелепи
E	Амелобластома верхньої щелепи
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Хвора 30-ти років після переохоло-дження скаржитися на перекошення облич-чя вправо, підвищення температури тіла до 37,9°C. Об'єктивно: не може нахмурити ло-ба зліва та закрити ліве око. Згладжена ліва носогубна складка. Губи щільно не стуляю-ться. Відсутній лівий надбрівний рефлекс. Назвіть патологію:
Правильна відповідь	Невропатія лицевого нерва
B	Невралгія трійчастого нерва
C	Прогресуюча геміатрофія обличчя
D	-
E	Лицевий геміспазм
№	крок 2019
Тема	ново-утворення
Текст завдання	Хворому поставлений діагноз: рак пра-вої привушної слинної залози T2N2M0. Який метод лікування показано хворому?
Правильна відповідь	Комбінована терапія
B	Хірургічне видалення лімфатичного вузла

С	Хірургічне видалення новоутворення
D	Хіміотерапія
Е	Променева терапія
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Хворого віком 21 рік доставлено в щелепно-лицеве відділення з фурункулум обличчя. Фурункули та карбункули якої ло-калізації найчастіше ускладнюються тром-бофлебітом кутової вени обличчя?
Правильна відповідь	Верхньої губи, підочної ділянки
В	Щоки, привушно-жувальної ділянки
С	Носа та зовнішнього кута ока
D	Нижньої губи та кута щелепи
Е	Нижньої губи та підборіддя
№	крок 2019
Тема	знеболення
Текст завдання	Хвора 27-ми років скаржиться на за-гальну слабкість, біль в нижній щелепі, при ковтанні. Два дні тому почав боліти 38 зуб. Відкривання рота неможливе. Яку анесте-зію необхідно виконати для огляду ротової порожнини та видалення 38 зуба?
Правильна відповідь	За Берше-Дубовим
В	За Верлоцьким
С	Ментальна
D	Інфільтраційна
Е	Туберальна
№	крок 2019
Тема	травма
Текст завдання	Хворий 21-го року три години тому отримав ножове поранення в ділянці пра-вої щоки; була кровотеча, на момент огляду припинилася. Об'єктивно: в ділянці правої щоки наявна рана з рівними краями, яка не проникає в порожнину рота, розміром 4x1 см. заповнена згустком. Накладання яких швів показане хворому?
Правильна відповідь	Первинні глухі
В	Ранні вторинні
С	Пізні вторинні
D	Первинні направляючі
Е	Первинні зближуючі

№	крок 2019
Тема	травма
Текст завдання	Хворий 35-ти років скаржитися на біль та рухомість верхньої щелепи при спробі закрити рот. Травма сталась внаслідок по-биття невідомим. Об'єктивно: при пальпації альвеолярний паросток верхньої щелепи рухомий з обох боків, позитивний сим-птом Малевича та симптом "навантаження" на рентгенограмі лінія перелому визначає-ться у ділянці нижньої стінки грушеподібного отвору, вилично-альвеолярних гребенів, зниження прозорості верхньощелепних па-зух. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Перелом верхньої щелепи за ЛеФор I (нижній тип)
B	Перелом кісток носа
C	Перелом альвеолярного відростка верх-ньої щелепи зліва
D	Перелом верхньої щелепи за ЛеФор III (верхній тип)
E	Перелом верхньої щелепи за ЛеФор II (середній тип)
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	В хірургічне відділення стоматологічної поліклініки звернувся пацієнт 29-ти років зі скаргами на болісну припухлість обличчя справа, що з'явилась 1,5-2 місяці тому і поступово збільшувалась. Об'єктивно: від-кривання рота вільне, обличчя асиметричне за рахунок припухлості в правій привушно- жувальній ділянці. Шкіра над припухлістю гіперемована, набрякла, пальпаторно ви-значається болісний інфільтрат розміром до 3 см. При масуванні із вивідної протоки правої привушної слинної залози виділяє-ться прозора слина. Яке захворювання мо-жна запідозрити у пацієнта?
Правильна відповідь	Хронічний гнійний лімфаденіт правої привушно-жувальної ділянки
B	Фурункул правої привушно-жувальної ділянки
C	Гострий гнійний паротит справа
D	Субмасетеріальний абсцес справа
E	Хронічний інтерстиціальний паротит справа
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Хворий звернувся зі скаргами на біль в нижній щелепі справа, утруднене відкриван-ня рота. Об'єктивно: при зовнішньому огля-ді обличчя симетричне, відкривання рота злегка утруднене тримз I ступеня. Слизова оболонка за 47 зубом набрякла, гіперемова-на, болісна при пальпації, видно медіальні горби 48 зуба, що не прорізався повністю. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	Перикоронарит

В	Абсцес крило-нижньощелепного простору
С	Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту
Д	Гострий одонтогенний періостит
Е	Гострий одонтогенний остеомієліт
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Хворий 49-ти років скаржиться на про-гресуюче утруднене відкривання рота, бо-лісне ковтання зліва, різке погіршення загального стану, підвищення температури до 39,3°C. Скарги на гострий біль у зруйнованому 38 зубі. Об'єктивно: обличчя симетричне, піднижньощелепні лімфатичні вузли зліва збільшені, болісні під час пальпації. Пальпація під лівим кутом нижньої щелепи та в лівій позадущелепній ділянці викликає різкий біль. Відкривання рота та бокові рухи вліво значно обмежені. Наявна гіперемія та інфільтрація лівої крило-щелепної складки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Флегмона крило-щелепного простору
В	Флегмона позадущелепної ділянки
С	Абсцес щелепно-язикового жолобка
Д	Флегмона піднижньощелепного простору
Е	Флегмона приглоткового простору
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	Дівчина 18-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль в привушних ділянках загальне нездужання. При огляді відзначається припухлість привушних ділянок з обох сторін, болюче відкривання рота, в ротовій порожнині - гіперемія та набряк слизової оболонки навколо усть протоків привушних слинних залоз. Наявні симптоми загальної інтоксикації: температура тіла - 38°C, біль в м'язах. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий епідемічний паротит
В	Гострий гнійний лімфаденіт
С	Гострий неепідемічний паротит
Д	Флегмона привушно-жувальної ділянки
Е	Псевдопаротит Герценберга
№	крок 2019
Тема	знеболення

Текст завдання	Хворий звернувся зі скаргами на зруй-новану коронку 16 зуба. При об'єктивно-му обстеженні: коронкова частина 16 зуба зруйнована повністю. Діагностовано: хро-нічний гранулюючий періодонтит 16 зуба. Хворому показане видалення даного зуба. Під яким знеболенням доцільно виконати цю операцію?
Правильна відповідь	Туберальна і палатинальна анестезія
B	Інфраорбітальна анестезія
C	Туберальна і різцева анестезія
D	Туберальна анестезія
E	Інфраорбітальна та туберальна анестезія
№	крок 2019
Тема	невідкладні стани
Текст завдання	Пацієнт 22-х років направлений на ви-далення 36-го зуба. На прийомі у хірурга - стоматолога перед проведенням анестезії, хворий відчув слабкість, шум у вухах, по-темніння в очах. Об'єктивно: шкіра облич-чя бліда, вкрита холодним потом, АТ-110/70 мм рт.ст. Пацієнт на декілька секунд втра-тив свідомість. Яке ускладнення виникло на прийомі у хворого?
Правильна відповідь	Зомління (Непритомність)
B	Стенокардія
C	Епілептичний напад
D	Колапс
E	Анафілактичний шок
№	крок 2019
Тема	травма
Текст завдання	Хворий 28-ми років отримав удар в під-боріддя. Скаржиться на біль в боковій ділян-ці обличчя справа. При огляді відзначається асиметрія обличчя за рахунок набряку тка-нин верхньої частини правої привушної ді-лянки, відкривання рота болісне, обмежене, зміщення щелепи в правий бік. косий пра-вобічний прикус. Який попередній діагноз у хворого?
Правильна відповідь	Травматичний однобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків
B	Травматичний ментальний перелом ни-жньої щелепи зі зміщенням відламків
C	Травматичний подвійний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків
D	Травматичний перелом шийки суглобово-го відростку нижньої щелепи зі зміщенням відламків
E	Травматичний центральний перелом нижньої щелепи зі зміщенням відламків
№	крок 2019
Тема	знеболення

Текст завдання	Пацієнту з метою видалення 27 зуба була проведена туберальна і піднебінна анестезія. При виведенні голки з м'яких тканин при виконанні піднебінної анестезії виникла кровотеча. Що необхідно зробити для зупинки кровотечі?
Правильна відповідь	Притиснути тампоном місце вколу
В	Ввести внутрішньом'язово вікасол
С	Ввести внутрішньовенно 10% розчин хлористого кальцію
Д	Перев'язати зовнішню сонну артерію
Е	Накласти шви
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	У пацієнта 37-ми років наявна асиметрія обличчя за рахунок припухлості привушно - жувальної ділянки справа. При пальпації - утвір щільної консистенції, без чітких меж, болючий, нерухомий. Кути рота й ока опущені. При намаганні надуті щоки права що-ка парусить. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Злоякісна пухлина привушної слинної залози
В	Флегмона привушно-жувальної ділянки
С	Центральний парез лицьового нерва
Д	Невралгія трійчастого нерва
Е	Периферичний парез лицьового нерва
№	крок 2019
Тема	знеболення
Текст завдання	Хвора 37-ми років звернулася до лікаря-стоматолога з метою видалення 25 зуба. Який метод знеболення треба застосувати?
Правильна відповідь	Одностороння інфраорбітальна і палатинальна анестезія
В	Одностороння інфраорбітальна і різцева анестезія
С	Одностороння туберальна, інфраорбітальна, палатинальна анестезія
Д	Двостороння центральна анестезія
Е	Одностороння туберальна і палатинальна анестезія
№	крок 2019
Тема	запальні процеси
Текст завдання	До лікаря звернулася хвора з приводу утвору в під'язиковій ділянці, який утруднює мову та процес вживання їжі. При огляді в під'язиковій ділянці відзначено утвір м'яко-еластичної консистенції, з гладкою поверхнею, чіткими контурами та розміром 1 см в діаметрі. Під час пальпації відзначається симптом флюктуації. Слизова оболонка порожнини рота над утвором розтягнена, напівпрозора з блакитним відтінком. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	Ранула під'язикової слинної залози
B	Аденолімфома
C	Змішана пухлина підщелепної слинної залози
D	Калькульозний сіалоаденіт
E	Гемангіома під'язикової ділянки
№	крок 2019
Тема	знеболення
Текст завдання	Хворому 32-х років поставлений діа-гноз: хронічний фіброзний пульпіт 27 зуба. Планується проведення лікування методом вітальної екстирпації з використанням анестетика амідного ряду для туберальної та піднебінної анестезії. Виберіть розчин для анестезії:
Правильна відповідь	Мепівастезин 3%
B	Лідокаїн 10%
C	Анестезин 5 %
D	Новокаїн 2%
E	Дикаїн 2%
№	крок 2019
Тема	знеболення
Текст завдання	Хворому 38-ми років показано видалення 12 зуба. Який метод знеболення слід застосувати при видаленні цього зуба?
Правильна відповідь	Підочну та різцеву
B	Підочну, піднебінну та різцеву
C	Підочну та піднебінну
D	Різцеву
E	Підочну
№	крок 2019
Тема	травма
Текст завдання	Пацієнт 40-ка років з вогнепальним по-раненням нижньої щелепи і дефектом кісткової тканини розміром 2 см в ділянці під-боріддя. Який метод іммобілізації йому по-казаний?
Правильна відповідь	Позаротовий апарат типу Рудько
B	Двощелепна шина із зачіпними петлями і міжщелепним еластичним витягуванням
C	Однощелепна шина-скоба
D	Фіксація за допомогою спиць і стержнів
E	Кістковий шов

№	крок 2019
Тема	знеболення
Текст завдання	До хірурга-стоматолога звернувся пацієнт зі скаргами на біль і припухлість у ділянці верхньої губи і нижніх відділів підчочномкової ділянки зліва, періодичний біль у зруй-нованому 22 зубі. Після проведеного обстеження встановлений діагноз: загострення хронічного періодонтиту 22 зуба, абсцес іклової ямки. Показана операція: видалення 22 зуба, розтин абсцесу внутрішньоротовим доступом. Виберіть оптимальний метод анестезії:
Правильна відповідь	Інфраорбітальна (позаротовий метод) і різцева анестезія
В	Туберальна і піднебінна анестезія
С	Наркоз
Д	Інфільтраційна анестезія
Е	Інфраорбітальна (внутрішньоротовий метод) і піднебінна анестезія
№	крок 2019
Тема	травма
Текст завдання	Хворий 19-ти років звернувся в травм-пункт зі скаргами на біль і асиметрію обличчя, кровотечу з носа. Травму отримав близько 3-х годин тому. Свідомості не втрачав. Об'єктивно: виражена асиметрія обличчя за рахунок набряку і гематоми правої нижньої повіки та підчочномкової ділянки. Відкривання рота обмежене незначно. Прикус не порушений. Пальпаторно визначається симптом "сходинок", деформація в ділянці зовнішнього краю правої орбіти та вилично-альвеолярного гребеня. Порушення чутливості верхньої губи справа. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Перелом правої виличної кістки
В	Перелом верхньої щелепи за ЛеФор I (нижній тип)
С	Перелом верхньої щелепи за ЛеФор III (верхній тип)
Д	Перелом верхньої щелепи за ЛеФор II (середній тип)
Е	Перелом кісток носа
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 28-ми років після падіння звернувся до клініки щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на обмеження відкривання рота, відчуття оніміння шкіри у підчочній ділянці зліва, верхньої губи, крила носа, біль у лівій виличній ділянці, що посилюється при спробі відкрити рот. Пальпаторно визначається симптом "сходинок". Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Перелом виличної кістки зі зміщенням
В	Перелом виличної кістки без зміщення
С	Перелом верхньої щелепи за середнім типом

D	Перелом верхньої щелепи за верхнім типом
E	Перелом виличної дуги зліва
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хвора 33-х років надійшла в щелепно-лицеве відділення зі скаргами на біль та припухлість правої підщелепної ділянки, підвищення температури тіла $39,5^{\circ}C$. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин правої підщелепної ділянки, де пальпаторно визначається щільний інфільтрат, шкіра над ним гіперемована, не береться в складку. В 46 зубі - глибока каріозна порожнина. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Флегмона піднижньощелепної ділянки справа
B	Гострий піднижньощелепний сіалоаденіт
C	Гострий гнійний періостит нижньої щелепи
D	Гострий гнійний піднижньощелепний лімфаденіт
E	Гострий остеомієліт нижньої щелепи справа
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 48-ми років скаржиться на новоутворення в правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до $37,0-37,2^{\circ}C$. Хворому проводилась протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. В правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабо болюче кулясте новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Якому захворюванню найбільш імовірно відповідає ця клінічна картина?
Правильна відповідь	Хронічний лімфаденіт
B	Хронічний сіалоаденіт
C	Слинокам'яна хвороба
D	Аденома слинної залози
E	Атерома
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	Хворий 56-ти років звернувся зі скаргами на наявність припухлості у правій білявушній ділянці, біль. Припухлість помітив 5-6 місяців тому. Об'єктивно: парез м'язів правої половини обличчя. Пальпаторно визначається горбиста пухлина, спаяна з навколишніми тканинами, помірно болісна. У центрі пухлини - розм'якшення. Піднижньощелепні і шийні лімфовузли справа збільшені, ущільнені. Рот відкриває у повному обсязі. З протоки правої білявушньої слинної залози виділення слини не відзначається. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	Аденокарцинома правої привушної слинної залози
В	Хронічний неепідемічний паротит
С	Хронічний лімфаденіт правої привушної області
Д	Змішана пухлина правої привушної слинної залози
Е	Актиномікоз правої привушної слинної залози
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Чоловік 36-ти років скаржиться на ниючий біль у ділянці 26 зуба, що посилюється при накушуванні. 26 у минулому лікований. Об'єктивно: слизова оболонка альвеолярного відростка верхньої щелепи з вестибулярного боку на рівні 26 зуба пастозна. На рентгенограмі 26 зуба визначається вогнище просвітління у верхівки медіального щічного кореня з чіткими контурами діаметром до 0,5 см. Встановіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Загострення хронічного грануломатозного періодонтиту 26
В	Хронічний фіброзний періодонтит 26
С	Хронічний гранулюючий періодонтит 26
Д	Кістогранульома
Е	Локальний пародонтит
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 43-х років скаржиться на відчуття важкості у правій навколовушній залозі, солонуватий присмак у роті, часті загострення. Об'єктивно: залоза щільна, пружноеластичної консистенції, безболісна. З вустя протоки виділяється слина з домішкою комочків слизу. На сіалогамі у паренхімі залози велика кількість дрібних порожнин. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний паренхіматозний паротит
В	Паротит Герценберга
С	Хронічний інтерстиціальний паротит
Д	Синдром Шегрена
Е	Аденома правої навколовушної залози

№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Чоловік 35-ти років звернувся зі скаргами на потовщення альвеолярного відростка верхньої щелепи. Попередній діагноз: радикалярна кіста верхньої щелепи. Що буде виявлено під час пункції альвеолярного відростка в області "потовщення" щічної ділянки?
Правильна відповідь	Жовтувата рідина
В	Кров
С	Гній
D	Епітелій
Е	Каламутний інфільтрат
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У чоловіка 40-ка років біля 6 місяців тому після видалення 26 зуба з'явилися сполучення між порожниною рота та гайморовою пазухою і перші ознаки гаймориту. Яке хірургічне лікування необхідно провести?
Правильна відповідь	Гайморотомія з одночасною пластикою нориці
В	Гайморотомія за Колдуелом-Люком
С	Ушивання нориці
D	Тампонада нориці йодоформною турундою
Е	Остеотомія альвеолярного відростка
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Жінка 46-ти років скаржиться на кровотечу з ясен, виділення гною, рухомість зубів. Хворіє 10-ти років. При огляді ясна на верхній та нижній щелепах гіперемовані, набряклі, при дотику - кровотеча. В області 42, 41, 31, 32 пародонтальні кишені до 8 мм з гнійними виділеннями, рухомість II ступеня, інших - I ступеня. На рентгенограмі - резорбція міжальвеолярних перегородок в ділянці 42, 41, 31, 32 на 1/2 довжини кореня, явище остеопорузу. Який з перерахованих методів найбільш показаний для хірургічного лікування даної хворої?
Правильна відповідь	Остеопластика
В	Кюретаж
С	Гінгівотомія
D	Гінгівоектомія
Е	Клаптева операція
№	крок 2017-2018

Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Чоловік 25-ти років скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи, патологічну рухливість, кровотечу з порожнини рота, порушення прикусу, неможливість пережовування їжі. 6 годин тому отримав травму. При обстеженні встановлений поодинокий перелом нижньої щелепи між першим і другим премолярами. Зміщення відламків незначне. Зуби усі в наявності, стійкі, правильної анатомічної форми. Який оптимальний метод лікування хворого?
Правильна відповідь	Двощелепні назубні шини
В	Остеосинтез із використанням мініпластинки
С	Однощелепна назубна шина
Д	Капова шина
Е	Накісний апарат
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У чоловіка 49-ти років через два роки після променевої терапії діагностовано рецидив раку нижньої губи. Об'єктивно: в області правої половини нижньої губи є новоутворення розміром 1x2 см з виразкою в центрі. В правій підщелепній області виявляються 2 збільшених, щільних, безболісних лімфовузли круглої форми. Який метод лікування у даному випадку оптимальний?
Правильна відповідь	Комбінований метод
В	Клиноподібна резекція нижньої губи
С	Прямокутна резекція нижньої губи
Д	Трапецієподібна резекція нижньої губи
Е	Операція Ванаха
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хвора 45-ти років скаржиться на пухлино-подібне слабкоболісне новоутворення в правій привушній ділянці, яке виникло 2 місяці тому без жодної причини. Відзначає слабкість, деколи підвищення температури до 37,2-37,6 ^o С. Півмісяця тому проведена протизапальна терапія, яка не дала позитивних результатів. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок незначної припухлості в правій привушній ділянці. Пальпаторно визначається округле новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, слабкоболісне, не спаяне зі шкірою. Із стенової протоки виділяється прозора слина в невеликій кількості. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Псевдопаротит Герценберга
В	Атерома привушної ділянки

C	Гострий інфекційний паротит
D	Сіалопатія Шегрена
E	
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 49-ти років скаржиться на прогресуюче утруднене відкривання рота, болісне ковтання зліва, різке погіршення загального стану, підвищення температури до 39,3° C. Скарги на гострі болі у зруйнованому 38 зубі. Об'єктивно: обличчя симетричне, піднижньощелепні лімфатичні вузли зліва збільшені, болісні під час пальпації. Пальпація під лівим кутом нижньої щелепи та в лівій позадущелепній ділянці викликає різкий біль. Відкривання рота та бокові рухи вліво значно обмежені. Наявна гіперемія та інфільтрація лівої крило-щелепної складки. Найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Флегмона крило-щелепного простору
B	Флегмона приглоткового простору
C	Флегмона позадущелепної ділянки
D	Флегмона піднижньощелепного простору
E	Абсцес щелепно-язикового жолобка
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 50-ти років із вогнепальним пораненням нижньої щелепи та дефектом кісткової тканини в ділянці підборіддя. Який метод імобілізації йому показаний?
Правильна відповідь	Позаротовий апарат типу Рудько
B	Двощелепна шина із зачіпними петлями та міжщелепним еластичним витягуванням
C	Кістковий шов
D	Однощелепна шина-скоба
E	Фіксація за допомогою спиць і стрижнів
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	Хворий 32-х років скаржиться на наявність припухлості у ділянці кута нижньої щелепи зліва. Об'єктивно: у ділянці нижньої щелепи на рівні відсутнього 38 зуба виявляється потовщення кістки, слизова оболонка альвеолярного відростка не змінена, пальпація безболісна. Регіонарні лімфо вузли не збільшені. На рентгенограмі визначається вогнище просвітлення кісткової тканини округлої форми до 3,5 см у діаметрі з чіткими рівними контурами, по периферії ободок склерозованої тканини. У порожнину вогнища просвітлення звернена коронкова частина ретинованого 38 зуба. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Фолікулярна кіста
В	Радикулярна кіста
С	Адамантинома
Д	Остеобластокластома
Е	Одонтома
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 47-ми років після безуспішного консервативного лікування хронічного гранулематозного періодонтиту 15 зуба з'явився для його видалення. Який вид щипців доцільно використати для видалення даного зуба?
Правильна відповідь	S-подібні
В	S-подібні праві
С	Прямі
Д	S-подібні ліві
Е	Байонети
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворому 20-ти років з приводу загострення хронічного періодонтиту показано видалення 12 зуба. Для знеболювання обрано інфраорбітальну та інцизивну анестезію. Які нервові утворення виключаються після проведення вказаної анестезії?
Правильна відповідь	Передні верхні альвеолярні гілки, <i>n. incisivus</i>
В	Середні верхні альвеолярні гілки, <i>n. nasopalatinus</i>
С	Задні верхні альвеолярні гілки, <i>n. incisivus</i>
Д	Великий нерв піднебіння, середні верхні альвеолярні гілки
Е	Носо-піднебінний нерв, передні верхні альвеолярні гілки
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	У хворої 56-ти років ерозія червоної облямівки нижньої губи овальної форми, з гладкою поверхнею, насиченого червоного кольору. На поверхні ерозії кров'яні кірочки, які знімаються з утрудненням. Після зняття кірок виникає невелика кровотеча. Легке травмування ерозії у місцях, де кірки відсутні, не викликає кровотечі. Визначте вид передраку нижньої губи:
Правильна відповідь	Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті
В	Бородавчастий передрак червоної облямівки губи
С	Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи
D	Хвороба Боуена
Е	Еритроплазія
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 30-ти років звернувся до лікаря для видалення 26 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об'єктивно: коронка 26 зруйнована на 1/3. Які щипці можна використати для видалення даного зуба?
Правильна відповідь	S-подібної форми з шипом на лівій щічці
В	S-подібної форми з шипом на правій щічці
С	Прямі
D	Прямий елеватор
Е	S-подібної форми без шипів
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворому 50-ти років було встановлено діагноз: слинокам'яна хвороба з локалізацією каменя в товщі підщелепної слинної залози. Оберіть лікувальну тактику:
Правильна відповідь	Видалення підщелепної слинної залози
В	Променева терапія
С	Склерозуюча терапія
D	Видалення каменя із збереженням залози
Е	Медикаментозне консервативне лікування
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	У хворого 30-ти років діагностовано гострий гнійний одонтогенний періостит лівої верхньої щелепи, причиною якого є 23 зуб. Коронка 23 зуба зліва зруйнована каріозним процесом на 1/3. 22, 24 зуби інтактні. На прицільній рентгенограмі відмічається розширення періодонтальної щілини 23 зуба. Яке лікування доцільно провести у даному випадку?
Правильна відповідь	Періостотомія, медикаментозне лікування з подальшим лікуванням причинного зуба
B	Видалення причинного зуба, періостотомія
C	Видалення причинного зуба, фізіотерапевтичне лікування
D	Видалення причинного зуба, медикаментозне лікування
E	-
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У хворого 45-ти років виявлено асиметрію обличчя за рахунок щільного відмежованого інфільтрату в правій щічній ділянці, шкіра над інфільтратом синюшна, витончена, по центру інфільтрату розташована нориця. У роті коронка 46 зуба зруйнована на 2/3, по перехідній складці пальпується тяж, що зв'язує зуб з норицею. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Мігруюча гранульома обличчя
B	Хронічний остеомієліт нижньої щелепи
C	Фурункул щічної ділянки
D	Одонтогенний лімфаденіт
E	Актиномікоз
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	До стоматолога звернувся хворий 30-ти років зі скаргами на припухлість в ділянці верхньої губи. Об'єктивно: визначається асиметрія обличчя за рахунок набряку верхньої губи, носогубна складка згладжена. У ротовій порожнині на вестибулярній поверхні верхньої щелепи перехідна складка на рівні 11, 21, 22 згладжена, гіперемована, під час пальпації відчувається біль та флюктуація. Діагностовано гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 21. Оберіть тактику лікування:
Правильна відповідь	Збереження 21, періостеотомія, протизапальна терапія
B	Збереження 21, протизапальна терапія
C	Видалення 21, періостеотомія, протизапальна терапія
D	Видалення 21, періостеотомія
E	Видалення 12, 21, 22 зубів, періостеотомія, протизапальна терапія
№	крок 2017-2018

Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 30-ти років скаржиться на постійний різкий біль пульсуючого характеру у ділянці верхньої щелепи зліва, що іррадіює у вухо, скроню, посилюється при горизонтальному положенні і змиканні зубів, на безсоння, загальне нездужання. Хворіє третій день, усі прояви наростають. Об'єктивно: у 26 зубі глибока каріозна порожнина, перкусія болісна. Зуб рухливий. Слизова оболонка навколо зуба набрякла, гіперемована, перехідна складка з вестибулярного боку згладжена, пальпаторно - інфільтрат з нечіткими контурами, різко болісний. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний періостит альвеолярного відростка верхньої щелепи у ділянці 26 зуба
В	Гострий остеомієліт альвеолярного відростка верхньої щелепи у ділянці 26 зуба
С	Гострий серозний періостит альвеолярного відростка верхньої щелепи у ділянці 26 зуба
D	Гострий періодонтит 26 зуба
Е	Гострий пульпіт 26 зуба
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У хворого 37-ми років був видалений медіальний корінь 36 зуба, а його дистальний корінь зламався у середній третині. Який інструмент слід обрати для видалення кореня?
Правильна відповідь	Елеватор під кутом праворуч
В	Елеватор під кутом ліворуч
С	Прямий елеватор
D	Дзьобоподібні щипці, що не сходяться
Е	Дзьобоподібні щипці, що сходяться
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У хворого планується розтин абсцедуючого фурункула верхньої губи. Який вид анестезії показаний для проведення даного втручання?
Правильна відповідь	Двобічна інфраорбітальна
В	Двобічна інфраорбітальна та різцева
С	Двобічна інфраорбітальна та палатинальна
D	Двобічна туберальна та палатинальна
Е	Двобічна палатинальна
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	Хворий звернувся зі скаргами на наявність безболісного пухлиноподібного новоутворення на нижній щелепі. Пальпаторно визначається симптом Дюпюїтрена. Коронка 36 зуба з глибокою каріозною порожниною. На Ро-грамі - ділянка деструкції кісткової тканини з чіткими межами, розташована у ділянці верхівок коренів 36 зуба, розміром - 2x2 см. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Радикулярна кіста нижньої щелепи
B	Остеобластокластома
C	Кератокіста нижньої щелепи
D	Фолікулярна кіста нижньої щелепи
E	Амелобластома нижньої щелепи
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	На рентгенограмі у хворої визначається вогнище деструкції кісткової тканини тіла нижньої щелепи розміром 3x4 см у вигляді великої кількості дрібних порожнин різної величини і форми, розділених перегородками. Під час пункції пухлини отримали буру рідину. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Остеобластокластома нижньої щелепи
B	Радикулярна кіста нижньої щелепи
C	Рак нижньої щелепи
D	М'яка одонтома нижньої щелепи
E	Амелобластома нижньої щелепи
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хвора 25-ти років звернулася до хірурга-стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об'єктивно: коронка 37 зуба зруйнована на 2/3. Слизова оболонка ясен у ділянці 37 зуба не змінена. Який вид анестезії слід застосувати хірургу-стоматологу для видалення 37 зуба?
Правильна відповідь	Мандибулярна та щічна
B	Внутрішньоротова інфраорбітальна
C	Губеральна
D	Мандибулярна
E	Ментальна
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	Хворий 35-ти років скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи при спробі закрити рот. Травма сталась внаслідок побиття невідомим. Об'єктивно: при пальпації альвеолярний паросток верхньої щелепи рухомий з обох боків, позитивний симптом Малевича та симптом "навантаження", на рентгенограмі лінія перелому визначається у ділянці нижньої стінки грушеподібного отвору та рівня прозорості верхньощелепних пазух. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Перелом верхньої щелепи за Le Fort I (нижній тип)
B	Перелом кісток носа
C	Перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи зліва
D	Перелом верхньої щелепи за Le Fort II (середній тип)
E	Перелом верхньої щелепи за Le Fort III (верхній тип)
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Чоловік віком 30-ти років скаржиться на біль, відчуття тяжкості і розпирання в правій половині обличчя, закладеність носа справа та загальну слабкість. За тиждень до цього відмічав сильний біль в 15 зубі. Об'єктивно: обличчя дещо асиметричне за рахунок припухлості підочноямкової та щічної ділянок справа. 15 зуб зруйнований на 2/3 коронки, перкусія різко болісна. На оглядовій рентгенограмі спостерігається затемнення правої верхньо-щелепної пазухи різного ступеня інтенсивності. Верхівка кореня 15 зуба з ознаками хронічного періодонтиту. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий правобічний одонтогенний гайморит від 15 зуба
B	Одонтогенна флегмона підочної ділянки справа від 15 зуба
C	Одонтогенна флегмона щічної ділянки справа від 15 зуба
D	Хронічний правобічний одонтогенний гайморит від 15 зуба
E	Гострий гнійний одонтогенний періостит від 15 зуба
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 34-х років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність набряку м'яких тканин нижньої щелепи зліва та нориці в піднижньощелепній ділянці. 36, 37 зуби зруйновані. На їх рівні слизова оболонка альвеолярного відростку набрякла, гіперемована. При рентгенологічному дослідженні: наявність секвестрів у тілі щелепи зліва. Який метод лікування необхідно обрати?
Правильна відповідь	Видалення 36, 37 зубів і секвестрэктомія нижньої щелепи
B	Видалення 36, 37 зубів
C	Секвестрэктомія нижньої щелепи
D	Пункція запального процесу
E	Антибактеріальна терапія

№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 42-х років поступив до клініки в тяжкому стані: млявий, температура тіла - 39,1° С, різко болючий інфільтрат дна порожнини рота та підщелепної ділянки справа. Шкіра над інфільтратом напружена, синюшного кольору. Під час пальпації під шкірою відчувається крепітація. Який діагноз можна поставити у даному випадку?
Правильна відповідь	Гнилісно-некротична флегмона дна порожнини рота
B	Аденофлегмона дна порожнини рота
C	Злоякісна пухлина дна порожнини рота
D	Актиномікоз дна порожнини рота
E	Одонтогенна флегмона дна порожнини рота
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Після удару в області СНЩС з'явились гематома на обличчі, тугорухомість, скутість рухів нижньої щелепи. Біль при широкому відкриванні рота. Які дії слід виконати для постановки діагнозу?
Правильна відповідь	Рентгенограма СНЩС справа і зліва при відкритому та закритому роті
B	Обмеження рухів у суглобі
C	Консультація невропатолога та рентгенобстеження
D	РЕГ та консультація невропатолога
E	Панорамна рентгенограма щелеп
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 48-ми років скаржиться на порушення рухливості нижньої щелепи. Захворювання розпочалось поступово з погіршення рухливості, скутості рухів нижньої щелепи. На рентгенограмі СНЩС справа та зліва з відкритим та закритим ротом виявлені екзофіти на суглобових поверхнях. Це характерно для такого захворювання:
Правильна відповідь	Артроз
B	Гострий артрит
C	Хронічний артрит
D	Невралгія II гілки трійчастого нерву
E	Внутрішньосуглобовий вивих
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	У хворої встановлено попередній діагноз: слинокам'яна хвороба з локалізацією каменю в слинній залозі. Оберіть метод дослідження для виявлення рентгеннегативних каменів слинних залоз?
Правильна відповідь	УЗ-діагностика
В	Реографія
С	Комп'ютерна рентгенографія
Д	Прицільна рентгенографія
Е	Термометрія
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Чоловік 35-ти років знаходиться на лікуванні у хірурга-стоматолога з приводу гострого одонтогенного остеомиєліту нижньої щелепи. З метою контролю якості лікування і визначення подальшої тактики планується проведення контрольного рентгенологічного дослідження. У які терміни від початку захворювання необхідно виконувати вказане дослідження цьому хворому для виявлення ознак деструкції кісткової тканини?
Правильна відповідь	До кінця 2-го тижня
В	Через 2-3 дні
С	Через 4-5 днів
Д	Через тиждень
Е	Через місяць
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	До хірурга-стоматолога звернувся пацієнт зі скаргами на болі і припухлість у ділянці верхньої губи і нижніх відділів підчонамкової ділянки зліва, періодичний біль у зруйнованому 22 зубі. Після проведеного обстеження встановлений діагноз: загострення хронічного періодонтиту 22 зуба, абсцес іклової ямки. Показана операція: видалення 22 зуба, розтин абсцесу внутрішньоротовим доступом. Оберіть оптимальний метод анестезії:
Правильна відповідь	Інфраорбітальна (позаротовий метод) і різцева анестезія
В	Інфраорбітальна (внутрішньоротовий метод) і піднебінна анестезія
С	Губеральна і піднебінна анестезія
Д	Інфільтраційна анестезія
Е	Наркоз
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	Хворий 22-х років звернувся до щелепно-лицевого відділення з попереднім діагнозом: перелом виrostкового відростка нижньої щелепи зліва. Яке найбільш інформативне дослідження треба провести хворому у першу чергу?
Правильна відповідь	Вивчити тримірне зображення відламків
B	Визначити кровотік у щілині перелому
C	Визначити ступінь зміщення відламків
D	Визначити візуалізацію щілини перелому
E	Визначити рівень лінії перелому по зовнішній і внутрішній кісткових пластинках
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Вкажіть, що з нижче перерахованого НЕ НАЛЕЖИТЬ до місцевих ускладнень, що виникають під час або відразу після проведення ін'єкції:
Правильна відповідь	Некроз слизової оболонки
B	Ішемія шкіри
C	Диплопія
D	Параліч функції або парез м'язів
E	Поранення судин ін'єкційною голкою
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Вкажіть, що з нижче перерахованого НЕ НАЛЕЖИТЬ до етапів типової операції видалення зубів щипцями?
Правильна відповідь	Накладання кінчика щічок щипців на край альвеолярного відростка
B	Накладання щічок щипців на зуб
C	Просування щічок щипців до емалево-цементної межі
D	Змикання ручок щипців
E	Вивихування й екстракція зуба з комірки
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Явище, за якого нормально розвинений зуб не прорізався у відповідний час на тому місці в зубному ряду, де він мав прорізатися, має назву:
Правильна відповідь	Ретенція
B	Інклюзія
C	Дистопія
D	Тортоаномалія

Е	Надкомплектний зуб
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У хворого після отриманої травми з'явилися кровотеча з носа, обмежене відкривання рота, відчуття парестезії шкірних покривів правої підочної ділянки і нижньої повіки. Об'єктивно: спостерігається асиметрія обличчя за рахунок западіння правої виличної ділянки, наявність симптому "сходінки" в середній частині правого нижнього краю очної ямки і в ділянці вилично-альвеолярного гребеня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Перелом виличної кістки зі зміщенням уламків
В	Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II
С	Перелом виличної кістки без зміщення уламків
D	Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I
Е	Перелом виличної дуги
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хвора 24-х років звернулася в хірургічний кабінет стоматологічної поліклініки з метою видалення 38 зуба. Яку анестезію доцільно застосувати при видаленні 38 зуба?
Правильна відповідь	Торусальна
В	Мандибулярна
С	Губеральна
D	Інфільтраційна
Е	Плексуальна
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 24-х років з'явився для видалення 47 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Укажіть кращий метод периферійної провідникової анестезії:
Правильна відповідь	Торусальна
В	Інфільтраційна
С	Позаротова мандибулярна
D	Ментальна
Е	Плексуальна
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	Лікар проштовхнув корінь у прищелепові м'які тканини. Корінь розташувався під слизовою оболонкою альвеолярної частини щелепи і чітко пропальповується пальцем. Яка тактика лікаря?
Правильна відповідь	Зробити розтин м'яких тканин над коренем та видалити його
B	Видалити корінь через комірку зуба
C	Видалити корінь через підщелеповий оперативний доступ
D	Зробити рентгенологічне обстеження хворого для визначення подальшої тактики
E	Залишити корінь в м'яких тканинах
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Була проведена піднебінна анестезія. При виведенні голки з м'яких тканин виникла кровотеча. Що необхідно зробити для зупинки кровотечі?
Правильна відповідь	Притиснути тампоном місце ін'єкції
B	Накласти шви
C	Ввести внутрішньовенно 10% розчин хлористого кальцію
D	Ввести внутрішньом'язово вікасол
E	Перев'язати зовнішню сонну артерію
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хвора звернулася до хірурга зі скаргами на рухливість зубів. Після об'єктивного огляду та аналізу рентгенограми встановлено діагноз: генералізований пародонтит 1-2 ступеня. Які зуби, уражені пародонтитом, підлягають видаленню?
Правильна відповідь	Зуби з 2-3 ступенем рухливості
B	Інтактні зуби
C	Зуби з болісною перкусією
D	Зуби з 1 ступенем рухливості
E	Зуби, вражені карієсом
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	На амбулаторному хірургічному прийомі треба провести хірургічне втручання, яке потребує знеболювання. Що в першу чергу повинен зробити лікар, перш ніж проводити анестезію?
Правильна відповідь	Провести алергічну пробу
B	Зробити загальний аналіз крові

С	Направити хворого до терапевта
D	Зробити рентгенограму
Е	-
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий скаржиться на безболісне новоутворення на нижній губі, що з'явилося 2 тижні тому після травми. Об'єктивно: безболісне, пружне новоутворення. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Ретенційна кіста малої слинної залози
В	Декубітальна виразка
С	Поліп
D	Трофічна виразка
Е	Епуліс
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	До медпункту звернулись мама з донькою 11-ти років. Зі слів матері, дівчинка, граючись, впала на вулиці. Лікар встановив, що у пацієнтки ізольоване механічне ушкодження м'яких тканин щічної ділянки з порушенням цілісності шкіри. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Садно
В	Забиття
С	Синець
D	Гематома
Е	Рана
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хвора із різаною раною щічної області звернулася до лікаря. Отримала побутову травму 4 доби тому, по медичну допомогу не зверталася. Об'єктивно: загоєння проходить шляхом поступового заповнення ранової порожнини, що містить гній, грануляційною тканиною з подальшими епітелізацією й утворенням рубця. Який вид загоєння має місце?
Правильна відповідь	Вторинний натяг
В	Первинний і вторинний натяг
С	Комбінований
D	Третинний натяг
Е	Первинний і третинний натяг

№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У зв'язку з тим, що у хворого мілкий присінок рота та беззуба нижня щелепа, було проведено операцію - переміщення слизово-окістного клаптя з альвеолярного гребеня до тіла щелепи з фіксацією клаптя пелотом протеза. За якою методикою проведено поглиблення присінку порожнини рота?
Правильна відповідь	За Румпелем
В	За Казаньяном
С	За Тіршем
Д	За Траунер
Е	За Рерман
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	В шпиталь поступив поранений 19-ти років, з діагнозом: мінно-вибухове поранення, відкритий перелом нижньої щелепи у ділянці лівого кута зі зміщенням відламків, рвано-забита рана лівої підщелепної ділянки. Стан середньої тяжкості, пульс - 80/хв., АТ- 110/80 мм рт.ст. Яке знеболювання необхідно обрати для виконання первинної хірургічної обробки рани?
Правильна відповідь	Ендотрахеальний наркоз
В	Внутрішньовенний наркоз
С	Нейролептаналгезія
Д	Провідникове знеболювання на фоні премедикації
Е	Провідникове знеболювання
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У хворого ретенований, дистопований зуб "мудрості" зліва. Впродовж 6 місяців зуб періодично турбував хворого, виникали біль и запальні процеси. В даний час боль відсутній, рот відкриває вільно, при огляді видно медіальні горби атипово розташованого 48 зуба. На рентгенограмі нижньої щелепи справа видно дистопований 48 зуб, коронка якого упирається в ділянку 47 зуба. Які дії лікаря?
Правильна відповідь	Операція - атипове видалення 48 зуба
В	Висікання "каптура" над 48 зубом
С	Ортодонтичне лікування
Д	Спостереження
Е	Видалення 47 зуба

№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хлопчик 10-ти років скаржиться на біль у верхньому зубі справа, який посилюється при накушуванні на 65 зуб. Біль з'явився 2 дні тому. Раніше зуб був лікований. Об'єктивно: коронка 65 зуба змінена в кольорі, зруйнована на 2/3, перкусія різко болюча. Слизова оболонка в ділянці проекції верхівок кореня 65 зуба гіперемована, пальпація болісна. Який з наступних діагнозів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Загострення хронічного періодонтиту
В	Гострий гнійний періостит верхньої щелепи
С	Гострий одонтогенний остеомієліт
D	Гострий серозний періодонтит
Е	Гострий гнійний періодонтит
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 43-х років звернувся зі скаргами на поступове болюче "почервоніння" обличчя, збільшення набряку в ділянках вилицевих кісток та вій, що з'явилося 10 годин тому. Опіки пов'язані з гасінням пожежі. Об'єктивно: відкриття рота болюче, колір слизової оболонки не змінений, шкіра обличчя на дотик дуже болюча, глибина ураження не досягає підшкірної клітковини, вкрита пухирями. Яка у хворого ступінь опікової хвороби?
Правильна відповідь	II
В	I
С	IIIa
D	IIIб
Е	IV
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хвора 42-х років скаржиться на припухлість і гноетечу з нориці у лівій навколонушної області, обмеження відкриття рота протягом трьох місяців. Півроку тому з приводу тривалого хронічного запалення було видалено 38 зуб. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок інфільтрата в лівій навколонушній області синюшного кольору, "дерев'янистої" щільності. На ньому дві нориці: з одної випинаються грануляції, з іншого виділяється рідкий крихтоподібний гній жовтуватого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Актиномікоз навколонушної області, шкірно-м'язова форма
В	Одонтогенна підшкірна гранулома навколонушної області
С	Хронічний дифузний остеомієліт кута і гілки нижньої щелепи

D	Паротит Герценберга
E	Слинна нориця навколоушної слинної залози
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 44-х років звернувся для видалення зруйнованого 24 зуба. Об'єктивно: обличчя симетричне, коронка 24 зуба зруйнована на 2/3, перкусія безболісна. Слизова оболонка ясен навколо зуба без змін. Рентгенографічно: рівномірне розширення та потовщення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний періодонтит 24
B	Хронічний гранулюючий періодонтит 24
C	Хронічний гранулематозний періодонтит 24
D	Загострення хронічного періодонтиту 24
E	Хронічний гангренозний періодонтит 24
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Дитині з одностороннім незарощенням верхньої губи проведено хейлопластику за Лімбергом. Які оптимальні терміни оперативного втручання при незарощеннях верхньої губи?
Правильна відповідь	6-7 місяців
B	2-3 роки
C	В перші дні
D	4-6 років
E	1 рік
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	На полі бою знайдено пацієнта 19-ти років з дислокаційною асфіксією. На якому етапі медичної евакуації пацієнту буде надана медична допомога?
Правильна відповідь	На полі бою
B	ОМедБ
C	В спеціалізованому госпіталі
D	МПБ
E	МПП
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	Жінка віком 36-ти років, перебуваючи в нетверезому стані, 4 години тому отримала побутову травму. Була доставлена до щелепно-лицевого відділення. Після обстеження встановлено попередній діагноз: наскрізна глибока різана рана бічної поверхні обличчя з пошкодженням навколоротової ділянки та привушної слинної залози. Рана зіяє. Зіяння рани зумовлене:
Правильна відповідь	Наявністю мімічних м'язів
B	Сполученням з порожниною рота
C	Особливостями іннервації обличчя
D	Наявністю жувальних м'язів
E	Глибиною пошкодження
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 28-ми років звернувся зі скаргами на наявність виразки на язиці. Об'єктивно: відмічається щільний інфільтрат, ерозія червоного кольору з гладким блискучим дном, діаметром біля 1,5 см чітко окреслена, з рівними краями, безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Первинний сифіліс
B	Туберкульозна виразка
C	Актиномікоз язика
D	Абсцес язика
E	Декубітальна виразка
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	До щелепно-лицевого відділення доставлено хворого зі скаргами на неможливість закрити рота. Стан виник під час відкушування яблука. Об'єктивно: обличчя хворого виражає переляк, рот широко відкритий, підборіддя зміщене вліво, відзначається витікання слини. Під час пальпації через зовнішній слуховий прохід рухи правої суглобової головки відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Вивих правого СНЩС
B	Перелом гілки нижньої щелепи
C	Гострий артрит СНЩС
D	Больова дисфункція СНЩС
E	Двобічний вивих СНЩС
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія

Текст завдання	У пацієнта діагностовано фібропапілому шкіри обличчя. Який метод лікування необхідно застосувати?
Правильна відповідь	Хірургічний
В	Променевий
С	Фізіотерапевтичний
D	Медикаментозний
Е	Комбінований
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	До лікаря-онколога звернувся хворий 67-ми років зі скаргою на болі в горлі при ковтанні. Хворіє 2 місяці, не лікувався. Під час обстеження в ділянці кореня язика справа виявлена болюча кратероподібна виразка. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Після проведення цитологічного обстеження встановлено діагноз раку кореня язика справа І стадії, Іа клінічна група, T1N0M0. Який розмір виразкової пухлини в найбільшому вимірі?
Правильна відповідь	Не більше 2 см
В	До 1 см
С	До 3 см
D	Від 1 до 3 см
Е	Від 2 до 4 см
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У хворої 48-ми років діагностований ревматоїдний артрит СНЦС. Що є характерною ознакою ревматоїдного артриту СНЦС?
Правильна відповідь	Двобічність ураження
В	Зниження гостроти слуху
С	Наявність у анамнезі хронічної травми
D	Поєднання з артрогенною контрактурою
Е	"Тугорухомість" нижньої щелепи зранку
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворий 63-х років звернувся до лікаря зі скаргами на неболючий утвір із широкою основою до 2 см на шкірі лівої щоки. У центрі утворення - рогові маси. Зі слів хворого, утвір виник 4 місяці тому. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який найімовірніший діагноз?
Правильна відповідь	Кератоакантома

B	Холестеатома
C	Меланома
D	Атерома
E	-
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У пацієнта 37-ми років наявна асиметрія обличчя за рахунок припухлості привушно-жувальної ділянки справа. При пальпації - утвір щільної консистенції, без чітких меж, болочий. Кути рота й ока опущені. При намаганні надуті щоки права щока парусить. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Злоякісна пухлина привушної слинної залози
B	Центральний парез лицьового нерва
C	Периферичний парез лицьового нерва
D	Невралгія трійчастого нерва
E	Флегмона привушно-жувальної ділянки
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Під час проведення інфраорбітальної анестезії у пацієнта виник осередок збліднення шкіри у підчочномковій ділянці. Загальний стан пацієнта не погіршився. Лікар діагностував ішемію шкіри. Яку допомогу необхідно надати хворому?
Правильна відповідь	Пацієнт лікування не потребує, ішемія проходить самостійно
B	Пацієнту необхідно ввести 1 мл 10% розчину кофеїну підшкірно
C	Дати понюхати нашатирний спирт
D	Необхідно ввести 1 мл кордіаміну
E	Необхідно ввести розчин тавегілу або супрастину внутрішньом'язово
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У пацієнта 48-ми років на слизовій оболонці щоки виявлені бородавчасті, щільні, сірувато-білі розростання, що підіймаються над прилеглими тканинами, оточені ділянками ороговіння сірувато-білого кольору, які не зішкрібаються. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Верукозна лейкоплакія
B	Ерозивна лейкоплакія
C	Хвороба Боуена
D	Еритроплазія Кейра

Е	Папіломатоз
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 44-х років після травми скаржиться на біль у нижній щелепі, що посилюється під час ковтання, особливо при відкриванні рота. Об'єктивно: конфігурація обличчя порушена, обширна гематома у ділянці кута нижньої щелепи зліва. Пальпація цієї ділянки болісна. Слизова оболонка блідо-рожева, вуздечка нижньої губи зміщена вліво від центральної лінії. При натисканні на підборіддя виникає біль у ділянці кута нижньої щелепи зліва. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Перелом кута нижньої щелепи зліва
В	Двобічний перелом гілки нижньої щелепи
С	Задній вивих нижньої щелепи зліва
Д	Передній двобічний вивих нижньої щелепи
Е	-
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Пацієнту 27-ми років був встановлений попередній діагноз: гострий гнійний одонтогенний синусит верхньощелепної пазухи. Який з променевих методів дослідження слід вважати найбільш інформативним для даної клінічної ситуації?
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія
В	Рентгенографія
С	Панорамний знімок
Д	Прицільний знімок
Е	-
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворому 35-ти років два дні тому під місцевою анестезією проводилось лікування карієсу 27, 28 зубів. Після відвідування лікаря, хворий виявив незначну припухлість у скроневій ділянці зліва. Впродовж наступного дня температура підвищилася до 38,5° С. Об'єктивно: набряк скроневої і навколоушно-жувальної ділянок зліва (симптом "пісочного годинника"), набряк повік лівого ока. Відкривання рота до 0,5 см, болісне. Пальпація скроневої ділянки безболісна. За горбом верхньої щелепи зліва визначається різко болісний інфільтрат, слизова оболонка у цій ділянці гіперемована, набрякла. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Флегмона підскроневої і крилопіднебінної ямок зліва
В	Абсцес підчонаймкової ділянки зліва

С	Флегмона підскроневої ямки зліва
D	Абсцес скроневої ділянки зліва
Е	-
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Жінка 45-ти років скаржиться на напади нестерпного болю у лівій половині обличчя тривалістю 1-2 хвилини. Напади провокуються жуванням. Захворіла два місяці тому після переохолодження. Об'єктивно: пальпаторна болочість у точках виходу трійчастого нерва зліва. Дотик біля крила носа зліва спричиняє черговий напад з тонічною судомою м'язів обличчя. Назвіть патологію:
Правильна відповідь	Невралгія II гілки трійчастого нерва
В	Невралгія I гілки трійчастого нерва
С	Невралгія III гілки трійчастого нерва
D	Неврит трійчастого нерва
Е	Неврит лицевого нерва
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хвора 30-ти років після переохолодження скаржиться на перекошення обличчя вправо, підвищення температури тіла до 37,9° С. Об'єктивно: не може нахмурити лоба зліва та закрити ліве око. Згладжена ліва носогубна складка. Губи щільно не стуляються. Відсутній лівий надбрівний рефлекс. Назвіть патологію:
Правильна відповідь	Невропатія лицевого нерва
В	Невралгія трійчастого нерва
С	Лицевий геміспазм
D	Прогресуюча геміатрофія обличчя
Е	-
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	У хворого 22-х років слизова оболонка ретромоларної області набрякла, гіперемована, 38 зуб покритий каптуром, з-під якого під час пальпації виділяється гній, температура тіла - 37,5° С. Яка невідкладна допомога показана в цьому випадку?
Правильна відповідь	Розсічення каптура і антибактеріальна терапія
В	Висічення каптура

С	Видалення 38 зуба
D	Антибіотикотерапія
E	Розсічення каптура
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Чоловік 43-х років звернувся до щелепно-лицевого хірурга зі скаргами на естетичний дефект. При огляді виявлено надлишкове утворення жирової тканини в ділянці шиї та верхньої частини тулуба у вигляді коміра без чітких меж, відмічається обмежена рухомість шиї. З анамнезу відомо, що такі ж симптоми присутні у батька пацієнта. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Хвороба Маделунга
В	Ліпома
С	Нейрофіброматоз
D	Фіброма
E	Лімфангіома
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Жінка 35-ти років скаржиться на виражений біль, появу вузлика під слизовою оболонкою вестибулярної поверхні нижньої щелепи в ділянці 44, 45 зубів, оніміння шкіри половини нижньої губи. Перші скарги з'явилися після хірургічного втручання в даній ділянці. Пальпаторно визначається обмежений болісний вузлик щільноеластичної консистенції із гладкою поверхнею округлої форми, близько 1 см в діаметрі, слизова оболонка над ним не змінена. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Травматична неврома
В	Ліпома
С	Папілома
D	Фіброма
E	Епулід
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Чоловікові 30-ти років встановлено діагноз перелом верхньої щелепи за верхнім типом. Лінія розлому симетрична з обох боків. В яких межах може бути порушена чутливість зубів та слизової оболонки?
Правильна відповідь	Чутливість може не порушуватись
В	Від 11 до 21 зуба

C	Від 13 до 23 зуба
D	Від 15 до 25 зуба
E	Від 18 до 28 зуба
№	крок 2017-2018
Тема	Хірургічна стоматологія
Текст завдання	Хворому 58-ми років проведена операція по заглибленню внутрішньокісткових частин гвинтоподібних імплантатів на нижню щелепу за двофазною методикою. Через скільки місяців йому необхідно з'єднати кореневу частину імплантату з голівкою?
Правильна відповідь	3-4
B	5=6
C	9-10
D	1-2
E	7-8
№	крок 2017
Тема	ЗНЕБОЛЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Текст завдання	У хлопчика 7-ми років діагностовано загострення хронічного гранулюючого періодонтиту 75 зуба. Коронка 75 зуба зруйнована на 3/4. Під час обстеження дитина поводити себе спокійно та відповідала на запитання. Хлопчик соматично здоровий. Оберіть доцільний метод знеболювання:
Правильна відповідь	Провідникова анестезія
B	Внутрішньовенний наркоз
C	Аплікаційна анестезія
D	Інфільтраційна анестезія
E	Масковий наркоз
№	крок 2017
Тема	ОПЕРАЦІЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ І КОРЕНІВ
Текст завдання	У хлопчика 7-ми років діагностовано хронічний періодонтит 64 та 85 зубів. Дитина страждає на гемофілію А. Визначте лікувальну тактику:
Правильна відповідь	Видалення можливе в гематологічному відділенні, після проведення відповідної підготовки
B	Видалення можливе як в щелепно-лицевому стаціонарі, так і в амбулаторії після відповідної підготовки
C	Видалення зубів можливе в амбулаторних умовах; після видалення слід тампонувати альвеоли гемостатичною губкою
D	Видалення зубів можливе в щелепно-лицевому відділенні

Е	Видалення зубів протипоказане через високу імовірність кровотечі
№	крок 2017
Тема	ЗНЕБОЛЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Текст завдання	Хлопчику 5-ти місяців з двобічним незрошенням верхньої губи планується хейлопластика. Який вид знеболювання потрібно застосувати при цьому оперативному втручанні?
Правильна відповідь	Ендотрахеальний наркоз з інтубацією через рот
В	Ендотрахеальний наркоз з інтубацією через ніс
С	Ендотрахеальний наркоз з інтубацією через трахеостому
Д	Масковий наркоз
Е	Місцеве потенційоване знеболювання
№	крок 2017
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Текст завдання	У 6-річної дитини біль у зубі і при-пухлість обличчя зліва. Об'єктивно: стан задовільний, температура тіла - 37,5° С . Обличчя асиметричне через колатераль-ний набряк м'яких тканин щічної і підщелепної ділянок зліва. У 74 зубі пломба, пер-кусія болісна, рухливість I ступеня. Пере-хідна складка у 74, 75 згладжена, слизова гіперемована. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний періостит
В	Гострий гнійний періостит
С	Одонтогенний остеомієліт
Д	Гострий гнійний пульпіт 74 зуба
Е	-
№	крок 2017
Тема	ДОБРОЯКІСНІ ТА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Текст завдання	Дитину 15-ти років скеровано на рентгенологічне обстеження у зв'язку з терапевтичним лікуванням 46 зуба. На рентгенограмі: періапікальних змін в ділянці коренів 46 зуба не виявлено; в ділянці кореня 45 зуба виявлено однорідну щільну тіню округлої форми з чіткими межами, діаметром - 5 мм. Новоутворення по структурі подібне до тканин кореня зуба. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Цементома
В	Одонтома
С	Гігантоклітинний епуліс
Д	Амелобластома

Е	Остеома
№	крок 2017
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Текст завдання	Хлопчика 5-ти років госпіталізовано в стаціонар щелепно-лицевої хірургії. При огляді і пальпації виявлено болючу "кульку", яка рухома, не спаяна з підлеглими тканинами, розміром - 1,5 см в діаметрі, яка з'явилась один тиждень тому. Шкіра над нею в кольорі не змінена, береться в складку. З анамнезу відомо, що дитина перенесла ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний неодонтогенний лімфаденіт
В	Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт
С	Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт
Д	Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт
Е	Бічна кіста ший
№	крок 2017
Тема	ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ
Текст завдання	У щелепно-лицеве відділення поступи-ла дитина віком до 1-го року з вродженою вадою обличчя. Об'єктивно виявлено середнє незрощення м'якого та твердого під-небіння, яке доходить до різцевого отвору, леміш розташований посередині. Комірковий відросток та тканини верхньої губи без деформацій. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Ізольоване повне незрощення твердого та м'якого піднебіння
В	Комбіноване незрощення піднебіння
С	Ізольоване неповне незрощення твердо-го та м'якого піднебіння
Д	Приховане незрощення твердого та м'якого піднебіння
Е	Повне незрощення м'якого та неповне незрощення твердого піднебіння
№	крок 2017
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ
Текст завдання	Хлопчик 10-ти років скаржитьсся на біль у верхньому зубі справа, який поси-люєтьсся при накушуванні на 65 зуб. Біль з'явивсся 2 дні тому. Раніше зуб був лікова-ний. Об'єктивно: коронка 65 зуба змінена в кольорі, зруйнована на 2/3, перкусія різко болюча. Слизова оболонка в ділянці прое-кції верхівок кореня 65 зуба гіперемована, пальпація болісна. Який з наступних діагнозів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Загострення хронічного періодонтиту
В	Гострий гнійний періостит верхньої ще-лепи
С	Гострий одонтогенний остеомієліт
Д	Гострий серозний періодонтит

Е	Гострий гнійний періодонтит
№	крок 2016, 2015, 2012, 2010
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У дівчинки 3-х років два дні тому з'явилися біль та припухлість у ділянці зруйнованих 51, 52, температура тіла підвищилась до $37,5-37,9^{\circ}C$. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок припухлості у ділянці верхньої губи та у правій підочної ділянці. Коронка 51 зруйнована повністю. Слизова оболонка у ділянці 52, 51, 61 зубів гіперемована, перехідна складка тут згладжена, пальпація її болісна; визначається рухливість 51, 52 зубів III ступеня. Який клінічний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний одонтогенний періостит верхньої щелепи
В	Гострий серозний одонтогенний періостит верхньої щелепи
С	Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи
Д	Одонтогенний абсцес підочної ділянки
Е	Загострення хронічного періодонтиту 51 зуба
№	крок 2016, 2015
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хлопчик 12ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури до $38, 5^{\circ}C$, утруднене відкривання рота, біль під час ковтання, їди, розмови. Об'єктивно: шкірні покрови бліді, обличчя незначно асиметричне через припухлість у лівій підщелепній ділянці. Відкривання рота обмежене до 12 см, болісне. Набряк тканин у лівій під'язиковій ділянці, лівий щелепноязиковий жолобок інфільтрований, згладжений, болісний під час глибокої пальпації, слизова оболонка тут різко гіперемована. Коронка 36 зуба зруйнована повністю. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	Одонтогенний абсцес щелепноязикового жолобка від 36 зуба
В	Гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 36 зуба
С	Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 36 зуба
Д	Одонтогенна флегмона лівої крилощелепної ділянки
Е	Одонтогенна флегмона лівої підщелепної ділянки
№	крок 2016, 2011
Тема	ОПЕРАЦІЯ ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Дитина 10-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на відлам коронки 11 зуба. Травма була 4 години тому внаслідок падіння з висоти. Об'єктивно: злам коронки 11 зуба, пульпа точково оголена, різко болюча. Який метод лікування оптимальний?
Правильна відповідь	Біологічний

В	Вітальна ампутація
С	Девітальна екстирпація
D	Вітальна екстирпація
Е	Девітальна ампутація
№	крок 2016, 2011
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩІД
Текст завдання	Батьки дитини 6-ти років звернулися зі скаргами на біль у дитини у піднижньощелепній ділянці зліва, підвищення температури до 37, 5°С . Об'єктивно: обличчя асиметричне з причини інфільтрату піднижньощелепної ділянки зліва. Інфільтрат м'якоеластичної консистенції, рухливий, розміром 2х2,5 см, пальпація трохи болісна, шкіра не змінена. Зуби інтактні. Зів гіперемований. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
В	Гострий серозний одонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
С	Гострий гнійний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
D	Гострий гнійний одонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
Е	Аденофлегмона піднижньощелепної ділянки
№	крок 2016, 2015, 2011, 2010
Тема	ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Дитина 7ми років отримала спортивну травму. На момент звернення відзначає біль у ділянці нижньої щелепи, неможливість змикання зубів. Під час натиснення на підборіддя посилюється біль у ділянці нижньої щелепи справа. У дитини діагностований перелом тіла нижньої щелепи без зміщення відламків. Якою повинна бути лікувальна тактика для попередження зміщення кісткових фрагментів у змінному прикусі?
Правильна відповідь	Імобілізація фрагментів зубоясеневою шиною
В	Призначення протизапальної терапії
С	Накладення пращеподібної пов'язки
D	Фіксація шинами Тігерштедта
Е	Проведення остеосинтезу
№	крок 2016
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩІД
Текст завдання	У хлопчика 4х років діагностовано гострий одонтогенний гнійний періостит нижньої щелепи від 75 зуба, коронка зуба збережена, рентгенологічно відмічається деструкція міжкореневої перегородки. Визначте лікарську тактику:
Правильна відповідь	Видалення 75 зуба, періостотомія

В	Ендодонтичне лікування 75 зуба
С	Ендодонтичне лікування 75 зуба та періостотомія
Д	Періостотомія
Е	Видалення зуба 75 зуба та призначення протизапальної терапії
№	крок 2016
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Хлопець 15ти років скаржиться на неможливість закрити рот, порушення мови, слинотечу. Об'єктивно: рот напіввідкритий, нижня щелепа висунута допереду. Суглобові голівки СНЩС пальпуються під виличними дугами. Який найбільш ймовірний діагноз?
Правильна відповідь	Двобічний передній вивих нижньої щелепи
В	Двобічний перелом нижньої щелепи
С	Однобічний передній вивих нижньої щелепи
Д	Двобічний задній вивих нижньої щелепи
Е	Перелом суглобового відростка нижньої щелепи зліва
№	крок 2016
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Текст завдання	Пацієнту 10 років. Скарги на загальне нездужання, підвищення температури тіла до 39 ^о С , біль під час ковтання. Об'єктивно: запалення слизової оболонки у ділянці зіву, піднебінних дужок і язичка, набряк мигдаликів. На мигдаликах визначається масивний фібринозний плівковий нальот, щільно спаяний з підлеглими тканинами, що поширюється на м'яке і тверде піднебіння. Плівки розташовані також на яснах і язиці. Визначаються підщелепний і шийний лімфаденіти. Який збудник захворювання?
Правильна відповідь	Паличка Лефлера
В	Вірус Коксакі
С	Вірус герпесу
Д	Гемолітичний стрептокок
Е	Паличка БордеЖангу
№	крок 2016
Тема	ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	У дитячий щелепнолицьовий стаціонар поступив хлопчик 6-ти років з множинними укусами обличчя в ділянці верхньої і нижньої губ, правої щоки, нижньої повіки правого ока. Дефекту тканин немає. Рани завдовжки до 2 см, глибиною 0,51 см. Виберіть вид знеболювання для проведення ПХО ран:

Правильна відповідь	Загальне внутрішньовенний наркоз
B	Загальне інтубаційний наркоз
C	Інфільтраційне
D	Провідникове
E	Аплікаційне
№	крок 2016, 2010
Тема	ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Дитина 2х років отримала травму зубів. Об'єктивно: коронки 51 і 61 коротші від сусідніх на 1/3. Слизова оболонка в ділянці 51 і 61 зубів гіперемована, набрякла. На рентгенограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів 51 і 61 зубів відсутня. Яка лікувальна тактика буде оптимальною?
Правильна відповідь	Диспансерне спостереження
B	Видалення 51, 61 зубів
C	Репозиція 51 і 61 зубів
D	Лігатурне шинування
E	Реплантація
№	крок 2016, 2017
Тема	РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ
Текст завдання	Дитині з одностороннім незарощенням верхньої губи проведено хейлопластику за Лімбергом. Які оптимальні терміни оперативного втручання при незарощеннях верхньої губи?
Правильна відповідь	67 місяців
B	23 роки
C	В перші дні
D	46 років
E	1 рік
№	крок 2016
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩІД
Текст завдання	Дитина 14-ти років скаржиться на припухлість м'яких тканин в ділянці проекції тіла нижньої щелепи справа, яка виникла близько місяця тому. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок відмежованого інфільтрату в піднижньощелепній ділянці, в центрі якого визначається нориця з гнійним виділенням, шкіра навколо якої синюшного кольору. В порожнині рота 46 зуб зруйнований на 2/3, перкусія безболісна, слизова оболонка в ділянці проекції коренів 46 пастозна, по перехідній складці пальпується щільний тяж від 46 зуба до нориці. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	Мігруюча гранульома
B	Нагноєння атероми підщелепної ділянки
C	Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту
D	Хронічний підщелепний лімфаденіт
E	Актиномікотична гранульома
№	крок 2016, 2017
Тема	ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У дитини 6ти місяців на слизовій оболонці гребеня альвеолярного відростка верхньої щелепи визначається утворення кулястої форми, м'якоеластичної консистенції діаметром 6 мм з вмістом блакитного відтінку, що просвічується. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гематома прорізування
B	Фіброма
C	Фолікулярна кіста
D	Радикулярна кіста
E	Папілома
№	крок 2015, 2014, 2011, 2010
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	Хлопчик 10-ти років (6-ти років) вдома добу тому вдарився лобом. Через кілька годин з'явилася пухлина у правій надбрівній ділянці. Об'єктивно: значний набряк тканин лоба, який розповсюджується на повіки правого ока, шкіра над пухлиною ціанотична, консистенція пухлини м'яка, наявний симптом флюктуації. Загальний стан хлопчика не порушений. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гематома правої надбрівної ділянки
B	Посттравматичний набряк тканин правої надбрівної ділянки
C	Перелом лобної кістки
D	Нагноєна гематома правої надбрівної ділянки
E	Запальний інфільтрат тканин правої надбрівної ділянки
№	крок 2015, 2014, 2013, 2012
Тема	ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ
Текст завдання	У дівчинки 6-ти років відкривання рота вільне. Альвеолярний паросток верхньої щелепи цілий. М'яке і тверде піднебіння незрощене до рівня 13 та 23 зубів, має трикутну форму. Мова нерозбірлива. М'яке піднебіння укорочене. Дитина народилася с даною вадою. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Природне часткове незрощення піднебіння

B	Ізольоване повне незрощення піднебіння
C	Скрите незрощення піднебіння
D	Ізольоване неповне незрощення піднебіння
E	
№	-крок 2015
Тема	ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 12-ти років звернувся в стоматологічну поліклініку зі скаргами на біль 16 зуба, який раніше лікувався з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об'єктивно: коронка 16 зруйнована на 1/2. Які щипці використає хірург для видалення 16 зуба?
Правильна відповідь	S-подібні щипці, на правій щічці яких є шип
B	S-подібні щипці з гладкими щічками
C	Прямі щипці
D	S-подібні щипці, на лівій щічці яких є шип
E	Клювоподібні щипці з щічками, що сходяться
№	крок 2015
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩІЛД
Текст завдання	Хлопчик 8-ми років скаржитися на болючий набряк правої привушної області, який виник 3 дні тому на фоні гнійного середнього отиту. При огляді: набряк та гіперемія шкіри в правій привушній ділянці, пальпаторно визначається округлий інфільтрат з чіткими межами, діаметром приблизно 3 см, щільний, болючий, обмежено рухомий, з ділянкою розм'якшення. Порожнина рота санована. Визначте клінічний діагноз:
Правильна відповідь	Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт правої привушної ділянки
B	Гострий серозний неодонтогенний лімфаденіт правої привушної ділянки
C	Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт правої привушної ділянки
D	Гострий неепідемічний паротит
E	Гострий епідемічний паротит
№	крок 2015, 2010, 2017
Тема	НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час операції видалення дермоїдної кісти перенісся хлопчик 14-ти років поскаржився на запаморочення, нудоту, слабкість. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск знижений (80/60 мм рт.ст.), руки холодні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Непритомність
B	Травматичний шок

С	Анафілактичний шок
D	Колапс
Е	Токсичний шок
№	крок 2015, 2017
Тема	ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	До хірурга-стоматолога звернулись батьки хлопчика 5-ти років через наявність воронкоподібного шкірного поглиблення, яке знаходиться попереду основи великого завитка вухної раковини. На дні цього поглиблення відмічається норицевий отвір, з якого при натисканні на козелок вуха виділяється густа слизоподібна речовина. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Парааурикулярна нориця
В	Бічна кіста шиї
С	Дермоїдна кіста
D	Присередня нориця шиї
Е	Бічна нориця шиї
№	крок 2014
Тема	ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Мама 4-річної дитини скаржиться на червону точкову пляму на обличчі, яка з'явилася місяць тому, зростає. Під час огляду у підочній ділянці патологічна червона пляма павукоподібної форми, при натисканні у центрі її забарвлення щезає. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Капілярна гемангіома
В	Кавернозна гемангіома
С	Судинний невус
D	Пігментний невус
Е	Бородавчастий невус
№	крок 2014
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Дівчинка 15-ти років скаржиться на припухлість та пульсуючий біль у ділянці тіла нижньої щелепи справа, підвищення температури до 39° С . Об'єктивно: значна асиметрія обличчя за рахунок припухлості у ділянці тіла нижньої щелепи справа та підщелепного трикутника. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, щільні, болісні під час пальпації. Виявляється запальна інфільтрація м'яких тканин довкола нижньої щелепи справа. Відкривання рота болоче, обмежене. Коронка 46 зуба зруйнована. Перкусія 46, 45, 44 зубів болісна, зуби рухомі. Слизова оболонка нижньої щелепи справа різко гіперемована; визначаються субперіостальні абсцеси з обох боків альвеолярного відростка, пальпація його болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий одонтогенний остеомиєліт нижньої щелепи від 46 зуба
В	Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 46 зуба
С	Гострий бактеріальний правобічний субмаксиліт
D	Одонтогенна флегмона правої підщелепної ділянки від 46 зуба
Е	Одонтогенний абсцес правого щелепноязикового жолобку від 46 зуба
№	крок 2014
Тема	АНАТОМІЯ
Текст завдання	При народженні дитини дві половинки нижньої щелепи з'єднані по середній лінії волокнистим хрящем. Окостеніння цього шва наступає на такому році життя:
Правильна відповідь	12
В	23
С	34
D	45
Е	до 0, 5
№	
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	Дитина 6ти років доставлена до приймального покою дитячої лікарні з діагнозом: забійнорвана рана лоба. На консультацію був викликаний щелепнолицевий хірург. Він оглянув рану, провів ПХО з накладенням первинних швів. Дитині рекомендовано подальше лікування у поліклініці за місцем проживання. Яка дія буде першочерговою у даному випадку?
Правильна відповідь	Консультація нейрохірурга
В	Спостереження хірургом
С	Санація порожнини рота
D	Протимікробна терапія

Е	Ліжковий режим
№	крок 2014
Тема	ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Дівчинка 16ти років, що страждає на синдром Дауна, потребує хірургічної санації порожнини рота. Оберіть метод знеболювання в амбулаторних умовах:
Правильна відповідь	Внутрішньовенний наркоз
В	Масковий наркоз
С	Нейролептаналгезія
Д	Потенційоване провідникове знеболювання
Е	Місцеве провідникове знеболювання
№	крок 2014
Тема	ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ
Текст завдання	На консультативний прийом до клініки щелепнолицевої хірургії доставлена дитина 1го місяця. Об'єктивно: двобічне незрощення верхньої губи, твердого і м'якого піднебіння зі значним вистоянням міжщелепної кістки. У які терміни внутрішньоутробного розвитку формуються верхня губа і піднебіння?
Правильна відповідь	Верхня губа кінець 2го місяця, піднебіння 23й місяць
В	Верхня губа 1й місяць, піднебіння 1й місяць
С	Верхня губа 5й місяць, піднебіння 6й місяць
Д	Верхня губа 4й місяць, піднебіння 5й місяць
Е	Верхня губа 8й місяць, піднебіння 9й місяць
№	крок 2014, 2013
Тема	НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час проведення анестезії розчином лідокаїну при лікуванні гострого загального пульпіту 36 зуба дитина 11ти років відчула утруднення дихання; почервоніння шкіри змінилося блідістю, почав падати артеріальний тиск. Який стан найбільш імовірно виник у пацієнта?
Правильна відповідь	Колапс
В	Анафілактичний шок
С	Больовий шок
Д	Напад епілепсії
Е	Зомління
№	крок 2014
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛІД

Текст завдання	Батьки дівчинки 9-ти років скаржаться на наявність набряку тканин білявушножувальної ділянки у дитини, підвищення температури тіла до 38, 2° C , зниження апетиту. Об'єктивно: під час пальпації права білявушножувальна ділянка щільна, болісна, шкіра над нею гіперемована, напружена. Вічко вивідної протоки залози розширене, виділяється каламутна слина з домішкою гною. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний правобічний паротит
В	Псевдопаротит Герценберга
С	Гострий гематогенний остеомієліт верхньої щелепи
D	Абсцес правої білявушножувальної ділянки
Е	Епідемічний паротит
№	крок 2014
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Дівчинка 13ти років скаржиться на сильний біль у ділянці комірки видаленого 3 дні тому 46 зуба, який іррадіює по ходу гілок трійчастого нерва. Об'єктивно: лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації, тканини навколо комірки набряклі, гіперемовані. Стінки комірки покриті сіруватозеленими нашаруваннями з гнилісним запахом. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Альвеоліт
В	Перікоронарит
С	Остит
D	Періостит
Е	Остеомієліт
№	крок 2013
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У дитини 9-ти років скарги на біль та набряк в підочної ділянці зліва. Два дні тому в 65 зубі накладено постійну пломбу з приводу ускладненого карієсу. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку щічної та підочної ділянок зліва, шкіра гіперемована, в складку береться погано. В ділянці 64, 65, 26 зубів слизова оболонка гіперемована, спостерігається набряк, при пальпації - значна флюктуація з обох боків альвеолярного паростка. Перкусія 65 зуба незначно болісна, рухливості немає. Двостороннє підокістне абсцедування є диференціально-діагностичним симптомом:
Правильна відповідь	Гострого одонтогенного остеомієліту
В	Гострого одонтогенного періоститу
С	Загострення хронічного періодонтиту

D	Хронічного одонтогенного остеомієліту
E	Хронічного абсцедуючого лімфаденіту
№	крок 2013
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У 14-річного хлопчика з'явилися скарги на значний біль у ментальній ділянці впродовж доби. З анамнезу відомо, що 5 років тому в цю ділянку був сильний удар м'ячем. Загальний стан середньої важкості, температура тіла 37, 5° C . Регіональний лімфаденіт. 31, 32, 41 та 42 зуби інтактні. Перкусія позитивна. З вестибулярного боку відмічається незначне вип'ячування тканин альвеолярного відростка, вкрите гіперерованою слизовою оболонкою. На Ro-грамі - дефект кісткової тканини на нижній щелепі в ділянці 31 та 41 зубів, овальної форми з чіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Нагноєння післятравматичної кісти
B	Нагноєння фолікулярної кісти
C	Гострий серозний періостит
D	Гострий гнійний періостит
E	Гострий одонтогенний остеомієліт
№	крок2013
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Дитині 2 роки. Захворювання почалося з появи припухлості на верхній губі та підвищення температури тіла. Об'єктивно: обличчя асиметричне внаслідок набряку верхньої губи, згладження носогубної складки зліва. В 51 зубі каріозна порожнина. Зуб рухомий, болочий при перкусії. Перехідна складка гіперерована, набрякла. Пальпація болоча в ділянці 51, 61, 62 зубів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва від 51
B	Гострий періодонтит 51
C	Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи від 51
D	Гострий гнійний пульпіт 51
E	Загострення хронічного періодонтиту 51
№	крок2013
Тема	ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Дитина 5-ти років направлена терапевтом-стоматологом для видалення 61 з приводу гнійного періодонтиту. Які інструменти необхідно використати в цьому випадку?
Правильна відповідь	Прямі щипці

B	Прямий елеватор
C	Дзьобоподібні щипці
D	Щипці, вигнуті по площині
E	Кутовий елеватор
№	крок2013
Тема	ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Дитині 13-ти років два дні тому в черговому кабінеті видалили 46 зуб. Комірка не перестає боліти. На Ro-грамі виявлений відламок верхівки дистального кореня. Яким інструментом слід видалити відламок кореня?
Правильна відповідь	Кутовим елеватором від себе
B	Прямим елеватором
C	Кутовим елеватором до себе
D	Байонетами
E	Распатором
№	крок 2013
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хлопчика 3-х років у ділянці правої бокової поверхні шиї пальпується болючій інфільтрат розміром 2x2 см, який з'явився напередодні. Інфільтрат має гладку поверхню, рухомий, із шкірою та підлеглими тканинами не спаяний. Шкіра над осередком у кольорі не змінена, береться в складку. Дитина останній тиждень хворіла на ангіну. Який процес має місце у ділянці правої бокової поверхні шиї?
Правильна відповідь	Гострий серозний неодонтогенний лімфаденіт
B	Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт
C	Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт
D	Хронічний гіперпластичний неодонтогенний лімфаденіт
E	Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт
№	крок 2013
Тема	ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ
Текст завдання	Новонароджена дитина відмовляється від грудей. Об'єктивно: вуздечка язика коротка, представлена дублікатурою слизової оболонки, язик обмежений у рухах. Виберіть оптимальний метод хірургічного втручання:
Правильна відповідь	Френулотомія
B	Пластика вуздечки за Дифенбахом
C	Френулектомія
D	V-подібна пластика вуздечки

Е	Пластика вуздечки методом переміщення трикутних клаптів
№	крок 2013
Тема	ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ
Текст завдання	Дитині 7-ми років необхідно провести пластику вуздечки верхньої губи. Яку пластичну операцію необхідно виконати для подовження вуздечки верхньої губи?
Правильна відповідь	Пластика за Діффенбахом
В	Пластика місцевими тканинами за Тіршем
С	Послаблюючі розтини слизової
Д	Пластика клаптем на ніжці
Е	Пластика місцевими тканинами за Шимановським
№	крок 2013
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Хворий 14-ти років скаржиться на не закривання рота, утруднення вимови, слинотечу, неможливість прийому їжі. Об'єктивно: рот напіввідкритий, нижня щелепа висунута допереду і фіксована внаслідок скорочення жувальних м'язів. Під час пальпації суглобових головок скронево-нижньощелепних суглобів через слухові проходи головки не пальпуються. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Двобічний передній вивих нижньої щелепи
В	Двобічний перелом нижньої щелепи
С	Однобічний передній вивих нижньої щелепи
Д	Однобічний задній вивих нижньої щелепи
Е	Перелом суглобового відростка нижньої щелепи зліва
№	крок 2012
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 14-ти років скаржиться на температуру тіла 37, 5° С, припухлість лівої щоки, біль у зубах верхньої щелепи зліва. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок припухлості у ділянці лівої щоки. Ліва очна щілина звужена, носогубна складка згладжена, обмежений інфільтрат у лівій щічній ділянці, болісний, м'який, шкіра над ним береться в складку. Рот відкривається обмежено. 26 зуб зруйнований до рівня ясни. По перехідній складці від 25 до 27 зуба вибухаючий інфільтрат, болісний, визначається флюктуація. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва
В	Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи зліва
С	Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту

D	Одонтогенна флегмона щічної ділянки зліва
E	Одонтогенний гострий гнійний щічний лімфаденіт зліва
№	крок 2012
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У 12-річної дівчинки температура тіла 38, 5° C, припухлість під щелепою справа. Захворіла 12 днів тому, коли з'явилися нежить, кашель, невелика рухома кулька під нижньою щелепою справа. Об'єктивно: загальний стан дитини середньої важкості. Обличчя асиметричне за рахунок припухлості в правій підщелепній ділянці. Шкіра гіперемована, блищить, розлитий інфільтрат в правій підщелепній ділянці, який поширюється у верхні відділи шиї справа, болісний, щільний, шкіра в складку не береться. Зуби здорові. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Аденофлегмона правої підщелепної ділянки
B	Гострий сіалоаденіт правої піднижньощелепної слинної залози
C	Гострий остеомієліт нижньої щелепи справа
D	Гострий піднижньощелепний лімфаденіт справа
E	Хронічний остеомієліт нижньої щелепи справа
№	крок 2012
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Дитина 12-ти років скаржиться на рвучий біль в ділянці нижньої щелепи справа, підвищення температури тіла до 39, 0° C загальну слабкість. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку в підщелепній ділянці справа, регіонарний лімфаденіт, утруднене відкривання та неприємний запах з рота. При внутрішньоротовому огляді: 46 зруйнований, раніше болів, але хворий до лікаря не звертався. Перкусія різко болюча, відмічається рухомість. В ділянці 44, 45, 46 та 47 гіперемована слизова, набряк з обох боків альвеолярного паростка. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи
B	Хронічний остеомієліт нижньої щелепи
C	Гострий гнійний періостит
D	Піднижньощелепна флегмона
E	Хронічний періодонтит 46 в стадії загострення
№	крок 2012
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Хлопчик 14-ти років звернувся зі скаргами на постійну ниючу біль в ділянці видаленого зуба, неприємний запах з рота. 4 доби тому було видалено 26 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. При огляді комірка видаленого зуба виповнена згустком сірого кольору. Слизова оболонка набрякла, гіперемована. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Альвеоліт
В	Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи
С	Хронічний остеомієліт
Д	Залишки коренів
Е	Неврит альвеолярного нерва
№	крок 2012
Тема	ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Батьки дитини 8-ми років з хворобою Дауна звернулися до лікаря з проханням санації порожнини рота. Після огляду зі значними складнощами, виявлено чотири зуба, зруйнованих хронічним періодонтитом. Який вид знеболювання слід обрати для проведення хірургічної санації порожнини рота в один сеанс?
Правильна відповідь	Внутрішньовенний наркоз
В	Провідникова анестезія
С	Масковий наркоз
Д	Ендотрахеальний наркоз
Е	Ендотрахеальний наркоз через трахеостому
№	крок 2012, 2011
Тема	ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	В клініку хірургічної стоматології дитячого віку звернулася мама з 14-річним хлопчиком зі скаргами на періодичне підвищення температури тіла до 38 – 39° С, сильний біль в зубах нижньої щелепи та на значну її деформацію. Обличчя асиметричне за рахунок збільшення нижньої щелепи зліва, слизова оболонка порожнини рота без змін, 34, 35, 36 зуби рухомі, пальпація альвеолярного гребня в їх ділянці болюча. На Ro-грамі в ділянці 34, 35, 36 зубів вогнище деструкції кісткової тканини неправильної форми з нечіткими межами. Який найімовірніший діагноз?
Правильна відповідь	Саркома Юінга
В	Рак нижньої щелепи
С	Амелобластома нижньої щелепи
Д	Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи
Е	Остеобластокластома нижньої щелепи

№	крок 2012
Тема	ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ
Текст завдання	На профілактичному огляді у дитини 4-х років було діагностовано низьке прикріплення вуздечки верхньої губи. Яким є оптимальний вік для проведення операції висічення вуздечки верхньої губи?
Правильна відповідь	До прорізування 11, 21 зубів
B	Після прорізування фронтальної групи зубів
C	Одразу після народження дитини
D	Після формування постійного прикусу
E	За бажанням батьків та дитини
№	крок 2011
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Дівчинка 12-ти років скаржиться на біль, набряклість у ділянці нижньої щелепи праворуч. 46 зуб болить декілька днів. Об'єктивно: загальний стан середньої важкості, температура тіла 37, 7° C . Обличчя асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин у проекції тіла нижньої щелепи з правого боку. 46 зруйнований значно, перкусія його різко болісна. З вестибулярного боку альвеолярного відростку в ділянці 46, 47, 45 пальпується болісний інфільтрат. Слизова оболонка тут гіперемована, набрякла, визначається позитивний симптом флюктуації. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний одонтогенний періостит нижньої щелепи від 46
B	Гострий серозний неодонтогенний періостит нижньої щелепи від 46
C	Загострення хронічного періодонтиту 46
D	Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46
E	Загострення хронічного одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи від 46
№	крок 2011
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хлопчик 13-ти років скаржиться на біль у ділянці видаленого 46 зуба, який іррадіює у вухо та скроню, неприємний запах з рота. Видалення було 3 дні тому. Об'єктивно: підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Слизова оболонка навколо видаленого зуба гіперемована, набрякла. Лунка 46 виповнена згустком сірого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Альвеоліт комірки видаленого 46
B	Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46
C	Гострий одонтогенний лімфаденіт правої підщелепної ділянки
D	Гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 46

Е	Невралгія ІІІ гілки трійчастого нерва
№	крок 2011
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	У дитини 7-ми років встановлено повний вивих 11 зуба в результаті травми, яка сталася 24 години тому. Зуб принесено з собою. Об'єктивно: краї комірки слабо гіперемовані, кісткові стінки цілі, комірка заповнена кров'яним згустком. Виберіть оптимальний метод лікування:
Правильна відповідь	Реплантація 11 з попереднім пломбуванням каналу
В	Реплантація 11 з наступним пломбуванням каналу
С	Видалення 11
Д	Репозиція і фіксація 11
Е	Ушивання комірки кетгутом
№	крок 2011
Тема	ВРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ
Текст завдання	До відділення патології новонароджених до дитини 2-х днів на консультацію викликаний щелепно-лицевий хірург. Клінічно виявлено: різке недорозвинення нижньої щелепи (мікрогенія), западання язика, незрощення твердого і м'якого піднебіння. Визначається утруднення дихання і ковтання. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Синдром П'єра-Робена
В	Синдром Франческетті-Клейна
С	Синдром Гольденара
Д	Синдром Лоу
Е	Синдром Халлермана-Штрайфа
№	крок 2011
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У дитини 7-ми років асиметрія обличчя, різкий біль у ділянці нижньої щелепи зліва, підвищення температури тіла до 39°С . Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок масивного набряку м'яких тканин у ділянці нижньої щелепи зліва. Шкіра над інфільтратом гіперемована, не береться в складку. Відкривання рота обмежене, болісне. Коронка 75 зруйнована на 2/3; зуб має рухливість ІІ ступеня. Перкусія 36 болісна, 75 - безболісна. Спостерігається набряк і флюктуація м'яких тканин з язикового і щічного боків у ділянці названих зубів. Назвіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 75
В	Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 75
С	Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 75

D	Гострий серозний періостит нижньої щелепи від 75
E	Аденофлегмона
№	крок 2011
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Батьки хлопчика 5-ти років, що відвідує дитячий садок, скаржаться на наявність у дитини набряку м'яких тканин в обох привушно-жувальних ділянках, підвищення температури тіла до $38^{\circ}C$. Об'єктивно: обидві привушні слинні залози збільшені, під час пальпації м'які, болісні. Шкіра напружена, бліда, лискуча. З проток слинних залоз виділяється невелика кількість прозорої слини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Епідемічний паротит
B	Псевдопаротит Герценберга
C	Бактеріальний паротит
D	Калькульозний сіалоаденіт
E	Хронічний паротит
№	крок 2011
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	Юнак 17-ти років отримав ножове поранення щоки. Рана глибока, не сполучається з порожниною рота. Оберіть метод знеболення для хірургічної обробки рани:
Правильна відповідь	Інфільтраційна анестезія
B	Мандибулярна анестезія
C	Ментальна анестезія
D	Аплікаційна анестезія
E	Наркоз
№	крок 2011
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хлопчик 12-ти років госпіталізований в щелепно-лицеве відділення із вираженими патологічними симптомами: асиметрія обличчя за рахунок значного набряку м'яких тканин та інфільтрату лівої піднижньощелепної ділянки на боці ураження; регіональний лімфаденіт; наявність "причинного"зуба. Діагноз: одонтогенна флегмона нижньощелепної ділянки. Який оперативний доступ найбільш доцільний?
Правильна відповідь	Розріз на 1,5-2 см нижче від краю нижньої щелепи та паралельно йому
B	Розріз по верхній шийній складці
C	Розріз по нижній шийній складці

D	Розріз паралельний під'язиковому валику
E	Розріз біля кута нижньої щелепи
№	крок 2010
Тема	ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	У дитини 8-ми років діагностовано хронічний гранулюючий періодонтит 55. Коронка зуба повністю зруйнована. На рентгенограмі - корені роз'єднані між собою. Оберіть інструмент для проведення оперативного втручання:
Правильна відповідь	Байонетні кореневі щипці
B	Прямі кореневі щипці
C	Дзьобоподібні кореневі щипці
D	Байонетні коронкові щипці
E	S-подібні коронкові щипці
№	крок 2010
Тема	НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Дитина 5-ти років з'явилася на операцію з приводу короткої вуздечки язика. Зовні ознак передопераційного страху немає. Після ін'єкції 0,5% розчину новокаїну в кількості 1,5 мл в дитини з'явився руховий неспокій, позиви на блювання, біль у животі. Об'єктивно: свідомість збережена, шкіра обличчя та шиї гіперемована, дихання прискорене, пульс частий. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Алергічна реакція на новокаїн
B	Больовий шок
C	Серцево-судинний колапс
D	Запаморочення
E	Передозування анестетика
№	крок 2010
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩІЛД
Текст завдання	Батьки дитини 6-ти років звернулися зі скаргами на біль у дитини у піднижньощелепній ділянці зліва, підвищення температури до 37,5°C. Об'єктивно: обличчя асиметричне з причини інфільтрату піднижньощелепної ділянки зліва. Інфільтрат м'якоеластичної консистенції, рухливий, розміром 2x2,5 см, пальпація трохи болісна, шкіра не змінена. Зуби інтактні. Зів гіперемований. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
B	Гострий серозний одонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
C	Гострий гнійний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт

D	Гострий гнійний одонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
E	Аденофлегмона піднижньощелепної ділянки
№	крок 2010
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Після перенесеного матір'ю гострого гнійного маститу, у дитини 2-х місяців з'явився набряк лівих підочної та виличної ділянок, гіперемія шкіри лівої половини обличчя, висока температура до 39- 40°C, гноетеча з носа. Який діагноз можна передбачити?
Правильна відповідь	Гострий гематогенний остеомієліт
B	Флегмона підочної ділянки
C	Гострий гайморит
D	Гострий одонтогенний остеомієліт
E	Гострий гнійний періостит
№	крок 2010
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Батьки скаржаться на погане самопочуття дитини 7-ми років, підвищення температури тіла до 39°C, біль у зубах на верхній щелепі зліва. Об'єктивно: стан важкий, дитина бліда, адинамічна, асиметрія обличчя через наявність інфільтрату на верхній щелепі зліва. У 64 порожнина, перкусія болісна. 63, 65 зуби інтактні, перкусія болісна, рухливість зубів I ступеня, з-під ясеневого краю 64 виділяється гній. Перехідна складка згладжена у 63, 64, 65 зубів, слизова гіперемована з вестибулярного і піднебінного боків. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи від 64
B	Гострий серозний періостит верхньої щелепи від 64
C	Гострий гнійний одонтогенний періостит верхньої щелепи від 64
D	Нагноєна радикалярна кіста верхньої щелепи від 64
E	Гострий одонтогенний гайморит від 64
№	крок 2009
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У 4-річної дівчинки спостерігається підвищення температури тіла, погіршення загального стану. Хворіє 3 доби. Об'єктивно: загальний стан тяжкий, температура тіла 38, 6° C, дівчинка збуджена, бліда. Неприємний запах з рота. Гіперемія і набряк слизової оболонки ясен в ділянці 83, 84, 85 з обох сторін альвеолярного відростка. Вказані зуби рухливі, перкусія їх різко болюча; 84 під пломбою. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 84

B	Гострий сіалоаденіт піднижньощелепної слинної залози
C	Загострення хронічного періодонтиту 84
D	Нагноєння навколореневої кістки нижньої щелепи від 84
E	Гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 84
№	крок 2009
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У дитини 8-ми років спостерігається набряк в піднижньощелепній ділянці, рот відкривається на 1,5 см, подальше відкривання утруднене, температура тіла 37, 6° C, перехідна складка згладжена вестибулярно, набрякла, гіперемована. В 84, 85 пломби, перкусія їх безболісна. 84 - рухомість 1 ступеня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий одонтогенний періостит
B	Гострий одонтогенний остеомієліт
C	Хронічний одонтогенний періостит
D	Хронічний одонтогенний остеомієліт
E	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2009
Тема	ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Дитині 14-ти років показане видалення 14 за ортодонтичними показаннями. Які щипці необхідно використати при видаленні 14?
Правильна відповідь	S-подібні щипці
B	S-подібні з шипом
C	Штикоподібні щипці
D	Дзьобоподібні щипці
E	Щипці, вигнуті по площині
№	крок 2009
Тема	ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	У дитини 14-ти років під час видалення 16 з приводу хронічного періодонтиту відбулася перфорація верхньощелепної пазухи з проникненням дистального щічного кореня у верхньощелепну пазуху. Які подальші дії лікаря?
Правильна відповідь	Направити до стаціонару для оперативного втручання
B	Намагатися видалити корінь самостійно
C	Сформувати згусток, не повідомляти хворому
D	Закрити перфорацію слизово-окісним клаптом

Е	Амбулаторно виконати гайморотомию
№	крок 2009, 2008
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хлопчика віком 1 місяць у медіального краю нижньої повіки з правого боку рана з гнійним виділенням. Захворів раптово, температура тіла до 40° С. Загальний стан важкий. На другий день захворювання з'явився інфільтрат у внутрішнього краю очниці і щоки з правого боку. Шкіра над ним гіперемована, флюктуація не визначається. Очна щілина звужена. З правого носового ходу виділяється гній. На вестибулярній поверхні альвеолярного відростка і на піднебінні праворуч має місце інфільтрат. Слизова оболонка по перехідній складці над ним гіперемована, визначається флюктуація. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гематогенний остеомієліт
В	Гострий дакріоцистит
С	Флегмона очниці з правого боку
Д	Гострий правобічний гайморит
Е	Гострий серозний періостит
№	крок 2009
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Батьки дитини 6-ти років звернулися зі скаргами на біль у дитини у піднижньощелепній ділянці зліва, підвищення температури до 37, 5° С. Об'єктивно: обличчя асиметричне з причини інфільтрату піднижньощелепної ділянки зліва. Інфільтрат м'якоеластичної консистенції, рухливий, розміром 2х2,5 см, пальпація злегка болісна, шкіра не змінена. Зуби інтактні. Зів гіперемований. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
В	Гострий серозний одонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
С	Гострий гнійний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
Д	Гострий гнійний одонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт
Е	Аденофлегмона піднижньощелепної ділянки
№	крок 2009
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	Дитину 5-ти років 2 доби тому вкусив собака. Діагноз - укушена рана щоки. Батьки своєчасно по допомогу не звернулися. В рані має місце гнійнозапальний процес. Який вид хірургічної обробки потрібно виконати?
Правильна відповідь	Вторинна
В	Первинна рання

С	Первинна відстрочена
D	Первинна пізня
Е	Хірургічне втручання не потрібне
№	крок 2009
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	Дівчинку 4-х років вкусив собака за ділянку верхньої губи. Яким із перерахованих розчинів, в першу чергу, необхідно обробити рану?
Правильна відповідь	10% розчином господарського мила
В	0,002% розчином хлоргексидину
С	1% розчином перекису водню
D	1 : 5000 розчином $KMnO_4$
Е	3% розчином соди
№	крок 2009
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Дівчинка 12-ти років скаржиться на сильний біль у ділянці комірки видаленого 3 дні тому 46, який іррадіює по ходу гілок трійчастого нерва. Об'єктивно: лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації, тканини навколо комірки набряклі, гіперемовані. Стінки комірки вкриті сірувато-зеленим нальотом з гнилісним запахом. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Альвеоліт
В	Перикоронарит
С	Остит
D	Періостит
Е	Остеомієліт
№	крок 2008
Тема	ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хлопчик 8-ми років направлений до хірургічного кабінету для видалення 64 зуба через загострення хронічного періодонтиту. Коронка зуба збережена. Яким інструментом необхідно скористатися?
Правильна відповідь	S-подібні щипці без шипів на щічках
В	Дзьобоподібні щипці з щічками, які сходяться
С	Прямі щипці
D	Дзьобоподібні щипці з щічками, які не сходяться

Е	S-подібні щипці з шипами на щічках
№	крок 2008, 2007
Тема	ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Дитині 5-ти років встановлено діагноз: вроджене повне незарощення твердого та м'якого піднебіння. Який вид знеболювання показаний при проведенні ураностафілопластики?
Правильна відповідь	Назотрахеальний наркоз
В	Масковий наркоз
С	Внутрішньовенний наркоз
Д	Оротрехеальний наркоз
Е	Ендотрахеальний наркоз через трахеостому
№	крок 2008, 2007
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩІД
Текст завдання	У дівчинки 2-х років температура тіла 38, 5 ⁰ С, припухлість під щелепою з правого боку. Хворіє 5 днів, коли з'явилися нежить, кашель, невелика рухлива кулька під нижньою щелепою праворуч. Об'єктивно: загальний стан дитини середньої важкості. Обличчя асиметричне за рахунок припухлості у правій підщелепній ділянці. Шкіра гіперемована, лискуча, розлитий інфільтрат у правій підщелепній ділянці, що поширюється на верхні відділи шиї з правого боку, болісний, щільний; шкіра у складку не береться. Зуби здорові. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Аденофлегмона правої підщелепної ділянки
В	Гострий неадонтогенний піднижньо-щелепний правобічний лімфаденіт
С	Гострий гнійний періостит нижньої щелепи праворуч
Д	Гострий сіалоаденіт правобічної піднижньощелепної слинної залози
Е	Хронічний остеомієліт нижньої щелепи з правого боку
№	крок 2008
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩІД
Текст завдання	Хлопчик 12-ти років скаржить на біль та припухлість в привушно-жувальній ділянці зліва, підвищення температури тіла до 37, 5 ⁰ С. Хворіє близько 5-ти діб. Об'єктивно: в привушно-жувальній ділянці з лівого боку пальпаторно виявляється щільне болісне утворення розміром 3,5х5 см, малорухоме. Колір шкіри не змінений. З устя протоки слинної залози зліва виділяється прозорий секрет. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Несправжній паротит Герценберга
В	Змішана пухлина привушної залози
С	Епідемічний паротит

D	Загострення хронічного паренхіматозного паротиту
E	Абсцес щоки
№	крок 2008, 2007
Тема	ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 55-ти років у ділянці видаленого 46 виникло не болюче, горбисте, синюшного кольору новоутворення на ніжці розміром 2x1x1,5 см. Відкривання рота в повному обсязі. На внутрішньоротовій рентгенограмі альвеолярного відростка в ділянці видаленого 46 відмічається вогнище деструкції кісткової тканини. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гігантоклітинний епуліс
B	Тверда одонтома нижньої щелепи
C	Гіпертрофічний гінгівіт
D	Папілома слизової оболонки в ділянці видаленого 46
E	Амелобластома нижньої щелепи
№	крок 2008
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	На травматологічний пункт щелепно-лицевого відділення звернулася дитина зі скаргами на зміну положення 21 зуба з його нахилом в бік піднебіння. Напередодні дитину вдарили в обличчя. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Неповний вивих 21 зуба
B	Повний вивих 21 зуба
C	Перелом коронкової частини 21 зуба
D	Забиття 21 зуба
E	Відлам коронкової частини 21 зуба
№	крок 2008
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Дитина 9-ти років скаржитися на припухлість м'яких тканин і біль під щелепою з правого боку. Об'єктивно: загальний стан задовільний, асиметрія обличчя за рахунок запального інфільтрату і колатерального набряку тканин правій підщелепній ділянці. Коронка 85 зруйнована, слизова оболонка ясен ділянці 84, 85, 46 зубів гіперемована, набрякла, перехідна складка згладжена. Яке лікування необхідно провести?
Правильна відповідь	Видалити 85 зуб
B	Ендодонтичне лікування 85 зуба
C	Видалити 85 зуб і зробити розтин по перехідній складці
D	Провести періостотомію

Е	Ендодонтичне лікування 85 зуба і періостотомія
№	крок 2008
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Після перенесеного матір'ю гострого гнійного маститу у дитини 2-х місяців з'явився набряк лівих підочної та виличної ділянок, гіперемія шкіри лівої половини обличчя, висока температура до 39 – 40 ⁰ С, гноетеча з носа. Який діагноз можна передбачити?
Правильна відповідь	Гострий гематогенний остеомієліт
В	Флегмона підочної ділянки
С	Гострий гайморит
Д	Гострий одонтогенний остеомієліт
Е	Гострий гнійний періостит
№	крок 2008
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	У дитини 3-х років, обпеченої окропом, на фоні гіперемії та набряку шкіри обличчя, виявляються різної величини пухирі, заповнені прозорою рідиною. Визначте ступінь опіку шкіри обличчя:
Правильна відповідь	II
В	I
С	III-А
Д	III-Б
Е	IV
№	крок 2008
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 13-ти років отримала травму в ділянці середньої зони обличчя. Звернулася зі скаргою на біль, припухлість м'яких тканин у ділянці верхньої щелепи, біль при закриванні рота. При обстеженні виявлена рухливість кісток носа, значна припухлість м'яких тканин лівої виличної ділянки, крововилив у склеру ока, симптом "сходінки" по нижньому краю обох очних западин вилично-щелепних швів, носова кровотеча, відкритий прикус, подовження середньої частини обличчя. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III
В	Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
С	Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I
Д	Перелом кісток носа

Е	Перелом основи черепа
№	крок 2016
Тема	ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 12ти років звернувся в стоматологічну поліклініку зі скаргами на біль 16 зуба, який раніше лікувався з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об'єктивно: коронка 16 зруйнована на 1/2. Які щипці використає хірург для видалення 16 зуба?
Правильна відповідь	Сподібні щипці, на правій щічці яких є шип
В	Сподібні щипці з гладкими щічками
С	Прямі щипці
Д	Сподібні щипці, на лівій щічці яких є шип
Е	Клювоподібні щипці з щічками, що сходяться
№	крок 2007
Тема	ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	Хлопчик 10-ти років на 4 добу після отримання травми в спортивному залі скаржить на біль у лівій половині обличчя, обмежене відкривання рота. Об'єктивно: значний набряк тканин лівих підочної та привушної ділянок. Прикус не змінений. Відкривання рота до 1,5 см, при спробі подальшого руху нижньої щелепи відзначається посилення болю та "механічна"перешкода. Пальпаторно в ділянці лівої виличної дуги виявляється западання кістки та помірна болісність. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Перелом лівої виличної дуги
В	Перелом лівого суглобового відростка нижньої щелепи
С	Травматичний артрит лівого скронево-нижньощелепного суглоба
Д	Суббазальний перелом верхньої щелепи
Е	Середній перелом верхньої щелепи
№	крок 2007
Тема	ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Дитині 5-ти років встановлено діагноз: вроджене повне незарощення твердого та м'якого піднебіння. Який вид знеболювання показаний при проведенні ураностафілопластики?
Правильна відповідь	Назотрахеальний наркоз
В	Масковий наркоз
С	Внутрішньовенний наркоз
Д	Оротрахеальний наркоз
Е	Ендотрахеальний наркоз через трахеостому

№	крок 2007
Тема	ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩІД
Текст завдання	Дитина 7-ми років скаржиться на біль і припухлість у навколоушній ділянці з правого боку. Хворіє третій рік. Об'єктивно: стан задовільний, температура тіла 37, 2 ⁰ С, у правій навколоушній ділянці пальпується болісний горбистий інфільтрат. З протоки правої навколоушньої залози виділяється каламутний з прожилками гною секрет. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного неспецифічного паротиту
В	Гострий серозний навколоушний лімфаденіт
С	Гострий гнійний навколоушний лімфаденіт
D	Несправжній паротит Герценберга
Е	Епідемічний паротит
Тема	пухлини
Текст завдання	У дитини 6-ти місяців на слизовій оболонці гребеня альвеолярного відростка верхньої щелепи визначається утворення кулястої форми, м'яко-еластичної консистенції діаметром 6 мм з вмістом блакитного відтінку, що просвічується. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гематома прорізування
В	Фіброма
С	Фолікулярна кіста
D	Радикулярна кіста
Е	Папілома
№	1. крок 2016
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 30ти років звернувся у стоматологічну поліклініку з приводу видалення 36. З анамнезу: пацієнт страждає на гемофілію. Попереднє видалення супроводжувалось довготривалою кровотечею. Доцільним є проведення видалення:
Правильна відповідь	A. В стаціонарі з проведенням перед та післяопераційної підготовки
В	B. У поліклініці з проведенням передопераційної підготовки
С	C. В стаціонарі з проведенням передопераційної підготовки
D	D. У поліклініці з наданням подальших рекомендацій
Е	E. У стаціонарі під наглядом гематолога
№	2. крок 2016
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ

Текст завдання	Хворий 47-ми років після безуспішного консервативного лікування хронічного гранулематозного періодонтиту 15 зуба з'явився для його видалення. Який вид щипців доцільно використати для видалення даного зуба?
Правильна відповідь	A. Сподібні
B	B. Сподібні праві
C	C. Прямі
D	D. Сподібні ліві
E	E. Байонети
№	3. крок 2016, 2015, 2013, 2012, 2011
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 30-ти років звернувся до лікаря для видалення 26 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Об'єктивно: коронка 26 зруйнована на 1/3. Які щипці можна використати для видалення даного зуба?
Правильна відповідь	A. Сподібної форми з шипом на лівій щічці
B	B. Сподібної форми з шипом на правій щічці
C	C. Прямі
D	D. Прямий елеватор
E	E. Сподібної форми без шипів
№	4. крок 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 49-ти років звернувся до хірургастоматолога з метою санації. Показане видалення 16 зуба. З анамнезу: зуб раніше не лікований, зруйнувався впродовж 4х років. Об'єктивно: коронка 16 зруйнована більш, ніж на 2/3, слизова оболонка без патологічних змін. Який інструмент необхідний для видалення цього зуба?
Правильна відповідь	A. Штикоподібні щипці кореневі
B	B. Сподібні (праві) щипці
C	C. Прямий елеватор
D	D. Сподібні щипці, що сходяться
E	E. Штикоподібні щипці коронкові
№	5. крок 2016
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворому 49ти років під плексусанестезією за допомогою артиакаїнуфорте видалено зуб на лівій верхній щелепі. По закінченні операції комірка не виповнилась кров'яним згустком. Як можна попередити виникнення альвеоліту у пацієнта?
Правильна відповідь	A. Пухко заповнити комірку йодоформним тампоном

B	B. Заповнити комірку гемостатичною губкою
C	C. Промити комірку розчином мікроциду
D	D. Промити комірку розчином 0,1% хлоргексидину
E	E. Заповнити комірку порошком антибіотика
№	6. крок 2016
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Лікар проштовхнув корінь у прищелепові м'які тканини. Корінь розташувався під слизовою оболонкою альвеолярної частини щелепи і чітко пропальповується пальцем. Яка тактика лікаря?
Правильна відповідь	A. Зробити розтин м'яких тканин над коренем та видалити його
B	B. Видалити корінь через комірку зуба
C	C. Видалити корінь через підщелеповий оперативний доступ
D	D. Зробити рентгенологічне обстеження хворого для визначення подальшої тактики
E	E. Залишити корінь в м'яких тканинах
№	7. крок 2016
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	У хворого 37-ми років обличчя симетричне, слизова оболонка в ділянці проекції верхівки кореня 12 зуба блідорожевого кольору, пальпація безболісна, коронка зуба зруйнована на 1/3, перкусія безболісна. На рентгенограмі: кореневий канал 12 зуба запломбований до верхівки, навколо верхівки кореня гранульома діаметром 4 мм. Оберіть хірургічний метод лікування:
Правильна відповідь	A. Видалення гранульоми з резекцією верхівки кореня зуба
B	B. Гемісекція кореня зуба
C	C. Коронарорадикулярна сепарація зуба
D	D. Ампутація кореня зуба
E	E. Видалення зуба
№	8. крок 2015
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 55-ти років звернулася для видалення 14 зуба. Які щипці доцільно вибрати для видалення даного зуба?
Правильна відповідь	A. S-подібні
B	B. S-подібні ліві
C	C. S-подібні праві
D	D. Штикоподібні
E	E. Прямі

№	9. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у 47 зубі. Під час рентгенологічного дослідження у каналах медіального та дистального коренів виявляються відламки ендодонтичних інструментів. В ділянці верхівки коріння осередки деструкції кістки з чіткими контурами. Виберіть найбільш доцільний метод лікування:
Правильна відповідь	А. Видалення зуба
В	В. Операція резекції верхівки кореня
С	С. Операція реплантації зуба
Д	Д. Гемісекція зуба
Е	Е. Консервативне лікування
№	10. крок 2014
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворому 26-ти років необхідно видалити 26 зуб. Діагноз: хронічний фіброзний періодонтит 26. Який інструмент необхідно мати для видалення?
Правильна відповідь	А. Щипці S-подібні праві
В	В. Щипці S-подібні ліві
С	С. Щипці байонетні (багнетоподібні)
Д	Д. Щипці прямі кореневі
Е	Е. Прямий елеватор
№	11. крок 2013
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Під час видалення 47 зуба дистальний корінь залишився в комірці. Виберіть інструмент для завершення видалення:
Правильна відповідь	А. Кутовий лівобічний елеватор
В	В. Кутовий правобічний елеватор
С	С. Прямий елеватор
Д	Д. Ключоподібні щипці для видалення коренів
Е	Е. Універсальні щипці-байонети
№	12. . крок 2012, 2011, 2009
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Під час видалення 47 трапився перелом дистального кореня зуба на рівні 1/2 його довжини. Який інструмент треба обрати для вилучення залишку кореня?
Правильна відповідь	А. Лівий кутовий елеватор

В	В. Дзьобоподібні щипці зі щічками, які не збігаються
С	С. Дзьобоподібні щипці зі щічками, які збігаються
Д	Д. Правий кутовий елеватор
Е	Е. Прямий елеватор
№	13. . крок 2012
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Жінка 56-ти років звернулася до хірурга-стоматолога для видалення 17 зуба. Який інструментарій для видалення слід обрати?
Правильна відповідь	А. S-подібні праві щипці
В	В. Штикоподібні кореневі щипці
С	С. Прямі щипці
Д	Д. S-подібні ліві щипці
Е	Е. Штикоподібні коронкові щипці
№	14. . крок 2012
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	У хірургічний стоматологічний кабінет звернувся пацієнт зі скаргами на наявність коренів зруйнованого 37 зуба. Який інструментарій можна використати для видалення коренів 37 зуба?
Правильна відповідь	А. Дзьобоподібні щипці, що сходяться, бокові елеватори
В	В. Дзьобоподібні щипці, що не сходяться, прямий елеватор
С	С. Щипці, зігнуті в площині, бокові елеватори
Д	Д. Багнетоподібні щипці, прямий елеватор
Е	Е. S-подібні щипці, прямий і бокові елеватори
№	15. . крок 2011
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	У хворого 43-х років після видалення 26 зуба виникло сполучення ротової порожнини із верхньощелепною пазухою. Рентгенологічно змін у верхньо-щелепових пазухах не виявлено. Якою буде тактика хірурга-стоматолога з метою профілактики виникнення гаймориту?
Правильна відповідь	А. Пластичне закриття сполучення
В	В. Тампонада комірки йодоформною турундою
С	С. Заповнення комірки гемостатичною губкою
Д	Д. Промивання пазухи розчином антибіотика
Е	Е. Заповнення комірки кров'яним згустком

№	16. крок 2011
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 70-ти років скаржитися на рухомість 21 зуба. Зуб раніше не лікувався. Об'єктивно: 21 має рухомість II ступеня, корінь оголений на 1/2. Який інструмент необхідно використати для видалення зуба?
Правильна відповідь	A. Прямі щипці
B	B. S-подібні щипці
C	C. Штикоподібні щипці
D	D. Прямий елеватор
E	E. Клювоподібні щипці
№	17. крок 2011
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 49-ти років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації. Показане видалення 16 зуба. З анамнезу: зуб раніше не лікований, зруйнувався протягом 4-х років. Об'єктивно: коронка 16 зруйнована більш, ніж на 2/3, слизова оболонка без патологічних змін. Який інструмент необхідний для видалення цього зуба?
Правильна відповідь	A. Штикоподібні щипці кореневі
B	B. S-подібні (праві) щипці
C	C. Прямий елеватор
D	D. S-подібні щипці, що сходяться
E	E. Штикоподібні щипці коронкові
№	18. крок 2011, 2007
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 43-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль у 36. Під час рентгенологічного обстеження виявлено залишок ендодонтичного інструменту в дистальному корені. В ділянці верхівки кореня деструкція кісткової тканини (d=5 мм) із чіткими контурами. Який метод лікування доцільно застосувати в даному випадку?
Правильна відповідь	A. Гемісекція зуба
B	B. Резекція верхівки кореня
C	C. Консервативне лікування
D	D. Реплантація зуба
E	E. Ампутація кореня
№	19. крок 2011
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ

Текст завдання	Хворому 49-ти років під плексус-анестезією за допомогою артиакаїну-форте видалено зуб на лівій верхній щелепі. По закінченні операції комірка не виповнилась кров'яним згустком. Як можна попередити виникнення альвеоліту у пацієнта?
Правильна відповідь	A. Пухко заповнити комірку йодоформним тампоном
B	B. Заповнити комірку гемостатичною губкою
C	C. Промити комірку розчином мікроциду
D	D. Промити комірку розчином 0,1% хлоргексидину
E	E. Заповнити комірку порошком антибіотика
№	20. крок 2010
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	У хворого 37-ми років було видалено медіальний корінь 36, а дистальний корінь зуба зламався в середній третині. Який інструмент слід застосувати для видалення кореня?
Правильна відповідь	A. Елеватор під кутом направо
B	B. Елеватор під кутом наліво
C	C. Прямий елеватор
D	D. Дзьобоподібні щипці, що не сходяться
E	E. Дзьобоподібні щипці, що сходяться
№	21. . крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 45-ти років скаржиться на біль у нижній щелепі, який виник після видалення 36. Об'єктивно: комірка вкрита кров'яним згустком. На рентгенограмі видно не видалений дистальний корінь 36. Які інструменти необхідні для видалення цього кореня?
Правильна відповідь	A. Елеватор під кутом, правий
B	B. Елеватор під кутом, лівий
C	C. Елеватор прямий
D	D. S-подібні щипці
E	E. Байонетні щипці
№	22. . крок 2010
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	На прийом до хірурга-стоматолога звернулась пацієнтка 70-ти років для видалення центральних різців верхньої щелепи, що мають рухомість III ступеню. Який інструмент слід застосувати?
Правильна відповідь	A. Прямі щипці

B	B. Прямий елеватор
C	C. Клювоподібні щипці
D	D. Байонетні щипці
E	E. S-подібні щипці
№	23. . крок 2010
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Під час ендодонтичного лікування періодонтиту 46 відбувся злам інструменту в середній третині медіального кореня. Виберіть метод лікування:
Правильна відповідь	A. Гемісекція медіального кореня
B	B. Ампутація медіального кореня
C	C. Корона-радикулярна сепарація
D	D. Резекція верхівки медіального кореня
E	E. Видалення зуба
№	24. крок 2010
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 45-ти років звернувся для видалення 13. Який інструментарій необхідно обрати для видалення?
Правильна відповідь	A. Прямі щипці
B	B. S-подібні праві щипці
C	C. Штикоподібні щипці
D	D. Прямий елеватор
E	E. S-подібні щипці
№	25. крок 2010, 2008
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся для видалення 14 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту після безуспішного терапевтичного лікування. Який Ваш вибір інструментарію для видалення?
Правильна відповідь	A. S-подібні щипці
B	B. Штикоподібні коронкові щипці
C	C. S-подібні праві щипці
D	D. Прямі щипці
E	E. Штикоподібні кореневі щипці
№	26. крок 2010
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ

Текст завдання	Чоловік 25-ти років звернувся до поліклініки з приводу видалення 18, коронка якого зруйнована на 1/2. Зуб раніше неодноразово лікований. Під час видалення зуба відбувся відрив горба верхньої щелепи. Які найбільш правильні дії в даній ситуації?
Правильна відповідь	A. Видалити відламок і ушити рану
B	B. Спробувати ввести відламок на місце
C	C. Встановити відламок на старе місце і зафіксувати
D	D. Видалити відламок
E	E. Видалити відламок і затампонувати рану
№	27. крок 2010
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	У дитини 7-ми років діагностовано хронічний періодонтит 64 та 85 зубів. Дитина страждає на гемофілію А. Визначте лікувальну тактику:
Правильна відповідь	A. Видалення зубів в гематологічному відділенні після відповідної підготовки
B	B. Видалення зубів можливо як в стаціонарі, так і в амбулаторії
C	C. Видалення зубів в амбулаторних умовах з подальшою тампонадою альвеол гемостатичною губкою
D	D. Видалення зубів у щелепно-лицевому відділенні
E	E. Видалення зубів протипоказане через високу імовірність кровотечі
№	28. крок 2009
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 48-ми років скаржиться на біль постійного характеру в ділянці 28. Хворіє 3 дні. Коронка 28 повністю зруйнована. За допомогою яких щипців можна видалити корені 28?
Правильна відповідь	A. Байонетні
B	B. S-подібні ліві
C	C. Прямі кореневі
D	D. S-подібні зі щічками, що сходяться
E	E. S-подібні з щічками, що не сходяться
№	29. крок 2008
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Чоловік 28-ми років звернувся до хірурга-стоматолога для видалення 38 зуба. Які щипці треба обрати для цієї операції?
Правильна відповідь	A. Ключоподібні щипці зігнуті по площині
B	B. Ключоподібні щипці з щічками, що не сходяться
C	C. Ключоподібні щипці з щічками, що сходяться

D	D. Клювоподібні щипці з шипами
E	E. Байонети кореневі
№	30. крок 2008
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	До лікаря звернувся хворий із скаргами на періодично виникаючий біль на верхній щелепі. Із анамнезу: 12 зуб раніше лікований з приводу пульпіту. Об'єктивно: коронка 12 зуба відновлена постійним пломбувальним матеріалом. На рентгенограмі верхньої щелепи виявляється вогнище деструкції кісткової тканини біля верхівки кореня 12 зуба діаметром до 15 мм. Кореневий канал запломбований до верхівки. Який оптимальний метод лікування цього хворого?
Правильна відповідь	A. Резекція верхівки кореня 12 зуба
B	B. Консервативне лікування
C	C. Видалення 12 зуба
D	D. Реплантація 12 зуба
E	E. Розтин по перехідній складці
№	31. . крок 2007
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хірург-стоматолог при видаленні 38 використав елеватор Леклюза. Після того, як щічка елеватора була введена між 37 та 38 і здійснена спроба вивихнути 38, виникло порушення прикусу. Яке ускладнення виникло найбільш вірогідно?
Правильна відповідь	A. Перелом нижньої щелепи в ділянці кута
B	B. Перелом коміркового відростка нижньої щелепи
C	C. Неповний вивих 37
D	D. Передній вивих нижньої щелепи
E	E. Задній вивих нижньої щелепи
№	32. крок 2007
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	До лікаря звернувся хворий зі скаргами на періодично виникаючий біль у ділянці кута нижньої щелепи та утруднене відкривання рота. Показано видалення 38 зуба. Оберіть щипці, якими потрібно провести видалення 38 зуба:
Правильна відповідь	A. Зігнуті по площині
B	B. Дзьобоподібні зі щічками, які не збігаються
C	C. Дзьобоподібні зі щічками, які збігаються
D	D. Дзьобоподібні з шипами на щічках
E	E. Байонетні
№	33. крок 2007

Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Жінка 49-ти років звернулася до хірурга-стоматолога для видалення 17. Діагноз: загострення хронічного гранулематозного періодонтиту 17. Який інструментарій слід використати для видалення?
Правильна відповідь	A. S-подібні праві щипці
B	B. Штикоподібні кореневі щипці
C	C. Штикоподібні коронкові щипці
D	D. S-подібні ліві щипці
E	E. Прямі щипці
№	34. крок 2007
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Через 3 години після видалення 45 у хворого почалася кровотеча з комірки. Під час огляду виявлена травма тканин ясни в ділянці комірки 45, яка переходить до слизової оболонки щоки. Яка тактика лікаря в цьому випадку?
Правильна відповідь	A. Ушивання комірки та рани щоки
B	B. Тампонада комірки йодоформною турундою
C	C. Стискальна пов'язка та парентеральне введення амінокапронової кислоти
D	D. Тампонада комірки кетгуттом
E	E. Тампонада комірки та рани тампоном з амінокапроновою кислотою
№	35. крок 2007
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 48-ми років після безуспішного лікування у терапевта-стоматолога з приводу хронічного гранулематозного пародонтиту 37 зуба з'явилася для його видалення. Який інструментарій слід обрати?
Правильна відповідь	A. Дзьобоподібні щипці із щічками, що мають шипи
B	B. Прямий елеватор
C	C. Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині
D	D. Дзьобоподібні щипці з щічками, що не збігаються
E	E. Дзьобоподібні щипці з щічками, що збігаються
№	36. крок 2007
Тема	ТЕМА ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ
Текст завдання	Хлопчик 14-ти років скаржиться на сильний біль у ділянці комірки видаленого 3 дні тому зуба, який іррадіює по ходу гілок трійчастого нерва. Об'єктивно: лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації, тканини навколо комірки набряклі та гіперемовані, стінки комірки покриті сірувато-зеленим нальотом з гнилісним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз?

Правильна відповідь	A. Альвеоліт
B	B. Перикоронарит
C	C. Остит
D	D. Періостит
E	E. Остеомієліт
№	1. крок 2016, 2011
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 28-ми років звернувся зі скаргами на припухлість в правій під'язиковій ділянці, яка обмежує рухомість язика, ускладнює мову. Помітив її тиждень тому. Об'єктивно: в правій під'язиковій ділянці кулеподібне вибухання розміром 2,0x2,5 см, з чіткими межами, в центрі прозора, розтягнута слизова оболонка. Пальпаторно визначається флюктуація. Язик дещо піднятий догори. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ретенційна кіста під'язикової слинної залози
B	B. Слинокам'яна хвороба під'язикової слинної залози
C	C. Хронічний сіаладеніт під'язикової слинної залози
D	D. Гострий сіаладеніт під'язикової слинної залози
E	E. Ретенційна кіста підщелепної слинної залози
№	2. крок 2016, 2015, 2013
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 46ти років при огляді порожнини рота на слизовій оболонці щічної ділянки справа визначається новоутворення розміром 1,0x1,0 см, м'якої консистенції, безболісне під час пальпації, кольору слизової оболонки ротової порожнини. Новоутворення з'явилося декілька років тому. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Фіброма слизової оболонки щічної ділянки
B	B. Ерозивна лейкоплакія слизової оболонки щічної ділянки
C	C. Пухирчатка слизової оболонки щічної ділянки
D	D. Плоска лейкоплакія слизової оболонки щічної ділянки
E	E. Ретенційна кіста слизової оболонки щічної ділянки
№	3. крок 2016, 2015
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У хворої 29ти років після клінічного і рентгенологічного обстеження встановлений діагноз: остеобластокластома нижньої щелепи (кістозна форма). Діагноз підтверджений характером пунктату (бура рідина) пухлина не виходить на межі кортикальної пластинки, хоча остання витончена. Який метод лікування доцільно застосувати при цьому виді пухлини?

Правильна відповідь	A. Екскохлеація пухлини
B	B. Резекція нижньої щелепи з одномоментною кістковою пластикою
C	C. Цистотомія
D	D. Цистектомія
E	E. Хіміотерапія
№	4. крок 2016, 2015
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 43х років скаржиться на потовщення тіла нижньої щелепи. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок потовщення нижньої щелепи зліва. 35, 36, 37 зуби рухливі. У ділянці перехідної складки з вестибулярного боку визначається безболісне вибухання кісткової тканини. На рентгенограмі нижньої щелепи зліва ділянки деструкції кісткової тканини округлої форми з чіткими межами. Корені 35, 36, 37 резорбовані. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Остеобластокластома нижньої щелепи
B	B. Радикулярна кіста нижньої щелепи
C	C. Хронічний остеомієліт нижньої щелепи
D	D. Фібозна остеодисплазія
E	E. Фолікулярна кіста нижньої щелепи
№	5. крок 2015, 2008, 2007
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на пухлиноподібне утворення на бічній поверхні шиї справа. Пухлину виявив рік тому. Об'єктивно: на бічній поверхні шиї справа пухлина напівовальної форми з чіткими межами, 3х2 см. Пухлина зі шкірою не спаяна, безболісна, щільно-еластичної консистенції, рухлива у вертикальному і горизонтальному напрямках. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Під час пункції пухлини отримана світложовта рідина, що біохімічно складається зі злушеного епітелію, кристалів холестерину, лімфоцитів, еритроцитів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Бічна кіста шиї справа
B	B. Серединна кіста шиї справа
C	C. Дермоїдна кіста шиї справа
D	D. Хемодектома шиї справа
E	E. Хронічний лімфаденіт шиї справа
№	6. крок 2015
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД

Текст завдання	До хірурга звернувся хворий 20-ти років з пухлиною на лівій щоці. Наявність утворення відзначає з народження. Об'єктивно: на шкірі лівої щоки наявне плоска округлої форми пляма до 1,5 см у діаметрі, рожево-червоного кольору. При натисканні на пухлину пальцем або інструментом утворення бліднішає. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Гемангіома
B	B. Лімфангіома
C	C. Невус
D	D. Нейрофіброматоз
E	E. Пігментна родима пляма
№	7. крок 2015
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворому 25-ти років, що знаходиться на лікуванні у клініці щелепно-лицевої хірургії з приводу амелобластоми нижньої щелепи локалізацією у ділянці кута, призначена операція: часткова резекція нижньої щелепи з одночасною кістковою аутопластикою. Звідки краще взяти кістковий трансплантат у хворого?
Правильна відповідь	A. Гребінець клубової кістки
B	B. Ключиця
C	C. Кістки ступні
D	D. Стегнова кістка
E	E. VI ребро
№	8. крок 2015
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 25-ти років скаржиться на припухлість в ділянці правого кута нижньої щелепи. обличчя асиметричне за рахунок потовщення нижньої щелепи в ділянці правого кута. Пальпація безболісна. Відкривання рота в повному обсязі, безболісне. На рентгенограмі правої половини нижньої щелепи визначається ретинований 48 зуб, навколо нього просвітлення кісткової тканини з чіткими контурами, овальної форми 2x3 см. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Фолікулярна кіста нижньої щелепи
B	B. Радикулярна кіста нижньої щелепи
C	C. Остеобластокластома нижньої щелепи
D	D. Одонтома
E	E. Адамантинома
№	9. . крок 2014, 2009, 2008, 2007
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД

Текст завдання	У хворого 27-ми років під час обстеження виявлено новоутворення округлої форми в підпідборідній ділянці. Шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, збирається в складку. В пунктаті - рідина солом'яно-жовтого кольору з домішкою холестерину. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	A. Природжена серединна кіста
B	B. Ліпома
C	C. Лімфаденіт
D	D. Ретенційна кіста під'язикової слинної залози
E	E. Дермоїдна кіста
№	10. . крок 2014
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 52-х років скаржитися на біль і припухлість у правій привушній ділянці. Хворіє біля 2-х років. За останній місяць припухлість збільшилася, біль посилюється. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок щільного інфільтрату у правій привушній ділянці, спаяного з навколишніми тканинами, без чітких меж, болісного під час пальпації. У ділянці шиї справа спереду і позаду кивального м'яза визначаються збільшені, рухливі, щільні, лімфовузли. Права носо-щічна складка згладжена, кут рота опущений. Рот відкриває вільно. Виражені симптоми парезу правого лицевого нерва. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	A. Аденокарцинома привушної слинної залози
B	B. Хронічний паротит
C	C. Актиномікоз привушно-жувальної ділянки
D	D. Хронічний лімфаденіт
E	E. Плеоморфна аденома привушної залози
№	11. . крок 2013
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність новоутворення в ділянці кінчика язика, яке він травмує зубами і яке то збільшується, то зменшується в розмірі. На кінчику язика має місце округле новоутворення діаметром 0,5 см, межі чіткі, на широкій основі, колір не відрізняється від кольору слизової язика. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Папілома язика
B	B. Абсцес язика
C	C. Ліпома язика
D	D. Гемангіофіброма язика
E	E. Фіброма язика
№	12. . крок 2013

Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У пацієнта 45-ти років є утворення на нижній губі, що має форму півкулі діаметром 1 см, щільної консистенції. Утворення виступає над червоною облямівкою на 0,5 см. Поверхня сірувато-рожевого кольору з невеликою кількістю щільно розташованих білуватих лусочок. При пальпації безболісне. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Бородавчастий (вузликовий) передрак червоної облямівки губ
В	В. Звичайна бородавка
С	С. Папілома
Д	Д. Піогенна гранульома
Е	Е. Хейліт Манганотті
№	13. крок 2013
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У пацієнта 43-х років на слизовій оболонці м'якого піднебіння локалізується новоутворення кулястої форми на ніжці, еластичне, колір слизової оболонки не змінений. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	А. Папілома слизової оболонки
В	В. Фіброма слизової оболонки
С	С. Ретенційна кіста малої слинної залози
Д	Д. Плеоморфна аденома малої слинної залози
Е	Е. Нейрофіброма
№	14. крок 2012
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	До хірурга звернувся хворий 25-ти років з пухлиноподібним утворенням у навколоушній ділянці зліва. Наявність пухлини відзначає з народження. Розміри пухлини не змінюються. Об'єктивно: у навколоушній ділянці зліва визначається утворення округлої форми до 2,0 см у діаметрі, що підвищується над шкірою; поверхня утворення горбиста, коричневого кольору. При натисканні колір не змінюється. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	А. Бородавчастий невус
В	В. Гемангіома
С	С. Лімфангіома
Д	Д. Меланома
Е	Е. Нейрофіброма
№	15. . крок 2012
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД

Текст завдання	Хвора 57-ми років звернулася зі скаргами на наявність новоутворення у підщелепній ділянці справа, що повільно росте. Помітила його випадково 3 роки тому. Об'єктивно: обличчя незначно асиметричне за рахунок припухлості у правій підщелепній ділянці. Колір шкіри не змінений. Під час пальпації визначається утворення тістуватої консистенції розміром 4x5 см, не спаяне зі шкірою, рухливе, безболісне. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	A. Ліпома підщелепної ділянки
B	B. Слинокам'яна хвороба
C	C. Атерома підщелепної ділянки
D	D. Злоякісна пухлина підщелепної ділянки
E	E. Лімфангіома
№	16. крок 2012, 2009
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на утворення на нижній губі, яке швидко збільшується у розмірах. Під час обстеження на червоній облямівці нижньої губи виявлений сірувато-червоний вузлик з заглибленням у центрі, заповнений роговими масами, які легко знімаються. Вузлик безболісний, рухливий. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Кератоакантома
B	B. Папілома
C	C. Вузликовий бородавчастий передрак червоної облямівки
D	D. Базаліома
E	E. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки
№	17. . крок 2012
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 56-ти років наявне утворення на нижній губі справа, що сягає розміру до 1 см і періодично відторгається. Об'єктивно: на червоній облямівці нижньої губи справа визначається утворення у вигляді конуса з вираженими ділянками гіперкератозу, що має брудно-сірий або коричнево-сірий колір, щільно спаяне з основою. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Шкірний ріг
B	B. Обмежений гіперкератоз
C	C. Папілома
D	D. Кератоакантома
E	E. Бородавчастий передрак
№	18. крок 2011
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД

Текст завдання	Чоловікові 48-ми років під час санації ротової порожнини зроблено рентгенівський знімок нижньої щелепи. Виявлено деструкцію кісткової тканини з рівними чіткими межами у ділянці кута нижньої щелепи, що не пов'язана з коренями зубів. При діагностичній пункції отримано ексудат коричневого кольору без кристалів холестерину. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Остеобластокластома
B	B. Гемангіома щелепи
C	C. Адамантинома
D	D. Кіста щелепи
E	E. Холестеатома
№	19. крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	На рентгенограмі в проекції верхівки кореня 27 спостерігається деструкція кісткової тканини круглої форми з чіткими рівними краями розміром 0,7x0,7 см. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Кістогранульома
B	B. Кіста
C	C. Гранульома
D	D. Одонтома
E	E. Остеома
№	20. крок 2010
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Батьки 7-ми річного хлопчика звернулись до дитячої стоматологічної поліклініки зі скаргами на відсутність 11. Об'єктивно: збільшення коміркового відростка в проекції 11, 12. На рентгенограмі визначаються множинні тіні різної величини, які мають зубоподібну форму і за щільністю відповідають твердим тканинам зуба. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Одонтома верхньої щелепи
B	B. Фолікулярна кіста верхньої щелепи від 11
C	C. Цементома верхньої щелепи
D	D. Адамантинома верхньої щелепи
E	E. Одонтогенна фіброма верхньої щелепи
№	21. крок 2010
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД

Текст завдання	Хвора 57-ми років скаржиться на наявність припухлості у під'язиковій ділянці, яку помітила 3 місяці тому. Відзначає її повільне збільшення. Об'єктивно: у під'язиковій ділянці має місце утворення еластичної консистенції, безболісне, слизова оболонка над ним з блакитним відтінком. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ранула
B	B. Слинокам'яна хвороба
C	C. Дермоїдна кіста дна порожнини рота
D	D. Ліпома під'язикової ділянки
E	E. Гемангіома під'язикової ділянки
№	22. . крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржиться на тривало існуючу тріщину у центральному відділі червоної облямівки нижньої губи. Тютюнопаління з 16-ти років. Об'єктивно: по середній лінії червоної облямівки нижньої губи має місце глибока тріщина довжиною 1,0 см, краї тріщини валикоподібно потовщені. Характерною ознакою тріщини є спонтанне загоєння, але після епітелізації вона рецидивує знову. Було встановлено діагноз - хронічна тріщина нижньої губи. Консервативні методи лікування неефективні. Оберіть правильний метод лікування у даній ситуації:
Правильна відповідь	A. Висічення у межах видимо здорових тканин
B	B. Кріодеструкція
C	C. Діатермокоагуляція
D	D. Висічення, відступивши на 0,5 см від меж утворення
E	E. Близькофокусна рентгенотерапія
№	23. крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 35-ти років звернулася до стоматолога з приводу новоутворення в ділянці 11, 12 зубів, яке безболісне, росте повільно. Під час обстеження: пухлина сплющеної форми, прилягає до зубів, має ніжку, забарвлення блідо-рожеве, розмір до 1,5 см, поверхня гладенька, консистенція щільна. Діагноз: епулід у ділянці 11, 12 зубів. Для якої форми епуліда характерна вказана картина?
Правильна відповідь	A. Фіброзний
B	B. Ангіоматозний
C	C. Гігантоклітинний
D	D. Епулід вагітних
E	E. -
№	24. крок 2009

Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 23-х років скаржитися на періодичний біль у ділянці 11, випинання альвеолярного відростка. 4 роки тому була травма. Об'єктивно: коронка 11 темного кольору, перкусія зуба безболісна. На рентгенограмі розрідження кісткової тканини округлої форми діаметром 2,0 см з чіткими контурами у верхівки кореня 11. Пункція: рідина жовтуватого кольору з кристалами холестерину. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Радикулярна кіста верхньої щелепи
B	B. Хронічний остеомієліт верхньої щелепи
C	C. Амелобластома верхньої щелепи
D	D. М'яка одонтома верхньої щелепи
E	E. Остеобластокластома верхньої щелепи
№	25. крок 2009
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Жінка 56-ти років звернулася зі скаргами на безболісне новоутворення на альвеолярному гребні верхньої щелепи зліва. Під час огляду: на ясні в ділянці премолярів яскраво-червона пухлина, що розташована по обидва боки альвеолярного гребня. Пухлина на широкій основі, щільноеластичної консистенції, безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Периферійна форма остеобластокластоми
B	B. Центральна форма остеобластокластоми
C	C. Фіброматоз ясен
D	D. Фіброзний епулід
E	E. Папілома
№	26. крок 2009
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 27-ми років звернулася зі скаргами на наявність припухлості у ділянці нижньої щелепи з правого боку. Об'єктивно: обличчя дещо асиметричне за рахунок потовщення тіла нижньої щелепи справа. Прилеглі м'які тканини у кольорі не змінені, нормальної консистенції. Рот відкривається у повному об'ємі. Слизова оболонка порожнини рота без змін. В зубному ряду нижньої щелепи справа відсутній 45. На рентгенограмі правої половини нижньої щелепи у боковій проекції визначається вогнище просвітлення кісткової тканини тіла овальної форми 2х3 см з чіткими рівними контурами. В порожнину вогнища просвітлення звернена коронкова частина горизонтального розташованого ретенуваного 45. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Фолікулярна кіста нижньої щелепи
B	B. Адамантинома нижньої щелепи
C	C. Саркома нижньої щелепи

D	D. Одонтома нижньої щелепи
E	E. Остеобластокластома нижньої щелепи
№	27. крок 2008
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Чоловік 37-ми років звернувся зі скаргами на біль та припухлість, виникаючу під час їжі в лівій підщелепній ділянці. Об'єктивно: в лівій підщелепній ділянці пальпується трохи болюче еластичне ущільнення довгастої форми. Відкриття рота вільне. При бімануальній пальпації в ділянці щелепно-язикового жолоба відзначається щільне, рухоме затвердіння. Слизова оболонка не змінена. З протоки лівої підщелепної слинної залози слина не виділяється. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Слинокам'яна хвороба
B	B. Хронічний лімфаденіт
C	C. Плеоморфна аденома
D	D. Ретенційна кіста
E	E. Ліпома підщелепної ділянки
№	28. крок 2008, 2007
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 55-ти років у ділянці видаленого 46 виникло не болюче, горбисте, синюшного кольору новоутворення на ніжці розміром 2x1x1,5 см. Відкриття рота в повному обсязі. На внутрішньоротовій рентгенограмі альвеолярного відростка в ділянці видаленого 46 відмічається вогнище деструкції кісткової тканини. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гігантоклітинний епуліс
B	B. Тверда одонтома нижньої щелепи
C	C. Гіпертрофічний гінгівіт
D	D. Папілома слизової оболонки в ділянці видаленого 46
E	E. Амелобластома нижньої щелепи
№	29. крок 2008
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 42-х років протягом 10-ти років у передньому відділі піднебіння виникало новоутворення. Слизова оболонка над ним в кольорі не змінена. 13, 12, 11, 21, 22, 23 інтактні. На внутрішньоротовій рентгенограмі верхньої щелепи відмічається поодинокий осередок деструкції кісткової тканини з чіткими контурами розміром 2,5x1,5 см. Періодонтальна щілина в ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 визначається добре. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Кіста носопіднебінного каналу

B	A. Радикулярна кіста
C	B. Глобуломаксилярна кіста
D	C. Резидуальна кіста
E	D. Фолікулярна кіста
№	30. крок 2007
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Чоловік 56-ти років скаржиться на біль у лівій навколоушно-жувальній ділянці, прогресуючу асиметрію обличчя, яку помітив місяць тому. Об'єктивно: парез м'язів ліворуч. Попереду від мочки вуха є інфільтрат без чітких меж, шкіра над ним синюшна, натягнута; з лівого боку збільшені шийні лімфовузли. Відкриття рота обмежене до 2,5 см. З протоки лівої навколоушної залози слина не виділяється. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Аденокарцинома
B	B. Змішана пухлина
C	C. Кіста залози
D	D. Туберкульоз залози
E	E. Хронічний лімфаденіт
№	31. крок 2007
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	До хірурга-стоматолога звернувся хворий 45-ти років зі скаргами на пухлиноподібне утворення в правому підщелепному трикутнику. Помітив новоутворення рік тому. Об'єктивно: у правому піднижньощелепному трикутнику визначається пухлиноподібне утворення округлої форми до 3,5 см у діаметрі, безболісне, м'якої консистенції з чіткими межами, рухливе разом з піднижньощелепною слинною залозою. З боку порожнини рота змін немає. Рот відкривається в повному обсязі. Під час пункції отримана безколірна в'язка рідина. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ретенційна кіста піднижньощелепної слинної залози
B	B. Дермоїдна кіста
C	C. Аденома
D	D. Лімфангіома
E	E. Ліпома
№	32. крок 2007
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 48-ми років проведено оперативне втручання з приводу доброякісної пухлини привушної слинної залози. У післяопераційному періоді спостерігається опущення кута рота, зміщення серединної лінії в здоровий бік, утруднення мови. Яка з гілок лицевого нерва уражена при оперативному втручанні?

Правильна відповідь	A. Крайова гілка нижньої щелепи
B	B. Щічна гілка
C	C. Вилична гілка
D	D. Шийна гілка
E	E. Сконева гілка
№	33. крок 2007
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на наявність тріщини нижньої губи. Об'єктивно: глибока тріщина у середній частині нижньої губи ділить її навпіл, супроводжується запальною реакцією і болісністю. Після раніше проведеного лікування ділянка ураження зникла, а потім знову з'явилася на попередньому місці. У основи тріщини і по її краях пальпується невелика інфільтрація тканин. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічна тріщина нижньої губи
B	B. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки
C	C. Ерозивна форма лейкоплакії
D	D. Верукозна лейкоплакія
E	E. Абразивний передкарцинозний хейліт Манганотті
№	34. . крок 2009
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 76-ти років на шкірі у ділянці правої носогубної борозни визначається виразка круглої форми. Дно виразки щільне, нерівне, вкрите жовтувато-сірими кірками і має вигляд воронки. Краї виразки щільні, кратероподібні. Виразка росте як по периферії, так і вглиб. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Базаліома
B	B. Туберкульозна виразка
C	C. Актиномікотична виразка
D	D. Сифілітична виразка
E	E. Плоскоклітинний рак шкіри
№	35. крок 2016, 2015
Тема	ТЕМА ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЩЛД

Текст завдання	Хворий скаржиться на наявність м'якого безболісного утворення на слизовій оболонці лівої щічної ділянки, яке з'явилося близько 3х місяців після неодноразового прикушування щоки при зубному протезуванні. На межі слизової оболонки нижньої губи і щоки зліва визначається новоутворення 1x1 см округлої форми, безболісне, з чіткими контурами, обмеженорухливе. Слизова оболонка над ними витончена, напівпрозора. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ретенційна кіста слизової оболонки щоки
B	B. Дермоїдна кіста
C	C. Фіброма
D	D. Кавернозна гемангіома
E	E. Папілома
№	1. крок 2016, 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 33х років надійшла в щелепнолицеве відділення зі скаргами на біль та припухлість правої підщелепної ділянки, підвищення температури тіла 39, 5° C . Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин правої підщелепної ділянки, де пальпаторно визначається щільний інфільтрат, шкіра над ним гіперемована, не береться в складку. В 46 зубі глибока каріозна порожнина. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Флегмона піднижньощелепної ділянки справа
B	B. Гострий піднижньощелепний сіалоаденіт
C	C. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи
D	D. Гострий гнійний піднижньощелепний лімфаденіт
E	E. Гострий остеомієліт нижньої щелепи справа
№	2. крок 2016, 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Жінка 23х років лікується з приводу фурункулу лівої щоки. Раптово стан хворої погіршився. З'явилися сильний головний біль, висока температура тіла, збільшився набряк щоки, з'явився щільний інфільтрат у вигляді тяжу, спрямованого до внутрішнього кута ока. Яке ускладнення розвинулося у хворої?
Правильна відповідь	A. Тромбофлебіт лицевих вен
B	B. Абсцес підочної ділянки
C	C. Гострий гнійний гайморит
D	D. Лімфангоїт
E	E. Бешиха

№	3. крок 2016, 2011
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 41-го року скаржиться на рухомість 24, 26, 27 зубів, виділення гною з комірки видаленого 25. Півтора місяці тому зроблено розтин по перехідній складці, видалено 25. Об'єктивно: слизова оболонка альвеолярного відростка в ділянці 24, 26, 27 синюшного кольору, набрякла. По перехідній складці нориця з вибухаючими грануляціями. З комірки видаленого 25 гнійні грануляції. В правій підочній ділянці невелика припухлість м'яких тканин. Носове дихання вільне. Якому захворюванню найбільш імовірно відповідає описана клінічна картина?
Правильна відповідь	A. Хронічний обмежений остеомієліт
B	B. Хронічний альвеоліт
C	C. Актиномікоз верхньої щелепи
D	D. Загострення хронічного гаймориту
E	E. Хронічний дифузний остеомієліт
№	4. крок 2016, 2015, 2012, 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Після переохолодження хворий 42-х років скаржиться на головний біль у лівій лобовій ділянці та лівій верхній щелепі. Об'єктивно: обличчя симетричне, утруднене дихання через лівий носовий хід, серозногнійні виділення з нього, незначний біль під час пальпації підочної ділянки і по перехідній складці у проекції 24, 25. Перкусія цих зубів безболісна. У 24 пломба. Слизова оболонка альвеолярного відростка без видимих змін. На рентгенограмі визначається зниження пневматизації лівої верхньощелепної пазухи. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного одонтогенного гаймориту
B	B. Гострий періодонтит 24
C	C. Загострення хронічного періодонтиту 24
D	D. Гострий риногенний гайморит
E	E. Гострий серозний періостит лівої верхньої щелепи
№	5. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Хвора 37ми років знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні щелепнолицевої хірургії. Загальний стан середньої важкості, температура тіла 38, 9° C . З анамнезу відомо, що захворювання розпочалось гостро, після мікротравми носа. Протягом доби виникло почервоніння шкіри та набряк щічних ділянок; спостерігався біль у підщелепних лімфатичних вузлах. На другий день захворювання одночасно з подальшим поширенням почервоніння на ніс з'явилися пухирі із серозним вмістом. При об'єктивному обстеженні виявлена еритема шкіри обличчя та набряк м'яких тканин. Від здорової шкіри ділянка обмежена виступаючим валом запалення, болюча під час пальпації. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Бешиха
B	B. Скарлатина
C	C. Лімфангіома
D	D. Гемангіома
E	E. Лімфангоїт
№	6. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хворої встановлено попередній діагноз: слинокам'яна хвороба з локалізацією каменю в слинній залозі. Оберіть метод дослідження для виявлення рентгеннегативних каменів слинних залоз?
Правильна відповідь	A. Уздіагностика
B	B. Реографія
C	C. Комп'ютерна рентгенографія
D	D. Прицільна рентгенографія
E	E. Термометрія
№	7. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	До амбулаторного хірургічного кабінету поступив пацієнт зі скаргами на больові відчуття в ділянці кута нижньої щелепи, утруднене ковтання. Об'єктивно: в ділянці 38 зуба слизова оболонка набрякла, гіперемована, має вигляд каптура. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий перикороніт 38 зуба
B	B. Локалізований гінгівіт в ділянці 38 зуба
C	C. Гострий серозний періодонтит 38 зуба
D	D. Хронічний гранулюючий періодонтит 38 зуба
E	E. Гострий гнійний періодонтит 38 зуба

№	8. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 23-х років звернувся зі скаргами на біль та припухлість в ділянці верхньої губи зліва. Внаслідок проведеного клінічного обстеження встановлено діагноз одонтогенний періостит верхньої щелепи зліва від 23 зуба. Рентгенологічно відмічаються ознаки гранулематозного періодонтиту 23 зуба. Виберіть тактику лікування:
Правильна відповідь	A. Періостотомія, консервативна терапія
B	B. Періостотомія, резекція верхівки кореня 23
C	C. Видалення 23
D	D. Консервативна терапія
E	E. Періостотомія, видалення 23
№	9. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	До хірурга-стоматолога звернулася хвора 60ти років із скаргами на наявність болючої виразки на боковій поверхні язика. Об'єктивно: на боковій поверхні язика зліва спостерігається виразка округлої форми з підритими м'якими нависаючими краями, болюча під час пальпації, дно виразки незначно кровоточить, вкрито жовтуватими вузликами. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Туберкульоз
B	B. Сифіліс
C	C. Травматична виразка
D	D. Актиномікоз
E	E. Трофічна виразка
№	10. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 47-ми років протягом 2-х років на шкірі обличчя в ділянці кута нижньої щелепи зліва спостерігається періодична поява болючої припухлості і утворення фістули. Після виділення з фістули гнійної рідини біль минає і припухлість зникає, а на шкірі обличчя залишається втягнутий невеликий рубець. Об'єктивно: невеликий рубець на шкірі обличчя на рівні лівого кута нижньої щелепи. У ділянці дна ротової порожнини під час пальпації під слизовою оболонкою в глибині визначається щільний тяж, який йде в м'яких тканинах щічної ділянки від фістули до проекції кореня 47 зуба. Коронка 47 зруйнована. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Одонтогенна гранульома обличчя
B	B. Атерома щоки, що нагноїлася
C	C. Туберкульоз нижньої щелепи

D	D. Актиномікоз лівої білявушно-жувальної ділянки
E	E. Хронічний остеомієліт в ділянці лівого кута нижньої щелепи
№	11. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 22-х років скаржиться на появу болючої припухлості в ділянці правої навколоушної слинної залози. За тиждень до цього у хворого було садно шкіри щоки, яке гоїлося під гнійним струпом. За останні два дні відмічає посилення болю і підвищення температури тіла до 38, 6°С . Об'єктивно: набряк м'яких тканин правої привушної ділянки, шкіра незначно напружена, не змінена в кольорі. Інфільтрат розміром 2,5х3,5 см, щільний, болючий, шкіра над ним обмежено рухлива. Рот відкриває в повному обсязі, слизова оболонка навколо гирла слинної протоки не змінена, слина прозора. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий лімфаденіт
B	B. Загострення хронічного паротиту
C	C. Абсцес білявушно-жувальної ділянки
D	D. Гострий неепідемічний паротит
E	E. Епідемічний паротит
№	12. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Пацієнт 30-ти років скаржиться на слабоболісний інфільтрат правої защеlepної ділянки, який зберігається впродовж 2-3 місяців. Прийняв призначений курс антибактеріальної терапії, покращення не було. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок слабоболісного інфільтрату правої защеlepної ділянки, дерев'янистої щільності, шкіра червоно-синюшно-фіолетового відтінку. На шкірі наявні нориці, з яких періодично виділяється гній з крупинками, також наявні щільні втягнуті рубці, відмічається безболісний тризм нижньої щелепи. Якому захворюванню найбільш імовірно відповідає описана клінічна картина?
Правильна відповідь	A. Актиномікоз защеlepної ділянки
B	B. Одонтогенна гранульома обличчя
C	C. Хронічний остеомієліт нижньої щелепи
D	D. Флегмона защеlepної ділянки
E	E. Хронічний лімфаденіт защеlepної ділянки
№	13. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Хворий 33-х років страждає від болю у ділянці комірки 47 зуба, видаленого з приводу хронічного періодонтиту. Температура тіла - 37, 5°. Помірна набряклість прилеглих тканин. Праві піднижньощелепні лімфовузли збільшені, болісні, рухливі. Слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні видаленого зуба набрякла, гіперемована. Неприємний запах з рота. Комірка зуба частково виповнена вмістом сірого кольору. Пальпація альвеолярного відростка у цій ділянці різко болісна. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	A. Альвеоліт
B	B. Гострий остеомиєліт (обмежений)
C	C. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи
D	D. Гострий серозний лімфаденіт
E	E. Неврит нижньокоміркового нерва
№	14. крок 2015, 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 30-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на нестерпний біль у язиці, різко болісне ковтання, набряк в ділянці підборіддя. Об'єктивно: шкіра на підборідді в кольорі не змінена, збирається в складку. Відкривання рота вільне. Язик збільшений в розмірах, малорухомий, щільний, відмічається рівномірний набряк язика, пальпація по середній лінії болісна. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	A. Абсцес кореня язика
B	B. Флегмона дна порожнини рота
C	C. Абсцес щелепно-язикового жолобка
D	D. Флегмона підборідної ділянки
E	E. Абсцес під'язикового валика
№	15. крок 2015, 2011, 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	До стоматолога звернувся хворий 30-ти років зі скаргами на припухлість в ділянці верхньої губи. згладжена. У ротовій порожнині на вестибулярній поверхні верхньої щелепи перехідна складка на рівні 11, 21, 22 згладжена, гіперемована, під час пальпації відчувається біль та флюктуація. Діагностовано гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 21. Оберіть тактику лікування:
Правильна відповідь	A. Збереження 21, періостеотомія, протизапальна терапія
B	B. Збереження 21, протизапальна терапія
C	C. Видалення 21, періостеотомія, протизапальна терапія
D	D. Видалення 21, періостеотомія

Е	Е. Видалення 12, 21, 22 зубів, періостеотомія, протизапальна терапія
№	16. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 40-ка років на рентгенограмі альвеолярного відростка правої верхньої щелепи, в ділянці верхівки кореня 13 зуба, відзначається просвітлення неправильної форми з нечіткими краями, що нагадує "язики полум'я". Для якого захворювання характерна така рентгенологічна картина?
Правильна відповідь	А. Хронічний гранулюючий періодонтит
В	В. Гострий серозний періодонтит
С	С. Гострий гнійний періодонтит
Д	Д. Хронічний фіброзний періодонтит
Е	Е. Хронічний гранульоматозний періодонтит
№	17. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У чоловіка 29-ти років у ділянці кута нижньої щелепи зліва є фурункул. Тканини, які його оточують, напружені. Синюшність і ущільнення у вигляді тяжу розповсюджується до кута ока. Загальний стан погіршений, температура тіла 38, 5°С . Яке ускладнення виникло у хворого?
Правильна відповідь	А. Тромбофлебіт лицевої вени
В	В. Абсцес щоки
С	С. Флегмона щоки
Д	Д. Гострий гайморит
Е	Е. Карбункул щоки
№	18. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 44-х років скаржиться на припухлість лівої щоки, біль на нижній щелепі зліва, підвищення температури до 37, 6°С . Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку лівої щоки нижньощелепної і підщелепної ділянок зліва. Відкривання рота не обмежене, по перехідній складці щільний болючий інфільтрат, в межах 47, 46, 45 зубів флюктуація. Коронка 46 зуба зруйнована на 2/3. Перкусія його болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи
В	В. Гострий остеомієліт нижньої щелепи
С	С. Гострий серозний періостит нижньої щелепи
Д	Д. Загострення хронічного періодонтиту

Е	Е. Флегмона піднижньощелепного простору
№	19. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 35-ти років три доби тому був видалений 47, після чого стан його погіршився. Об'єктивно: хворий блідий, температура тіла 38, 1°С, нижня щелепа зліва муфтоподібно потовщена, м'які тканини навколо неї набряклі, відкриття рота утруднене. Перехідна складка на рівні 48, 47, 46 набрякла, слизова оболонка гіперемована, з лунки 47 виділяється гній, перкусія 48, 46, 45 болюча. В ділянці нижньої губи - парестезія. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Гострий остеомиєліт нижньої щелепи
В	В. Гострий періостит нижньої щелепи
С	С. Флегмона підщелепної ділянки
Д	Д. Гострий періодонтит 47 зуба
Е	Е. Нагноєння радикулярної кісти нижньої щелепи
№	20. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Пацієнт 26-ти років скаржитися на наявність новоутворення в ділянці бічної поверхні шиї справа. Новоутворення вперше помітив 4 місяці тому, до лікаря не звертався. Об'єктивно: відмічається асиметрія обличчя за рахунок новоутворення правої верхньо-третьої бічної поверхні шиї. Пальпаторно відмічається безболісне новоутворення округлої форми, розміром 3х3,5 см, щільно-еластичної консистенції, шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, береться в складку. Новоутворення з оточуючими м'якими тканинами не спаяне, розташоване по ходу переднього краю груднино-ключично-сосцеподібного м'яза. В пунктаті - рідина світло-жовтого кольору, тягуча. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Бічна кіста шиї
В	В. Флегмона бічної поверхні шиї
С	С. Хронічний лімфаденіт бічної поверхні шиї
Д	Д. Ліпома бічної поверхні шиї
Е	Е. Гострий серозний лімфаденіт бічної поверхні шиї
№	21. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Чоловік 38-ми років звернувся зі скаргами на припухлість в ділянці щоки зліва, обмежене відкривання рота, відчуття жару, лихоманку. Під час обстеження виявлена асиметрія обличчя за рахунок припухлості в ділянці верхньої щелепи зліва. В ділянці горба верхньої щелепи зліва визначається щільний, болісний інфільтрат. Шкіра над інфільтратом щільна, болісна, у складку не збирається. Рот відкриває обмежено. Біль іррадіює у скроню та око. У порожнині рота 27 зуб зруйнований на 2/3, перкусія його болісна. Якому захворюванню притаманна дана клініка?
Правильна відповідь	A. Флегмона підскроневої і крилопіднебінної ямок
B	B. Флегмона скроневої ділянки
C	C. Флегмона щоки
D	D. Флегмона біляглоткового простору
E	E. Непідемічний паротит
№	22. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У чоловіка 30-ти років на шкірі крил носа з'явилися набряк і гіперемія, які розповсюдилися до шкіри верхньої губи і щоки. Під час обстеження виявлена тріщина по нижньозовнішньому краю лівого носового отвору. Шкіра напружена, щільна, червоносинюшного кольору, малюнок згладжений, температура місцево підвищена. Ділянка ураження має чіткі межі, неправильної форми. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Бешихове запалення
B	B. Актиномікоз шкіри
C	C. Туберкульоз шкіри
D	D. Рак шкіри
E	E. Тромбофлебіт лицевої вени
№	23. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У чоловіка 23-х років у ділянці верхньої губи справа є різкий набряк і щільний інфільтрат розміром 1,5x1,5 см. В центрі інфільтрату є крапкова некротична кірка. Після її зняття видно некротичний стовбур. Флюктуації немає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Фурункул
B	B. Бешихове запалення
C	C. Актиномікоз
D	D. Карбункул
E	E. Атерома
№	24. крок 2014

Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 34х років скаржитися на біль, припухлість м'яких тканин в ділянці нижньої щелепи зліва, погіршення загального стану. Біль та припухлість з'явилися 4 дні тому. При огляді обличчя асиметричне за рахунок припухлості м'яких тканин щічної та піднижньощелепної ділянок зліва. Відкривання рота не утруднене. 36 зуб зруйнований, корені на рівні ясен. У ділянці 35, 36, 37 зубів муфтоподібний інфільтрат. Перкусія 36 зуба болісна, 35, 37 різко болісна, зуби рухомі. Із пародонтальних кишень виділяється гній. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	А. Гострий остеомиєліт нижньої щелепи зліва
В	В. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи зліва
С	С. Флегмона щічної ділянки зліва
D	D. Пародонтальний абсцес у ділянці 36 зліва
Е	Е. Абсцес щелепноязикового жолобка зліва
№	25. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 37-ми років госпіталізований до щелепно-лицевого відділення з приводу хронічного одонтогенного остеомиєліту нижньої щелепи у ділянці 48, 47, 46 зубів. Об'єктивно: права половина нижньої щелепи потовщена, слизова альвеолярного відростка застійно гіперемована, на рівні "причинного"47 - нориця з рясним гнійним виділенням і вибухаючими грануляціями. Під час зондування нориці визначається оголена шорстка ділянка кістки, що зміщується при натисканні. На Ro-грамі нижньої щелепи - вогнище деструкції, у центрі якого розташований секвестр 1,0x1,5 см, повністю відділений від здорової кісткової тканини. Оберіть метод лікування:
Правильна відповідь	А. Секвестректомія
В	В. Стимулююча терапія
С	С. Санація порожнини рота
D	D. Антибіотикотерапія
Е	Е. Секвестректомія з видаленням 47
№	26. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хворої 36-ти років клінічно і рентгенологічно встановлено діагноз: слинокам'яна хвороба правої піднижньощелепної слинної залози з локалізацією каменя у протоці, з загостренням запального процесу (абсцес щелепно-язикового язичка). Яке лікування слід запропонувати у першу чергу?
Правильна відповідь	А. Розкриття абсцесу щелепно-язикового жолобка
В	В. Протизапальна терапія
С	С. Видалення зубного каменя

D	D. Внутрішньо пілокарпін
E	E. Фізіотерапевтичні процедури
№	27. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Пацієнт звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на підвищення температури тіла до $37,6^{\circ}C$, припухлість м'яких тканин, біль у зубі на нижній щелепі зліва, що посилюється при доторкуванні язиком або зубом-антагоністом. Об'єктивно: гіперемія та згладженість перехідної складки альвеолярного відростка з вестибулярного боку в ділянці зруйнованого 36. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий одонтогенний гнійний періостит
B	B. Гострий серозний періодонтит
C	C. Хронічний періодонтит в стадії загострення
D	D. Пародонтальний абсцес
E	E. Гострий одонтогенний остеомиєліт
№	28. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 42-х років скаржиться на біль у 26 зубі, який підсилюється при стисненні щелеп, слабкість, кволість, підвищення температури тіла до $38^{\circ}C$, головний біль, відчуття тиснення в лівій половині обличчя. Ліва половина носу закладена, з лівої ніздрі виділяється слизова рідина. Біль у зубі з'явився 3 дні тому. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку м'яких тканин лівої підочної ділянки. Слизова оболонка лівої половини носової порожнини гіперемована. Відкривання рота вільне. Слизова оболонка по перехідній складці в ділянці 26 зуба гіперемована. Коронкова частина 26 зруйнована на 2/3. Перкусія різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий одонтогенний гайморит
B	B. Гострий гнійний періодонтит 26
C	C. Гострий гнійний періостит від 26
D	D. Одонтогенна флегмона підочної ділянки
E	E. Одонтогенний гострий лімфаденіт щоки
№	29. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Хворий 32-х років скаржиться на біль у ділянці лівого СНЩС, що іррадіює у вухо, головний біль, погіршення загального стану, неможливість жування, обмежене відкривання рота. Обличчя симетричне. Шкіра в цій ділянці в кольорі не змінена. Біль посилюється при мінімальних рухах нижньої щелепи. Пальпація суглоба викликає незначний біль. Відкриття рота трохи обмежене. Подібні симптоми відзначав і раніше впродовж 3-х років. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного артрити лівого СНЩС
B	B. Гострий артрит лівого СНЩС
C	C. Гострий гнійний паротит зліва
D	D. Деформуючий артроз лівого СНЩС
E	E. Міогенний остеоартроз лівого СНЩС
№	30. крок 2013, 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	До клініки звернувся пацієнт 62-х років з діагнозом: артроз СНЩС. Проведено рентгенологічне обстеження. Назвіть правильно рентгенологічну картину при артрозах СНЩС:
Правильна відповідь	A. Зміна форми кісткових елементів суглоба
B	B. Звуження суглобової щілини
C	C. Розширення суглобової щілини
D	D. Відсутність суглобової щілини
E	E. Ущільнення кортикального шару суглобової головки
№	31. . крок 2013, 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 39-ти років госпіталізована у відділення щелепно-лицевої хірургії з приводу припухлості та розпираючого болю у лівій підщелеповій ділянці. Припухлість з'явилася після прийому гострої їжі. Після клінічного огляду, пальпації та рентгенологічного обстеження діагностовано калькульозний сіалоаденіт підщелепової залози з локалізацією каменя в передньому відділі протоки. Якою є правильна тактика хірурга-стоматолога після видалення каменя з протоки?
Правильна відповідь	A. Рану і протоку не ушивати і не дрениувати
B	B. Ушити рану по ходу розтину
C	C. Рану по ходу розтину ушити та задренувати
D	D. Провести пластику вивідної протоки
E	E. Ушити вивідну протоку і рану
№	32. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Хворий 59-ти років скаржиться на наявність припухлості м'яких тканин і біль у зубі нижньої щелепи справа, підвищення температури тіла до 37, 5° С. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин у ділянці тіла нижньої щелепи справа. Слизова оболонка альвеолярного відростка у ділянці 46 зуба гіперемована, набрякла, перехідна складка згладжена. Пальпаторно визначається інфільтрат, 46 зуб під коронкою рухливий, перкусія різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 46
B	B. Загострення хронічного періодонтиту 46
C	C. Абсцес правої щоки
D	D. Гострий гнійний надщелеповий лімфаденіт
E	E. Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи справа від 46
№	33. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 33-х років звернувся в клініку зі скаргами на періодично виникаюче порушення носового дихання, відчуття важкості в лівій половині голови. При риноскопії виявлена гіпертрофія нижньої носової раковини, синюшність. При огляді порожнини рота виявлено зруйнований 26 зуб, який періодично турбує хворого. На рентгенограмі верхньощелепної пазухи відмічається пристіночне затемнення її, особливо в ділянці дна. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	A. Хронічний одонтогенний катаральний гайморит
B	B. Хронічний одонтогенний поліпозно-гнійний гайморит
C	C. Інтерстиціальна кіста верхньощелепної пазухи
D	D. Біякоренева кіста
E	E. Гострий одонтогенний гайморит
№	34. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	До хірурга-стоматолога звернулася хвора 36-ти років зі скаргами на наявність утворення у підборідній ділянці, яке повільно і безболісно збільшується у розмірах. Об'єктивно: у підборідній ділянці визначається округлий інфільтрат з чіткими межами, слабкоболісний, достатньо щільний, з ділянками розм'якшення, синюшного кольору, шкіра над ним витончена. Під час пальпації у присінку порожнини рота визначається щільний тяж, що йде від утворення до зруйнованого 33 зуба. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	A. Одонтогенна підшкірна гранульома обличчя
B	B. Атерома підборідної ділянки

C	C. Одонтогенний абсцес підборідної ділянки
D	D. Хронічний лімфаденіт підпідборідної ділянки
E	E. Гострий гнійний лімфаденіт підпідборідної ділянки
№	35. крок 2012, 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	При розтині флегмони дна порожнини рота в гнійних осередках виявлені некротичні маси брудно-сірого кольору, наявність в них пухирців газу та крапельок жиру, різкий неприємний запах ексудату. Тканини мають темно-буре забарвлення, м'язи - вигляд вареного м'яса. Які медикаментозні засоби слід призначити першочергово з метою попередження поширення процесу?
Правильна відповідь	A. Введення полівалентної протигангренозної сироватки
B	B. Введення ударної дози антибіотиків широкого спектру дії
C	C. Введення глюкокортикоїдних препаратів
D	D. Введення гіпосенсибілізуючих препаратів
E	E. Введення імуномодуляторів
№	36. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 28-ми років звернувся до стоматолога з приводу обмеженого інфільтрату і нориці у ділянці лівої щоки, синюшності шкіри, незначної болісності. Об'єктивно: 46 зуб періодонтитний, по перехідній складці тяж, що йде до поверхні шкіри у проекції даного зуба. Для якого захворювання характерні вказані клінічні ознаки?
Правильна відповідь	A. Мігруюча гранульома
B	B. Актиномікоз щоки
C	C. Гума щоки
D	D. Хронічний остеомієліт щелепи
E	E. Туберкульоз лімфовузлів щоки
№	37. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 56-ти років скаржиться на шум та клацання в ділянці лівого СНЩС, обмежене відкривання рота (особливо зранку), зміщення нижньої щелепи в сторону при відкриванні рота. На панорамній зонограмі лівого СНЩС в боковій проекції відмічено зменшення висоти головки та її сплюснення, остеофіт на її передній суглобовій поверхні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Артроз лівого СНЩС
B	B. Артрит лівого СНЩС

C	C. Передній вивих лівого СНЩС
D	D. Синдром больової дисфункції СНЩС
E	E. Анкілоз лівого СНЩС
№	38. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У пацієнта на верхній губі різко болісний, обмежений інфільтрат, що здіймається над рівнем здорової шкіри, конусоподібної форми з гнійно-некротичним стрижнем у центрі. Температура тіла 39, 0° C. Хворіє 5 днів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Фурункул
B	B. Карбункул
C	C. Остеофолікуліт
D	D. Глибокий фолікуліт
E	E. Сибірковий карбункул
№	39. . крок 2012, 2011, 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Жінка 48-ми років звернулася зі скаргами на тупий ниючий біль у ділянці лівого СНЩС, що посилюється під час прийому твердої їжі, який з'явився близько 2,5 років тому. Об'єктивно: відкривання рота дещо обмежене, під час відкривання щелепа зміщується вбік, чути хрускіт у СНЩС. У порожнині рота - вторинна часткова адентія. На рентгенограмі визначається склероз кортикальної пластинки та звуження суглобової щілини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Артроз СНЩС
B	B. Хронічний артрит СНЩС
C	C. Гострий артрит СНЩС
D	D. Больова дисфункція СНЩС
E	E. Загострення хронічного артрити СНЩС
№	40. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	До лікаря звернувся хворий зі скаргами на періодичний біль у фронтальному відділі верхньої щелепи. З анамнезу: 12 зуб раніше лікований з приводу пульпіту. Об'єктивно: коронка 12 відновлена за допомогою пломби. На Ro-грамі верхньої щелепи виявляється осередок деструкції кісткової тканини біля верхівки кореня 12 діаметром до 1 см. Кореневий канал 12 запломбований до верхівки. Встановлено діагноз: кістогранульома 12 зуба. Оберіть оптимальний метод лікування:

Правильна відповідь	A. Резекція верхівки кореня 12
B	B. Видалення 12
C	C. Консервативне лікування
D	D. Розтин по перехідній складці
E	E. Реплантація 12
№	41. крок 2011, 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 30-ти років на 7-й день після операції на черевній порожнині виникли біль і припухлість в ділянці лівої привушної слинної залози. Об'єктивно: температура тіла 39°С, обмеження відкривання рота, сухість у роті; при масажі залози з'являється гнійний ексудат з її протоки. Яке захворювання можна діагностувати у даного хворого?
Правильна відповідь	A. Гострий неепідемічний паротит
B	B. Гострий епідемічний паротит
C	C. Флегмона субжувального простору
D	D. Паренхіматозний паротит
E	E. Флегмона привушно-жувальної ділянки
№	42. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 53-х років скаржиться на біль, хрускіт, клацання при прийомі їжі в ділянці суглоба нижньої щелепи зліва. При рентгенологічному обстеженні виявлено крайові кісткові розростання суглобових поверхонь. Зуби інтактні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Деформуючий артроз
B	B. Гострий артрит
C	C. Підвивих нижньої щелепи
D	D. Невралгія трійчастого нерва
E	E. Запалення жувального м'яза
№	43. . крок 2011, 2009
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	До відділення щелепно-лицевої хірургії надійшла жінка 37-ми років зі скаргами на біль у щоці, що посилюється під час дотику. З анамнезу відомо що 5 днів тому впала з драбини та забила щоку. Об'єктивно: в товщі щоки виявлено обмежений інфільтрат, шкіра щоки гіперемована, важко береться у складку, симптом флюктуації. Слизова оболонка набрякла, з відбитками зубів. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	A. Нагноєна гематома щоки
B.	Травматичний остеомієліт нижньої щелепи
C.	Гематома щоки
D.	Флегмона щоки
E.	Гострий лімфаденіт
№	44. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У чоловіка 52-х років з діагнозом: генералізований пародонтит III ступеня важкості, загострений перебіг, діагностований пародонтальний абсцес між 45 і 46 у ділянці проекції верхівок коренів. Вкажіть оптимальний варіант розрізу для розтину абсцесу у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Паралельно ясеневому краю ближче до перехідної складки
B.	Паралельно ясеневому краю ближче до краю ясни
C.	Перпендикулярно ясеневому краю
D.	T-подібний розріз
E.	Через пародонтальну кишеню
№	45. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 28-ми років надійшов до щелепно-лицевого стаціонару з діагнозом: карбункул обличчя. Об'єктивно: стан хворого вкрай важкий, набряк і ціаноз обличчя, слизової оболонки губ, кон'юнктиви. Температура тіла 40° С . Маячіння, галюцинації. На верхній губі розташований карбункул, м'які тканини навколо нього набряклі. Очні щілини закриті за рахунок набряку повік. Яке ускладнення карбункулу найбільш імовірне?
Правильна відповідь	A. Тромбоз кавернозного синуса
B.	Менінгіт
C.	Абсцес мозку
D.	Сепсис
E.	Флегмона орбіти
№	46. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Хворий звернувся до хірурга-стоматолога для видалення коренів 36. Зуб зруйнований давно. Об'єктивно: коронка зруйнована на 2/3, перкусія безболісна, слизова оболонка у ділянці 36 без видимих патологічних змін. На Ro-грамі альвеолярного відростка біля верхівки медіального кореня ділянка просвітлення з чіткими контурами, округлої форми. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	A. Хронічний гранулематозний періодонтит
B	B. Загострення хронічного періодонтиту
C	C. Хронічний гранулюючий періодонтит
D	D. Гострий гнійний періодонтит
E	E. Хронічний фіброзний періодонтит
№	47. . крок 2011, 2009
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 32-х років скаржиться на біль і припухлість у ділянці нижньої щелепи і щоки зліва. Хворіє впродовж двох днів. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Температура тіла 37, 5° C . набряк м'яких тканин щічної ділянки зліва. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені з обох боків, болісні під час пальпації. Коронка 37 частково зруйнована, зуб нерухомий, перкусія слабо болісна. Перехідна складка у ділянці 37 набрякла, гіперемована, згладжена, пальпація різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 37
B	B. Гострий одонтогенний остеомиєліт нижньої щелепи від 37
C	C. Хронічний продуктивний періостит нижньої щелепи від 37
D	D. Хронічний одонтогенний остеомиєліт нижньої щелепи від 37
E	E. Абсцес щелепно-язикового жолобка зліва
№	48. . крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 42-х років скаржиться на поганий загальний стан. Температура тіла 41°С, відмічаються нудота, блювання, задишка. На обличчі виражене почервоніння шкіри з чіткими обрисами у вигляді язиків полум'я. Піднижньощелепні лімфатичні вузли збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Бешиха
B	B. Стрептодермія
C	C. Флебїт лицевої вени
D	D. Вовчак шкіри
E	E. Сибїрка

№	49. крок 2010, 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Чоловік 43-х років звернувся до лікаря зі скаргами на болісне ковтання, обмежене відкривання рота. 3 дні тому почав боліти зруйнований 37, наступного дня з'явився біль при ковтанні, ще через день почалося обмеження відкривання рота. Об'єктивно: невелика м'яка припухлість в лівій підщелепній ділянці. Пальпується збільшений лімфатичний вузол. Рот відкривається на 1,5 см. Спостерігається набряк лівої піднебінної дужки та бокової стінки глотки. 37 зруйнований, слизова оболонка навколо зуба набрякла, перкусія слабо болісна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Одонтогенна навкологлоткова флегмона
B	B. Одонтогенна крило-щелепна флегмона
C	C. Одонтогенна підщелепна флегмона
D	D. Перитонзиллярний абсцес
E	E. Гострий підщелепний лімфаденіт
№	50. крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хвора звернулася зі скаргами на біль та припухлість в правій підщелепній ділянці. Впродовж тижня лікувала 45. Об'єктивно: температура тіла 38°C. В правій підщелепній ділянці болісний, напружений інфільтрат. Шкіра не береться в складку, гіперемована, блищить. Рот відкривається на 3 см. Ковтання безболісне. Якому захворюванню відповідає зазначена вище клінічна картина?
Правильна відповідь	A. Одонтогенна флегмона правої підщелепної ділянки
B	B. Абсцес правого щелепно-язикового жолоба
C	C. Аденофлегмона правої підщелепної ділянки
D	D. Гострий гнійний сіалоаденіт
E	E. Флегмона крилощелепного простору
№	51. крок 2010, 2009, 2008, 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 43-х років скаржиться на новоутворення у правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Проводилась протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. Об'єктивно: температура тіла 37, 2°C. У правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабкоболісне кулясте новоутворення щільноеластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під'язиковий валик не змінений. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний лімфаденіт

B	B. Хронічний сіалоаденіт
C	C. Слинокам'яна хвороба
D	D. Аденома слинної залози
E	E. Атерома
№	52. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Після складного видалення 37 у хворого виникла анестезія в ділянці лівої половини нижньої губи та підборіддя. При обстеженні на ЕОД відзначено зниження електрозбудливості зубів нижньої щелепи зліва. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Неврит лівого нижньоальвеолярного нерва
B	B. Невралгія лівого нижньоальвеолярного нерва
C	C. Альвеоліт у ділянці комірки 37 зуба
D	D. Herpes Zoster n.Trigemini
E	E. Гострий остеомієліт тіла нижньої щелепи
№	53. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 30-ти років скаржитися на підвищення температури тіла до 39°C, погіршення загального самопочуття, наявність інфільтрату округлої форми на верхній губі. Хворіє 3 дні. Об'єктивно: в ділянці верхньої губи зліва інфільтрат округлої форми в діаметрі 2,5 см, шкіра над ним багряного кольору з некротичним стрижнем в центрі. Верхня губа гіперемована, набрякла. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Фурункул верхньої губи
B	B. Карбункул верхньої губи
C	C. Ретенційна кіста верхньої губи
D	D. Гострий періостит верхньої щелепи
E	E. Гострий гнійний лімфаденіт
№	54. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 30-ти років діагностований післятравматичний остеомієліт нижньої щелепи у ділянці тіла справа. Травма відбулася 1,5 місяці тому. На рентгенограмі визначається лінія перелому і тінь сформованого кісткового секвестру в лінії перелому. На шкірі має місце нориця з гнійним виділенням. Визначте тактику лікування:
Правильна відповідь	A. Висічення нориці, секвестрэктомія

В	В. Фізіотерапевтичне лікування
С	С. Секвестректомія
Д	Д. Висічення нориці
Е	Е. Висічення нориці, антибактеріальна терапія
№	55. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Чоловік 54-х років скаржиться на біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що з'явився три дні тому і поступово наростає, підвищення температури тіла до 37, 2°C. Об'єктивно: слизова ясен набрякла, гіперемована, легко кровить. Пародонтальні кишені 6-7 мм з незначними гнійними виділеннями. У ділянці 26 пальпується болісний інфільтрат. Рухливість 26 III ступеня, решти зубів I-II ступеня. Рентгенологічно: у ділянці 26 визначається резорбція міжальвеолярних перегородок на 2/3 довжини коренів. Яка оптимальна тактика стосовно 26?
Правильна відповідь	А. Видалення
В	В. Тимчасове шинування, консервативна терапія
С	С. Кюретаж пародонтальної кишені
Д	Д. Розкриття абсцесу через ясну
Е	Е. Розкриття абсцесу через пародонтальну кишеню
№	56. крок 2009, 2008, 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 42-х років скаржиться на біль у підщелепній ділянці та під язиком, який посилюється під час приймання їжі, підвищення температури тіла до 37, 6° С. Хворіє два місяці. Об'єктивно: по ходу правого під'язикового валика інфільтрація, гіперемія, набряк м'яких тканин, різкий біль під час пальпації. З протоки правої піднижньощелепної слинної залози виділяється каламутна слина з домішками гною. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Загострення слинокам'яної хвороби
В	В. Гострий гнійний лімфаденіт підщелепної ділянки
С	С. Аденофлегмона підщелепної ділянки
Д	Д. Абсцес щелепно-язикового жолобка
Е	Е. Ретенційна кіста під'язикової слинної залози
№	57. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Хворий 32-х років скаржиться на наявність нориці в підщелепній ділянці. Об'єктивно: припухлість щоки в ділянці нижньої щелепи зліва, під час пальпації ущільнення - м'яких тканин. В проекції 35, 36 на яснах - нориця з гнійним вмістом і грануляціями; слизова гіперемована, 35, 36 рухомі. На рентгенограмі - деструкція кістки, наявність секвестру. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний остеомиєліт
B	B. Актиномікоз
C	C. Сифіліс
D	D. Саркома
E	E. Остеома
№	58. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржиться на підвищення температури тіла до 38° C, наявність інфільтрату округлої форми на верхній губі. Об'єктивно: у ділянці верхньої губи зліва інфільтрат округлої форми, шкіра над інфільтратом буря-кового кольору, спаяна з навколишніми тканинами, з некротичним стрижнем в центрі. Верхня губа гіперемована, набрякла. Який діагноз можна встановити?
Правильна відповідь	A. Фурункул верхньої губи
B	B. Гострий періостит верхньої губи
C	C. Ретенційна кіста
D	D. Гострий лімфаденіт
E	E. Карбункул верхньої губи
№	59. крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Чоловік 25-ти років скаржиться на свербіж та почервоніння шкіри у щічній ділянці, загальну слабкість, квалість. Початок захворювання пов'язує з травмування шкіри під час гоління. Об'єктивно: температура 39, 0° C. У щічній області ділянка шкіри гіперемована, межі чіткі. На гіперемованій поверхні наявні пухирі із серозною рідиною. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Бешихове запалення обличчя
B	B. Флегмона щічної ділянки
C	C. Фурункул
D	D. Сибірка
E	E. Стрептодермія

№	60. крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У чоловіка 48-ми років на шкірі підборіддя з'явилася пустула, яка швидко розвинулася до щільного, різко болісного інфільтрату розміром 3x5 см. Шкіра над ним синьо-червоного кольору. У центрі три зони некрозу навколо волосяних фолікулів. Лімфовузли підборіддя збільшені, болісні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Карбункул підборіддя
B	B. Бешихове запалення підборіддя
C	C. Актиномікоз шкіри підборіддя
D	D. Атерома, яка нагноїлася
E	E. Фурункул підборіддя
№	61. . крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У чоловіка 30-ти років на шкірі крил носа з'явилися набряк і гіперемія, які поширилися до шкіри верхньої губи і щоки. Під час обстеження виявлена тріщина по нижньозовнішньому краю лівого носового отвору. Шкіра напружена, щільна, червоно-синюшного кольору, малюнок згладжений, підвищення місцевої температури. Ділянка ураження має чіткі межі, неправильну форму. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Бешихове запалення
B	B. Актиномікоз шкіри
C	C. Туберкульоз шкіри
D	D. Рак шкіри
E	E. Тромбофлебіт лицевої вени
№	62. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 36-ти років звернулася зі скаргами на постійний біль у зубах верхньої щелепи, підвищення температури тіла. Лікар виявив, що 26 неодноразово був лікований, решта зубів інтактні. Після рентгенологічного обстеження встановлено діагноз: гострий гайморит. Вкажіть найбільш ефективний метод лікування:
Правильна відповідь	A. Видалення причинного зуба і медикаментозна терапія
B	B. Гайморотомія за Колдуел-Люком
C	C. Пункція гайморової порожнини і медикаментозна терапія
D	D. Медикаментозна терапія
E	E. Медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування
№	63. крок 2008

Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Чоловік 34-х років скаржиться на сильний головний біль, підвищення температури тіла до 39, 1 ⁰ С, нездужання. Об'єктивно: незначна асиметрія обличчя за рахунок набряку м'яких тканин лівої підочної ділянки. Коронка 26 частково зруйнована. Перкусія - різко болюча. Слизова оболонка з вестибулярного боку в ділянці 25, 26 набрякла, гіперемована. Дихання через ліву половину носа затруднене, виділяється гній. На рентгенограмі: ліва половина верхньощелепової пазухи гомогенно затемнена. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	А. Гострий гнійний одонтогенний гайморит
В	В. Загострення хронічного Pt 26
С	С. Гострий періостит верхньої щелепи
D	D. Нагноєння кістки верхньої щелепи
Е	Е. Гострий одонтогенний остеомієліт
№	64. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хвора 32-х років звернулася до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота перед протезуванням. Під час огляду порожнини рота лікар визначив: коронка 25 зуба зруйнована, корінь стійкий, перкусія його безболісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка не змінена. На рентгенограмі - незначне розширення періодонтальної щілини. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	А. Хронічний фіброзний періодонтит 25 зуба
В	В. Хронічний періодонтит 25 зуба
С	С. Хронічний гранулематозний періодонтит 25 зуба
D	D. Хронічний гранулюючий періодонтит 25 зуба
Е	Е. Кістогранульома
№	65. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворого турбують гострий інтенсивний біль та припухлість в ділянці зруйнованого зуба на нижній щелепі праворуч, погіршення загального самопочуття, підвищення температури тіла до 38, 3 ⁰ С, погіршення апетиту та безсоння. Об'єктивно: колатеральний набряк м'яких тканин піднижньощелепної ділянки і нижнього відділу правої щоки. Регіональні лімфатичні вузли збільшені з правого боку, болючі під час пальпації. Коронка 46 зруйнована наполовину, 45, 46, 47 - рухомі, в ділянці цих зубів відзначається муфтоподібний інфільтрат. Симптом Венсана позитивний з правого боку. Який діагноз слід поставити?
Правильна відповідь	А. Гострий одонтогенний остеомієліт

В	В. Гострий гнійний одонтогенний періостит
С	С. Гострий гнійний періодонтит
Д	Д. Хронічний одонтогенний остеомієліт в стадії загострення
Е	Е. Хронічний одонтогенний остеомієліт
№	66. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 40-ка років, з переломом нижньої щелепи, звернувся до лікаря через 3 тижні після іммобілізації відламків у зв'язку з появою болю, підвищенням температури тіла. Об'єктивно: припухлість в ділянці підборіддя, слизова альвеолярного паростка в ділянці 21, 12 гіперемована, набрякла, болісна при пальпації. Назубна шина на 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 в задовільному стані, порушення прикусу не було. Виставлено діагноз: гострий гнійний періостит нижньої щелепи. Яка хірургічна маніпуляція показана?
Правильна відповідь	А. Розкриття гнійника до кістки
В	В. Внутрішньоротова новокаїнова блокада
С	С. Зняття і заміна назубної шини
Д	Д. Трепанція 21 та 12 зубів
Е	Е. Спостереження за хворим
№	67. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 43-х років звернувся зі скаргами на рухомість 24, 26, 27 зубів, виділення гною з лунки видаленого 25 зуба. Півтора місяця тому зроблено розтин по перехідній складці, видалено 25 зуб. Об'єктивно: в правій підочній ділянці невелика припухлість м'яких тканин, лімфовузли лівої підщелепної ділянки збільшені, слабо болісні, носове дихання вільне. Слизова оболонка альвеолярного паростка в ділянці 24, 26, 27 зубів набрякла, синюшного, кольору. По перехідній складці - норича з вибухаючими грануляціями. З лунки видаленого 5 зуба - гнійні грануляції. Якому захворюванню найбільш вірогідно відповідає зазначена клінічна картина?
Правильна відповідь	А. Хронічний обмежений остеомієліт
В	В. Гострий остеомієліт
С	С. Загострення обмеженого пародонтиту
Д	Д. Загострення хронічного гаймориту
Е	Е. Хронічний альвеоліт
№	68. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Пацієнт 23-х років звернувся зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці 12 зуба. На рентгенограмі в ділянці верхівки кореня 12 зуба визначається розрідження з чіткими краями, діаметром до 8-10 мм. Який метод хірургічного лікування є найбільш доцільним?
Правильна відповідь	A. Резекція верхівки кореня
B	B. Ампутація кореня
C	C. Гемісекція
D	D. Видалення зуба
E	E. Цистотомія
№	69. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий був госпіталізований до щелепно-лицевого відділення з діагнозом одонтогенна флегмона дна порожнини рота. Об'єктивно: загальний стан хворого важкий, положення в ліжку вимушене - сидячи з нахилою допереду головою. Скаржиться на біль за грудниною, що посилюється при спробі нахилу голови дозад, кашель, задишка. Яке ускладнення розвинулось у даного пацієнта?
Правильна відповідь	A. Медіастеніт
B	B. Флегмона заглоткового простору
C	C. Флегмона ший
D	D. Флегмона кореня язика
E	E. Флегмона навкологлоткового простору
№	70. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 36-ти років з'явилися симптоми, які характерні для хронічного гаймориту: головний біль, наявність фістули в ділянці видаленого п'ять місяців тому 27 зуба. Яке лікування необхідно провести цьому хворому?
Правильна відповідь	A. Гайморотомія з одночасною пластикою фістули
B	B. Ушиття фістули
C	C. Тампонада фістули йодоформною турундою
D	D. Консервативна терапія
E	E. Гайморотомія
№	71. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Хвора 28-ми років звернулася на 3-ю добу після видалення 16. У місці ін'єкції помітила м'яку, слабкоболісну припухлість з синюшним відтінком. Скаржиться на біль за верхньою щелепою, що іррадіює у скроню, око, половину голови. Об'єктивно: t^0 37, 8 ⁰ С. Обличчя асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин правих щічної, виличної, нижньої частини скроневої ділянок. Контрактура. У порожнині рота, в комірці видаленого 16 зуба, кров'яний згусток. По перехідній згортці праворуч, на рівні 18, слизова гіперемована, набрякла, під час пальпації різко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Постін'єкційна флегмона підскроневої ямки праворуч
B	B. Гострий періостит верхньої щелепи з правого боку від 16 зуба
C	C. Постін'єкційна флегмона виличної ділянки праворуч
D	D. Одонтогенна флегмона скроневої ділянки з правого боку від 16 зуба
E	E. Одонтогенна флегмона підскроневої ямки з правого боку від 16 зуба
№	72. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворому видалено 37 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. Через три дні він повторно звернувся до лікаря зі скаргами на постійний ниючий біль у ділянці видаленого зуба. Інтенсивність болю постійно зростає. Під час огляду встановлено: слизова оболонка альвеолярного відростка у ділянці 37 різко гіперемована, болісна. Комірка видаленого 37 вкрита сіруватим нальотом. З рота неприємний запах. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Альвеоліт
B	B. Гострий остеомієліт нижньої щелепи
C	C. Гострий періостит
D	D. Гострий лімфаденіт
E	E. Перікороніт
№	73. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Дитина 8-ми років скаржиться на гострий біль у нижній щелепі з лівого боку. Зі зменшенням постійного болю на 3-тю добу з'явився набряк тканин щоки. Об'єктивно: загальний стан середньої важкості, t^0 - 38, 2 ⁰ С. Виражений набряк тканин щічної ділянки. Шкірні покриви в цій ділянці гіперемовані. Регіонарний лімфаденіт. Корені 74 на рівні ясни. 73, 75, 36 без патології. Перехідна складка з вестибулярного боку згладжена через підокісний запальний інфільтрат, що флюктує по всій поверхні. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний періостит

B	B. Гострий серозний періостит
C	C. Загострення хронічного остеомиєліту
D	D. Загострення хронічного періодонтиту
E	E. Гострий одонтогенний остеомиєліт
№	74. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Пацієнт 30-ти років скаржиться на інфільтрат правої защеlepної ділянки, який утримується протягом 2-3-х місяців. Курс антибактеріальної терапії ефекту не дав. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок слабо-болісного інфільтрату правої защеlepної ділянки, дерев'янистої щільності, шкіра червоно-синюшного відтінку. На шкірі є нориці, з них періодично виділяється гній з крупинками, мають місце щільні втягнуті рубці, відмічається безболісний тризм нижньої щелепи. Яке захворювання найбільш вірогідно в хворого?
Правильна відповідь	A. Актиномікоз защеlepної ділянки
B	B. Одонтогенна гранульома обличчя
C	C. Хронічний остеомиєліт нижньої щелепи
D	D. Флегмона защеlepної ділянки
E	E. Хронічний лімфаденіт защеlepної ділянки
№	75. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 49-ти років скаржиться на рухомість 24, 26, 27; виділення гною з комірки видаленого 25 (видалений 1,5 місяці тому, зроблено розтин по перехідній складці). Об'єктивно: в підочний ділянці невелика припухлість м'яких тканин, слабкоболісні збільшені підщелепні лімфовузли ліворуч, вільне носове дихання. Слизова оболонка альвеолярного відростка в ділянці 24, 26, 27 набрякла, синюшна. По перехідній складці - нориця з вибухаючими грануляціями. З комірки видаленого 25 - гнійні грануляції. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний остеомиєліт
B	B. Гострий остеомиєліт
C	C. Загострення хронічного гаймориту
D	D. Альвеоліт
E	E. Загострення обмеженого пародонтиту
№	76. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД

Текст завдання	Пацієнт 42-х років хворіє близько 1 року. Об'єктивно: асиметрія обличчя внаслідок деформації верхньої щелепи. Шкірні покриви над деформацією не змінені. Оніміння шкіри в підочній ділянці, смердючі гнійно-геморагічні виділення з носа. 24, 25, 26, 27 зуби мають рухомість III ст. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені, рухомі. На рентгенограмі додаткових пазух носа відзначається затемнення верхньощелепної пазухи ліворуч та резорбція її зовнішньої стінки. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Злоякісна пухлина верхньої щелепи зліва
B	B. Остеобластокластома верхньої щелепи зліва
C	C. Перелом верхньої щелепи зліва
D	D. Хронічний одонтогенний гайморит зліва
E	E. Актиномікоз верхньої щелепи зліва
№	77. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Дівчинка 6-ти місяців направлена на консультацію з приводу виразки на піднебінні, що з'явилася 3,5 місяці тому. З анамнезу: народилася недоношеною, вигодовування штучне. Об'єктивно: на твердому піднебінні ліворуч, при переході на м'яке, визначається виразка розміром 1,3x0,8 см овальної форми, вкрита жовто-сірим нальотом, з вираженим інфільтраційним валом. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Афта Беднара
B	B. Рецидивний афтозний стоматит
C	C. Гострий герпетичний стоматит
D	D. Афта Сеттона
E	E. Вроджений сифіліс
№	78. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У чоловіка 20-ти років дві доби тому заболів 26 зуб, з'явилася болісна припухлість у ділянці верхньої щелепи з лівого боку. Температура тіла 37, 5 ⁰ C. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості в ділянці лівої щоки та підочної ділянки. З боку порожнини рота: набряк та гіперемія слизової оболонки альвеолярного відростка та перехідної складки в межах 25-27. Ці зуби нерухомі. Під час пальпації по перехідній складці - флюктуація. Перкусія 26 - слабкоболісна. Коронка його зруйнована повністю. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий одонтогенний періостит
B	B. Загострення хронічного періодонтиту
C	C. Гострий одонтогенний остеомієліт

D	D. Гострий одонтогенний гайморит
E	E. Нагноєна кіста верхньої щелепи
№	79. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У чоловіка 20-ти років у ділянці верхньої губи з правого боку є різкий набряк та щільний інфільтрат розміром 1,5x1,5 см. В центрі інфільтрату є крапкова некротична кірка. Після зняття її видно некротичний стовбур. Флюктуації немає. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Фурункул
B	B. Сибірковий карбункул
C	C. Актиномікоз шкіри
D	D. Карбункул
E	E. Атерома, що нагноїлася
№	80. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У хворого 43-х років після видалення 26 виникло сполучення із верхньощелепною пазухою. Рентгенологічно змін у верхньощелепних пазухах не виявлено. Якою буде тактика хірурга-стоматолога з метою профілактики виникнення гаймориту?
Правильна відповідь	A. Пластичне закриття сполучення
B	B. Тампонада комірки йодоформною турундою
C	C. Заповнення комірки гемостатичною губкою
D	D. Промивання пазухи розчином антибіотика
E	E. Заповнення комірки кров'яним згортком
№	81. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 48-ми років скаржитися на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до 39, 8 ⁰ С, наявність на шкірі підборіддя болісного осередку. Об'єктивно: на шкірі підборіддя щільний, різко болісний інфільтрат розміром 3x5 см. Шкіра на ним синьо-червоного кольору. У центрі осередку три зони некрозу навколо волосяних фолікулів. Лімфовузли підборіддя збільшені, болісні. Яке захворювання виникло в пацієнта?
Правильна відповідь	A. Карбункул підборіддя
B	B. Бешиха підборідньої ділянки
C	C. Актиномікоз шкіри підборіддя

D	D. Атерома, що нагноїлася
E	E. Фурункул підборіддя
№	82. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 33-х років скаржиться на виразку дна порожнини рота, яка розташована від 45 до 35 зуба між тілом нижньої щелепи та під'язиковим валиком. Вона утруднює рухомість язика, мову та приймання їжі. При огляді відмічається щільний конгломерат підщелепних та підпідборідних лімфатичних вузлів, визначаються лімфатичні вузли в середньобочковому відділі шиї з правого боку. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Рак дна порожнини рота
B	B. Декубітальна виразка дна порожнини рота
C	C. Туберкульозна виразка дна порожнини рота
D	D. Виразково-некротичний стоматит
E	E. Сифілітична виразка
№	83. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Чоловік 25-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль в ділянці 38 напівретинованого зуба, обмежене відкривання рота, погіршення загального самопочуття, неприємний запах з рота. Хворіє 7 тижнів. Об'єктивно: в порожнині рота слизовий клапоть над 38 зубом гіперемований, з-під нього виділяється гній. Перехідна складка напружена. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний перикороніт
B	B. Гострий серозний перикороніт
C	C. Гострий гнійний періостит
D	D. Гострий остеомієліт нижньої щелепи
E	E. Гострий виразковий перикороніт
№	84. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	У парубка 18-ти років в ділянці лівої носо-губної складки є фурункул. Тканини, які його оточують, напружені. Синюшність і ущільнення у вигляді тяжу розповсюджуються до медіального кута ока. Загальний стан порушений, температура тіла 38, 5° C. Яке ускладнення виникло?
Правильна відповідь	A. Тромбофлебіт лицевої вени
B	B. Абсцес підочної ділянки

С	С. Флегмона щоки
D	D. Гострий гнійний гайморит
Е	Е. Бешиха
№	85. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Хворий 27-ми років звернувся до хірурга-стоматолога з приводу загострення хронічного періодонтиту 17. Під час операції видалення зуба піднебінний корінь потрапив у гайморову пазуху. Яка тактика лікаря в даній ситуації?
Правильна відповідь	A. Провести рентгенологічне обстеження і направити хворого до стаціонару
B	B. Затампонувати комірку йодоформною марлею
С	С. Видалити корінь через перфораційний отвір, що утворився
D	D. Провести операцію гайморотомії
Е	Е. Ушити комірку видаленого зуба
№	86. . крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЩЛД
Текст завдання	Пацієнт 38-ми років звернувся до стоматологічної поліклініки зі скаргами на ниючий біль в ділянці 48, що посилюється при накушуванні, погіршення самопочуття та підвищення температури тіла до 37, 6°C. Об'єктивно: в ретромолярній ділянці незначна припухлість та гіперемія слизової оболонки. 48 вкритий слизовим каптуром, різко болісним під час пальпації, з-під нього виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний перікоронарит
B	B. Гострий пульпіт
С	С. Гострий періодонтит 48
D	D. Афтозний стоматит
Е	Е. Гострий гнійний періостит
№	1. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВІВ
Текст завдання	Хвора 46ти років звернулася до хірургастоматолога зі скаргами на пухлиноподібне утворення у білявушній ділянці справа. Діагностована змішана пухлина білявушної слинної залози справа. Хворій проведена резекція білявушної слинної залози, після чого з'явилася сглаженість носогубної складки, опущення кута рота; при вишкірянні зубів рот перетягується вліво. Яке ускладнення розвинулось у хворої?
Правильна відповідь	A. Неврит лицевого нерва
B	B. Невралгія третьої гілки трійчастого нерва

С	С. Неврит щічного нерва
D	D. Невралгія вушноскроневого нерва
Е	Е. Неврит трійчастого нерва
№	2. . крок 2013, 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВІВ
Текст завдання	Хвора 30-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на ниючий біль, відчуття оніміння у нижніх зубах, у ділянці нижньої губи і підборіддя справа. З анамнезу: скарги з'явилися тиждень тому після видалення ретинованого зуба мудрості нижньої щелепи справа. Яке захворювання розвинулось у хворої?
Правильна відповідь	A. Неврит нижньокоміркового нерва
B	B. Невралгія третьої гілки трійчастого нерва
С	С. Неврит лицевого нерва
D	D. Невралгія вушно-скроневого нерва
Е	Е. Неврит трійчастого нерва
№	3. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВІВ
Текст завдання	Хворий 62-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на інтенсивний нападopodobний біль у ділянці нижньої губи і підборіддя, який з'являється під час їжі та при розмові, триває до 5-7 хв. На добу до 5 нападів. На панорамній Ro-грамі виявлено ретинований, дистопований 35 зуб, який лежить косо, доходючи до нижньощелепового каналу. Діагноз: периферична невралгія III гілки трійчастого нерва. Оберіть метод лікування:
Правильна відповідь	A. Атипове видалення 35 зуба
B	B. Тривалі блокади анестетиками за типом мандибулярної анестезії
С	С. Голкотерапія (акупунктура)
D	D. Гіпноз
Е	Е. Декортикація нижньощелепового каналу з резекцією нервово-судинного пучка
№	4. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВІВ
Текст завдання	До стоматолога-хірурга звернувся пацієнт зі скаргами на напади болю, схожого на дію струму, в половині нижньої щелепи, оніміння половини язика, що з'явилися місяць тому після атипового видалення 38 зуба. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожева, комірка 38 зуба епітелізована. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Неврит язикового нерва
B	B. Неврит язикоглоткового нерва
С	С. Невралгія трійчастого нерва

D	D. Глосалгія
E	E. Глосит
№	5. . крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВІВ
Текст завдання	Хвора 52-х років скаржиться на сильний нападopodobний біль у ділянці 34 зуба. Протягом року через сильний біль були послідовно видалені 35, 36, 37. Перкусія 34 викликає різкий нападopodobний біль. Такий самий біль виникає у ділянці проекції ментального отвору під час розмови та вмиванні. Клінічне та рентгенологічне обстеження ознак деструкції кісткової тканини не виявило. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	A. Невралгія 3 гілки трійчастого нерва
B	B. Пульпіт 34
C	C. Неврит лицевого нерва
D	D. Гангліоніт крило-піднебінного вузла
E	E. Неврит 3 гілки трійчастого нерва
№	6. крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ НЕРВІВ
Текст завдання	Хвора 42-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на інтенсивний різучий нападopodobний біль з відчуттям проходження електроструму в ділянці верхньої губи справа. Больові напади виникають спонтанно і тривають 3-5 хвилин. Кількість нападів 2-3 рази на добу. Причини виникнення захворювання хвора визначити не може. При огляді ротової порожнини патологічних змін не виявлено. Санована. На контрольній ортопантограмі виявлено зверхкомплектний ретинований 13 зуб. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Периферична невралгія II-ої гілки трійчастого нерва
B	B. Гангліоніт крилопіднебінного вузла
C	C. Неврит II-ої гілки трійчастого нерва
D	D. Невралгія II-ої гілки трійчастого нерва центрального походження
E	E. Пульпіт зуба на верхній щелепі справа
№	1. крок 2016, 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИННИХ ЗАЛОЗ

Текст завдання	Хвора 45-ти років скаржиться на пухлиноподібне слабкоболісне новоутворення в правій привушній ділянці, яке виникло 2 місяці тому без жодної причини. Відзначає слабкість, деколи підвищення температури до $37,2-37,6^{\circ}C$. Півмісяця тому проведена протизапальна терапія, яка не дала позитивних результатів. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок незначної припухлості в правій привушній ділянці. Пальпаторно визначається округле новоутворення щільноеластичної консистенції з рівними контурами, слабкоболісне, не спаяне зі шкірою. Із стенової протоки виділяється прозора слина в невеликій кількості. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Псевдопаротит Герценберга
B	B. Атерома привушної ділянки
C	C. Гострий інфекційний паротит
D	D. Епідемічний паротит
E	E. Сіалопатія Шегрена
№	2. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИННИХ ЗАЛОЗ
Текст завдання	Хворий 43-х років, скаржиться на нездужання, головний біль, асиметрію обличчя, підвищену температуру тіла. Хворіє впродовж 5-ти днів. Об'єктивно: температура тіла $38, 2^{\circ}C$. Обличчя асиметричне за рахунок припухлості м'яких тканин лівої білявушної ділянки. Білявушна слинна залоза щільна, різко болісна, без чітких меж. набряк розповсюджується на скроневу, позадушепелну ділянки. Шкіра над залозою гіперемована, набрякла. При масажі з устя протоки слина не виділяється. Встановіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	A. Епідемічний паротит
B	B. Синдром Шегрена
C	C. Калькульозний сіалоаденіт
D	D. Паротит Герценберга
E	
№	3. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИННИХ ЗАЛОЗ
Текст завдання	Хвора скаржиться на новоутворення в правій нижньощелепній ділянці, яке виникає під час їжі і супроводжується нападами гострого болю, біль при ковтанні. Через 2-3 години новоутворення поступово зменшується і зникає. На рентгенограмі дна порожнини рота є рентгенконтрастна тінь подовженої форми розміром $0,5 \times 0,2$ см, що розташована паралельно тілу нижньої щелепи в проекції 45 та 44 зубів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Слинокам'яна хвороба
B	B. Сіалоаденіт

C	C. Аденома слинної залози
D	D. набряк Квінке
E	E. Лімфаденіт піднижньощелепної ділянки
№	1. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Пацієнт 43х років скаржиться на скутість рухів у скроневопіднижньощелепному суглобі, яка особливо відчутна зранку, лускіт, хрускіт при відкриванні рота. Рентгенологічно: деформація суглобової головки, суглобового горбика, звуження і деформація суглобової щілини. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Артроз СНЩС
B	B. Несправжній суглоб
C	C. Звичайний вивих СНЩС
D	D. Артрит СНЩС
E	E. Дисфункція СНЩС
№	2. крок 2016, 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Під час операції видалення 46 зуба лікар не фіксував нижню щелепу лівою рукою. Вивихування зуба проводив з великим зусиллям. Під час видалення хворий відчув біль у ділянці лівого слухового проходу, щелепа змістилася вліво. Намагання закрити рот стало неможливим. Яке ускладнення виникло у хворого?
Правильна відповідь	A. Однобічний вивих СНЩС
B	B. Перелом гілки нижньої щелепи
C	C. Перелом суглобового відростка верхньої щелепи
D	D. Перелом кута нижньої щелепи
E	E. Двобічний вивих СНЩС
№	3. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Хворий 16-ти років звернувся до клініки щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на неможливість відкривання рота, утруднений прийом їжі, косметичний недолік у вигляді недорозвинення нижньої третини обличчя. У дитинстві переніс остеомієліт нижньої щелепи. Об'єктивно: відкривання рота до 3 мм, прикус відкритий, дистальний. На рентгенограмі СНЩС: суглобова щілина не визначається внаслідок кісткового зрощення суглобової голівки і ямки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Кістковий анкілоз СНЩС
B	B. Хронічний артрит СНЩС

С	С. Гострий артрит СНЩС
D	D. Больова дисфункція СНЩС
Е	Е. Загострення хронічного артрити СНЩС
№	4. крок 2012, 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Хворий 65-ти років висловлює скарги на хрускіт, лускання в обох СНЩС, біль під час зміщення нижньої щелепи вправо, шум у вухах, сухість у роті, глосалгію. 6 місяців користується повним знімним протезом на нижню щелепу. Ревматичні захворювання пацієнт заперечує. Об'єктивно: нижня третина обличчя укорочена, підборідна складка різко виражена, кути рота опущені, заїди, тріщини. Пальпаторно: хрускіт під час рухів у СНЩС. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Синдром Костена
B	B. Артрит СНЩС
С	С. Артроз СНЩС
D	D. Вивих СНЩС
Е	Е. Артрозо-артрит СНЩС
№	5. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Хвора скаржиться на обмежене відкривання рота. З анамнезу відомо про наявність внутрішньосуглобових розладів у лівому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС). На Ro-грамі: сплюснення передньоверхньої поверхні лівої суглобової головки, наявність екзофіта в її передньому відділі та зміна форми даної ділянки. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Деформуючий артроз
B	B. Склерозуючий артроз
С	С. Гострий артрит
D	D. Кістковий анкілоз
Е	Е. Фіброзний анкілоз
№	6. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Жінка 35-ти років на другий день після операції видалення 38 зуба звернулася до хірурга-стоматолога зі скаргами на біль у привушно-жувальній ділянці справа, відчуття, що зуби не змикаються на цьому боці, порушення мови, жування. Об'єктивно: підборіддя зміщене вліво, рот напіввідкритий, прикус порушений, бічні рухи нижньої щелепи обмежені, справа від козелка вуха западання м'яких тканин. Який діагноз можна припустити?

Правильна відповідь	A. Правобічний передній вивих нижньої щелепи
B	B. Перелом гілки нижньої щелепи справа
C	C. Лівобічний передній вивих нижньої щелепи
D	D. Гострий артрит СНЩС
E	E. Двобічний вивих нижньої щелепи
№	7. крок 2011, 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Хвора 40-ка років скаржиться на ляскіт в ділянці проекції СНЩС справа, який виникає в кінцевій фазі відкривання рота. Суглобові звуки з'явилися після протезування. Відкривання рота вільне, за прямою траєкторією, амплітуда відкривання 5 см. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Підвивих нижньої щелепи
B	B. Вивих нижньої щелепи
C	C. Передній вивих суглобового диска
D	D. Задній вивих суглобового диска
E	E. Перфорація меніска
№	8. . крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Хворий 20-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на неможливість рухів нижньої щелепи, утруднення мови та прийому їжі. Стан пов'язує з травмою, що виникла під час відкушування яблука. При огляді відмічається напіввідкритий рот, прикус відкритий за рахунок одиноких контактів дистальних горбів останніх молярів щелеп, слинотеча, мова нерозбірлива, пальпуються суглобові голівки нижньої щелепи попереду козелків. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий передній двобічний вивих нижньої щелепи
B	B. Фіброзний анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба
C	C. Загострення артрозо-артриту скронево-нижньощелепного суглоба
D	D. Травматичний двобічний перелом суглобових відростків нижньої щелепи
E	E. Перелом суглобових відростків нижньої щелепи
№	9. крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ

Текст завдання	Хвора звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неможливість закрити рот, утруднену мову. Об'єктивно: порожнина рота напіввідкрита, з неї тече слина, центральна лінія зміщена в правий бік. Перед козелком вуха - западина, а під виличною дугою - випинання за рахунок голівки нижньої щелепи в підскроневу ямку. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Однобічний передній вивих нижньої щелепи з лівого боку
B	B. Однобічний передній вивих нижньої щелепи з правого боку
C	C. Однобічний задній вивих нижньої щелепи з лівого боку
D	D. Однобічний задній вивих нижньої щелепи з правого боку
E	E. Двобічний передній вивих
№	10. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Хвора 58-ми років скаржиться на клацання в скронево-нижньощелепному суглобі при прийомі їжі. Періодично, при більш широкому розкритті рота, нижня щелепа займає таке положення, при якому закривання рота неможливе. Шляхом натиснення пальцями на вінцеві відростки нижньої щелепи остання легко стає на місце. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	A. Звичний вивих нижньої щелепи
B	B. Гострий вивих нижньої щелепи
C	C. Підвивих нижньої щелепи
D	D. Передній вивих
E	E. Задній вивих
№	11. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	Дитина 12-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на біль та припухлість у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба. Із анамнезу відомо, що 2 дні тому дитина дуже широко відкрила рот та відчула сильний біль у ділянці суглоба. Об'єктивно: в ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба припухлість, пальпація болісна, відкриття рота дещо обмежене, болісне. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий артрит лівого скронево-нижньощелепного суглоба
B	B. Хронічний артрит лівого скронево-нижньощелепного суглоба
C	C. Юнацька дисфункція лівого скронево-нижньощелепного суглоба
D	D. Анкілоз лівого скронево-нижньощелепного суглоба
E	E. Артроз лівого скронево-нижньощелепного суглоба
№	12. крок 2007

Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ
Текст завдання	У хворой рентгенологічно виявлено сплюснення та гострокінцеву форму головки правого скронево-нижньощелепного суглоба, утворення екзофітів у ділянці шийки суглобового відростка і вирізки гілки нижньої щелепи. З анамнезу відомо про поступове порушення рухів нижньої щелепи. Яке захворювання суглоба має пацієнт?
Правильна відповідь	A. Деформуючий артроз
B	B. Гострий артрит
C	C. Хронічний артрит
D	D. Кістковий анкілоз
E	E. Фіброзний анкілоз
№	13. . крок 2009
Тема	ТЕМА
Текст завдання	Хворий 42-х років скаржиться на різкий біль у ділянці лівого СНЩС з іррадіацією у вухо, головний біль, погіршення загального стану, неможливість жування і обмежене відкривання рота. Обличчя асиметричне за рахунок набряку в ділянці лівого СНЩС. Шкіра в цій ділянці гіперемована. Біль посилюється при мінімальних рухах нижньої щелепи. Пальпація суглоба викликає сильний біль. Відкривання рота обмежене до 15-20 мм. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Гострий артрит лівого СНЩС
B	B. Гострий гнійний паротит
C	C. Підвивих нижньої щелепи
D	D. Деформуючий артроз лівого СНЩС
E	E. Міогенний остеоартроз
№	1. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	Хворий 58-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність "бородавки"на губі, стан дискомфорту. Об'єктивно: на незмінній червоній облямівці нижньої губи визначається вузол напівкулястої форми з горбистою поверхнею, підвищений над рівнем епітелію на 4 мм. Зверху вузол вкритий щільно прикріпленими сірими лусочками. Пальпація безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Бородавчатий передрак червоної облямівки губи
B	B. Кератоакантома
C	C. Екзематозний хейліт
D	D. Фіброкератома Унна
E	E. Верукозна лейкоплакія
№	2. . крок 2011

Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	У хворого діагностований плоскоклітинний зроговілий рак слизової оболонки переднього відділу дна порожнини рота III ступеня. На Ro-грамі нижньої щелепи наявна резорбція альвеолярного відростка у фронтальному відділі, розміром 1,0x0,5 см. Яке лікування показано хворому?
Правильна відповідь	A. Комбіноване
B	B. Хірургічне
C	C. Променева терапія
D	D. Хіміотерапія
E	E. Паліативне хіміопроменеве та симптоматичне
№	3. . крок 2010, 2008
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	Хворий 49-ти років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на збільшення в розмірах "родинної плями", її лущення, свербіж. Зі слів хворого, змінена у кольорі і розмірах ділянка шкіри з'явилася рік тому, після травми її під час гоління. Об'єктивно: у підочній ділянці зліва визначається інтенсивно пігментована пляма коричневого кольору, розміром до 2 см, з дрібними вузликами на поверхні, овальної форми, виступає над шкірою, з ознаками лущення, безболісна під час пальпації. Регіонарні лімфовузли збільшені, спаяні із шкірою, безболісні. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Меланома
B	B. Невус пігментований
C	C. Невус бородавчастий
D	D. Плоскоклітинний рак
E	E. Папіломатоз
№	4. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	Хворий 43-х років скаржить на постійний біль у ділянці верхньої щелепи справа, що іррадіює у скроню. Біль з'явився місяць тому. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості правої щоки. Слизова оболонка порожнини рота не змінена. Утруднене дихання через правий носовий хід, тут же кров'янисто-гнійні виділення з неприємним запахом. На оглядовій рентгенограмі лицевого скелету у напіваксіальній проекції визначається інтенсивне затемнення правої гайморової пазухи, порушення цілісності внутрішньої і верхньої її стінок. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Рак верхньої щелепи
B	B. Хронічний одонтогенний гайморит
C	C. Хронічний одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи

D	D. Невралгія II гілки трійчастого нерва
E	E. Остеома верхньої щелепи
№	5. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	Під час обстеження хворого встановлено, що пухлина на язиці займає більшу його частину, рухомість язика обмежена, виявляються поодинокі регіонарні лімфатичні вузли на боці ураження. Після цитологічного дослідження встановлено діагноз: рак язика T2N1M0. Яке лікування необхідно застосувати у цього хворого?
Правильна відповідь	A. Комбінований метод
B	B. Променева терапія
C	C. Хірургічне видалення новоутворення
D	D. Хіміотерапія
E	E. Видалення лімфовузлів
№	6. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	Хворий 47-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність пухлини на шкірі у правій щічній ділянці, яка свербить та значно збільшилась за останній час. При огляді виявлена пухлина неправильної форми, розміром до 1,5 см, чорного кольору, блискуча. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Меланома шкіри
B	B. Пігментний невус
C	C. Базаліома шкіри
D	D. Рак шкіри
E	E. Шкірний ріг
№	7. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	Чоловік 56-ти років скаржиться на біль у лівій навколоушно-жувальній ділянці, прогресуючу асиметрію обличчя, яку помітив місяць тому. Об'єктивно: парез м'язів зліва. Допереду від мочки вуха є інфільтрат без чітких меж, шкіра над ним синюшна, натягнута; збільшені шийні лімфовузли зліва. Відкриття рота обмежене до 2,5 см. З протоку лівої навколоушною залози слина не виділяється. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Аденокарцинома
B	B. Змішана пухлина
C	C. Кіста залози
D	D. Туберкульоз залози

Е	Е. Хронічний лімфаденіт
№	8. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	На рентгенограмі у хворої виявлено вогнище деструкції кісткової тканини тіла нижньої щелепи розмірами 3x5 см у вигляді великої кількості малих порожнин різної величини та форми, що розділені перегородками. Під час пункції пухлини отримано буру рідину. Яке захворювання слід запідозрити в даній хворій?
Правильна відповідь	А. Остеобластокластома
В	В. Одонтома м'яка
С	С. Амелобластома
Д	Д. Рак нижньої щелепи
Е	Е. Радикулярна кіста нижньої щелепи
№	9. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	Хворий 56-ти років тривалий час лікується з приводу хронічного риногенного гаймориту. В останні три місяці з'явилися виділення з носа типу "м'ясних помий" з неприємним запахом, потовщення альвеолярного відростка у ділянці правих молярів, рухливість цих інтактних зубів. На амбулаторному прийомі лікар-стоматолог встановив діагноз гострого гнійного періоститу, видалив 16 зуб, провів періостеотомію. Гною при розрізі отримано не було. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	А. Рак верхньої щелепи
В	В. Осифікуючий періостит верхньої щелепи
С	С. Хронічний одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи
Д	Д. Загострення хронічного правобічного гаймориту
Е	Е. Еозинофільна гранулома
№	10. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	Хворий 75-ти років звернувся зі скаргами на наявність пухлиноподібного утворення на бічній поверхні носа, яке з'явилося 4 роки тому. В останні місяці стало помітно збільшуватися, утворюються кірки, після зняття яких наявна ерозія, що кровить. Інфільтрація підлеглих тканин відсутня. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	А. Базальноклітинний рак
В	В. Папілома
С	С. Плоскоклітинний зроговілий рак
Д	Д. Плоскоклітинний незроговілий рак

Е	Е. Кератоакантома
№	
Тема	ТЕМА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність пухлини у ділянці нижньої щелепи, рухливість зубів. Біль не усувається анальгетиками, переважає вночі. Пухлину помітив 2 місяці тому; тиждень тому з'явилося оніміння нижньої губи. Об'єктивно: пухлина нерухома, щільної консистенції, слизова оболонка над нею бліда. На Ro-грамі: видно ділянки ущільнення кістки з нечіткими межами і наявність кісткових голок, розташованих перпендикулярно до поверхні щелепи. Про яке захворювання можна думати?
Правильна відповідь	А. Саркома нижньої щелепи
В	В. Остеобластокластома нижньої щелепи
С	С. Рак нижньої щелепи
Д	Д. Радикулярна кіста
Е	Е. Гіпертрофічна форма хронічного остеомієліту
№	1. крок 2016, 2015, 2012, 2011
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворому 19-ти років встановлений діагноз: двобічний кістковий анкілоз скроневонижньощелепних суглобів. Об'єктивно: визначається характерний вид "пташиного обличчя", рот відкриває на 0,5 см, підборіддя скошене. Хворому планується хірургічне видалення анкілозу шляхом остеотомії (створення несправжніх суглобів). Який метод знеболення слід обрати?
Правильна відповідь	А. Ендотрахеальний наркоз
В	В. Двобічна центральна анестезія
С	С. Масковий наркоз
Д	Д. Двобічна торусальна анестезія
Е	Е. Внутрішньовенний наркоз
№	2. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Які нерви необхідно блокувати для забезпечення безболісного видалення 11 зуба?
Правильна відповідь	А. Передні коміркові та різцевий
В	В. Великий піднебінний
С	С. Середні коміркові та великий піднебінний
Д	Д. Нижньокомірковий
Е	Е. Задні коміркові та великий піднебінний

№	3. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Яку з перерахованих нижче периферійних провідникових анестезій НЕ ВИКОНУЮТЬ позаротовим шляхом?
Правильна відповідь	A. Піднебінна
B	B. Туберальна
C	C. Інфраорбітальна
D	D. Мандибулярна
E	E. Торусальна
№	4. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	При проведенні центральної анестезії у овального отвору вилочнокрилоподібним шляхом у пацієнта з'явилося неповне змикання очної щілини на боці анестезії. З анестезією гілок якого нерву зв'язані зазначені явища?
Правильна відповідь	A. Лицевий
B	B. Нижньощелепний
C	C. Верхньощелепний
D	D. Очний
E	E. Очноруховий
№	5. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хвора 38-ми років з діагнозом: хронічний гранулюючий періодонтит 24 зуба звернулася для його видалення в зв'язку з відсутністю позитивного ефекту від консервативного лікування. Зробіть вибір місцевої анестезії:
Правильна відповідь	A. Інфраорбітальна і палатинальна
B	B. Плексуальна і різцева
C	C. Інфільтраційна і різцева
D	D. Туберальна і палатинальна
E	E. Туберальна і щічна
№	6. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хвора 25-ти років, яка працює вчителем, звернулася в клініку ортопедичної стоматології із скаргами на косметичний дефект, неможливість відкушування їжі, порушення дикції. Зуби втрачено внаслідок травми. Зубна формула: 87654300!00345678. 3!3 стійкі, інтактні, перкусія безболісна. Яку анестезію доцільно провести для цієї групи зубів перед препаруванням для виготовлення металокерамічного мостоподібного протеза?

Правильна відповідь	A. Інфільтраційна
B	B. Аплікаційна
C	C. Центральна провідникова
D	D. Туберальна
E	E. Спонгіозна
№	7. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворий 64-х років місяць тому переніс інфаркт міокарда. У стоматологічному кабінеті йому повинні лікувати пульпіт 12. Оберіть метод знеболення:
Правильна відповідь	A. Медикаментозна підготовка + анестетики без вазоконстриктора
B	B. Анестетик з вазоконстриктором
C	C. Премедикація + анестетик без вазоконстриктора
D	D. Премедикація + анестетик з вазоконстриктором
E	E. Медикаментозна підготовка + анестетики з вазоконстриктором
№	8. крок 2015, 2012, 2010
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хвора 39-ти років звернулася зі скаргами на біль у ділянці 21 впродовж 2-х днів. В анамнезі: лікування даного зуба з приводу карієсу. Об'єктивно: 21 вкритий металокерамічною коронкою, слизова оболонка в проекції верхівки кореня набрякла, гіперемована. Перкусія зуба різко болісна. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований неякісно. Планується зняття коронки з 21. Яка анестезія найбільш показана?
Правильна відповідь	A. Провідникова
B	B. Інфільтраційна
C	C. Інтралігаментарна
D	D. Аплікаційна
E	E. Внутрішньокісткова
№	9. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Пацієнт 46-ти років звернувся до стоматолога-хірурга з метою видалення 17 зуба. Яку анестезію слід застосувати?
Правильна відповідь	A. Туберальна та палатинальна
B	B. Палатинальна, інфраорбітальна
C	C. Інфільтраційна, різцева
D	D. Мандибулярна

Е	Е. Торусальна
№	10. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	У хворого планується розкриття абсцедуючого фурункула верхньої губи. Який вид анестезії показаний для проведення данного втручання?
Правильна відповідь	А. Двобічна інфраорбітальна
В	В. Двобічна інфраорбітальна та різцева
С	С. Двобічна інфраорбітальна та палатинальна
Д	Д. Двобічна туберальна та палатинальна
Е	Е. Двобічна палатинальна
№	11. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хвора 23-х років звернулася для видалення кореня верхнього зуба мудрості. Під час проведення туберальної анестезії виникла післяін'єкційна гематома. Що було пошкоджено при анестезії?
Правильна відповідь	А. Крилоподібне венозне сплетення
В	В. Верхньощелепова артерія
С	С. Підочна артерія
Д	Д. Вилична артерія
Е	Е. Піднебінна артерія
№	12. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворий 49-ти років звернувся до хірургічного кабінету стоматологічної поліклініки зі скаргами на болі у ділянці верхньої щелепи зліва, що з'явилися 3 дні тому. Після огляду лікар встановив діагноз: загострення хронічного періодонтиту 17 зуба. Показане видалення 17 зуба. Які нерви необхідно блокувати для забезпечення безболісного видалення 17 зуба?
Правильна відповідь	А. Задні коміркові нерви і великий піднебінний нерв
В	В. Великий піднебінний нерв
С	С. Передні коміркові нерви і різцевий нерв
Д	Д. Середні коміркові нерви і великий піднебінний нерв
Е	Е. Носопіднебінний нерв
№	13. . крок 2014, 2011
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ

Текст завдання	Хворому 20-ти років з приводу загострення хронічного періодонтиту показано видалення 12 зуба. Для знеболення обрано інфраорбітальну та інцизивну анестезію. Які нервові утворення виключаються після проведення вказаної анестезії?
Правильна відповідь	A. Передні верхні альвеолярні гілки, <i>n. incisivus</i>
B	B. Середні верхні альвеолярні гілки, <i>n. nasopalatinus</i>
C	C. Задні верхні альвеолярні гілки, <i>n. incisivus</i>
D	D. Великий нерв піднебіння, середні верхні альвеолярні гілки
E	E. Носо-піднебінний нерв, передні верхні альвеолярні гілки
№	14. . крок 2014, 2010
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	У хворого 23-х років з метою видалення 46 зуба була проведена анестезія за Вайсбромом. Вкажіть цільовий пункт введення анестезуючого розчину при цій анестезії:
Правильна відповідь	A. Ділянка нижньощелепного підвищення
B	B. Ділянка горба верхньої щелепи
C	C. Ретромоларна ямка
D	D. Ділянка скроневого гребеня нижньої щелепи
E	E. Защелепна ямка
№	15. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хвора 36ти років, якій показано видалення 38 зуба з приводу хронічного фіброзного періодонтиту, звернулася у стоматологічну поліклініку. Хірургстоматолог провів торусальну анестезію. Які нерви втратили чутливість при цій анестезії?
Правильна відповідь	A. Нижньокомірковий, язиковий, щічний
B	B. Язиковий, щічний
C	C. Нижньокомірковий, щічний
D	D. Нижньокомірковий, язиковий
E	E. Язиковий, щічний, підборідний
№	16. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворому 30-ти років з метою санації порожнини рота показано видалення різців на верхній щелепі. Які нервові утворення виключаються після проведення різцевої анестезії?
Правильна відповідь	A. Носопіднебінний нерв

В	В. Передня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва
С	С. Середня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва
Д	Д. Задня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва
Е	Е. Нервове зубне сплетення
№	17. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Для знеболювання при видаленні другого моляру на нижній щелепі зліва з приводу загострення хронічного періодонтиту лікар зробив укол голки у точку перетинання борозенки між зовнішнім скатом крилощелепної складки і щокою, і лінією, умовно проведеною на 0,5 см нижче жувальної поверхні останнього моляру верхньої щелепи. Яку анестезію виконав лікар?
Правильна відповідь	А. Торусальна
В	В. Мандибулярна
С	С. Ментальна
Д	Д. Туберальна
Е	Е. Язикова
№	18. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворому показане видалення 46 зуба. Коронка зуба збережена, відкривання рота вільне. Виберіть оптимальний метод провідникового знеболення та інструментарій для видалення зуба:
Правильна відповідь	А. Торусальна анестезія, дзьобоподібні щипці з шипиками на щічках
В	В. Анестезія по Берше-Дубову, кутовий і прямий елеватор
С	С. Мандибулярна анестезія, прямий і кутовий елеватор, дзьобоподібні щипці з щічками, що сходяться
Д	Д. Мандибулярна і щічна анестезія, прямий елеватор, зігнуті по площині дзьобоподібні щипці
Е	Е. Торусальна анестезія, прямий і кутовий елеватор, дзьобоподібні щипці з щічками, що сходяться
№	19. крок 2012, 2007
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Чоловік 35-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу видалення 26 зуба. Під час проведення туберальної анестезії відзначалося швидке наростання набряку тканин і обмеження відкривання рота. Чим обумовлений такий стан?
Правильна відповідь	А. Травма судин під час проведення анестезії
В	В. Травма м'язів під час проведення анестезії
С	С. Травма нервових стовбурів

D	D. Місцева реакція тканин на анестетик
E	E. Розвиток набряку Квінке
№	20. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Пацієнт 58-ми років звернувся до лікаря-стоматолога з метою видалення 48 зуба. Яку потрібно зробити анестезію для видалення 48 зуба?
Правильна відповідь	A. Торусальна
B	B. Ментальна
C	C. Туберальна
D	D. Інфраорбітальна
E	E. Піднебінна
№	21. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Пацієнтові 20-ти років необхідно провести аплікаційну анестезію на верхній щелепі у фронтальній ділянці перед проведенням провідникової анестезії. Яка концентрація розчину лідокаїну використовується для здійснення аплікаційної анестезії?
Правильна відповідь	A. 10%
B	B. 5%
C	C. 20%
D	D. 30%
E	E. 15%
№	22. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	У хворого відкриття рота обмежене до 1 см. Показано видалення 38. Оберіть анестезію, яку необхідно зробити для повного знеболення тканин в ділянці 38:
Правильна відповідь	A. Анестезія за Берше-Дубовим
B	B. Мандибулярна, аподактильна
C	C. Торусальна
D	D. Зовнішньоротовий засіб мандибулярної анестезії
E	E. Мандибулярна, дактильна
№	23. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ

Текст завдання	Хворий 50-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з метою видалення 36 за санаційними показаннями. Хворий рік тому переніс інфаркт міокарда, страждає на стенокардію напруги. Оберіть найбільш раціональний метод знеболення:
Правильна відповідь	A. Провідникове потенційоване
B	B. Наркоз
C	C. Інфільтраційне
D	D. Провідникове
E	E. Аплікаційне
№	24. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворому 32-х років виготовляють металокерамічні коронки на 12, 11, 21, 22 зуби. Застосовується інфільтраційна анестезія анестетиком <i>Ultracain DS</i> . Що входить до його складу?
Правильна відповідь	A. 4% артикаїн з адреналіном
B	B. 2% мопівакаїн з адреналіном
C	C. 4% артикаїн без вазоконстриктора
D	D. 3% мепівакаїн без вазоконстриктора
E	E. 2% артикаїн з епінефіраном
№	25. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворому 40-ка років з метою санації порожнини рота показане видалення центральних різців на верхній щелепі. Які нервові утворення виключаються після проведення різцевої анестезії?
Правильна відповідь	A. Носопіднебінний нерв
B	B. Передня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва
C	C. Середня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва
D	D. Задня верхня альвеолярна гілка інфраорбітального нерва
E	E. Зубне нерве сплетіння
№	26. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворий звернувся до стоматолога зі скаргами на постійний ниючий біль в 38. Відкриття рота обмежене до 1 см. Показано видалення 38. Яку анестезію слід зробити для проведення операції?
Правильна відповідь	A. Анестезія за Берше-Дубовим
B	B. Мандибулярна
C	C. Торусальна

D	D. Зовнішньоротовий спосіб мандибулярної анестезії
E	E. Туберальна
№	27. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворий скаржиться на зруйновану коронку 27. Діагностовано хронічний періодонтит даного зуба. Об'єктивно: коронка 27 зруйнована повністю. Необхідно видалення даного зуба. Під якою провідниковою анестезією доцільно виконати цю операцію?
Правильна відповідь	A. Туберальна і палатинальна
B	B. Інфраорбітальна
C	C. Туберальна
D	D. Інфраорбітальна та туберальна
E	E. Туберальна і різцева
№	28. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворий 40-ка років госпіталізований з переломом верхньої щелепи за ЛеФор II. Зубні ряди інтактні. Оберіть апарат для лікування цього хворого:
Правильна відповідь	A. Стандартний комплект Збаржа
B	B. Апарат Ядрової
C	C. Апарат Рудько
D	D. Апарат Єрмолаєва-Кулагова
E	E. Шина Порта
№	29. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хвора 38-ми років звернулася до хірургічного кабінету стоматологічної поліклініки з метою видалення 36. Яку анестезію доцільно застосувати при видаленні?
Правильна відповідь	A. Торусальна
B	B. Мандибулярна
C	C. Туберальна
D	D. Інфільтраційна
E	E. Стовбурова за Войно-Ясинецьким
№	30. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ

Текст завдання	Хвора 27-ми років, вагітність 21 тиждень, після безрезультатного терапевтичного лікування направлена на видалення 28 зубу з приводу загострення хронічного періодонтиту. Під якою анестезією необхідно видалити зуб цій хворій?
Правильна відповідь	A. Туберальна та піднебінна
B	B. Туберальна та різцева
C	C. Інфраорбітальна та піднебінна
D	D. Торусальна
E	E. Мандибулярна
№	31. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	В умовах щелепно-лицевого стаціонару хворій проводилася операція - радикальна гайморотомія з пластичним закриттям нориці через комірку видаленого 27. Провели інфільтраційну і всі периферичні провідникові анестезії на верхній щелепі зліва 2% р-ном лідокаїну 6,0 мл. Через 3 хвилини хвора відзначила двоїння в лівому оці, неможливість його закрити. Яка з проведених анестезій є причиною вищевказаних скарг?
Правильна відповідь	A. Інфраорбітальна
B	B. Туберальна
C	C. Палатинальна
D	D. Інцизівальна
E	E. Інфільтраційна
№	32. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	До хірургічного кабінету стоматологічної поліклініки звернувся хворий зі скаргами на біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що з'явилися 3 дні тому. Після огляду лікар встановив діагноз: загострення хронічного періодонтиту 17. Показане видалення 17. Які нерви необхідно блокувати для забезпечення безболісного видалення 17?
Правильна відповідь	A. Задні коміркові нерви і великий піднебінний нерв
B	B. Великий піднебінний нерв
C	C. Передні коміркові нерви і різцевий нерв
D	D. Середні коміркові нерви і великий піднебінний нерв
E	E. Носопіднебінний нерв
№	33. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ

Текст завдання	Жінка 49-ти років звернулася до хірургічного кабінету стоматологічної поліклініки зі скаргами на постійний сильний, ниючий біль в ділянці верхньої щелепи справа. З анамнезу відомо, що 17 неодноразово, але безуспішно лікувався терапевтом-стоматологом з приводу загострення хронічного періодонтиту. Який вид анестезії слід застосувати при видаленні 17?
Правильна відповідь	A. Туберальна та палатинальна
B	B. Туберальна та різцева
C	C. Туберальна, різцева та палатинальна
D	D. Різцева та палатинальна
E	E. Торусальна
№	34. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	У хворого планується розтин абсцесу твердого піднебіння (знаходиться в межах 23, 24, 25) та видалення 24 - "причинного зуба", що призвів до виникнення абсцесу. Який вид анестезії показаний для проведення даного втручання?
Правильна відповідь	A. Інфраорбітальна, палатинальна та різцева
B	B. Туберальна, інфраорбітальна та різцева
C	C. Туберальна, інфраорбітальна та палатинальна
D	D. Туберальна та різцева
E	E. Туберальна та палатинальна
№	35. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хвора 34-х років, якій показано видалення 38 з приводу хронічного фіброзного періодонтиту, звернулася у стоматологічну поліклініку. Хірург-стоматолог провів торусальну анестезію. Якими нервами припинилася передача больової інформації при цій анестезії?
Правильна відповідь	A. Нижньокомірковий, язиковий, щічний
B	B. Язиковий, щічний
C	C. Нижньокомірковий, щічний
D	D. Нижньокомірковий, язиковий
E	E. Язиковий, щічний, підборідний
№	36. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ

Текст завдання	Пацієнтка 22-х років боїться болю під час проведення провідникового знеболення. Лікар вирішив, що перед проведенням анестезії необхідно застосувати аплікаційне знеболення слизової оболонки в місці уколу. Який препарат використовується для цього?
Правильна відповідь	A. Лідокаїнова мазь 5%
B	B. Синтоміцинова мазь 1%
C	C. Оксацилінова мазь 5%
D	D. Синафланова мазь 3%
E	E. Дексациклінова мазь 3%
№	37. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хвора 24-х років звернулася для видалення кореня верхнього зуба мудрості. Під час проведення туберальної анестезії виникла післяін'єкційна гематома. Що було пошкоджено під час проведення анестезії?
Правильна відповідь	A. Крилоподібне венозне сплетіння
B	B. Верхньощелепна артерія
C	C. Підочна артерія
D	D. Вилична артерія
E	E. Піднебінна артерія
№	38. крок 2008, 2007
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Пацієнту показано видалення медіального різця правої верхньої щелепи з приводу хронічного періодонтиту. Які види анестезії слід застосувати при видаленні цього зуба?
Правильна відповідь	A. Підочна та різцева
B	B. Підочна та піднебінна
C	C. Термінальна та різцева
D	D. Підочна, піднебінна та різцева
E	E. Плексуальна та різцева
№	39. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворій 48-ми років, на підставі клініко-рентгенологічного дослідження, показано видалення 26 зуба з приводу хронічного гранулематозного періодонтиту в стадії загострення. Вкажіть, під якою провідниковою анестезією, буде проводитись дана операція:
Правильна відповідь	A. Туберальна і палатинальна

В	В. Торусальна
С	С. Інфраорбітальна та різцева
Д	Д. Плексуальна
Е	Е. Інфраорбітальна та палатинальна
№	40. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хвора звернулася зі скаргами на біль під час ковтання, утруднене відкривання рота. Декілька днів тому був видалений 47 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. Однак стан продовжував погіршуватися, температура тіла 37, 9 ⁰ С. Об'єктивно: обличчя симетричне, деяка блідість шкіри. Збільшені праві піднижньощелепні лімфовузли, болісні під час пальпації. Огляд порожнини рота неможливий через виражену контрактуру нижньої щелепи (рот відкриває до 0,5 см між центральними різцями). Яку анестезію необхідно провести для забезпечення відкривання рота?
Правильна відповідь	А. Анестезія за Берше-Дубовим
В	В. Плексуальна анестезія
С	С. Торусальна анестезія
Д	Д. Блокада верхнього шийного сплетення
Е	Е. Мандибулярна анестезія
№	41. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	До щелепно-лицевого відділення доставлено хворого з однобічним вивихом правого скронево-нижньощелепного суглобу. Який вид місцевої анестезії показаний для релаксації жувальних м'язів при вправленні суглоба?
Правильна відповідь	А. За Берше-Дубовим, підвиличним шляхом
В	В. Внутрішньоротова мандибулярна анестезія
С	С. Позаротова мандибулярна анестезія, піднижньощелепний шлях
Д	Д. Позаротова мандибулярна анестезія, позадущелепний шлях
Е	Е. Торусальна анестезія
№	42. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	У хворого проведена піднебінна анестезія. При виведенні голки з м'яких тканин виникла кровотеча. Що необхідно зробити для зупинки кровотечі?
Правильна відповідь	А. Притиснути тампоном місце уколу
В	В. Накладання швів

C	C. Внутрішньовенне введення 10% розчину хлористого кальцію
D	D. Внутрішньом'язове введення вікасолу
E	E. Перев'язка зовнішньої сонної артерії
№	43. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога з приводу загострення хронічного періодонтиту 25. Після огляду хірург вирішив 25 видалити. Яку анестезію слід застосувати?
Правильна відповідь	A. Інфраорбітальна, туберальна, піднебінна
B	B. Туберальна та піднебінна
C	C. Плексуальна та піднебінна
D	D. Інфільтраційна та піднебінна
E	E. Інфільтраційна анестезія з вестибулярної та піднебінної поверхонь
№	44. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗНЕБОЛЕННЯ
Текст завдання	Чоловік 49-ти років через 2 доби після видалення 38 скаржить на утруднене відкривання рота, незначний біль під час ковтання. 38 зуб видалений під торусальною анестезією. Об'єктивно: запальна контрактура III ступеня. набряк та гіперемія слизової оболонки порожнини рота по крилоподібно-нижньощелепній складці ліворуч. Комірка 38 виповнена гнилісно-некротичними масами сірого кольору, з неприємним запахом. Під час пальпації піднижньощелепні лімфатичні вузли збільшені, болісні. Який вид провідникової анестезії слід застосувати при проведенні ревізії лунки 38 зуба?
Правильна відповідь	A. Анестезія за Берше-Дубовим
B	B. Мандибулярна, язикова
C	C. Щічна, язикова
D	D. Інфільтраційна
E	E. Туберальна
№	1. крок 2016, 2015, 2013
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час операції кістотомії хлопчик 9ти років поскаржився на запаморочення, нудоту. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, АТ 80/45 мм рт.ст., руки холодні. Визначте імовірний діагноз:
Правильна відповідь	A. Непритомність
B	B. Колапс
C	C. Анафілактичний шок

D	D. Травматичний шок
E	E. Токсичний шок
№	2. крок 2016, 2015
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Пацієнт 59ти років звернувся до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. При наданні стоматологічної допомоги у пацієнта виникли наступні симптоми: свідомість збережена, слабкість, прострація, шкірні покриви бліді, ціанотичні, липкий піт, систолічний тиск знизився до 80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Колапс
B	B. Непритомність
C	C. Шок
D	D. Діабетична кома
E	E. Інфаркт міокарда
№	3. крок 2016
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час транспортування постраждалого бійця з поля бою виникла зупинка серця. Пацієнту показаний непрямий масаж серця. З якою частотою необхідно чергувати масаж серця з дихальними рухами?
Правильна відповідь	A. 46 на 1 дихальний рух
B	B. 810 на 1 дихальний рух
C	C. 56 на 2 дихальних рухи
D	D. 12 на 2 дихальних рухи
E	E. 78 на 1 дихальний рух
№	4. крок 2016
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У хворої 39-ти років під час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квінке з наростанням явищ асфіксії. Які дії лікаря стоматолога необхідні для попередження стенотичної асфіксії?
Правильна відповідь	A. Проведення трахеостомії
B	B. Введення десенсибілізуючих засобів
C	C. Введення глюкокортикоїдів
D	D. Введення адреноміметиків
E	E. Проведення штучного дихання
№	5. крок 2016
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН

Текст завдання	У коридорі в очікуванні прийому лікаря сидів чоловік 59ти років. Раптово він відчув сильний біль за грудиною, який іррадіює у міжлопаткову ділянку та обидві руки. Прийнятий валідол не допоміг. Перед виходом з дому прийняв метопролол для зниження АТ. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Інфаркт міокарда
B	B. Тромбоемболія легеневої артерії
C	C. Защемлена діафрагмальна грижа
D	D. Дифузний кардіосклероз
E	E. Гостра лівошлуночкова недостатність
№	6. крок 2016
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий доставлений в приймальне відділення після ДТП у стані ступору. Визначається спотворення обличчя внаслідок множинних зяючих ран, кровотечі, розлитого набряку. На рентгенограмі: перелом верхньої щелепи за верхнім та середнім типом, множинні переломи коронок та коренів зубів на верхніх та нижній щелепах. Шкірні покриви бліді, зіниці слабо реагують на світло, АТ 70/50 мм рт.ст., пульс слабкий, 120/хв. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Травматичний шок
B	B. Аспіраційна асфіксія
C	C. Геморрагічний шок
D	D. Обтураційна асфіксія
E	E. Гостра дихальна недостатність
№	7. крок 2015
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Через 1 хвилину після проведення торусальної анестезії (4 мл 2% розчином новокаїну) з приводу видалення 17 зуба, хворий почав скаржитися на відчуття утруднення дихання. Під час огляду встановлено, що верхня та нижня губа набрякли, слизова оболонка гортані і порожнини рота також набрякли, різко гіперемовані. Яке ускладнення виникло у цього хворого?
Правильна відповідь	A. набряк Квінке
B	B. Інтоксикація анестетиком
C	C. Анафілактичний шок
D	D. Колапс
E	E. Гостра легенева недостатність
№	8. крок 2015, 2013

Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час гемотрансфузії у пацієнта виникли нудота, тремор, біль у попереку, за грудиною. При огляді шкіра гіперемована у подальшому стала блідою, гіпергідроз, дихання важке, Ps- 110/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Сеча чорного кольору. Яке ускладнення ви-никло у хворого?
Правильна відповідь	А. Гемотрансфузійний шок
В	В. Гостра ниркова недостатність
С	С. Тромбоемболія легеневої артерії
D	D. Анафілактичний шок
Е	Е. Гіпотонічний криз
№	9. крок 2015
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворому 35-ти років для лікування 26 зуба було проведено провідникову анестезію. Через декілька хвилин після введення анестетика хворий почав хвилюватися, часто дихати, вкрився рясним потом, почервоніння шкіри змінилося блідістю. Спостерігається різке падіння артеріального тиску. Який з перелічених препаратів застосовується при цьому стані в першу чергу?
Правильна відповідь	А. Адреналіну гідрохлорид
В	В. Преднізолон
С	С. Кальцій хлорид
D	D. Фенкарол
Е	Е. Димедрол
№	10. крок 2015
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час виконання мандибулярної анестезії 4% розчином <i>Ultracain-forte</i> дівчинка 13-ти років поскаржилася на раптову слабкість, утруднене дихання, нудоту, страх. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом, на шкірі обличчя та шиї виявляються плями гіперемії. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск знижений (60/40 мм рт.ст.), руки холодні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Анафілактичний шок
В	В. Токсичний шок
С	С. Зомління
D	D. Травматичний шок
Е	Е. Колапс
№	11. крок 2015, 2013

Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий 48-ми років на прийомі у лікаря-стоматолога відчув голод. Відзначено почашення пульсу, звуження зіниць, менінгеальні симптоми, падіння температури. З анамнезу відомо, що хворий страждає на цукровий діабет. Лікарем-стоматологом встановлений діагноз: гіпоглікемічний криз. Як усунути напад?
Правильна відповідь	A. Дати пацієнту випити склянку солодкого чаю
B	B. Парентерально ввести інсулін
C	C. Перорально ввести інсулін
D	D. Парентерально ввести великі дози глюкози
E	E. Госпіталізувати хворого
№	12. крок 2015, 2013
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	При зняття повного анатомічного зліпку гіпсом з верхньої щелепи шматочки гіпсу потрапили у дихальні шляхи. Який вид асфіксії виник у даного пацієнта?
Правильна відповідь	A. Обтураційна
B	B. Аспіраційна
C	C. Клапанна
D	D. Стенотична
E	E. Дислокаційна
№	13. крок 2014
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У хворого на цукровий діабет 29ти років після ін'єкції 30 ОД інсуліну виникло короточасне збудження, після чого знепритомнів. Яка найбільш імовірна причина?
Правильна відповідь	A. Гіпоглікемічна кома
B	B. Інсульт
C	C. Гіперглікемічна кома
D	D. Інфаркт міокарда
E	E. Кетоацидотична кома
№	14. крок 2014, 2010
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Через 1 хвилину після проведення торусальної анестезії 2% розчином новокаїну 4 мл. з приводу видалення 17 зуба, хворий 33-х років почав скаржитися на відчуття утруднення дихання. Об'єктивно: обидві губи набрякли, слизова оболонка гортані та порожнини рота також набрякла, різко гіперемована. Яке ускладнення виникло у цього хворого?

Правильна відповідь	A. набряк Квінке
B	B. Інтоксикація анестетиком
C	C. Анафілактичний шок
D	D. Колапс
E	E. Гостра легенева недостатність
№	15. крок 2014, 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У хворого 34-х років при ударі виник перелом верхньої щелепи. Об'єктивно: сплющення та втиснення обличчя, рухомість і звисання відламаної щелепи з хрящовою частиною носа і очних яблук, носова кровотеча, набряк тканин, симптом "окулярів", пальпаторно - крепітація, підшкірна емфізема, лікворея, втрата чутливості в ділянці половини верхньої щелепи, крил носа і передніх зубів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом верхньої щелепи по Ле Фор III
B	B. Остемія верхньої щелепи
C	C. Одонтома верхньої щелепи
D	D. Перелом верхньої щелепи по Ле Фор I
E	E. Рак верхньої щелепи справа
№	16. . крок 2014
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий 48ми років звернувся з метою санації порожнини рота. Після проведення анестезії хворий відзначив запаморочення, дзвін у вухах, потемніння в очах, загальну слабкість. Пульс слабкий до 96/хв., АТ 90/60 мм рт.ст. Хворий знепритомнів на 30 секунд. Який стан розвинувся у хворого?
Правильна відповідь	A. Зомління
B	B. Колапс
C	C. Анафілактичний шок
D	D. Епілептичний напад
E	E. Травматичний шок
№	17. крок 2014
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У пацієнта 50-ти років, який хворіє на ішемічну хворобу серця, виникла фібриляція шлуночків. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути:
Правильна відповідь	A. Електрична дефібриляція
B	B. Введення лідокаїну

C	C. Введення адреналіну
D	D. Введення калію хлориду
E	E. Введення новокаїнамідю
№	18. крок 2013
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Жінка 25-ти років була витягнута бригадою рятувальників із ставка. Під водою постраждала пробула впродовж декількох хвилин. Завдяки проведенням реанімаційних заходів свідомість постраждалої відновилася, при цьому вода з дихальних шляхів не виходила. Який механізм утоплення найбільш імовірний у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Рефлекторний ларингоспазм
B	B. Аспірація рідини
C	C. Рефлекторна зупинка серця
D	D. Гемодилуція
E	E. набряк легень
№	19. Крок 2013
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворого 32-х років скерували на видалення кореня 35 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Через 2–3 хвилини після проведення мандибулярної анестезії хворий почав скаржитися на відчуття здавлення в горлі, голос став сиплим, утруднилося дихання, з'явився набряк язика, нижньої губи, тканин дна порожнини рота. Про яке ускладнення може йти мова?
Правильна відповідь	A. Ангіоневротичний набряк Квінке
B	B. Істерія
C	C. Постін'екційна гематома
D	D. Напад бронхіальної астми
E	E. Інтотоксикація анестетиком
№	20. крок 2012
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Через 10 хвилин після проведення анестезії (15 мл 2% розчину лідокаїну) у хворого 26-ти років розвинулись тахікардія, екстрасистолія, задишка, сухий кашель, ціаноз, артеріальна гіпотензія, втрата свідомості. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	A. Анафілактичний шок
B	B. Аспіраційна асфіксія
C	C. Гіпертонічний криз

D	D. Діабетична кома
E	E. -
№	21. крок 2012
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час видалення 46 зуба у пацієнта 34-х років з'явилися короточасна непритомність, блідість слизових та шкірних покривів. Пульс слабкий, частий, АТ- 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?
Правильна відповідь	A. Зомління
B	B. Колапс
C	C. Гостра серцева недостатність
D	D. Кома
E	E. Гостра дихальна недостатність
№	22. крок 2012
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	На прийомі у лікаря-стоматолога у хворого з'явився різкий головний біль, запаморочення, шум і дзвін у вухах, підвищення артеріального тиску, носова кровотеча, нудота, блювання, "сітка перед очима". Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гіпертонічний криз
B	B. Непритомність
C	C. Анафілактичний шок
D	D. Клінічна смерть
E	E. Колапс
№	23. . крок 2012
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У хворого 63-х років на черговому етапі ортопедичного лікування раптово різко погіршився загальний стан: блідість шкірних покривів, холодний піт, ціаноз губ, шкіра з мармуровим відтінком, свідомість загальмована, почашене дихання, тахікардія, гучні хлопаючі тони серця, загострені риси обличчя. Зниження артеріального тиску. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Колапс
B	B. Анафілактичний шок
C	C. Алергічна реакція
D	D. Зомління
E	E. Спазм судин головного мозку

№	24. крок 2012
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У хворого 65-ти років на прийомі у лікаря-стоматолога розвинувся напад стенокардії. Який препарат вибору для купірування нападу у даній ситуації?
Правильна відповідь	A. Валідол
B	B. Строфантин
C	C. Анаприлін
D	D. Фуросемід
E	E. Еуфілін
№	25. крок 2011
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У хворого 39-ти років під час видалення 48 зуба виникли запаморочення, різка слабкість. Свідомість збережена. Шкіра бліда, холодна на дотик, волога. Дихання поверхневе, тахікардія, пульс слабкого наповнення. Температура і артеріальний тиск низькі. Яке ускладнення можна запідозрити у хворого?
Правильна відповідь	A. Колапс
B	B. Анафілактичний шок
C	C. Непритомність
D	D. Травматичний шок
E	E. набряк Квінке
№	26. крок 2011
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий 23-х років під час препарування зубів раптово знепритомнів. Спостерігалися різке збліднення шкірних покривів, холодний піт, похолодання кінцівок, значне уповільнення пульсу, зниження артеріального тиску. Такий стан тривав близько 2 хвилин. Який невідкладний стан розвинувся у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Непритомність
B	B. Шок
C	C. Колапс
D	D. Стенокардія
E	E. Інфаркт міокарда
№	27. . крок 2011
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН

Текст завдання	Хворий 40-ка років після проведеної анестезії відзначив появу різкої слабкості, нудоти, болю за грудниною, який іррадіює в лопаткову ділянку та в ліву руку, частішіання серцебиття. Триразове застосування нітрогліцерину не дало позитивного ефекту. Об'єктивно: хворий при свідомості, млявий, чоло вкрите холодним потом, відзначається блідість шкірних покривів, АТ- 100/60 мм рт.ст., тони серця глухі, пульс слабкого наповнення, ниткоподібний, аритмічний. Який стан розвивається у хворого?
Правильна відповідь	A. Інфаркт міокарда
B	B. Кардіогенна форма анафілактичного шоку
C	C. Напад стенокардії
D	D. Загострення виразкової хвороби шлунка
E	E. Гострий панкреатит
№	28. крок 2011
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий 43-х років доставлений до щелепно-лицевого відділення у тяжкому стані. Після огляду діагностована флегмона порожнини рота з розповсюдженням гнійного процесу на шию. Температура тіла 39, 5°С . АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв. ЧДР- до 24/хв. У положенні хворого лежачи на операційному столі з'явилися ознаки асфіксії. Які заходи необхідно провести у першу чергу?
Правильна відповідь	A. Трахеотомія
B	B. Надати хворому вертикального положення
C	C. Розтин флегмони під масковим наркозом
D	D. Проведення медикаментозного симптоматичного лікування
E	E. Зафіксувати язик
№	29. крок 2011
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Після проведення торусальної анестезії для препарування зубів під металокерамічні коронки розчином лідокаїну у пацієнта наступила слабкість, що з часом посилювалася, відчуття стиснення за грудниною. Об'єктивно: АТ- 60/20 мм рт.ст., шкірні покриви бліді, пульс частий, ниткоподібний. Почалися болі у животі, нудота, блювання. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Анафілактичний шок
B	B. Колапс
C	C. набряк Квінке
D	D. Непритомність

Е	Е. Гіпертонічний криз
№	30. крок 2011
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хвора 56-ти років знепритомніла на прийомі у стоматолога, який проводив лікування хронічного генералізованого пародонтиту. Об'єктивно: хвора бліда, шкіра і слизові оболонки сухі, дихання глибоке, прискорене, запах ацетону, пульс частий, ниткоподібний. Яка невідкладна допомога?
Правильна відповідь	А. Негайне введення інсуліну 60-100 ОД
В	В. Введення 0,5 мл 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду
С	С. Введення 1-2 мл 24% розчину еуфіліну
Д	Д. Проведення штучного дихання з рота в рот
Е	Е. Промивання шлунку за допомогою зонда
№	31. крок 2011
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хвора 56-ти років звернулася з метою санації порожнини рота. Діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 36 зуба. Проведена торусальна анестезія Sol. Ubistesini 4% - 1,8 ml. Через 10 хвилин хвора поскаржилася на оніміння руки і ноги зліва, посмикування лівого ока, біль у голові. АТ- 200/120 мм рт.ст. Які препарати потрібно ввести негайно?
Правильна відповідь	А. Гіпотензивні
В	В. Антигістамінні
С	С. Гормональні
Д	Д. Судинозвужуючі
Е	Е. Інгібітори протеолізу
№	32. . крок 2011
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Готуючись до препарування зуба під металокерамічну коронку, стоматолог провів хворому, який страждає на бронхіальну астму, провідникову анестезію 2% розчином новокаїну. Через декілька хвилин хворий поскаржився на утруднене дихання (більш утруднений видих), з'явився акроціаноз, вени шиї роздулись, Ps- 100/хв, ритмічний, АТ- 180/110 мм рт.ст. Перкуторно над легеньми визначається "коробочний"звук. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	А. Напад бронхіальної астми
В	В. Напад стенокардії
С	С. Тромбоз легеневої артерії
Д	Д. Бронхоектатична хвороба
Е	Е. Колапс

№	33. крок 2010
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У хворого 30-ти років під час лікування пульпіту 25 у якості знеболюючого засобу використали 2% розчин лідокаїну. Через декілька хвилин після ін'єкції з'явилися "задерев'янілість язика", задуха, важкість за грудниною, сухий кашель, ціаноз, загальне занепокоєння, судоми. АТ- 90/60 мм рт.ст. Встановіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	A. Анафілактичний шок
B	B. Гостра серцева недостатність
C	C. Непритомність
D	D. набряк Квінке
E	E. Епілепсія
№	34. крок 2010
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У хворого 66-ти років, що страждає на ІХС та атеросклероз, під час стоматологічного прийому з'явився сильний за груднинний біль з іррадіацією в ліву лопатку, який супроводжувався онімінням лівої руки. Об'єктивно: шкіра бліда, на лобі виступив піт. АТ- 140/90 мм рт.ст., Рс- 75/хв, ритмічний. Біль не знімається валідолом, але став зменшуватись після прийому нітрогліцерину. Яка хвороба зумовила напад у хворого?
Правильна відповідь	A. Стенокардія
B	B. Інфаркт міокарду
C	C. Гіпертонічний криз
D	D. Тахікардія
E	E. Пароксизмальна тахікардія
№	35. крок 2010
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Пацієнтка 62-х років звернулась до стоматолога з метою ортопедичного лікування 12, 21, 22 зубів. До протезування артеріальний тиск, за словами пацієнтки, був 165/110 мм рт.ст. У зв'язку з емоційними переживаннями тиск підвищився до 220/130 мм рт.ст. Який діагноз можна встановити?
Правильна відповідь	A. Гіпертонічний криз
B	B. Гостра дихальна недостатність
C	C. Гостра серцева недостатність
D	D. Непритомність
E	E. Колапс
№	36. крок 2010

Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	До клініки щелепно-лицевої хірургії надійшов поранений з розривом м'яких тканин піднебіння та глотки. Звисаючий клапоть з рани під час дихання частково, а інколи і повністю закриває вхід до гортані. Який вид асфіксії може статися у хворого?
Правильна відповідь	A. Клапанна
B	B. Аспіраційна
C	C. Обтураційна
D	D. Дислокаційна
E	E. Стенотична
№	37. крок 2010
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час видалення 14 зуба у пацієнта 64-х років з'явились скарги на біль у загруднинній ділянці з іррадіацією в спину. Відмічається блідість слизових та шкірних покривів, асиметрія пульсу на сонних артеріях. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий інфаркт міокарда
B	B. Гіпертонічний криз
C	C. Гостра дихальна недостатність
D	D. набряк Квінке
E	E. Колапс
№	38. крок 2010, 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Пацієнту виготовляються металокерамічні коронки на 11, 12 зуби. Перед препаруванням було проведено провідникову анестезію. Через кілька хвилин хворий відчув неспокій, шум у вухах, біль у животі, запаморочення. Дихання прискорене, пульс частий, АТ-60/40 мм рт.ст. Яку допомогу необхідно надати хворому в першу чергу?
Правильна відповідь	A. Ввести в/в 0,5 мл 0,1% р-ну адреналіну, преднізолон
B	B. Ввести промедол, супрастин
C	C. Піднести до носа ватку, змочену нашатирним спиртом
D	D. Надати хворому горизонтального положення
E	E. Ввести еуфілін
№	39. . крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН

Текст завдання	В очікуванні своєї черги біля кабінету стоматолога-ортопеда сиділа хвора 64-ти років. Раптово вона впала, з'явилося хрипле дихання, судомне посмикування рук та ніг, обличчя та шия набули ціанотичного відтінку, зіниці розширились, реакція на світло відсутня. Артеріальний тиск і пульс не визначаються. Тони серця не прослуховуються. Відзначено мимовільне сечовиділення. Який стан характеризується вказаними симптомами?
Правильна відповідь	A. Клінічна смерть
B	B. Епілепія
C	C. Шок
D	D. Кома
E	E. Колапс
№	40. крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У пацієнта 60-ти років після нескладного видалення 37 зуба спостерігається рясна коміркова кровотеча. З анамнезу встановлено, що хворий страждає на гіпертонічну хворобу впродовж останніх 6-ти років. В даний час АТ- 180/110 мм рт.ст. Яку невідкладну допомогу має надати лікар?
Правильна відповідь	A. Ввести гіпотензивні препарати і провести тугу тампонаду комірки
B	B. Провести тампонаду комірки гемостатичною губкою
C	C. Провести тугу тампонаду комірки йодоформним тампоном
D	D. Ушити комірку видаленого зуба
E	E. Ввести гемостатичні препарати
№	41. крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У пацієнта, який знаходиться на лікуванні у стоматолога, виникли тахікардія, серцебиття, пітливість, тремтіння, нудота, відчуття голоду. Свідомість збережена. Пацієнт страждає на інсулінозалежний цукровий діабет. Яку допомогу повинен надати стоматолог пацієнту?
Правильна відповідь	A. Припинити процедуру, дати цукор у будь-якій формі per os
B	B. Вкласти пацієнта на пласку поверхню і опустити головний кінець, відчинити вікна
C	C. Дати пацієнту нітрогліцерин у спреї або таблетку сублінгвально
D	D. Ввести внутрішньом'язево адреналін у дозі 0,5-1,0 мг
E	E. Ввести внутрішньовенно кортикостероїди
№	42. крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН

Текст завдання	Хвора 23-х років доставлена до травмпункту з забрудненою колото-різаною раною правої ступні. Проведена первинна хірургічна обробка рани, введена протиправцева сироватка. Через деякий час стан хворої погіршився: з'явилися різка слабкість, запаморочення, серцебиття. Об'єктивно: відзначається блідість шкірних покривів, холодний піт, частий пульс слабого наповнення до 100/хв. АТ- 90/40 мм рт.ст. Що стало причиною різкого погіршення стану хворої?
Правильна відповідь	A. Анафілактичний шок
B	B. Геморагічний шок
C	C. Больовий шок
D	D. Інфекційно-токсичний шок
E	E. Лікарська (сироваткова) хвороба
№	43. . крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Чоловік підібраний на вулиці у непритомному стані і доставлений до санпропускника. З невеликими інтервалами у нього спостерігаються повторні напади тонічних і клонічних судом рук і ніг. Об'єктивно: без свідомості, зіниці широкі, не реагують на світло. На язиці - сліди прикушування. Було мимовільне сечовиділення. Ознак вогнищового ураження головного мозку не виявлено. АТ- 140/90 мм рт.ст. Голова хворого може бути вільно приведена до грудей. Визначте найбільш імовірну патологію:
Правильна відповідь	A. Епілепсія, епілептичний статус
B	B. Паренхіматозний крововилив
C	C. Інфаркт мозку
D	D. Правець
E	E. Гострий менінгоенцефаліт
№	44. крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хвору було знайдено в непритомному стані в квартирі, яка опалювалась дровами, комин в печі був закритий, в кімнаті відчувався запах диму. Об'єктивно: хвора непритомна, шкіра та слизові вишневого кольору. Зіниці на світло не реагують, корнеальні і сухожилльні рефлексі відсутні, тонус м'язів знижений. Рс- 96/хв, слабого наповнення. Тони серця глухі, поодинокі екстрасистоли, АТ- 90/60 мм рт.ст. В нижніх відділах легенів поодинокі дрібнопухирчасті хрипи, ЧДР- 28/хв. Який найвірогідніший діагноз?
Правильна відповідь	A. Гостре отруєння оксидом вуглецю
B	B. Гостре отруєння хлором
C	C. Гостре отруєння сірчистим газом
D	D. Гостре отруєння метаном

Е	Е. Гостре отруєння бензолом
№	45. . крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час транспортування хворого 60-ти років лікар швидкої допомоги помітив погіршення його загального стану, відсутність пульсу, дихальних рухів грудної клітки, розширення зіниць. До приймального відділення 5 хвилин їзди. Що є першочерговою дією по відношенню до даного хворого?
Правильна відповідь	А. Розпочати серцево-легеневу реанімацію
В	В. Якнайшвидше довести хворого до лікарні
С	С. Внутрішньосерцево ввести адреналін
Д	Д. Налагодити інгаляцію кисню
Е	Е. Внутрішньовенно ввести поліглюкін
№	46. . крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Жінка 18-ти років впродовж 5-ти років хворіє на цукровий діабет. Отримує 36 ОД інсуліну на добу. Під час пневмонії стан різко погіршився: значно посилилась спрага, з'явився біль у животі, нудота, блювання, сонливість. Хвора відмовилась ввечері від їжі, не отримала чергову вечірню дозу інсуліну, а вранці знепритомніла. Об'єктивно: без свідомості, шкіра суха, тургор знижений. Язик сухий. Дихання шумне та глибоке, різкий запах ацетону з рота. Температура тіла - 36, 6° С, Рs- 100/хв, малий, АТ- 90/50 мм рт.ст. В сечі різко позитивна реакція на ацетон. Глюкоза крові - 33 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Кетоацидотична кома
В	В. Гіперосмолярна кома
С	С. Лактацидемічна кома
Д	Д. Печінкова кома
Е	Е. Церебральна кома
№	47. крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	В оранжереї ботанічного саду чоловік 28-ми років після того, як понюхав орхідею, зблід, знепритомнів. Об'єктивно: ЧСС- 115/хв, АТ- 50/0 мм рт.ст. Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?
Правильна відповідь	А. Преднізолон
В	В. Кордіамін
С	С. Строфантин

D	D. Мезатон
E	E. Димедрол
№	48. . крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий 68-ми років близько року приймав диклофенак з приводу болю у колінних суглобах. Напередодні ввечері після ситної вечері несподівано з'явилися рідкі випорожнення чорного кольору, різка слабкість, одноразове блювання, після якої він знепритомнів. Бригадою швидкої допомоги доставлений до клініки. Об'єктивно: хворий у свідомості, дещо загальмований, блідий, дихання 20/хв, Рs- 102/хв, АТ- 110/70 мм рт.ст. Живіт м'який, чутливий в епігастрії. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	A. Шлунково-кишкова кровотеча
B	B. Харчове отруєння
C	C. Інфаркт міокарда
D	D. Гостре порушення мозкового кровообігу
E	E. Тромбоз мезентеріальних артерій
№	49. крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий 55-ти років після проведення анестезії відзначив появу різкої слабкості, болю за грудниною, яка іррадіює в ліву руку і лопаткову ділянку, почащене серцебиття. Об'єктивно: притомний, млявий, лоб вкритий холодним потом, відзначається блідість шкірних покривів, АТ- 90/60 мм рт.ст., тони серця глухі, пульс ниткоподібний, аритмічний. Який стан розвивається в хворого?
Правильна відповідь	A. Інфаркт міокарда
B	B. Кардіогенна форма анафілактичного шоку
C	C. Напад стенокардії
D	D. Колапс
E	E. -
№	50. . крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хвора 56-ти років під час видалення зуба відзначила появу ниючого болю за грудниною, відчуття стиснення у грудях. Хірург-стоматолог, що проводив видалення, діагностував напад стенокардії. Що необхідно застосувати для купірування даного стану?
Правильна відповідь	A. Нітрогліцерин, валідол
B	B. Анальгін

C	C. Баралгін
D	D. Димедрол
E	E. Кетанов
№	51. крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час виконання місцевої анестезії (2 мл 10% лідокаїну) дівчинка 9-ти років зойкнула, знепритомніла, почалися генералізовані судоми. Об'єктивно: шкіра блідо-синюшна. Пульс намацати неможливо через судоми. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Інтоксикація лідокаїном
B	B. набряк Квінке
C	C. Анафілактичний шок
D	D. Бронхіальна обструкція
E	E. Фебрильні судоми
№	52. . крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У пацієнта 60-ти років після нескладного видалення 37 зуба спостерігається рясна коміркова кровотеча. З анамнезу встановлено, що хворий страждає на гіпертонічну хворобу протягом останніх 6-ти років. В даний час АТ-180/110 мм рт.ст. Яку невідкладну допомогу має надати лікар?
Правильна відповідь	A. Ввести гіпотензивні препарати і провести тугу тампонаду комірки
B	B. Провести тампонаду комірки гемостатичною губкою
C	C. Провести тугу тампонаду комірки йодоформним тампоном
D	D. Ушити комірку видаленого зуба
E	E. Ввести гемостатичні препарати
№	53. крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час препарування зуба у пацієнта стався епілептичний припадок. Визначте тактику лікаря в даній ситуації?
Правильна відповідь	A. Покласти пацієнта, голову набік, язик фіксувати
B	B. Не приймати ніяких заходів
C	C. Посадити у крісло у вертикальному положенні
D	D. Посадити пацієнта, голову наперед, фіксувати потилицю
E	E. Покласти пацієнта на живіт, зафіксувати руки, голова вниз
№	54. . крок 2008

Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	На прийомі у стоматолога в пацієнта 62-х років раптово виникли задишка і сухий кашель, відчуття задухи, що наростає. Стан прогресивно погіршується; число дихальних рухів досягло 30/хв, посилюється акроціаноз, з'явилося клекочуче дихання, з порожнини рота виділяється велика кількість пінистого харкотиння, психомоторне збудження. Артеріальна гіпертензія. Який патологічний стан розвинувся в хворого?
Правильна відповідь	A. набряк легень
B	B. Напад бронхіальної астми
C	C. Епілептичний напад
D	D. Анафілактичний шок
E	E. Спонтанний пневмоторакс
№	55. . крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	До приймального відділення доставлено хворого після ДТП. Під час огляду потерпілого у ділянці порожнини рота виявлена значних розмірів гематома з поширенням на ділянку шиї і значний набряк м'яких тканин дна порожнини рота та шиї. Мають місце ознаки асфіксії. Який вид невідкладної допомоги показаний даному хворому?
Правильна відповідь	A. Проведення трахеотомії
B	B. Введення лобеліну
C	C. Фіксація язика
D	D. Розтин і випорожнення гематоми
E	E. Проведення медикаментозного симптоматичного лікування
№	56. . крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота. Після проведення анестезії хворий відзначив нудоту, що з'явилася раптово, різку слабкість, відчуття стиснення за грудниною, біль у серці, виникло блювання. Хворий знепритомнів, з'явилися судоми. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Анафілактичний шок
B	B. Колапс
C	C. Зомління
D	D. Травматичний шок
E	E. Епілептичний напад

№	57. крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Чоловік 20-ти років отримав удар у ділянку підборіддя. Не непритомнів. Об'єктивно: загальний стан задовільний. набряк і гематома в ділянці нижньої щелепи з обох боків. Щелепа під час пальпації різко болісна. Відкриття рота обмежене. Розрив слизової оболонки порожнини рота в ділянці 44, 43 та 34, 35 зубів. Прикус порушений. Який тип асфіксії може розвинути в цього хворого?
Правильна відповідь	A. Дислокаційна
B	B. Обтураційна
C	C. Стенотична
D	D. Клапанна
E	E. Аспіраційна
№	58. крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	До клініки ортопедичної стоматології звернувся хворий 43-х років з метою протезування. В анамнезі: цукровий діабет протягом 15-ти років. Перед прийомом лікаря дуже хвилювався. Раптово стан хворого погіршився, виникла слабкість у кінцівках. Хворий покриття холодним липким потом, втратив свідомість. Який невідкладний стан виник у хворого?
Правильна відповідь	A. Гіпоглікемічна кома
B	B. Зомління
C	C. Гіперглікемічна кома
D	D. Анафілактичний шок
E	E. Інфаркт міокарда
№	59. крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хвора 25-ти років звернулася до клініки з метою санації порожнини рота. Під час препарування 45 зуба з приводу хронічного середнього карієсу хвора зблідла, на лобі виступив холодний липкий піт, з'явилася нудота, шум у вухах. Хвора знепритомніла. Об'єктивно: Ps- 50/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, зіниці звужені. Діагностуйте даний стан:
Правильна відповідь	A. Зомління
B	B. Анафілактичний шок
C	C. Стенокардія
D	D. Колапс
E	E. набряк Квінке

№	60. . крок 2008
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	В очікуванні своєї черги біля кабінету хірурга-стоматолога сиділа хвора 64-х років. Раптом вона впала, з'явилося хрипле дихання, судомні посмикування рук та ніг. Обличчя та шия стали ціанотичними, зіниці розширилися, реакція на світло відсутня, артеріальний тиск та пульс не визначаються, тони серця не прослуховуються, відзначено мимовільне сечовиділення. Для якого стану характерні наведені симптоми?
Правильна відповідь	A. Клінічна смерть
B	B. Втрата свідомості
C	C. Інсульт
D	D. Інфаркт міокарда
E	E. Колапс
№	61. крок 2007
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Для анестезії під час препарування зуба було використано препарат з немаркованої ампули. Під час препарування пацієнт знепритомнів. Об'єктивно: судоми, блідість шкірних покривів, АТ- 80/60 мм рт.ст. Яку помилку допустив лікар?
Правильна відповідь	A. Використав невідому речовину
B	B. Не обробив місце уколу
C	C. Не зробив алергічну пробу
D	D. Не з'ясував анамнез життя
E	E. Не мав права виконувати анестезію
№	62. крок 2007
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Під час препарування 37 зуба під штучну коронку лікар сепараційним диском пошкодив язик. Об'єктивно: з порожнини рота спостерігається значна кровотеча. На правій боковій поверхні язика - глибока різана рана близько 3 см завдовжки з рівними краями, з глибини якої - кровотеча яскраво-червоною кров'ю. Якою має бути тактика лікаря в даному випадку?
Правильна відповідь	A. Глибоке глухе прошивання рани
B	B. Антисептична обробка порожнини рота
C	C. Зупинка кровотечі шляхом накладання затискача в рані
D	D. Перев'язка зовнішньої сонної артерії
E	E. Перев'язка язикової артерії в трикутнику Пирогова

№	63. крок 2007
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Лікар, що надавав допомогу хворому, інфікованому на ВІЛ, випадково кореневою голкою пошкодив ділянку шкіри долоні. Які першочергові дії лікаря?
Правильна відповідь	A. Витиснути кров, обробити 70% розчином спирту
B	B. Витиснути кров, обробити міцним розчином калію перманганату
C	C. Накласти джгут на плече
D	D. Обробити 5% розчином йоду
E	E. Обробити 3% розчином перекису водню
№	64. крок 2007
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Через 1 хвилину після проведення торусальної анестезії 2% розчином новокаїну 4 мл з приводу видалення 17, хворий почав скаржитися на відчуття утруднення дихання. Об'єктивно: верхня та нижня губи, слизова оболонка гортані та порожнини рота набрякли, різко гіперемовані. Яке ускладнення виникло в хворого?
Правильна відповідь	A. Набряк Квінке
B	B. Інтوكсикація анестетиком
C	C. Колапс
D	D. Кома
E	E. Анафілактичний шок
№	65. крок 2007
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Загальний стан хворого почав погіршуватися після проведення інфраорбітальної анестезії за допомогою ультракаїну 4% DS-forte 1,0. З'явилися запаморочення і дзвін у вухах, стиснення за грудниною, блідість шкіри. Виступив холодний піт. Виражена тахікардія, пульс слабкого наповнення. Артеріальний тиск почав знижуватись, короточасні судоми. Знепритомнів на одну хвилину. Яке ускладнення можна запідозрити в хворого?
Правильна відповідь	A. Зомління
B	B. Анафілактичний шок
C	C. Колапс
D	D. Кропив'янка
E	E. Епілептичний напад
№	66. крок 2007
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН

Текст завдання	Під час стоматологічного прийому пацієнт 15-ти років відчув різке погіршення загального самопочуття, запаморочення. Об'єктивно: блідість шкірних покривів, холодний піт, різке зниження артеріального тиску, частий та слабкий пульс, часте поверхневе дихання, периферичні вени пустішають, свідомість збережена. Який невідкладний стан виник у даного пацієнта?
Правильна відповідь	A. Колапс
B	B. Анафілактичний шок
C	C. Зомління
D	D. Артеріальна гіпертензія
E	E. Ішемічна хвороба серця
№	67. крок 2007
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий доставлений до медичного закладу в коматозному стані. Зі слів супроводжуючих, знепритомнів під час тренування на завершальному етапі марафонської дистанції. Яка кома, найбільш вірогідна, в даного пацієнта?
Правильна відповідь	A. Гіпоглікемічна
B	B. Гіперглікемічна
C	C. Гіпотиреоїдна
D	D. Печінкова
E	E. Ацидотична
№	68. . крок 2013
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У хворого після контакту з хімічними речовинами на виробництві раптово виникло стридорозне дихання, осиплість голосу, "гавкаючий"кашель, стала зростати задишка. Об'єктивно: акроціаноз. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. набряк гортані
B	B. Рак гортані
C	C. ТЕЛА
D	D. Ателектаз легень
E	E. Пневмоторакс
№	69. . крок 2013
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У 50-річного ливарника під час плавки металу (у літню пору) з'явилися сильний головний біль, загальна слабкість, блювання. Об'єктивно: температура тіла 39° C , АТ- 140/90 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	A. Тепловий удар
B	B. Гіпертонічний криз
C	C. Геморагічний інсульт
D	D. Гостре респіраторне захворювання
E	E. Загострення органічного захворювання ЦНС
№	70. крок 2012
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	Хворий 37-ми років страждає на хронічний пародонтит, абсцедування, стадія загострення. Під час накладання пародонтальних пов'язок з антибіотиками, пацієнт поскаржився на свербіж обличчя, став занепокоєним. Дихання набуло спазматичного відтінку, обличчя набрякло, особливо в ділянці щелепи, пульс прискорився. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. набряк Квінке
B	B. Напад серцевої астми
C	C. Напад бронхіальної астми
D	D. Аспіраційна асфіксія
E	E. Інфаркт міокарда
№	71. . крок 2012
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	На прийом до лікаря-стоматолога звернувся хворий 60-ти років. Діагноз: загострення хронічного періодонтиту 37 зуба. З анамнезу: гіпертонічна хвороба III ступеня важкості, ішемічна хвороба серця. Після проведення торусальної анестезії хворий раптово відчув себе погано, з'явилися скарги на головний біль, затерпання рук, відбулося блювання і хворий знепритомнів. АТ-180/100 мм рт.ст., Ps- 95/хв., інспіраторна задишка. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Геморагічний інсульт
B	B. Ішемічний інсульт
C	C. Інфаркт міокарда
D	D. Епілептичний напад
E	E. Напад стенокардії напруги
№	72. . крок 2012
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН

Текст завдання	Пацієнт 35-ти років страждає на цукровий діабет 1 типу. Перед відвідуванням лікаря-стоматолога інсулін не вводив. Діагноз: гострий пульпіт 13 зуба. Через 5 хвилин після проведення інфраорбітальної анестезії лідокаїном з адреналіном хворий раптово зблід і знепритомнів. Об'єктивно: сухість шкіри, реакція на больові подразники відсутня, зіничний, рогівковий рефлекс різко знижені, дихання ледь помітне, тони серця приглушені. Яка патологія розвинулася у даного пацієнта?
Правильна відповідь	A. Гіперглікемічна кома
B	B. Інтоксикація анестетиком
C	C. Гіпоглікемічна кома
D	D. Клінічна смерть
E	E. Анафілактичний шок
№	73. крок 2009
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	На прийомі у лікаря пацієнт 35-ти років поводить себе занепокоєно, постійно висловлює скарги на страх перед стоматологом, неохоче дозволяє себе оглядати. Препарати якої групи бажано дати пацієнту перед стоматологічною маніпуляцією?
Правильна відповідь	A. Седативні
B	B. Анальгетики
C	C. Гіпотензивні
D	D. Серцеві глікозиди
E	E. Десенсибілізуючі
№	74. крок 2007
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН
Текст завдання	У чоловіка 22-х років під час препарування зубів без анестезії раптово виникли запаморочення, нудота, різка блідість обличчя, легкий ціаноз губ, короткочасна втрата свідомості. Що обумовило невідкладний стан у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Зомління
B	B. Інфаркт міокарда
C	C. Гіпертонічний криз
D	D. Колапс
E	E. Стенокардія
№	75. . крок 2013
Тема	ТЕМА НЕВІДКЛАДНИЙ СТАН

Текст завдання	Хворий 28-ми років під час проведення анестезії відзначив появу слабкості, легкого запаморочення, потемніння в очах. Об'єктивно: хворий блідий, лоб вкритий холодним потом. АТ- 90/50 мм рт.ст. Передвісниками якого стану є зазначені симптоми?
Правильна відповідь	A. Непритомність
B	B. Анафілактичний шок
C	C. Напад стенокардії
D	D. Кардіальні болі
E	E. Колапс
№	1. крок 2016, 2012, 2011
Тема	ТЕМА ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ
Текст завдання	У хворого 30-ти років після вогнепального поранення утворився тотальний дефект носа, рубцева деформація шкіри щік і підочних ділянок, що прилягають до дефекту. Оберіть оптимальний варіант відновлення носа:
Правильна відповідь	A. Радикальна ринопластика за Ф.Хітровим
B	B. Трилопатовий стебельчастий клапоть
C	C. Клапоть на ніжці з чола
D	D. Вільний шкірний трансплантат
E	E. Два клаптя на ніжці зі щік
№	2. крок 2016
Тема	ТЕМА РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ
Текст завдання	У пацієнта 40-ка років виявлено післяопіковий дефект приротової ділянки зліва. Після нанесення відповідної розмітки на тканинах йому під ендотрахеальним наркозом через ніс, проведено серединний розріз, від кінців якого додатково виконали ще 2 розрізи, які за довжиною рівні першому. Після цього трикутні клапті мобілізували у шарі клітковини гострим шляхом і поміняли місцями між собою. Потім на рану наклали шви. Яку операцію виконали цьому пацієнтові?
Правильна відповідь	A. Пластика зустрічними трикутними клаптями за Лімбергом
B	B. Пластика місцевими тканинами за Тіршем
C	C. Пластика клаптем на ніжці
D	D. Пластика стеблом Філатова
E	E. "Індійський спосіб" пластики
№	3. . крок 2014
Тема	ТЕМА РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ
Текст завдання	У хворого 34-х років посттравматичний дефект крила носа зліва з порушенням цілісності крильного хряща. Який метод лікування буде найбільш ефективним?

Правильна відповідь	A. Вільна пластика частиною вушної раковини за Суисловою
B	B. Вільна пересадка шкіри
C	C. Вільна пластика хрящем за А.О.Лімберг
D	D. Пластика Філатовським стеблом
E	E. Пластика шкірним клаптем за Седило
№	4. крок 2014, 2013
Тема	ТЕМА РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ
Текст завдання	Хворому 25ти років, що знаходиться на лікуванні у клініці щелепнолицевої хірургії з приводу амелобластоми нижньої щелепи з локалізацією у ділянці кута, призначена операція: часткова резекція нижньої щелепи з одночасною кістковою аутопластикою. Звідки краще взяти кістковий трансплантат у хворого?
Правильна відповідь	A. Гребінець клубової кістки
B	B. Ключиця
C	C. Кістки ступні
D	D. Стегнова кістка
E	E. VI ребро
№	5. крок 2013
Тема	ТЕМА РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ
Текст завдання	До відділення щелепно-лицевої хірургії скеровано хворого для пластичного лікування післятравматичного дефекту крила носа діаметром до 3,0 см. Давність травми - півроку. Який вид пластики показаний в даному клінічному випадку?
Правильна відповідь	A. Шкірно-хрящовим трансплантатом вушної раковини
B	B. Місцевими тканинами носогубної або щічної ділянок
C	C. Клаптем на ніжці лобної та щічної ділянок
D	D. Філатовським стеблом
E	E. Вільна пластика дермальним клаптем на всю товщину
№	6. . крок 2012
Тема	ТЕМА РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ
Текст завдання	Батьки хлопчика, який народився з вадою піднебіння, звернулися дощелепно-лицевого хірурга. Встановлений діагноз: природжене ізольоване неповне незрощення піднебіння. В якому віці показане оперативне лікування дитини?
Правильна відповідь	A. В дошкільному віці
B	B. В будь-якому віці
C	C. В віці до року

D	D. В молодшому шкільному віці
E	E. В старшому шкільному віці
№	7. крок 2009
Тема	ТЕМА РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНА ХІРУРГІЯ
Текст завдання	У дитини 3-х місяців вроджений дефект тканин у порожнині рота. Об'єктивно: губа ціла, у порожнині рота щілеподібний дефект м'якого піднебіння і середнього відділу твердого піднебіння. Встановлено діагноз: вроджене повне незрощення м'якого піднебіння, частково твердого. Визначте групу диспансеризації за Колесовим:
Правильна відповідь	A. Перша
B	B. Друга
C	C. Третя
D	D. Четверта
E	E. П'ята
№	крок 2016, 2015, 2012, 2011, 2010
Тема	ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У хворого 62-х років серединний перелом нижньої щелепи з утворенням суглоба. Об'єктивно: зубна формула 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухомість відламків незначна, зміщення немає. Застосування якого протеза є найбільш доцільним?
Правильна відповідь	A. Мостоподібний без шарніра
B	B. Пластинковий без шарніра
C	C. Пластинковий з шарніром Гаврилова
D	D. Пластинковий з шарніром Оксмана
E	E. Пластинковий з шарніром Вайнштейна
№	2. крок 2016, 2011
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 28-ми років після падіння звернувся до клініки щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на обмеження відкривання рота, відчуття оніміння шкіри у підочній ділянці зліва, верхньої губи, крила носа, біль у лівій виличній ділянці, що посилюється при спробі відкрити рот. Пальпаторно визначається симптом "сходинок". Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом виличної кістки зі зміщенням
B	B. Перелом виличної кістки без зміщення
C	C. Перелом верхньої щелепи за середнім типом
D	D. Перелом верхньої щелепи за верхнім типом

Е	Е. Перелом виличної дуги зліва
№	3. крок 2016, 2015, 2012, 2011
Тема	ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	У хворого 59-ти років двосторонній перелом нижньої щелепи в ділянці 44, 34 зубів, решта жувальних зубів відсутня, беззубі фрагменти не зміщені, але рухомі. Який ортопедичний апарат доцільно застосувати для іммобілізації відламків?
Правильна відповідь	А. Шина Ванкевич з пелотами
В	В. Апарат Рудько
С	С. Шина Лімберга
D	D. Апарат Петросова
Е	Е. Апарат Збаржа
№	4. крок 2016, 2014
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Хворий 46-ти років скаржиться на болісне і утруднене закривання рота, неможливість приймати їжу і різкі болі в скроневопіднижньощелепному суглобі. Об'єктивно: рот напіввідкритий, нижня щелепа зміщена дистально, гілки її зміщені догори, тризм жувальних м'язів, припухлість у ділянці скроневопіднижньощелепних суглобів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Дистальний вивих нижньої щелепи
В	В. Двобічний перелом нижньої щелепи в ділянці кутів
С	С. Гострий артрит скроневопіднижньощелепних суглобів
D	D. Двобічний анкілоз скроневопіднижньощелепного суглоба
Е	Е. Двобічні переломи суглобових відростків гілки нижньої щелепи
№	5. крок 2016, 2014, 2009
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Хлопчику 4 роки. Дві години тому отримав травму. Батьки звернулися до чергового лікарястоматолога, який поставив діагноз: інтрузійний вивих 61 зуба. Яка лікувальна тактика лікаря?
Правильна відповідь	А. Видалення
В	В. Спостереження
С	С. Репозиція 61 зуба
D	D. Шинування 61 зуба
Е	Е. Депульпування 61 зуба
№	6. крок 2016, 2013
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД

Текст завдання	Чоловік 25ти років скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи, патологічну рухливість, кровотечу з порожнини рота, порушення прикусу, неможливість пережовування їжі. 10 годин тому отримав травму. При обстеженні встановлений поодинокий перелом нижньої щелепи між першим і другим премолярами. Зміщення відламків незначне. Зуби усі в наявності, стійкі, правильної анатомічної форми. Який оптимальний метод лікування хворого?
Правильна відповідь	A. Двощелепні назубні шини
B	B. Остеосинтез із використанням мініпластинки
C	C. Однощелепна назубна шина
D	D. Капова шина
E	E. Накісний апарат
№	7. крок 2016, 2015, 2012, 2011
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Загальний стан пораненого середньої важкості, свідомість збережена, шкіра бліда із синюшним відтінком, губи ціанотичні. Дихання часте, утруднене (28/хв.). Є підозра на дислокаційну асфіксію. На якому етапі медичної евакуації пораненого язик прошивається шовковою лігатурою?
Правильна відповідь	A. На МПБ
B	B. На полі бою
C	C. На МПП
D	D. В ОМедБ
E	E. У спеціалізованому шпиталі
№	8. крок 2016, 2015, 2012, 2011
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	До лікарні доставлений хворий після ДТП. Об'єктивно: обличчя асиметричне, забій, гематоми ментальної ділянки, відсутній 33 зуб. Прикус порушений незначно. На Рограмі лінія зламу по осі комірки 33 зуба. Який метод іммобілізації слід застосувати для лікування хворого?
Правильна відповідь	A. Шини із зачіпними гачками на міжщелепових еластичних тягах
B	B. Міжщелепова лігатурна фіксація за Айві
C	C. Внутрішньоротовий остеосинтез
D	D. Фіксація гладкою шиноюскобою
E	E. Фіксація шиною з розпіркою
№	9. крок 2016, 2015
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД

Текст завдання	Хворий 38ми років звернувся зі скаргами на болі у ділянці верхньої щелепи, порушення прикусу, що виникли після удару. Об'єктивно: середня зона обличчя сплюснена. Прикус відкритий. При зміщенні альвеолярного відростка верхньої щелепи визначається рухливість середньої зони обличчя. Під час пальпації визначається симптом "сходінки" по нижньоочному краю, виличноальвеолярному гребеню з обох боків. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	A. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
B	B. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (нижній тип)
C	C. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (верхній тип)
D	D. Перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи
E	E. Перелом кісток носа
№	10. крок 2016
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У пораненого на полі бою виявлено рану правої скроневої ділянки. На рану накладена асептична пов'язка із індивідуального перев'язувального пакету, застосована знеболююча і антибактеріальна терапія. На якому етапі медичної евакуації пораненому вводиться правцевий анатоксин?
Правильна відповідь	A. МПП
B	B. На полі бою
C	C. МПБ
D	D. ОМедБ
E	E. ОМЗ
№	11. крок 2016
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 22х років звернувся до щелепнолицевого відділення з попереднім діагнозом: перелом виросткового відростка нижньої щелепи зліва. Яке найбільш інформативне дослідження треба провести хворому у першу чергу?
Правильна відповідь	A. Вивчити тримірне зображення відламків
B	B. Визначити кровотік у щілині перелому
C	C. Визначити ступінь зміщення відламків
D	D. Визначити візуалізацію щілини перелому
E	E. Визначити рівень лінії перелому по зовнішній і внутрішній кісткових пластинках
№	12. крок 2016
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД

Текст завдання	Хворий із рваною раною щічної області звернувся до лікаря за медичною допомогою. Травма побутова. Лікар, оглянувши хворого, вирішує провести ранню хірургічну обробку рани. Протягом якого часу після поранення проводиться цей вид обробки?
Правильна відповідь	A. Перша доба
B	B. Тиждень
C	C. Місяць
D	D. Два тижні
E	E. Три доби
№	13. крок 2015
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	У хворого 30-ти років свіжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення відламків. Який ортопедичний апарат за призначенням показаний у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Фіксуючий
B	B. Направляючий
C	C. Заміщуючий
D	D. Вправляючий
E	E. Формуючий
№	
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Хворий 24-х років отримав травму під час бійки. Діагноз: перелом лівої вилицевої кістки зі зміщенням, перелом передньої стінки верхньощелепного синусу. Яке оперативне втручання показане хворому?
Правильна відповідь	A. Радикальна гайморотомія з репозицією відламків
B	B. Радикальна гайморотомія
C	C. Остеотомія верхньої щелепи
D	D. Остеосинтез вилицевої кістки
E	E. Репозиція відламків
№	15. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Хворий 50-ти років із вогнепальним пораненням нижньої щелепи та дефектом кісткової тканини в ділянці підборіддя. Який метод імобілізації йому показаний?
Правильна відповідь	A. Позаротовий апарат за типом Рудька
B	B. Двощелепна шина із зачіпними петлями та міжщелепним еластичним витягуванням

С	С. Кістковий шов
D	D. Однощелепна шина-скоба
Е	Е. Фіксація за допомогою спиць і стрижнів
№	16. крок 2015
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У хворого травматичний серединний перелом нижньої щелепи без зміщення фрагментів. Всі зуби інтактні. Яку назубну шину необхідно застосувати для фіксації відламків?
Правильна відповідь	A. Гладка шина-скоба
В	B. З зачіпними гачками
С	С. Вебера
D	D. Стандартна Васильєва
Е	Е. З похилою площиною
№	17. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У хворого 41-го року встановлений діагноз: перелом альвеолярного відростка нижньої щелепи. Об'єктивно: зубні ряди інтактні. При змиканні верхньої та нижньої щелеп відзначається множинний контакт. Необхідне транспортування у спеціалізований лікувальний заклад. Яка долікарська допомога показана у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Підборідна праща Ентіна
В	B. Гладенька шина-скоба
С	С. Стандартна шина за Васильєвим
D	D. Шина із зачіпними петлями за Тігерштедтом
Е	Е. Лігатурне зв'язування за Айві
№	18. крок 2015, 2014
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворого 57-ми років із шизофренією в стадії загострення, направлено до щелепнолицьового стаціонару з діагнозом: перелом нижньої щелепи в ділянці 34-35 зубів зі зміщенням відламків. Який метод лікування йому показаний?
Правильна відповідь	A. Остеосинтез
В	B. Однощелепна гладенька шина-скоба
С	С. Двощелепна назубна шина
D	D. Шина Вебера
Е	Е. Шина Ванкевич
№	19. крок 2015, 2011, 2010

Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Постраждалий 27-ми років доставлений до відділення шелепно-лицевої хірургії з діагнозом: різана рана правої щоки. Травма побутова, нанесена під час бійки. У постраждалого крайній термін проведення ранньої ПХО рани без попередньої ін'єкції антибіотиків складає не більше:
Правильна відповідь	A. 24 годин
B	B. 48 годин
C	C. 72 годин
D	D. 12 годин
E	E. 1 години
№	20. крок 2015, 2013
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 34-х років потрапив в авто-транспортну аварію. Свідомість не втрачав. Скарги на головний біль, запаморочення, загальну слабкість, нудоту. Через 12 годин після травми з'явився "симптом окулярів", який не виходить за межі колового м'яза ока. Даний симптом характерний для перелому:
Правильна відповідь	A. Кісток основи черепа
B	B. Верхньої щелепи за Ле Фор II
C	C. Кісток носа
D	D. Виличних кісток
E	E. Лобних кісток
№	21. крок 2015, 2014
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 19-ти років звернувся зі скаргами на біль у ділянці верхньої щелепи, кровотечу з носа, неможливість жування. Дві години тому отримав травму у ділянку верхньої губи. Свідомість не втрачав. Об'єктивно: виражений набряк і гематома верхньої губи, що наростає. Весь верхній зубний ряд разом з твердим піднебінням зміщений дозад. Пальпаторно визначається патологічна рухливість і біль у ділянці грушоподібного отвору, вилично-альвеолярних гребенів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (нижній)
B	B. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
C	C. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (верхній)
D	D. Перелом виличних кісток
E	E. Перелом кісток носа
№	22. крок 2015, 2014, 2011, 2010

Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Постраждалий отримав травму обличчя та скроневої ділянки. Встановлено діагноз: перелом виличної дуги. Відростки яких кісток черепа пошкоджені?
Правильна відповідь	A. Скроневий відросток виличної кістки і виличний відросток скроневої кістки
B	B. Виличний відросток лобної кістки і виличний відросток скроневої кістки
C	C. Скроневий відросток виличної кістки і виличний відросток лобної кістки
D	D. Виличний відросток верхньої щелепи і виличний відросток скроневої кістки
E	E. Виличний відросток верхньої щелепи і виличний відросток лобної кістки
№	
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 33-х років висловлює скарги на біль і набряк лівої половини обличчя. З анамнезу: травму отримав добу тому при падінні на сходи. Свідомість не втрачав, нудоти, блювання не було. Об'єктивно: гематома і набряк м'яких тканин виличної ділянки зліва, під час пальпації визначається деяке западання м'яких тканин і порушення цілісності виличної дуги зліва. Рот відкриває на 1,0 см. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом виличної дуги зліва
B	B. Перелом нижньої щелепи у ділянці суглобового відростка зліва
C	C. Перелом нижньої щелепи у ділянці кута зліва
D	D. Передній лівобічний вивих нижньої щелепи
E	E. Перелом верхньої щелепи Ле Фор II
№	24. крок 2014
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У хворого 37-ми років односторонній відкритий перелом нижньої щелепи зліва на рівні ментального отвору, зі зміщенням. У хворого наявні всі зуби. Йому планується іммобілізація відламків. Лінія перелому проходить між 34-35 зубами. Яку шину Тігер-штедта доцільно використати?
Правильна відповідь	A. Двощелепна шина із зачіпними гачками
B	B. З розпірочним вигином
C	C. Гладенька шина-скоба
D	D. Шина з похилою площиною
E	E. –
№	25. крок 2014
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД

Текст завдання	Військовослужбовець 21-го року отримав осколкове поранення в ділянці підборідного відділу нижньої щелепи, що призвело до відриву підборіддя та виникнення асфіксії. Який найбільш імовірний вид асфіксії має місце у потерпілого?
Правильна відповідь	A. Дислокаційна
B	B. Стенотична
C	C. Клапанна
D	D. Аспіраційна
E	E. Обтураційна
№	26. . крок 2014
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У військовослужбовця 20-ти років, обпеченого полум'ям вогню, на фоні гіперемованої та набряклої шкіри обличчя, виявлено різної величини пухирі, заповнені прозорою рідиною. Який ступінь опіку шкіри обличчя?
Правильна відповідь	A. II
B	B. I
C	C. III-A
D	D. III-B
E	E. IV
№	27. крок 2014
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 46-ти років проведено паратидектомію з приводу доброякісної пухлини привушної слинної залози. В післяопераційному періоді спостерігається опущення кута рота, зміщення серединної лінії в здоровий бік, утруднення мови. Яка з гілок лицевого нерву уражена при оперативному втручанні?
Правильна відповідь	A. Крайова гілка нижньої щелепи
B	B. Щічна гілка
C	C. Вилична гілка
D	D. Шийна гілка
E	E. Сконева гілка
№	28. крок 2014
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 67ми років після отриманої травми скаржить на утруднене відкривання рота, оніміння у підочній ділянці та у ділянці верхньої губи зліва. Об'єктивно: шкірні покриви у кольорі не змінені, наявне западання у виличній ділянці, "сходінка" по нижньому краю очної ямки. Рот відкривається на 2,5 см. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом виличної кістки

В	В. Суборбітальний перелом верхньої щелепи
С	С. Субназальний перелом верхньої щелепи
Д	Д. Перелом виличної дуги
Е	Е.
№	29. крок 2014
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	У хворого 26ти років різана рана бічної поверхні спинки язика внаслідок травми сепараційним диском. В результаті потрапляння крові у дихальні шляхи виникла асфіксія. Яка форма асфіксії виникла у хворого?
Правильна відповідь	А. Аспіраційна
В	В. Клапанна
С	С. Дислокаційна
Д	Д. Стенотична
Е	Е. Обтураційна
№	30. крок 2013
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Хвора 48-ми років була доставлена в лікарню зі скаргами на наявність рани щоки, а також сильний головний біль, нудоту, запаморочення. З анамнезу: травма при падінні. Після обстеження був встановлений діагноз: забійно-рвана рана щоки. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку. До яких пошкоджень можна віднести дану травму?
Правильна відповідь	А. Поєднане
В	В. Ізольоване
С	С. Комбіноване
Д	Д. Множинне
Е	Е. Поодиноке
№	31. . крок 2013
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Хвора 30-ти років скаржиться на обмеження відкриття рота. З анамнезу: вдарилася підборіддям об твердий предмет. Об'єктивно: обличчя асиметричне, відкриття рота обмежено до 1,5 см, прикус порушений. Пальпаторно визначається біль по передньому краю гілки нижньої щелепи зліва, симптом "навантаження" позитивний в ділянці гілки нижньої щелепи зліва. Визначте обов'язкове додаткове обстеження хворої:
Правильна відповідь	А. Рентгенологічне дослідження нижньої щелепи в двох проєкціях
В	В. УЗД скронево-нижньощелепного суглоба

С	С. Електроміографія, ультразвукове дослідження
D	D. Загальне клінічно-лабораторне дослідження стану хворої
Е	Е. Морфологічне дослідження пунктату хворобливого місця
№	32. крок 2013
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У хворого 29-ти років, який отримав травму 3 години тому, відмічається западання лівої виличної кістки, симптом "сходинки" в середній третині підчочномкового краю, порушення чутливості у ділянці розгалуження підчочномкового нерва зліва, крововилив у клітковину лівого ока. Відкриття рота вільне. Найбільш імовірно у хворого перелом:
Правильна відповідь	A. Лівої виличної кістки
B	B. Верхньої щелепи Ле-Фор II
C	C. Лівої виличної дуги
D	D. Лівої виличної кістки та дуги
E	E. Верхньої щелепи Ле-Фор III
№	33. крок 2013
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворому 25-ти років під час госпіталізації до щелепно-лицевого відділення був встановлений діагноз: лівобічний перелом нижньої щелепи у ділянці тіла зі зміщенням. Хворому було проведено двощелепне шинування. Який вид шин доцільно застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Шина Тігерштедта із зачіпними петлями
B	B. Гладенька шина-скоба
C	C. Шина з розпірковим вигином
D	D. Шина з похилою площиною
E	E. Шина Вебера
№	34. . крок 2013
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	До щелепно-лицевого відділення звернувся хворий 38-ми років у стані алкогольного сп'яніння, зі скаргами на наявність рани у ділянці щоки і підборіддя зліва, набряк та біль у цій ділянці. Три години тому був вкушений бродячим собакою. Об'єктивно: у ділянці лівої щоки і підборіддя відзначається рана з нерівними краями, розміром 5,0 см, заповнена кров'яним згустком, яка не проникає у порожнину рота. Якою буде тактика лікування після проведення первинної хірургічної обробки рани?
Правильна відповідь	A. Курс антирабічних щеплень, антибактеріальне медикаментозне лікування
B	B. Медикаментозне лікування, десенсибілізуючі, знеболюючі, антибактеріальні препарати

С	С. Санація порожнини рота, антибактеріальні препарати
D	D. Фізіотерапевтичне лікування - електрофорез із лідазою
Е	Е. Термінове виведення із стану алкогольного сп'яніння
№	35. крок 2012
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Чоловік поранений осколком снаряду. Велика рана з нерівними рваними краями розташовується у межах всієї лівої половини щоки на протязі 9 см, без ознак пошкодження лицевого нерва. Слизова оболонка порожнини рота, зуби і альвеолярний відросток верхньої щелепи не пошкоджені. Після поранення пройшло 13 годин. Яка хірургічна обробка рани показана?
Правильна відповідь	A. Рання первинна хірургічна обробка
B	B. Відстрочена первинна хірургічна обробка
С	С. Вторинна хірургічна обробка
D	D. Хірургічна обробка рани не показана
Е	Е. Пізня первинна хірургічна обробка
№	36. крок 2012
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	В результаті автодорожньої травми постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму та двобічний перелом нижньої щелепи у ділянці ментальних отворів. Який вид асфіксії загрожує хворому?
Правильна відповідь	A. Дислокаційна
B	B. Обтураційна
С	С. Стенотична
D	D. Клапанна
Е	Е. Аспіраційна
№	37. крок 2012
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У хворого 62-х років діагностовано відкритий травматичний злам нижньої щелепи зліва на рівні 37, 38 зубів з різким зміщенням фрагментів. Об'єктивно: повна відсутність зубів, хворий користується знімними протезами, на рівні 37, 38 зубів - розрив слизової ясен. Короткий кістковий фрагмент оголений, зміщений вверх, назовні. Який вид лікування необхідно провести даному хворому?
Правильна відповідь	A. Остеосинтез відламків нижньої щелепи
B	B. Шина Гунінга Порта і підпідборідна праща
С	С. Шина Вебера

D	D. Апарат Рудька
E	E. Апарат Панчохи, Бернацького
№	38. крок 2012
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	До стоматолога-хірурга звернувся хворий з забитою раною верхньої губи, що сталася 12 годин потому. Якою буде хірургічна обробка рани в цьому випадку?
Правильна відповідь	A. Первинна хірургічна обробка
B	B. Пізня хірургічна обробка
C	C. Вторинна хірургічна обробка
D	D. Відкладена хірургічна обробка
E	E. Хірургічна обробка у даному випадку не проводиться
№	39. крок 2012
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	До відділення шелепно-лицевої хірургії звернувся чоловік 29-ти років зі скаргами на біль у середньому відділі обличчя, що виник після травми. Об'єктивно: визначається припухлість м'яких тканин у ділянці верхньої щелепи справа і зліва, гематоми у ділянці повік, рухливість верхньої щелепи і кісток носа, кісткові сходинок по нижньоочному краю з обох боків та у ділянці перенісся. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
B	B. Перелом кісток носа
C	C. Перелом виличної кістки
D	D. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I
E	E. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III
№	
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩЛД
Текст завдання	На медичний пункт полку надійшов постраждалий з вогнепальним пораненням навколоушно-жувальної ділянки справа. У ході обстеження виявлено, що у пацієнта не закривається праве око, опущений кут рота справа. Дана симптоматика обумовлена пошкодженням:
Правильна відповідь	A. Лицевого нерва
B	B. Мімічних м'язів
C	C. Паренхіми навколоушної слинної залози
D	D. Капсули навколоушної слинної залози
E	E. Вивідної протоки навколоушної

№	41. крок 2011, 2010
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Жінка 25-ти років надійшла до відділення щелепно-лицевої хірургії через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, на обличчі краплі поту. Дихання переривчасте, утруднене. Рс- 120/хв, ниткоподібний, АТ- 70/60 мм рт.ст. На обличчі у ділянці щоки зліва - рана, що проникає до порожнини рота. Під час транспортування жінка знаходилася в положенні на спині з закинутою головою. Який тип асфіксії розвивається у даної хворої?
Правильна відповідь	A. Аспіраційна
B	B. Клапанна
C	C. Стенотична
D	D. Обтураційна
E	E. Дислокаційна
№	42. крок 2011
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Хворий 25-ти років отримав травму обличчя. Об'єктивно: значний набряк м'яких тканин лівої половини обличчя, крововилив в склеру лівого ока, крепітація в ділянці кісток носа. Пальпаторно: рухомість верхньої щелепи, при її перкусії - тимпаніт. На Ro-грамі: відмічається лінія зламу через нижній край орбіти з обох боків по вилично-криловому шву, який проходить за горб верхньої щелепи. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом верхньої щелепи за Le Fort II
B	B. Перелом верхньої щелепи за Le Fort I
C	C. Перелом верхньої щелепи за Le Fort III
D	D. Перелом лівої суглобової кістки
E	E. Перелом кісток носа
№	43. крок 2011, 2009
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Поранено солдата 20-ти років. Об'єктивно: повністю відсутні підборіддя і нижня щелепа до 34 і 45 зубів. 45, 46, 47, 48, 34, 35, 36, 37 зуби стійкі. На якому етапі медичної евакуації пораненому буде надана спеціалізована медична допомога?
Правильна відповідь	A. СВІХШ
B	B. МПБ
C	C. МПП
D	D. ОМО
E	E. ОмедБ

№	44. крок 2011
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Постраждалий 38-ми років доставлений у відділення щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: інфікована різана рана правої щічної ділянки. Травму отримав 10 годин тому. Який вид хірургічної обробки рани застосує лікар?
Правильна відповідь	А. Первинна рання хірургічна обробка
В	В. Первинна відстрочена хірургічна обробка
С	С. Вторинна рання хірургічна обробка
D	D. Вторинна пізня хірургічна обробка
Е	Е. Первинна пізня хірургічна обробка
№	45. . крок 2011
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	До ОМедБ доставлено пораненого з вогнепальною раною нижньої третини обличчя, переломом нижньої щелепи у ділянці підборіддя та тіла щелепи, значним порушенням дихання. Яка асфіксія, як ускладнення вогнепального поранення, виникла у пораненого?
Правильна відповідь	А. Дислокаційна
В	В. Обтураційна
С	С. Стенотична
D	D. Клапанна
Е	Е. Аспіраційна
№	46. крок 2011
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	На якому етапі медичної евакуації постраждалому проводять остаточну зупинку кровотечі?
Правильна відповідь	А. ОМедБ
В	В. МПП
С	С. МПР
D	D. МПБ
Е	Е. -
№	47. крок 2010
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Постраждалий на полі бою отримав наскрізну рану лівої щоки, забруднену радіоактивними речовинами. На рану накладена асептична пов'язка із індивідуального перев'язувального пакету, застосована знеболююча і антибактеріальна терапія. На якому етапі медичної евакуації слід замінити пов'язку?

Правильна відповідь	A. На кожному етапі евакуації
B	B. На медичному пункті батальйону
C	C. На медичному пункті полку
D	D. На окремому медичному батальйоні
E	E. Коли пов'язка в незадовільному стані
№	48. крок 2010
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Рядовий з вогнепальним пораненням в ділянці підборіддя доставлений на МПП з дислокаційною асфіксією. Які заходи необхідно виконати для усунення асфіксії?
Правильна відповідь	A. Прошити і вивести язик
B	B. Провести інтубацію трахеї
C	C. Накласти трахеостому
D	D. Ввести повітровід
E	E. Штучна вентиляція легень
№	49. крок 2010
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 25-ти років звернувся до травмпункту зі скаргами на біль у правій половині обличчя, обмежене відкривання рота. Об'єктивно: помірно виражений набряк і гематома у ділянці правої виличної дуги. Пальпаторно у ділянці правої виличної дуги визначається западіння кісткової тканини, помірна болісність. Прикус не порушений. Відкривання рота - 1,5 см. Під час намагання подальшого відкривання рота відчуває механічну перепону і посилення болю. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом правої виличної дуги
B	B. Перелом правої виличної кістки
C	C. Травматичний артрит скронево-нижньощелепного суглоба
D	D. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III (верхній)
E	E. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II
№	50. крок 2010
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 19-ти років скаржиться на біль у підборідному відділі нижньої щелепи. Напередодні отримав травму. Об'єктивно: незначна припухлість тканин у ділянці підборіддя. Рот відкривається достатньо. Зуби інтактні. Слизова оболонка у ділянці центральних різців набрякла, трохи кровить. Тут визначається рухомість фрагментів нижньої щелепи. Прикус не порушений. Яким чином слід надати допомогу хворому?

Правильна відповідь	A. Гладенькою шиною-скобою
B	B. Шиною із розпірковим вигином
C	C. Шиною із похилою площиною
D	D. Шинами із зачіпними петлями та міжщелепною фіксацією
E	E. Лігатурним зв'язуванням 31, 32, 42, 41 за Айві
№	51. крок 2010
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У доставленого з поля бою офіцера 33-х років відстріл підборідного відділу нижньої щелепи, слинотеча, незначна кровотеча з порожнини рота, асфіксія що виникає періодично під час зміни положення голови. Які дії спрямовані на боротьбу с розвитком асфіксії у пораненого?
Правильна відповідь	A. Фіксація язика, транспортування в положенні обличчям донизу
B	B. Накладання трахеостоми
C	C. Фіксація щелеп підборідною пращею
D	D. ПХО ран, накладання трахеостоми
E	E. Транспортування в положенні обличчям донизу
№	52. крок 2010
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Постраждалий 24-х років звернувся до клініки з опіком обличчя. Травму отримав внаслідок дії відкритого полум'я. Скаржится на біль та печіння шкіри обличчя. Об'єктивно: гіперемія шкіри обличчя, на ділянках підборіддя, носа, брів, лоба, вилиць мають місце пухирі з прозорою рідиною. Який ступінь опіку встановить лікар хворому?
Правильна відповідь	A. I-II ступінь
B	B. II-III A ступінь
C	C. II-III B ступінь
D	D. III B-IV ступінь
E	E. II-IV ступінь
№	53. крок 2010
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД

Текст завдання	Хворий 32-х років доставлений до травмпункту зі скаргами на кровотечу з носа, сильний головний біль, запаморочення, деформацію обличчя, утруднене дихання, неможливість жування. Травму отримав близько трьох годин тому в шахті. Не непритомнів. Об'єктивно: подовження середньої третини обличчя, значні гематоми і набряк у ділянці кореня носа, повік обох очей. Верхня щелепа зміщена донизу, рухлива разом з кістками носа, виличними кістками і очними яблуками. Пальпаторно визначається деформація, біль і патологічна рухливість у ділянці перенісся, зовнішніх країв орбіт, крилоподібних відростків основної кістки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор (верхній)
B	B. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I (нижній)
C	C. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор
D	D. Перелом виличних кісток
E	E. Перелом кісток носа
№	54. крок 2009, 2008, 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хвора 38-ми років звернулася до лікарні зі скаргами на наявність рани у ділянці лівої щоки. Травму отримала 16-18 годин тому, не непритомніла. Об'єктивно: у ділянці щоки з лівого боку визначається порушення цілісності шкіри, підшкірно-жирової клітковини та м'яза довжиною близько 3 см. Кровотеча з рани. Яка ПХО рани буде проведена хворій?
Правильна відповідь	A. Рання ПХО рани
B	B. Відстрочена ПХО рани
C	C. Вторинна хірургічна обробка рани
D	D. ПХО з пластикою
E	E. -
№	55. крок 2009
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 69-ти років звернувся для видалення 12, 11. Діагностований пародонтит, генералізована форма; 12, 11 другого ступеня рухливості. Оберіть інструментарій для видалення:
Правильна відповідь	A. Прямі щипці
B	B. S-подібні щипці
C	C. S-подібні праві щипці
D	D. Штикоподібні кореневі щипці
E	E. Штикоподібні коронкові щипці
№	56. крок 2009, 2008, 2007

Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У бійця 24-х років, пораненого осколком снаряду, діагностований перелом нижньої щелепи з дефектом кістки в ділянці підборіддя більше 2 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний?
Правильна відповідь	А. Фіксація відламків апаратом Рудька
В	В. Шини Тигерштедта
С	С. Міжщелепне лігатурне зв'язування за Айві
Д	Д. Шина Гунінга-Порта
Е	Е. Прямий остеосинтез
№	57 крок 2009
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У хворого 34-х років внаслідок травми (падіння) з'явилася рухомість альвеолярного відростка з зубами всієї верхньої щелепи, прикус змінений. На рентгенограмі визначається щілина перелому, що проходить від грушоподібного отвору по дну гайморової пазухи по обидва боки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I
В	В. Частковий перелом альвеолярного відростка
С	С. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II
Д	Д. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III
Е	Е. Однобічний перелом верхньої щелепи
№	58. крок 2009
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	На сортувальний пост медичного пункту полку (МПП) доставлено пораненого у щелепно-лицеву ділянку, в якого під час дозиметричного контролю зафіксовано ураження радіоактивними речовинами. У який функціональний підрозділ МПП необхідно скерувати потерпілого?
Правильна відповідь	А. Площадка спеціальної обробки
В	В. Перев'язочна палатка
С	С. Евакуаційна палатка
Д	Д. Ізолятор
Е	Е. Приймально-сортувальна палатка
№	59. крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД

Текст завдання	У період проведення бойових дій військ розпорядженням начальника ВМУ фронту розгорнутий стоматологічний загін у районі ГБФ, до якого надійшов хворий з осколковим пораненням обличчя. Який вид допомоги може бути наданий у стоматологічному загоні?
Правильна відповідь	A. Спеціалізована допомога
B	B. Кваліфікована допомога
C	C. Консультативна допомога
D	D. Стоматологічна допомога
E	E. Зубопротезна допомога
№	60. крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий після отримання травми скаржиться на обмежене відкривання рота, кровотечу з носа, оніміння шкіри підочної ділянки і нижньої повіки. Об'єктивно: спостерігається деформація обличчя за рахунок западіння м'яких тканин виличної ділянки зліва, наявність симптому "сходинки" у середній частині лівого нижнього краю очниці та в ділянці вилично-альвеолярного гребеня. Який метод дослідження найбільш доцільний для діагностики захворювання?
Правильна відповідь	A. Рентгенографія лицьового черепа в аксіальній проекції
B	B. Рентгенографія лицьового черепа в прямій проекції
C	C. Рентгенографія лицьового черепа в боковій проекції
D	D. Рентгенографія лицьового черепа та придаткових пазух носа
E	E. Ортопантомограма
№	61. крок 2008, 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 19-ти років звернувся до травмпункту зі скаргами на асиметрію обличчя, парестезію верхньої губи з правого боку, кровотечу з носа. Об'єктивно: виражена асиметрія обличчя за рахунок набряку та гематоми правої нижньої повіки та підочної ділянки. Відкривання рота декілька обмежене, прикус не порушений. Пальпаторно визначається симптом сходинки в ділянці правого вилично-верхньощелепного шва, деформація в ділянці зовнішнього краю правої орбіти та вилично-альвеолярного гребеня, газова крепітація в правій підочній ділянці; перкуторно - симптом "горіха, що тріснув". Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом правої виличної кістки
B	B. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (нижній)
C	C. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
D	D. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (верхній)
E	E. Перелом кісток носа

№	62. крок 2008, 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У бійця, пораненого уламком снаряду, діагностовано вогнепальний перелом нижньої щелепи із дефектом кістки в ділянці підборіддя більше 3 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний у цьому випадку?
Правильна відповідь	А. Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський)
В	В. Назубні шини Тігерштедта
С	С. Прямий остеосинтез
D	D. Шина Гунінга-Порта
Е	Е. Міжщелепне лігатурне зв'язування за Айві
№	63. крок 2008
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 20-ти років отримав травму в ділянці верхньої щелепи. Звернувся до стоматолога зі скаргами на рухливість передніх верхніх зубів, біль під час накушування та змикання зубів. Об'єктивно: 11, 21 рухливі II-III ступеня. Коронки зубів інтактні, але розташовані орально. Повне змикання зубів неможливе через розташування зубів поза дугою. На рентгенограмі відзначається розширення періодонтальної щілини у 11 до 0,5-2 мм. Корені не ушкоджені. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	А. Травматичний неповний вивих 11, 21
В	В. Травматичний періодонтит 11, 21
С	С. Травматичний повний вивих 11, 21
D	D. Перелом альвеолярного відростка у ділянці 11, 21
Е	Е. Травматична екстракція 11, 21
№	64. крок 2008
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У пораненого травматичний перелом нижньої щелепи в ділянці відсутніх 34, 35 зубів з незначним зміщенням та дефектом альвеолярної частини в ділянці 34, 35. Інші зуби на нижній та верхній щелепах інтактні. Яка з шин в даному випадку оптимальна?
Правильна відповідь	А. Шина Тігерштедта з розпірковим вигином
В	В. Гладка шина-скоба
С	С. Шина Порта
D	D. Стрічкова шина Васильєва
Е	
№	65. крок 2008

Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 45-ти років у результаті ДТП отримав травму верхньої щелепи. Об'єктивно: подовжене і сплюснене обличчя, рясна носова кровотеча, лікворея з носа і вух. Для якого перелому верхньої щелепи характерні зазначені клінічні ознаки?
Правильна відповідь	A. Суббазальний (Ле Фор III)
B	B. Субназальний (Ле Фор I)
C	C. Суборбітальний (Ле Фор II)
D	D. Двобічний перелом виличних кісток
E	E. -
№	66. крок 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий 48-ми років скаржиться на біль у верхній щелепі та у фронтальній ділянці, порушення прикусу. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку м'яких тканин верхньої губи, шкіра верхньої губи синюшного кольору. Слизова оболонка порожнини рота в межах 23, 22, 21, 11, 12, 13 зубів гіперемована, набрякла, спостерігаються петехіальні крововиливи. Під час пальпації визначається рухливість фронтального фрагменту верхньої щелепи в межах 23-13 зубів. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи
B	B. Перелом верхньої щелепи за нижнім типом
C	C. Перелом верхньої щелепи за середнім типом
D	D. Перелом виличної кістки
E	E. Односторонній перелом верхньої щелепи за нижнім типом
№	67. крок 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Дитина 14-ти років скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи ліворуч, який посилюється під час жування, порушення змикання зубів. З анамнезу: отримала травму 2 дні тому. На підставі клініки, об'єктивних і рентгенологічних даних, встановлено діагноз: відкритий перелом нижньої щелепи між 34 та 45. Оберіть метод лікувальної іммобілізації щелепи:
Правильна відповідь	A. Назубне шинування
B	B. Тимчасова іммобілізація
C	C. Шина Порта
D	D. Апарат Рудька
E	E. Ясенева пластинка

№	68. крок 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	У хворого 40 років перелом нижньої щелепи в ділянці ментального отвору ліворуч. Проведено репозицію відламків нижньої щелепи. Зуби на відламках стійкі. Для лікування використано шину Вебера. До якої групи ортопедичних апаратів вона відноситься?
Правильна відповідь	А. Фіксуючі
В	В. Формуючі
С	С. Розділяючі
D	D. Заміщаючі
Е	Е. Репонуючі
№	69. крок 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Офіцер 52-х років отримав на полі бою вогнепальний перелом нижньої щелепи. До поранення користувався знімними протезами (частковим пластинковим для в/щ та повним для н/щ). Що можна використати для транспортної іммобілізації перелому?
Правильна відповідь	А. Протези пацієнта
В	В. Шину Васильєва
С	С. Шину Тігерштедта
D	D. Шину Ентеліса
Е	Е. Апарат Збаржа
№	70. крок 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІД
Текст завдання	Хвора 23-х років отримала травму середньої зони обличчя. Скаржиться на біль, припухлість м'яких тканин в ділянці верхньої щелепи, біль при закритті рота. Об'єктивно: рухомість кісток носа, значна припухлість м'яких тканин лівої виличної ділянки, крововилив у склеру лівого ока, симптом "сходінки" по нижньоочному краю з двох боків і в ділянці вилично-щелепних швів, носова кровотеча, відкритий прикус. Видовження середньої частини обличчя. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	А. Перелом верхньої щелепи Ле-Фор II
В	В. Перелом верхньої щелепи Ле-Фор I
С	С. Перелом лівої виличної кістки
D	D. Перелом кісток носа
Е	Е. Перелом верхньої щелепи Ле-Фор III

№	71. крок 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	У пацієнта наскрізне кульове поранення в ділянці нижньої щелепи. Визначається двобічний ментальний перелом нижньої щелепи з вираженим зміщенням центрального фрагменту дозад; кровотеча з ранового каналу незначна. Свідомість збережена, хворий відмічає утруднене дихання, зростає дихальна недостатність. Чим викликано утруднення дихання в хворого?
Правильна відповідь	A. Розвиток дислокаційної асфіксії
B	B. Розвиток стеногічної асфіксії
C	C. Розвиток геморагічного шоку
D	D. Розвиток травматичного шоку
E	E. Поєднана черепно-щелепно-лицева травма
№	72. крок 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Поранений доставлений до відділення для надання спеціалізованої допомоги через 48 годин після отримання осколкового поранення щелепно-лицевої ділянки. Під час огляду розлога зяюча рана м'яких тканин обличчя неправильної форми, краї інфільтровані, набряклі. Який вид швів при обробці рани необхідно використати?
Правильна відповідь	A. Пластинковий
B	B. Первинний
C	C. Ранній вторинний
D	D. Первинний відстрочений
E	E. Пізній вторинний
№	73. крок 2007
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	По закінченню 3-х місяців після перелому тіла нижньої щелепи у хворого зберігається патологічна рухомість відламків. На рентгенограмі тіла нижньої щелепи у боковій проекції по краях фрагментів визначаються замикальні пластинки. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	A. Несправжній суглоб
B	B. Перелом, що не зрісся
C	C. Патологічний перелом
D	D. Перелом, що не зростається
E	E. Хронічний травматичний остеомієліт
№	

Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	При лікуванні перелому нижньої щелепи з дефектом кісткової тканини у фронтальному відділі, з метою попередження западання м'яких тканин губи та підборіддя в ротову порожнину, стоматолог виготовляє шину. Визначте її найбільш доцільну конструкцію при даній клінічній ситуації:
Правильна відповідь	A. Шина Рауера з розпоркою
B	B. Шина Тігерштедта
C	C. Шина Марєя з похилою площиною
D	D. Зубо-ясенева шина Вебера
E	E. Шина Порта
№	75. крок 2012, 2009
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хворий звернувся до щелепно-лицевого відділення зі скаргами на біль, набрякання у правій підочній ділянці та правій виличній ділянці, оніміння шкіри в ділянці правої половини верхньої губи, кровотечі з носа. Дані симптоми з'явилися після травми. Яке захворювання слід запідозрити?
Правильна відповідь	A. Перелом виличної кістки
B	B. Перелом верхньої щелепи за Le For I
C	C. Перелом верхньої щелепи за Le For II
D	A. Перелом верхньої щелепи за Le For III
E	A. Перелом кісток носа
№	76. крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД
Текст завдання	Хвора звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неможливість закрити рот, утруднену мову. Об'єктивно: порожнина рота напіввідкрита, з неї тече слина, центральна лінія зміщена в правий бік. Перед козелком вуха - западина, а під виличною дугою - випинання за рахунок голівки нижньої щелепи в підскроневу ямку. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Однобічний передній вивих нижньої щелепи з лівого боку
B	B. Однобічний передній вивих нижньої щелепи з правого боку
C	C. Однобічний задній вивих нижньої щелепи з лівого боку
D	D. Однобічний задній вивих нижньої щелепи з правого боку
E	E. Двобічний передній вивих
№	77. крок 2016
Тема	ТЕМА ТРАВМИ ЩІЛД

Текст завдання	Хворий 22х років звернувся до щелепнолицевого відділення з попереднім діагнозом: перелом виrostкового відростка нижньої щелепи зліва. Яке найбільш інформативне дослідження треба провести хворому у першу чергу?
Правильна відповідь	A. Вивчити тримірне зображенні відламків
B	B. Визначити кровотік у щілині перелому
C	C. Визначити ступінь зміщення відламків
D	D. Визначити візуалізацію щілини перелому
E	E. Визначити рівень лінії перелому по зовнішній і внутрішній кісткових пластинках