

№1	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Чоловікові 50 років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. На етапі припасування індивідуальної ложки уточнюється межа в ділянці щелепно-під'язикової лінії. Яку пробу Гербста треба провести?
A	Облизування язиком верхньої губи
B	Ковтання слини
C	Висування язика в напрямку кінчика носа
D	Широке відкривання рота
E	Торкання язиком почергово правої та лівої щоки
№2	крок 2021
Тема	Захворювання тканин пародонта
Текст завдання	Пацієнтка 48 років скаржиться на порушення жування, пов'язане із втраченою зубів. Об'єктивно встановлено: 33-й, 32-й, 31-й, 41-й, 42-й, 43-й зуби мають високі коронки та рухомість першого ступеня. Вирішено виготовити бюгельний протез-шину. Який вид кламерів забезпечить шинувальні властивості цієї конструкції?
A	Багатоланковий
B	Опорний
C	Вестибулярний
D	Утримуючий
E	Зубоальвеолярний
№3	крок 2021
Тема	Щелепно-лицева ортопедія
Текст завдання	Хворий чоловік 28 років отримав травму підборіддя. Рентгенологічно діагностовано двосторонній ментальний перелом нижньої щелепи. Який напрям зміщення малого уламка?
A	Униз і назад
B	Не зміщується
C	Угору і назад
D	-
E	Униз і вперед
№4	крок 2021
Тема	Незнімне протезування

Текст завдання	Під час припасування металевого каркасу металокерамічного мостопо- дібного протеза встановлено, що кар-кас перебуває в контакті із зубами- антагоністами в положенні центральної оклюзії, доходить до уступів на опорних зубах, має товщину 0,3 мм. Якою буде тактика лікаря-стоматолога?
A	Допрепарувати опорні зуби, зняти робочий відбиток
B	Відправити каркас на наступний лабо-раторний етап
C	Отримати відбиток із припасованим у порожнині рота каркасом
D	Визначити ділянки, що заважають накладанню мостоподібного протеза
E	Зішліфувати металевий каркас у ді-лянках контакту із зубами-антагоністами
№5	крок 2021
Тема	Мікропротезування
Текст завдання	Жінка 36 років звернулася з приводу протезування зубів. Об'єктивно встановлено: на жувальній і мезіальній поверхнях 46-го зуба каріозна порожнина, між-зубний контакт порушений. Планується виготовлення вкладки. До якого класу за класифікацією Блека належить така порожнина?
A	II
B	III
C	V
D	I
E	IV
№6	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Жінці 68 років виготовляються повні знімні протези на обидві щелепи. Об'єктивно встановлено: альвеолярні відростки щелеп незначно атрофовані, слизова оболонка помірно піддатлива. Отримані анатомічні відбитки. Який етап протезування буде наступним для цієї пацієнтки?
A	Виготовлення індивідуальних ложок
B	Отримання функціональних відбитків
C	Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками
D	Перевірка конструкції протезів
E	Визначення центрального співвідношення щелеп
№7	крок 2021
Тема	Знімне протезування

Текст завдання	Під час пресування пластмасового тіста зубний технік декілька разів відкривав та закривав кювету для контролю кількості внесеної маси. До чого можуть призвести такі дії?
A	Виникнення гранулярної пористості
B	Залишкові напруження в конструкції протеза
C	Розтріскування пластмаси
D	Виникнення газової пористості
E	Виникнення пористості стиснення
№8	крок 2021
Тема	Незнімне протезування
Текст завдання	Пацієнт 44 років звернувся до стома-тологічної поліклініки з приводу протезування. Скарги на утруднене пережовування їжі, естетичний дефект. Об'єктивно встановлено: відсутні 14-й, 15-й і 22-й зуби. Укажіть втрату жувальної ефективності за Агаповим:
A	18%
B	20%
C	9%
D	12%
E	16%
№9	крок 2021
Тема	Щелепно-лицева ортопедія
Текст завдання	Чоловіку 65 років діагностовано двобічний неускладнений перелом нижньої щелепи в ментальних відділах. Пацієнт користується повними знімними протезами. Оберіть метод постійного шинування:
A	Шина Порта
B	Шина Вебера
C	Шина Ванкевич
D	Протези пацієнта
E	Шина Васильєва
№10	крок 2021
Тема	Щелепно-лицева ортопедія
Текст завдання	У чоловіка 35 років відкритий односторонній перелом тіла нижньої щелепи зліва без зміщення. Лінія перелому проходить між відсутніми 33-м і 34-м зубами. Планується іммобілізація відламків. Яку шину доцільно використати?

A	Шина Тігерштедта з розпірковим вигином
B	Двощеленна шина із зачіпними петлями
C	Шина з похилою площиною
D	Гладенька шина-скоба
E	Шина Порта
№11	крок 2021
Тема	Незнімне протезування
Текст завдання	Жінці 27 років потрібне протезуван-ня. Об'єктивно встановлено: відсутній 15-й зуб, 16-й і 14-й зуби інтактні. Яко-му виду протеза ви надасте перевагу?
A	Адгезивний мостоподібний протез
B	Частковий знімний пластинковий протез
C	Штампований мостоподібний протез
D	Бюгельний протез
E	Металокерамічний мостоподібний протез
№12	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Хворому 60 років виготовляються часткові знімні протези на обидві щеле-пи. З анамнезу відомо, що хворий страждає на хронічну заїду. На що потрібно звернути увагу під час виготовлення протезів?
A	Відновлення міжальвеолярної висоти
B	Кінцеву обробку базисів протезів
C	Вибір відбиткового матеріалу
D	Вибір матеріалу для базисів протезів
E	Вибір матеріалу для базисів протезів
№13	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Чоловік 71 року звернувся до стоматолога-ортопеда з приводу проте-зування. Під час огляду стоматолог вия-вив таку клінічну картину: слизова оболонка, яка вкриває альвеолярні відростки та піднебіння, стоншена й малопід- датлива. Для якого класу за Суппле характерна така клінічна картина?
A	Другий
B	Третій
C	Перший

D	-
E	Четвертий
№14	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту виготовляється бюгельний протез із кламерною фіксацією. Часткова відсутність зубів, I клас за Кеннеді. Проведено зняття відбитків, відлито моделі, визначено та зафіксовано центральне співвідношення щелеп. Який лабораторний етап наступний?
A	Вивчення робочої моделі в паралелометрі
B	Встановлення ливникової системи і вивчення робочої моделі в паралелометрі
C	Дублювання моделі
D	Розкреслення каркасу протеза
E	Отримання вогнетривкої моделі
№15	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Пацієнт 35 років скаржиться на відсутність зубів на нижній щелепі. Об'єктивно встановлено: відсутні 36-й, 37-й, 38-й зуби. 34-й, 35-й зуби інтактні. Який метод заміщення дефекту зубного ряду показаний найбільше?
A	Металокерамічні коронки з опорою на імпланти в ділянці 36-го, 37-го зубів
B	Бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу
C	Бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу
D	Металокерамічний консольний протез з опорними коронками на 34-й, 35-й зуби
E	Частковий знімний пластинковий протез на нижню щелепу
№16	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Хвора 35 років звернулась до стома-тологічної клініки зі скаргами на рухо-мість зубів. Об'єктивно встановлено: 42-й, 41-й, 31-й, 32-й зуби мають рухо-мість II ступеня, а 43-й, 33-й зуби - I ступеня, коронки зубів інтактні. Прикус глибокий. Рентгенологічно виявлено: резорбція міжзубних перетинок на 1/3 висоти кореня. Яку шинувальну конструкцію доцільно застосовувати як тим-часову?
A	З армованого композиту
B	З напівкоронки
C	З екваторних коронок

D	Ковпачкову
E	Бюгельний протез
№17	крок 2021
Тема	Щелепно-лицева ортопедія
Текст завдання	Хворий 26 років звернувся по допомогу до стоматологічної клініки. Було встановлено діагноз: перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи без зміщення в ділянці 14-го, 15-го зубів. Безперервність зубного ряду збережена. Усі зуби стійкі. Яку шину необхідно застосувати в цьому разі?
A	Гладенька шина-скоба
B	Шина Тігерштедта з похилою площиною
C	Шина Васильєва
D	Шина Тігерштедта із зачіпними петлями
E	Шина Тігерштедта з розпіркою
№18	крок 2021
Тема	Знеболення в клініці ортопедичної стоматології
Текст завдання	Пацієнтці 31 року виготовляється ме-талокерамічний мостоподібний протез з опорою на вітальні 33-й, 36-й, 37-й зуби. Планується препарування зубів під анестезією. Який вид анестезії буде най-ефективнішим у цій клінічній ситуації?
A	Провідникова (торусальна)
B	Інтралігаментарна
C	Інфільтраційна
D	Аплікаційна
E	Провідникова (туберальна і піднебінна)
№19	крок 2021
Тема	Знеболення в клініці ортопедичної стоматології
Текст завдання	Чоловіку 38 років планується препарування вітального 34-го зуба для виготовлення суцільнокерамічної коронки. Пацієнт страждає на ішемічну хворобу серця. Яку анестезію доцільно використати?
A	Інфільтраційну
B	Торусальну
C	Ментальну
D	Інтралігаментарну
E	Туберальну

№20	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Чоловік 40 років звернувся до стома-тологічної клініки зі скаргами на крово-точивість, набряк, гіперемію ясен і від-сутність бічних зубів на нижній щелепі. Планується комплексне лікування і про-тезування за допомогою знімних про-тезів. Який метод функціональної діа-гностики застосовується для визначення стану судин иародонта?
A	Реопародонтографія
B	Мастікаціографія
C	Гальванометрія
D	Рентгенографія
E	Міографія
№21	крок 2021
Тема	Незнімне протезування
Текст завдання	Пацієнт 40 років скаржитьься на по-стійне розцементування металокрамі-чної коронки на 11-му зубі, яка була ви-готовлена 1 рік тому. Якою повинна бути кукса відпрепарованого зуба, щоб забез-печити функціонування цього виду ко-ронки?
A	Конусоподібна форма, кут конверген-ції 5-7 градусів, двоплощинне препа-рування, циркулярний уступ
B	Циліндрична форма, двоплощинне препа-рування, циркулярний уступ
C	Конусоподібна форма, кут конверген-ції 15-20 градусів, одноплощинне препа-рування, циркулярний уступ
D	Циліндрична форма, одноплощинне препа-рування, без уступу
E	Конусоподібна форма, кут конверген-ції 10-15 градусів, одноплощинне препа-рування, циркулярний уступ
№22	крок 2021
Тема	Незнімне протезування
Текст завдання	Пацієнтці 35 років виготовляється незнімний металокерамічний мостоподі- бний протез. Одержано двошарові від-битки силіконовим матеріалом "Сілофлкс". Відбитки відправлені на знеза-раження. Який антисептичний розчин слід застосувати для їх оброблення?
A	5%-й розчин гіпохлориту натрію
B	70%-й розчин спирту
C	0,5%-й розчин перекису водню
D	3%-й розчин хлораміну
E	1,5%-й розчин двовуглекислої соди

№23	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	На другий день після фіксації час-ткових пластинкових протезів хворий скаржиться на печіння в порожнині ро-та, неприємний присмак під час користу-вання протезами. Під час огляду слизова оболонка гіперемована, спостерігається гіпсрсалівація. Перед виготовленням но-вих протезів користувався старими 5 ро-ків, схожих скарг не було. Яка можлива причина цього явища?
A	Наявність залишкового мономеру в базисі протеза
B	Погана якість базисної пластмаси
C	Порушення гігієни порожнини рота
D	Порушення правил користування протезами
E	Алергічна реакція на компоненти базисної пластмаси
№24	крок 2021
Тема	Незнімне протезування
Текс завдання	Для жінки 55 років планується ви-готовити знімні протези на обидві ще-лепи з опорою на імплантати. Вибирає-ться вид імплантації, потрібна кількість імплантатів та їх розташування. Викори-стання якого додаткового методу дослі-дження дасть можливість здійснити це найефективніше?
A	Комп'ютерна томографія
B	Оклюзіографія
C	Ультразвукова денситометрія
D	Вивчення діагностичних моделей
E	Прицільна рентгенографія
№25	крок 2021
Тема	Щелепно-лицева ортопедія
Текст завдання	У чоловіка 40 років свіжий менталь-ний перелом нижньої щелепи без види-мих зміщень уламків. Який ортопеди-чний апарат показаний?
A	Фіксуєчий
B	Замісний
C	Формуючий
D	Фіксуєчий
E	Ренонуєчий
№26	крок 2021



Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту 70 років з повною відсутністю зубів на обох щелепах та різко вираженою прогенією виготовляють повні знімні протези. Які штучні зуби не виставляються у протезах?
A	На верхній щелепі - другі премоляри
B	На нижній щелепі - другі моляри
C	На нижній щелепі - другі премоляри
D	На верхній щелепі - другі моляри
E	На нижній щелепі - перші премоляри
№27	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Жінка 60 років скаржиться на біль у суглобовій ділянці та вухах, клацання зубів під час розмови. Повні знімні протези були виготовлені 2 тижні тому. Об'єктивно встановлено: носогубні складки згладжені, жувальна група м'язів напружена. Якою буде тактика лікаря стоматолога-ортопеда?
A	Виготовлення нових протезів
B	Корекція оклюзійної поверхні верхнього протеза
C	Корекція оклюзійних контактів обох протезів
D	Виготовлення нового верхнього протеза
E	Корекція оклюзійної поверхні нижнього протеза
№28	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту 65 років проводиться визначення міжальвеолярної висоти анатомо-фізіологічним методом за повної відсутності зубів. Якою повинна бути різниця у відстані між точками на підборідді і біля основи носа у порівнянні зі станом фізіологічного спокою нижньої щелепи?
A	На 2-3 мм меншою
B	На 5-6 мм меншою
C	На 5-6 мм більшою
D	Однакова відстань
E	На 2-3 мм більшою
№29	крок 2021
Тема	Знімне протезування

Текст завдання	Пацієнт 47 років звернувся до лікаря- стоматолога з приводу протезування. Об'єктивно встановлено: 43-й, 44-й, 45-й зуби відсутні. Який це клас дефекту нижнього зубного ряду за Кеннеді?
A	3
B	2
C	1
D	-
E	4
№30	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Пацієнт 42 років скаржиться на утруднене пережовування їжі. Об'єктивно встановлено: відсутній 26-й зуб. На ме-діальній поверхні 27-го зуба та на ди-стальній поверхні 25-го зуба каріозні по-рожнини II класу за Блемом. Рекомен-дується виготовити суцільнолиту мосто- подібну конструкцію з опорою на 27-й та 25-й зуби. Який матеріал використо-вують для діагностики щільності приля-гання каркасу мостонодібного протеза до опорних зубів?
A	Коригувальна силіконова маса
B	Артикуляційний папір
C	Базова силіконова маса
D	-
E	Моделювальний віск
№31	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту планується виготовлення повного знімного пластинкового протеза на верхню щелепу. Об'єктивно вста-новлено: на слизовій оболонці протезно-го ложа значна кількість ущільнених па-пілом різного розміру. Визначте тактику лікаря:
A	Після видалення папілом виготовити протез з двошаровим базисом з еласти-чною підкладкою
B	Виготовлення металевого базису про-теза
C	Користування знімним протезом про-типоказано
D	Зменшити площу базису протеза
E	Об'ємне моделювання базису протеза
№32	крок 2021
Тема	Невідкладні стани в клініці ортопедичної

Текст завдання	Жінці 50 років, яка страждає на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету, робиться зубне протезування. Пацієнтка перебуває у клініці протягом декількох годин; вона не їла та знервувалася. Під час отримання відбитків жінка раптом повелася агресивно, зблідла, вкрилася холодним потом, втратила свідомість. Що є засобом невідкладної допомоги в такій клінічній ситуації?
A	Інсулін
B	Розчин глюкози
C	Розчин глюкози
D	Валокордин
E	Нітрогліцерин
№33	крок 2021
Тема	Огляд хворого в клініці ортопедичної стоматології
Текст завдання	Під час внутрішньоротового огляду пацієнта у лікаря стоматолога-ортопеда виникла підозра на наявність у нього си-філісу. Які подальші дії будуть правильними?
A	Закінчити огляд, направити пацієнта на відповідні аналізи
B	Продовжити огляд і почати препарування зубів
C	Відмовити пацієнту в наданні стоматологічної допомоги
D	Зняти відбитки для вивчення діагностичних моделей
E	Сказати хворому про свою підозру і завершити прийом
№34	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту планується виготовлення повного знімного пластинкового протеза на верхню щелепу. Об'єктивно встановлено: на слизовій оболонці протезного ложа значна кількість ущільнених папілом різного розміру. Визначте тактику лікаря:
A	Після видалення папілом виготовити протез з двошаровим базисом з еластичною підкладкою
B	Виготовлення металевого базису протеза
C	Користування знімним протезом протипоказано
D	Зменшити площу базису протеза
E	Об'ємне моделювання базису протеза
№35	крок 2021
Тема	Знімне протезування

Текст завдання	Чоловік 45 років скаржиться на біль і рухомість передніх зубів нижньої щелепи. Об'єктивно встановлено: 42-й, 41-й, 31-й, 32-й зуби мають III ступінь рухо-мости. Планується видалення цих зубів і виготовлення безпосереднього протеза. Коли після видалення зубів накладають безпосередній протез?
A	У день видалення зубів
B	За 3-4 дні після видалення зубів
C	За 7 днів після видалення зубів
D	За 14 днів після видалення зубів
E	За 1-2 дні після видалення зубів
№36	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Чоловік 60 років звернувся до лікаря- стоматолога за 2 дні після фіксації час-ткового знімного протеза зі скаргами на виникнення виразки на слизовій оболонці порожнини рота. Що є причиною ушкодження слизової оболонки біля меж базису протеза?
A	Механічна травма слизової оболонки краєм базису
B	Погана фіксація протеза
C	Уживання грубої їжі
D	Неправильне розміщення кламерів
E	Помилки у доборі штучних зубів
№37	крок 2021
Тема	Щелепно-лицева ортопедія
Текст завдання	Хворий чоловік 47 років скаржиться на вивих щелепи, що часто повторюється. Об'єктивно встановлено: зуби збережені, моляри вкриті штучними коронками. Оберіть тактику лікування:
A	Обмеження відкривання рота апаратом Петросова
B	Фізіотерапевтичне лікування
C	Імобілізація щелепи лігатурним скріпленням зубів
D	Міогімнастика, лікувальна фізкультура
E	Обмеження відкривання рота апарата- углом Шредера
№38	крок 2021
Тема	Незнімне протезування

Текст завдання	Під час підготовки до протезування у пацієнта 38 років виявлена перфорація дна пульпової камери в ділянці бі-фуркації коренів 46-го зуба. Об'єктивно встановлено: 46-й зуб нерухомий, пародонтальних кишень у ділянці 46-го зуба не виявлено. На рентгенограмі виявлено: канали 46-го зуба запломбовані на всю довжину, патологічних змін у ПС-риапикальній ділянці коренів немає. У ділянці біфуркації коренів 46-го зуба спостерігається деструкція верхівки між-кореневої перегородки. Який вид зубо-зберігальної операції показаний у цьому разі?
A	Коронаро-радикулярна сепарація
B	Реплантація
C	Ампутація
D	Резекція
E	Гемісекція
№39	крок 2021
Тема	Знімне протезування
Текст завдання	Для жінки 55 років планується виготовити знімні протези на обидві щелепи з опорою на імплантати. Вибирається вид імплантації, потрібна кількість імплантатів та їх розташування. Використання якого додаткового методу дослідження дасть можливість здійснити це найефективніше?
A	Комп'ютерна томографія
B	Оклюзіографія
C	Ультразвукова денситометрія
D	Вивчення діагностичних моделей
E	Прицільна рентгенографія
№ 1	крок 2020
Тема	повне знімне протезування
Текст завдання	Хворий 67-ми років скаржиться на погану фіксацію повного знімного пластинкового протеза на верхній щелепі. Протезом користується близько 7-ми років. Об'єктивно: протез балансує, погано фіксується. Яка тактика лікаря у даному випадку?
Правильна відповідь	Виготовити новий протез
B	Провести корекцію протеза
C	Провести перебазування протеза
D	Виготовити еластичну підкладку
E	Пришліфувати штучні зуби в протезі

№ 2	крок 2020
Тема	часткова адентія
Текст завдання	Пацієнт 43-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на утруднене пережовування їжі та естетичний дефект. Об'єктивно: відсутні 15, 16 зуби на верхній щелепі та 46, 47, 48 зуби - на нижній. Які класи часткових дефектів зубних рядів за Кеннеді діагностовані на щелепах?
Правильна відповідь	На верхній - 3, на нижній - 2
В	На верхній - 4, на нижній - 2
С	На верхній -1, на нижній - 3
Д	На верхній - 3, на нижній - 3
Е	На верхній - 2, на нижній - 2
№ 3	крок 2020
Тема	Щелепно-лицьова ортопедія
Текст завдання	Хворий 27-ми років отримав травму нижньої щелепи. Після проведення рентгенологічного обстеження діагностований односторонній відкритий перелом нижньої щелепи на рівні ментального отвору зі зміщенням. У хворого є всі зуби. Лінія перелому проходить між 34-35 зубами. Яку шину доцільно використати?
Правильна відповідь	Двощелепна шина із зачіпними петлями
В	Шина з похилою площиною
С	Шина з коригувальною петлею
Д	Двощелепна шина з розпірковим вигином
Е	Гладка шина-скоба
№ 4	крок 2020
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Хворому 60-ти років виготовляються часткові знімні протези на обидві щелепи. З анамнезу відомо, що хворий страждає на хронічну заїду. На що потрібно звернути увагу при виготовленні протезів?
Правильна відповідь	Відновлення міжальвеолярної висоти
В	Вибір матеріалу для базисів протезів
С	Вибір відбиткового матеріалу
Д	Кінцеву обробку базисів протезів
Е	Санацію порожнини рота
№ 5	крок 2020
Тема	захворювання СНЩС

Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на порушення зовнішності, скорочення нижньої третини обличчя, погіршення слуху, дискомфорт у ділянці суглобів. Об'єктивно: зниження висоти нижньої третини обличчя на 8 мм. При огляді порожнини рота - інтактні зубні ряди. Ієнералізоване стирання зубів на обох щелепах, що характеризується вкороченням висоти коронок на 1/3-2/3 висоти. Яке лікування дозволить усунути дисфункцію СНЩС?
Правильна відповідь	Відновлення міжальвеолярної висоти
В	Механотерапія
С	Фізіотерапія
Д	Протизапальна терапія
Е	Нормалізація мезіодистального співвідношення щелеп
№ 6	крок 2020
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	Хвора 32-х років звернулася з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрана конструкція металокерамічної коронки. Який відбитковий матеріал показаний для одержання відбитку?
Правильна відповідь	Стомафлекс
В	Репін
С	Ортокор
Д	Стенс
Е	Стомальгін
№ 7	крок 2020
Тема	імплантологія
Текст завдання	Хворий 25-ти років відсутній 21 зуб відновлюється коронкою на основі діоксиду цирконію, зафіксованою на імплантаті. Після встановлення індивідуального абатменту оцінюється відстань між ним та антагоністом. Який мінімальний зазор повинен бути?
Правильна відповідь	1,5 мм
В	2,0 мм
С	1,0 мм
Д	3,0 мм
Е	0,5 мм
№ 8	крок 2020
Тема	імплантологія

Текст завдання	Хворій 55-ти років планується виготовлення знімних протезів на обидві щелепи з опорою на імпланти. Обирається вид імплантації, необхідна кількість імплантів та їх розташування. Використання якого додаткового методу дослідження дозволить здійснити це найбільш ефективно?
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія
B	Вивчення діагностичних моделей
C	Оклюдіографія
D	Прицільна рентгенографія
E	Ультразвукова денситометрія
№ 9	крок 2020
Тема	матеріалознавство
Текст завдання	Пацієнту 70-ти років виготовляються часткові знімні протези на обидві щелепи. Для виготовлення діагностичних моделей отримують альгінатні відбитки з обох щелеп. Лікар готує альгінатну масу шляхом змішування порошку з водою у гумовій колбі. Протягом якого часу лікар повинен нанести відбиткову масу на ложку та розмістити її в ротовій порожнині?
Правильна відповідь	Менше 1 хвилини
B	3-5 хвилин
C	Менше 3 хвилин
D	5-10 хвилин
E	Більше 10 хвилин
№ 10	крок 2020
Тема	захворювання парадонту
Текст завдання	Хвора 55-ти років лікується в клініці з приводу генералізованого пародонтиту (II-III ст.). В ході лікування їй необхідно видалити велику кількість зубів III ступеня рухомості. Через який термін після операції накладається безпосередній протез?
Правильна відповідь	В день видалення зубів
B	Через добу
C	Через 14 діб
D	Через 7 діб
E	Через 2 місяці
№ 11	крок 2020
Тема	матеріалознавство



Текст завдання	Хворий 46-ти років звернувся до лікаря-стоматолога ортопеда з метою протезування. Об'єктивно: відсутні 44 і 45 зуби, планується виготовлення металоке-рамічного мостоподібного протезу. Після препарування опорних 43 і 46 зубів знято відбиток силіконовим матеріалом. Який розчин необхідно використати для дезін-фекції відбитка?
Правильна відповідь	Хлорамін 0,1 %
В	Дезоксон 0,1 %
С	Розчин фурациліну
D	Обробка лізоцимом 5 хвилин
Е	Промивання 70% етиловим спиртом
№ 12	крок 2020
Тема	Щелепно-лицьова ортопедія
Текст завдання	1. У пацієнтки 21-го року після побутової травми виник перелом альвеолярного від-ростка верхньої щелепи в межах 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубів. Об'єктивно: зубні ряди інтактні. Яку шину потрібно використати при вказаному переломі?
Правильна відповідь	Гладку шину-скобу
В	З розпірковим вигином
С	З похилою площиною
D	З опорною площиною
Е	Із зачіпними петлями
№ 13	крок 2020
Тема	повне знімне протезування
Текст завдання	Хворий 75-ти років скаржиться на по-гану фіксацію повного знімного протезу на нижній щелепі, потрапляння їжі під ба-зис протезу. Нижня третина обличчя зани-жена. Альвеолярні відростки різко атро-фовані. Яке анатомічне утворення на ни-жній щелепі можна використати для по-кращення фіксації повного знімного про-тезу?
Правильна відповідь	Ретроальвеолярний простір
В	Перехідну складку
С	Внутрішню косу лінію
D	Щелепно-під'язиковий валик
Е	Присінок ротової порожнини
№ 14	крок 2020
Тема	патологічна стертість

Текст завдання	Хворому 45-ти років встановлено діагноз: патологічна стертість, горизонталь-на генералізована форма, ускладнена зниженням висоти прикуса на 10 мм. Для відновлення оклюзійної висоти планується виготовити пластмасову капу. Яке допустиме одномоментне роз'єднання зубних рядів?
Правильна відповідь	4-6 мм
В	3-4 мм
С	9-10 мм
D	0,5-1 мм
Е	1-2 мм
№ 15	крок 2020
Тема	повне знімне протезування
Текст завдання	У хворого 70-ти років повна відсутність зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: верхньощелепні горби і альвеолярні відростки повністю атрофовані, склепіння піднебіння плоске, вкрите шаром помірно піддатливої слизової оболонки. До якого типу атрофій беззубих щелеп можна віднести цей випадок?
Правильна відповідь	Штип за Шредером
В	Ш тип за Келлером
С	—
D	II тип за Келлером
Е	II тип за Шредером
№ 16	крок 2020
Тема	матеріалознавство
Текст завдання	Під час бойових дій у зубного техника спеціалізованого шпиталю для виготовлення зубних протезів виникла потреба поповнення зуботехнічних матеріалів з комплекту. В якому комплекті вони знаходиться?
Правильна відповідь	ЗТ-3
В	ЗВ
С	ЗП
D	ЗТ-1
Е	ЗТ-2
№ 17	крок 2020
Тема	

Текст завдання	У клініці ортопедичної стоматології хворому 26-ти років проводиться підготовка до зубного протезування. Об'єктивно: 45,46 зуби відсутні; 44,47 зуби інтактні, стійкі. Спостерігається зубоальвеолярне подовження в ділянці 15, 16 зубів на 1/3 висоти коронок. Який метод усунення де-формації оклюзійних поверхонь потрібно використати?
Правильна відповідь	Вкорочення зубів
В	Хірургічний
С	Ортодонтичний
Д	Видалення зубів
Е	Оклюзійної корекції
№ 18	крок 2020
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	У пацієнта 27-ми років вестибулярні поверхні верхніх і нижніх різців уражені деструктивною формою флюорозу. Яка з перерахованих конструкцій дає максимальний естетичний результат за міні-мального втручання?
Правильна відповідь	Керамічні вініри
В	Металокерамічні коронки
С	---
Д	Пластмасові коронки
Е	Керамічні коронки
№ 19	крок 2020
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту 60-ти років планується виготовлення часткового знімного протеза на верхню щелепу. Проведено перевірку постановки штучних зубів на восковому базисі в ротовій порожнині. Який буде наступний клінічний етап виготовлення часткових знімних протезів?
Правильна відповідь	Примірка та фіксація часткових знімних протезів в ротовій порожнині
В	Кінцеве моделювання базису протеза
С	Кінцеве полірування протеза
Д	Визначення та фіксація центрального співвідношення щелеп
Е	Гіпсування гіпсових моделей в артикулятор
№ 20	крок 2020

Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту 59-ти років виготовляють часткові знімні пластинкові протези на етапі визначення центральної оклюзії. Який лабораторний етап наступний?
Правильна відповідь	Загіпсовка моделей в оклюдатор
В	Кінцеве моделювання
С	Виготовлення воскових валиків
Д	Постановка зубів
Е	Загіпсовка в кювету
№ 21	крок 2020
Тема	захворювання СНЩС
Текст завдання	Пацієнт 44-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на біль і хрускіт в ділянці СНЩС, порушення функції жування внаслідок часткової відсутності зубів на нижній щелепі. Об'єктивно: відсутні 38 37 36 35 / 45 46 47 48 зуби, патологічна стертість зубів нижньої щелепи II ступеня. Як зміщується розташування голівок СНЩС при зниженні міжальвеолярної висоти в положенні центральної оклюзії?
Правильна відповідь	Дистально і вглиб суглобової ямки
В	Вниз попереду суглобового горбка
С	Вгору попереду суглобового горбка
Д	Вниз позаду суглобового горбка
Е	Займають центральне положення суглобової ямки
№ 22	крок 2020
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 30-ти років з включеним дефектом нижнього зубного ряду. Після проведення обстеження, патології з боку тканин пародонту не виявлено. Планується виготовлення мосто-подібної конструкції. Яким повинно бути співвідношення суми коефіцієнтів жувальної ефективності опорних зубів до суми коефіцієнтів жувальної ефективності зубів, що відсутні?

Правильна відповідь	1:1
B	1:1,5
C	1:0,8
D	1:3
E	1:2,5
№ 23	крок 2020
Тема	захворювання СНЦС
Текст завдання	Хворому 37-ми років зі звичним вивихом нижньої щелепи виготовляється не- знімний апарат для обмеження відкривання рота. Який термін користування даним апаратом?
Правильна відповідь	2-3 місяці
B	1-2 тижні
C	6-12 місяців
D	4-5 років
E	3-4 тижні
№ 24	крок 2020
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Після виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу оцінюється якість виготовленої конструкції. В межах яких значень повинна бути ширина дуги протезу?
Правильна відповідь	5- 8 мм
B	12-15 мм
C	10-12 мм
D	1,5-2 мм
E	3-5 мм
№ 25	крок 2020
Тема	матеріалознавство
Текст завдання	Лікар отримав з лабораторії частково-вий знімний протез. При огляді виявлено наступний недолік: протез має мармуровий вигляд (білі прожилки). Яку помилку допустив технік при заміні воску на пластмасу?
Правильна відповідь	Неякісне перемішування пластмасового тіста

B	Надлишок мономеру
C	Пакування в "пісочній" стадії
D	Пакування в "гумоподібній" стадії
E	---
№ 26	крок 2020
Тема	обстеження
Текст завдання	Юнак призовного армійського віку проходить обстеження в клініці ортопеди-чної стоматології. Об'єктивно: відсутні 46, 16 зуби. Яка втрата жувальної ефективно-сті за Агаповим?
Правильна відповідь	12%
B	24%
C	5%
D	10% .
E	6%
№ 27	крок 2020
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	<p>Пацієнт 42-х років скаржиться на утруднене пережовування їжі. Об'єктив-но: відсутні 26, 25 зуби. На медіальний по-  верхні 27 зуба та на дистальній поверхні 24 зуба каріозні порожнини II класу за Блеком. Рекомендується виготовити су-  щільнолиту мостоподібну конструкцію з опорами на 27 та 24 зуби. Який матеріал використовують для діагностики  щільно-сті прилягання каркасу мостоподібного протеза до опорних зубів?</p> <p>A. Моделювальний віск  B. Артикуляційний папір  C. Коригувальна силіконова маса  IX-  E. Базова силіконова маса</p>
Правильна відповідь	Коригувальна силіконова маса
B	Моделювальний віск

C	Артикуляційний папір
D	---
E	Базова силіконова маса
№ 28	крок 2020
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 56-ти років під час отримання повного анатомічного відбитку з верхньої щелепи альгінатною масою виникла різка задишка, блідість шкірних покривів, підвищена пітливість, ціаноз, свистяче дихання. Який невідкладний стан розвинувся?
Правильна відповідь	Напад бронхіальної астми
B	Гострий бронхіт
C	Підвищений блювотний рефлекс
D	Напад бронхіальної астми
E	Пневмоторакс
№ 29	крок 2020
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Хворому 68-ми років виготовляють часткові знімні протези. На етапі перевірки конструкції протезів спостерігається горбково-горбковий контакт у бічних ділянках та сагітальна щілина у фронтальній. Яку помилку допустив лікар?
Правильна відповідь	Зафіксована передня оклюзія
B	Завищена висота ЦО
C	Занижена висота ЦО
D	Зафіксована бокова оклюзія
E	Неправильна побудова протетичної площини
№	крок 2019
Тема	повне знімне протезування
Текст завдання	Хворому 65-ти років з повною відсутністю зубів на верхній щелепі для виготовлення повних знімних пластинкових протезів необхідно зняти анатомічні відбитки з верхньої і нижньої щелеп. У пацієнта підвищений блювотний рефлекс. Який медикаментозний засіб необхідно використати для зниження блювотного рефлексу?

Правильна відповідь	10% розчин лідокаїну
B	1 % розчин димедролу
C	10% розчин глюкози
D	0.1% розчин атропіну
E	0.2% розчин норадреналіну
№	крок 2019
Тема	щелепно-лицеве протезування
Текст завдання	У хворого 59-ти років внаслідок виробни-чої травми стався перелом нижньої щелепи. Раніше користувався знімними протезами (частковими пластинковими для верхньої щелепи і повними для нижньої щелепи). Що можна використовувати для транспортної іммобілізації перелому?
Правильна відповідь	Протези пацієнта з підборідною пращею Ентіна
B	Шину Ентіна
C	Шину Васильєва
D	Шину Тігершtedта
E	Апарат Збаржа
№	крок 2019
Тема	щелепно-лицеве протезування
Текст завдання	Хворій 42-х років після обстеження було поставлено діагноз: закритий серединний перелом нижньої щелепи в ділянці 31. 41 зубів, без зміщення. Коронкові частини ре-шти зубів інтактні. Також діагностований хронічний генералізований пародонтит се-реднього ступеня тяжкості. Яка найраціональніша шина для лікування перелому у даної пацієнтки?
Правильна відповідь	Шина Тігершtedта із зачіпними гачками
B	Шина Тігершtedта
C	Зл'бо-ясенна шина Вебера
D	Наясенна шина Порта
E	Зубо-ясенна шина Ванкевич
№	крок 2019
Тема	знімне протезування
Текст завдання	Хворому тиждень тому були накладені знімні протези на верхню і нижню щелепи. Під час чергового прийому хворий скаржи-ться на прикушування щік, біль. Об'єktiv-но: гіперемія, набряк, з вираз кування на сли-зовій щік в ділянці штучних молярів по лінії змикання зубів. Чим це може бути спричи-нене?



Правильна відповідь	Горбки молярів верхньої та нижньої щелеп змикаються в одній вертикальній площині
B	Неправильно визначена висота прикусу
C	Зафіксована передня оклюзія
D	Токсико-алергічна дія компонентів бази-сної пластмаси
E	Травматичність слизової внаслідок діабету
№	крок 2019
Тема	організація стоматологічної допомоги
Текст завдання	У стоматологічній поліклініці, що за районом обслуговування забезпечує стоматологічною допомогою понад 25 тисяч мешканців мікрорайону міста, є по 10 посад лікарів стоматологів-терапевтів, та хірургів. Як розрахувати кількість посад стоматологів-ортопедів ?
Правильна відповідь	В залежності від потреби населення та обсягу роботи
B	1 посада на 2 тисячі населення
C	1 посада на 4 тисячі населення
D	1 посада на 2,5 тисячі населення
E	1 посада на 3 тисячі населення
№	крок 2019
Тема	повне знімне протезування
Текст завдання	Чоловік 60-ти років із повною відсутністю зубів. Користується протезами 15 років. Об'єктивно: нижня третина обличчя знижена, альвеолярні відростки на верхній та нижній щелепах різко атрофовані, піднебіння плоске, торус різко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована. без підслизового шару. Який відбиток і матеріал доцільно використати у даному випадку?
Правильна відповідь	Функціональний декомпресійний дентафлексом
B	Повні анатомічні гіпсом
C	Функціональний компресійний стенсом
D	Повні анатомічні стомальгіном
E	Функціональний диференційований репі-ном
№	крок 2019
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Хворій виготовляється частковий знімний пластинковий протез на в/щ. Який клінічний етап є наступним після визначення і фіксації центральної оклюзії?
Правильна відповідь	Перевірка воскової композиції протеза в порожнині рота

В	Постановка штучних зубів
С	Заміна воску на пластмасу
D	Визначення меж базису
Е	Визначення міжальвеолярної висоти
№	крок 2019
Тема	невідкладні стани
Текст завдання	Хворий 45-ти років звернувся до ортопедичного відділення з метою протезування. Перед препаруванням твердих тканин інтра-ктних зубів проведено інфільтраційне зне-болювання 0,5% розчином лідокаїну. Через декілька хвилин з'явилося пригнічення сві-домості, падіння АТ, судоми, самовільне се-човипускання. Який невідкладний стан роз-винувся?
Правильна відповідь	Анафілактичний шок
В	Серцева недостатність
С	Колапс
D	Больовий шок
Е	Зомління
№	крок 2019
Тема	часткове протезування
Текст завдання	У пацієнта 47-ми років після втрати пре молярів на н/щ зліва зуби, що обмежують дефект, поступово змістились всередину дефекту. Одночасно зуби-антагоністи вису-нулися в бік беззубої частини альвеоляр-ного відростка. Яку назву має в літературі описана клінічна ситуація?
Правильна відповідь	Феномен Попова-Юдона
В	Синдром Костена
С	Синдром Папійона-Лефевра
D	Феномен відносного зубо-альвеолярного видовження
Е	Феномен Курляндського
№	крок 2019
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту 60-ти років планується виго-товлення часткового знімного протеза на верхню щелепу. Проведено перевірку по-становки штучних зубів на восковому ба-зисі в ротовій порожнині. Який буде насту-пний клінічний етап виготовлення частко-вих знімних протезів?
Правильна відповідь	Примірка та фіксація часткових знімних протезів в ротовій порожнині

В	Кінцеве полірування протезу
С	Гіпсування гіпсових моделей в артикуля- тор
D	Кінцеве моделювання базису протеза
Е	Визначення та фіксація центрального співвідношення щелеп
№	крок 2019
Тема	щелепно-лицьове протезування
Текст завдання	В якому лікувальному закладі поране-ні на полі бою у щелепно-лицеву ділянку одержують відповідну ортопедичну (виго-товлення лікувальних шин, апаратів, протезів) та зуболікарняну допомогу?
Правильна відповідь	У СВПХГ (спеціалізованому військово-польовому хірургічному госпіталі)
В	У ОМЗ (окремому медичному загоні)
С	У ОМедБ (окремому медичному баталь-йоні)
D	У цивільних медичних закладах
Е	У евакогоспіталях
№	крок 2019
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Хворому 64-х років виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу при наявності дефекту зубного ряду 2-го класу за Кеннеді. Після проведеної паралелометрії встановлені типи межових ліній на опорних зубах. На 24 зубі межова лінія -I типу. Який тип кламера із системи Нея показаний хво-рому?
Правильна відповідь	I
В	III
С	V
D	II
Е	IV
№	крок 2019
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	Пацієнтці 35-ти років виготовляється незнімний металокерамічний мостоподібний протез. Одержано двошарові відбитки си-ліконовим матеріалом «Сілафлекс». Відби-тки скеровано на знезараження. Який ан-тисептичний розчин слід застосувати для їх обробки?
Правильна відповідь	3% розчин хлораміну
В	0,5% розчин перекису водню
С	1,5% розчин двовуглекислої соди

D	70% розчин спирту
E	0,5% розчин гіпохлориту натрію
№	крок 2019
Тема	повне знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту 67-ми років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Проводиться припасування індивідуальної ложки за методикою Гербста. Уточнюється межа ложки під'язикової ділянки, відступивши 1 см від середньої лінії. Яку пробу Гербста слід провести з цією метою?
Правильна відповідь	Поперемінне дотикання язиком щоки
B	Провести язиком по червоній облямівці верхньої губи
C	Повільне відкривання рота
D	Активні рухи мимічної мускулатури
E	Ковтання
№	крок 2019
Тема	надзвичайні стани
Текст завдання	Під час бойових дій у зубного техника спеціалізованого шпиталю для виготовлення зубних протезів виникла потреба поповнення зуботехнічних матеріалів з комплекту. В якому комплекті вони знаходяться?
Правильна відповідь	ЗТ-3
B	ЗТ-1
C	ЗТ-2
D	ЗП
E	ЗВ
№	крок 2019
Тема	імплантація
Текст завдання	Хворому 46-ти років з метою протезування показана класична 2-х етапна хірургічна установка імплантатів на верхній щелепі. Який повинен бути інтервал між цими етапами?
Правильна відповідь	3-6 місяців
B	2 місяці
C	1,5 місяця
D	0,5 місяця
E	1 місяць
№	крок 2019

Тема	захворювання парадонту
Текст завдання	Хворий 46-ти років, викладач, звернувся зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи, що утруднює відкушування їжі. Об'єктивно: безперервний зубний ряд, рухомість фронтальних зубів II ступеня. Рентгенологічно: кореневі канали 32, 31, 41, 42 зубів прямі, запломбовані. Який засіб стабілізує фронтальні зуби зі збереженням естетично-го вигляду?
Правильна відповідь	Шина Мамлока
В	Шина з амбразурними кламерами
С	Коронково-ковпачкова шина
Д	Знімна багатоланкова шина для фронтальних зубів
Е	Шина з напівкоронки
№	крок 2019
Тема	повне знімне протезування
Текст завдання	Пацієнту планується виготовлення повного знімного пластинкового протезу на верхню щелепу. Об'єктивно: на слизовій оболонці протезного ложа значна кількість ущільнених папілом різної величини. Визначте тактику лікаря:
Правильна відповідь	Після видалення папілом виготовити протез з двошаровим базисом з еластичною підкладкою
В	Виготовлення металевого базису протезу
С	Зменшити площу базису протезу
Д	Об'ємне моделювання базису протезу
Е	Користування знімним протезом протипоказано
№	крок 2019
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Після виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу оцінюється якість виготовленої конструкції. В межах яких значень повинна бути ширина дуги протезу?
Правильна відповідь	5-8 мм
В	10-12 мм
С	12-15 мм
Д	3-5 мм
Е	1,5-2 мм
№	крок 2019
Тема	часткове знімне протезування

Текст завдання	В клініку ортопедичної стоматології з метою протезування звернувся пацієнт 55-ти років з відсутністю 11 зуба. Два тижні тому виписаний із стаціонару після перене-сеного інфаркту міокарда. Яка тактика лі-каря?
Правильна відповідь	Виготовити тимчасовий знімний протез
В	Тимчасово відмовити в протезуванні
С	Провести імплантацію
D	Виготовити мостоподібний протез з опо-рою на 12,21
Е	Виготовити бюгельний протез
№	крок 2019
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	Пацієнт 28-ми років скаржиться на есте-тичний дефект. Об'єктивно: коронки 12, 11 та 21, 22, 23 - зруйновані каріозним проце-сом більш ніж на 2/3 висоти коронки. При-кус ортогнатичний. На рентгенограмі: кана-ли даних зубів запломбовані на всю довжи-ну, патологічних змін в периапікальних тка-нинах не виявлено. Запропонуйте найбільш раціональну конструкцію в цьому випадку:
Правильна відповідь	Виготовлення куксових вкладок та мета-локерамічних коронок
В	Куксові вкладки, облицьовані пластмасою
С	Виготовлення комбінованих штампованих коронок за Бородюком
D	Виготовлення іммедіат-протезу на шти-фтах
Е	Відновлення коронкових частин за до-помогою фотополімерних пломбувальних матеріалів
№	крок 2019
Тема	організація стоматологічної допомоги
Текст завдання	Лікар-стоматолог ортопедичного відді-лення З£ зміну надав консультацію та об-стежив пацієнта, перевінив коронки, зафі-ксував мостоподібні протези, визначив цен-тральне співвідношення щелеп та здійснив корекцію знімних протезів. Якими є норми навантаження лікаря в умовних одиницях праці (УОП) за зміну та на місяць при п'я-тиденному робочому тижні за нормативами надання допомоги дорослому населенню?
Правильна відповідь	6 УОП -126 УОП
В	5 УОП -105 УОП
С	7 УОП - 147 УОП
D	9 УОП -189 УОП
Е	8 УОП -168 УОП
№	крок 2019
Тема	повне знімне протезування

Текст завдання	У хворого 70-ти років повна відсутність зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: верх-ньощелепні горби і альвеолярні відростки повністю атрофовані, склепіння піднебіння пласке, вкрите шаром помірно піддатливої слизової оболонки. До якого типу атрофій беззубих щелеп можна віднести цей випадок?
Правильна відповідь	III тип за Шредером
В	IV тип за Келлером
С	II тип за Шредером
D	III тип за Келлером
Е	II тип за Келлером
№	крок 2019
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	Хворий 47-ми років скаржиться на зміну кольору 11 та 21 зубів. Об'єктивно: 11,21 зу-би рожевого кольору, канали запломбовано до верхівок. Вирішено виготовити метало-керамічні коронки на 11 та 21 зуби. Під яким оптимальним кутом слід проводити препа-рування апроксимальних поверхонь опор-них зубів?
Правильна відповідь	5°
В	0°
С	20°
D	10°
Е	15°
№	крок 2019
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Хворому 64-х років проводиться фікса-ція часткового знімного протеза на нижню щелепу. При огляді базиса лікарем виявле-но чіткий "мармуровий малюнок" в вигля-ді сітки білих смуг, які пронизують товщу базисної пластмаси. Яка найбільш імовірна причина виникнення цього дефекту?
Правильна відповідь	Порушення процесу полімеризації акри-лової пластмаси
В	Порушення процесу поліровки базису протеза
С	Сторонні вклучення в товщі базису про-теза
D	Нерівномірне зволоження мономером акрилової пластмаси
Е	Тріщини в базисі протезу в результаті механічного пошкодження
№	крок 2019
Тема	незнімне протезування

Текст завдання	Пацієнту 54-х років показано виготовлення суцільнолитих металокерамічних мостоподібних протезів на верхню та нижню щелепи. Яку групу відбиткових матеріалів необхідно вибрати при виготовленні даних зубних протезів?
Правильна відповідь	Силіконові
B	Цинкооксидевгенолові
C	Термопластичні
D	Альгінатні
E	Гіпс
№	крок 2019
Тема	захворювання парадонта
Текст завдання	Жінка 39-ти років звернулася зі скар-гами на рухомість зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: зубна формула: 17 16 15 14 13 12 11 / 21 22 23 24 25 26 27, 47 46 45 44 43 42 41/31 32 33 34 35 36 37. Зуби інтактні, корон-ки високі. Навколо 42 41/31 32 зубів ясенні кишени, рухомість I та II ступенів. Для ім-мобілізації рухомих зубів виготовлена ков- пачкова шина з фіксуючими коронками на 43/33 зуби. Яку стабілізацію зубів дозволяє провести дана шина?
Правильна відповідь	Фронтальна
B	Сагітальна
C	Парасагітальна
D	Фронтно-сагітальна
E	Колова
№	крок 2019
Тема	щелепно-лицеве протезування
Текст завдання	Хворому 37-ми років зі звичним виви-хом нижньої щелепи, виготовляється незнімний апарат для обмеження відкривання рота. Який термін користування даним апа-ратом?
Правильна відповідь	2-3 місяці
B	3-4 тижні
C	6-12 місяців
D	4-5 років
E	1-2 тижні
№	крок 2019
Тема	щелепно-лицеве протезування



Текст завдання	У хворого 40-ка років серединний дефект твердого піднебіння розміром 2x3 см. Зубні ряди інтактні. Яку конструкцію обтуратора краще застосувати у даному ви-падку?
Правильна відповідь	Плаваючий обтуратор
В	Піднебінна пластинка
С	Обтуратор за Померанцевою-Урбанською
Д	Обтуратор за Ільїною-Маркосян
Е	Пластинковий протез з обтуруючою частиною
№	крок 2019
Тема	матеріалознавство
Текст завдання	Хворий 29-ти років потребує заміщен-ня дефектів зубного ряду верхньої щелепи, яке може бути здійсненим шляхом виготов-лення мостоподібних протезів з естетичним облицюванням. При виготовленні суцільнолитих металопластмасових мостоподібних протезів надійна фіксація ' пластмасового облицювання ("Сінма-М") до каркасу до-сягається при використанні:
Правильна відповідь	Ретенційних кульок
В	Обробки в піскоструменевому апараті
С	Лаку ЕДА
Д	Лаку "Коналор"
Е	Якісного полірування каркасу
№	крок 2019
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Чоловік скаржиться на печіння в ді-лянці слизової оболонки твердого підне-біння при користуванні частковим знімним пластинковим протезом, виготовленим ти-ждень тому. Діагностовано алергічний кон-тактний стоматит. Визначте тактику ліку-вання, коли відомо, що умов для виготов-лення дугового протезу немає, а пацієнт вперше користується знімною конструк-цією:
Правильна відповідь	Виготовлення нового знімного протезу з металевим базисом
В	Виготовлення нового протезу з додаван-ням в пластмасове тісто меншої кількості полімеру
С	Кип'ятіння раніше виготовленого протезу в дистильованій воді протягом 10 хвилин
Д	Накладання виготовленого протезу з частим полосканням водою, та прийомом гіпосенсибілізуючих засобів
Е	Виготовлення нового протезу з додаван-ням в пластмасове тісто меншої кількості мономеру
№	крок 2019
Тема	захворювання парадонта

Текст завдання	Хворий 35-ти років страждає на локалі-зований пародонтит фронтальних зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: на верхній щелепі зубний ряд безперервний, на нижній щелепі відсутні 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38 зуби, інші зуби мають рухомість II ступеня, тріси, діастему. Визначте тактику лікаря-ортопеда в даній клінічній ситуації:
Правильна відповідь	Шинувати рухливі зуби з подальшим протезуванням
В	Ортодонтичне лікування з подальшим шинуванням і протезуванням
С	Відновити оклюзійну висоту частковим знімним пластинковим протезом
D	Відновити оклюзійну висоту бюгельним протезом
Е	Виконати тимчасове шинування зубів нижньої щелепи
№	крок 2019
Тема	матеріалознавство
Текст завдання	Одним з етапів виготовлення повно-го знімного протеза є припасування індивідуальної ложки і зняття функціонального відбитка. Яким із перерахованих матеріалів проводиться функціональне оформлення країв індивідуальної ложки?
Правильна відповідь	Ортокор
В	Стомальгін
С	Хромопан
D	Гіпс
Е	Тіодент
№	крок 2019
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	Хворому 28-ми років виготовляється вкладка на 24 зуб непрямым методом. Сформована порожнина для вкладки. Який етап протезування має бути наступним?
Правильна відповідь	Отримання відбитка
В	Моделювання вкладки
С	Відливка вкладки
D	Виготовлення моделі
Е	Фіксація вкладки
№	крок 2019
Тема	незнімне протезування

Текст завдання	Хворий 60-ти років звернувся в щелепно-лицевий стаціонар зі скаргами на біль, кровотечу, порушення жування. В анамнезі травма нижньої щелепи на рівні центральних різців. Об'єктивно: припухлість в місці травми, відкривання рота не обмежене. Діагностований серединний перелом нижньої щелепи. Обидві щелепи без-зубі. Яка конструкція найбільш доцільна?
Правильна відповідь	Наясенна шина Порта
В	Наясенна шина Іунінга
С	Апарат Рудько
Д	Зубо-ясенна шина Ванкевич
Е	Зубо-ясенна шина Вебера
№	крок 2019
Тема	матеріалознавство
Текст завдання	Хворий 39-ти років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Після об'єктивного обстеження хворому показано виготовлення металокерамічних коронок на 13,14 зуби. Який відбитковий матеріал потрібно використати для отримання робочого відбитка?
Правильна відповідь	Спідекс
В	У пін
С	Кромопан
Д	Ортокор
Е	Репін
№	крок 2019
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	Хворому 68-ми років виготовляють часткові знімні протези. На етапі перевірки конструкції протезів спостерігається горбково-горбковий контакт у бічних ділянках та сагітальна щілина у фронтальній. Яку помилку допустив лікар?
Правильна відповідь	Зафіксована бічна оклюзія
В	Завищена висота ЦО
С	Зафіксована передня оклюзія
Д	Занижена висота ЦО
Е	Неправильна побудова протетичної площини
№	крок 2019
Тема	захворювання СНЩС

Текст завдання	Пацієнт 44-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології за скаргами на біль і хрускіт в ділянці СНЩС, порушення функції жування внаслідок часткової відсутності зубів на нижній щелепі. Об'єктивно: відсутні 38 37 36 35 / 45 46 47 48 зуби, пато-логічна стертість зубів нижньої щелепи II ступеню. Як зміщується положення голівок СНЩС при зниженні висоти прикусу в положенні центральної оклюзії?
Правильна відповідь	Дистально і вглиб суглобової ямки
В	Вгору попереду суглобового горбка
С	Вниз позаду суглобового горбка
Д	Вниз попереду суглобового горбка
Е	Займають центральне положення суглобової ямки
№	крок 2019
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	Чоловікові 35-ти років планується виготовлення адгезивного мостоподібного протеза. Об'єктивно: втрачений 15 зуб. Опорні 14 і 16 зуби стійкі. Коронки зубів середньої висоти. Екватор виражений. Прикус ортогнатичний. Що може бути опорною частиною адгезивного протеза?
Правильна відповідь	Литі панцерні або перфоровані накладки
В	Куксові вкладки
С	Повні литі коронки
Д	Комбіновані коронки
Е	Екваторні коронки
№	крок 2019
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	Пацієнт 44-х років звернувся до стоматологічної поліклініки з метою протезування. Скарги на утруднене пережовування їжі, естетичний дефект. Об'єктивно: відсутні 14, 15 і 22 зуби. Вкажіть втрату жувальної ефективності за Агаповим:
Правильна відповідь	18%
В	12%
С	20%
Д	16%
Е	9%
№	крок 2019
Тема	

Текст завдання	При внутрішньоротовому огляді пацієнта у лікаря-стоматолога ортопеда виникла підозра на наявність у нього сифілісу. Які на Вашу думку правильні подальші дії?
Правильна відповідь	Зняти відбитки для вивчення діагностичних моделей
В	Закінчити огляд, направити пацієнта на відповідні аналізи
С	Сказати хворому про свою підозру і закінчити прийом
Д	Відмовити пацієнту в наданні стоматологічної допомоги
Е	Продовжити огляд і почати препарування зубів
№	крок 2019
Тема	незнімне протезування
Текст завдання	Пацієнту виготовляється металокерамічна коронка на 11 зуб. Планується зуб залишити вітальним. Які заходи на час лікування доцільно застосувати для профілактики виникнення в подальшому запалення пульпи даного зуба?
Правильна відповідь	Виготовлення провізорної коронки
В	Призначення кальційвмісних препаратів
С	Призначення протизапальних препаратів
Д	Фізіотерапевтичні заходи
Е	Призначення фторвмісних препаратів
№	крок 2019
Тема	часткове знімне протезування
Текст завдання	В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 42-х років із скаргами на неможливість пережовування їжі у зв'язку з частковою втратою зубів. Об'єктивно: у бокових ділянках відсутні 18, 16, 15, 25, 26, 28, 38, 35, 36, 44, 46, 48. Інші зуби мають рухо-мість I-II ступеня. Діагноз: генералізований пародонтит II ступеня. Яка на Вашу думку конструкція протезів найбільш раціональна в даному випадку?
Правильна відповідь	Бюгельні протези з шинуючими елементами
В	Часткові знімні пластинкові протези
С	Незнімні суцільноліті мостоподібні протези
Д	Протези з металевим базисом
Е	-
№	крок 2019
Тема	матеріалознавство

Текст завдання	Хвора 26-ти років звернулась з приводу протезування зубів. Об'єктивно: коронка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується відновлення її анатомічної форми фарфоровою вкладкою, яку будуть виготовляти прямим методом. За допомогою чого потрібно зняти відбиток з сформованої порожнини для вкладки?
Правильна відповідь	Силіконові матеріали
В	Віск
С	Твердокристалічні матеріали
D	Термопластичні матеріали
Е	Золота або платинова фольга
№	крок 2019
Тема	захворювання парадонта
Текст завдання	Хворий 57-ти років звернувся в клініку зі скаргами на рухомість значної групи, зубів. Після обстеження вирішено в комплексі лікування виготовити даному хворобу знімну шину. Шинуючі властивості знімних шин забезпечуються застосуванням таких кламерів:
Правильна відповідь	Багатоланкові і перекидні
В	Утримуючі
С	Вестибулярні
D	Зубо-альвеолярні
Е	Опорні
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому 75-ти років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Об'єктивно: альвеолярний паросток не-зн
Правильна відповідь	Від ікла до ікла з вестибулярної сторони
В	Від ікла до ікла з язикової сторони
С	Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під'язикової лінії
D	Уздовж щелепно-під'язикової лінії
Е	В ділянці премолярів з язикової сторони
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У пацієнта 62-х років встановлено діагноз: хронічний генералізований пародонтит середньої форми важкості з наявними
Правильна відповідь	Вибіркове пришліфовування зубів
В	Тимчасове шинування

С	Раціональне протезування
D	Використання постійних шинуючих протезів
Е	Виготовлення шини Ельбрехта
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Жінка 48-ми років скаржиться на відсутність 38, 37, 36, 45, 46, 47, 48 зубів. 35, 44 інтактні, стійкі, коронки анатомічної форми
Правильна відповідь	Бюгельний протез
В	Знімний пластинковий протез
С	Мостоподібний протез
D	Мікропротез
Е	Адгезивний мостоподібний протез
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хвора 32-х років звернулась з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрана конструкція металокерамічної корони
Правильна відповідь	Стомафлекс
В	Репін
С	Стомальгін
D	Стенс
Е	Ортокор
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хвора 69-ти років звернулася до клініки зі скаргою на те, що при користуванні недавно виготовленими повними знімними протезами
Правильна відповідь	Завищено висоту прикуса
В	Не створено трьохпунктний контакт Бонвіля
С	Неправильно визначено протетичну площину
D	Занижено висоту прикусу
Е	Неправильно оформлені краї функціонального відбитку
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 57-ти років звернувся в клініку зі скаргами на рухомість значної групи зубів. Після обстеження вирішено в комплексному лікуванні
Правильна відповідь	Багатоланкові і перекидні

В	Вестибулярні
С	Зубо-альвеолярні
Д	Утримуючі
Е	Опорні
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому 58-ми років виготовлено знімний частковий протез для верхньої щелепи. Під час оцінки якості його виготовлення
Правильна відповідь	Швидке зростання температури при полімеризації пластмаси
В	Використання пластмаси з минулим терміном придатності
С	Велика товщина пластмаси
Д	Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси
Е	Мала товщина пластмаси
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому 65-ти років виготовляються повні знімні протези. Визначено прогенічне співвідношення щелеп. Які особливості
Правильна відповідь	Верхню зубну дугу скорочують на два премоляри
В	Передні зуби ставлять у прямому змиканні
С	Нижню зубну дугу скорочують на два премоляри
Д	Передні зуби ставлять у ортогнатичному змиканні
Е	Зуби фронтальної частини ставлять на "приточці"
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнтка 55-ти років скаржиться на болі та лускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Об'єктивно: обличчя симе
Правильна відповідь	Дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба
В	Ревматичний артрит
С	Деформуючий артроз
Д	Гострий післятравматичний артрит
Е	Анкілоз суглоба
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнту 67-ми років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Проводиться припасування індивідуальної л



Правильна відповідь	Поперемінне дотикання язиком щоки
B	Провести язиком по червоній облямівці верхньої губи
C	Активні рухи мимічної мускулатури
D	Ковтання
E	Повільне відкривання рота
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 75-ти років протезується повними знімними протезами. Об'єктивно: повна відсутність зубів на верхній і нижній щелепах
Правильна відповідь	Фіксація передньої оклюзії
B	Деформація робочої моделі
C	Помилка під час постановки зубів
D	Відсутність контакту між прикусними валиками у бічних ділянках
E	Відсутність контакту між прикусними валиками у фронтальній ділянці
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 47-ми років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. З анамнезу з'ясовано, що зуби втрачені у р
Правильна відповідь	Металокерамічний мостоподібний
B	Пластмасовий мостоподібний
C	Бюгельний з фіксацією на атачменах
D	Частковий знімний пластинковий на верхню щелепу
E	Металічний штампований мостоподібний з фасетками
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Жінка 43-х років звернулась з приводу протезування дефекту коронки зуба. Об'єктивно: 25 зруйнований на рівні ясен. На R
Правильна відповідь	Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян
B	Штифтовий зуб за Ахмедовим
C	Напівкоронка
D	Екваторна коронка
E	Вкладка
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія

Текст завдання	Хворому 64-х років виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу при наявності дефекту зубного ряду 2-го класу за К	
Правильна відповідь	I тип	
B	IV тип	
C	II тип	
D	III тип	
E	V тип	
№	крок 2017-2018	
Тема	Ортопедична стоматологія	
Текст завдання	Хворому 32-х років виготовляють металеву вкладку на 36 зуб I класу за Блеком. Які поверхні вкладки необхідно шліфувати	
Правильна відповідь	Оклюзійна	
B	Бічні	
C	Усі поверхні	
D	Дно вкладки	
E	Бічні і дно вкладки	
№	крок 2017-2018	
Тема	Ортопедична стоматологія	
Текст завдання	Жінка 59-ти років потребує шинування зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: зубна	
Правильна відповідь		
B		формула
C		Коронки зубів нижньої щелепи високі, зуби інтактні, шийки оголені, рухомість II ступеня. Яку шину краще застосувати?
D		Суцільнолита знімна

Е	Зі спаяних коронок
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Чоловік 45-ти років скаржиться на болі і рухомість передніх зубів верхньої щелепи. Об'єктивно: зубна формул
Правильна відповідь	В день видалення зубів
В	Через 1-2 дні
С	Через 3-4 дні
Д	Через 5-6 днів
Е	Через 6-7 днів
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому вперше виготовляються повні знімні протези. Хворий з'явився на клінічний етап "накладення протезів". У числі
Правильна відповідь	Через 3 роки
В	Через 2 роки
С	Через рік
Д	Через півроку
Е	Через 5 років
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У пацієнта 25-ти років вестибулярні поверхні верхніх різців уражені флюорозом. Яка з перерахованих конструкцій дасть
Правильна відповідь	Вінір
В	Пластмасова коронка
С	Керамічна коронка
Д	Металокерамічна коронка
Е	Металопластмасова коронка за Мате
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся в клініку зі скаргами на біль в ділянці тіла нижньої щелепи зліва. Об'єктивно припухлість обл
Правильна відповідь	Алюмінієві шини із зачіпними гачками і міжщелепною тягою
В	Виготовити пружну дугу Енгля на нижню щелепу
С	Виготовити апарат Ванкевич

D	Виготовити апарат Бетельмана
E	Провести медикаментозне лікування
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 42-х років, за професією вчитель, звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: передні зуби верхньої щелепи
Правильна відповідь	Безпосередньо після видалення
B	Через 1 день
C	Через 2 дні
D	Через 3 дні
E	Через 4 дні і більше
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Під час бойових дій у зубного техника спеціалізованого шпиталю для виготовлення зубних протезів виникла потреба поповн
Правильна відповідь	ЗТ-3
B	ЗТ-1
C	ЗТ-2
D	ЗП
E	ЗВ
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	В клініку звернувся пацієнт з дефектом коронкової частини 26 зуба. При обстеженні виявлено каріозну порожнину I класу з
Правильна відповідь	Вкладка
B	Пломбування цементом
C	Штучна коронка
D	Штифтовий зуб
E	Видалення зуба і виготовлення мостоподібного протезу
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами на рухливість зубів нижньої щелепи. Який в
Правильна відповідь	По дузі
B	Сагітальний

С	Фронтальний
D	Парасагітальний
Е	Фронтосагітальний
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 40-ка років звернувся у клініку зі скаргами на рухливість фронтальних зубів. Об'єктивно: рухливість фронтальних з
Правильна відповідь	Мамлока
В	З багатоланковим кламером
С	Ельбрехта
D	Інтердентальна за Копейкіним
Е	Новотні
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Жінка 26-ти років звернулася з приводу протезування зубів. 45, 46 відсутні. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. На діагнос
Правильна відповідь	Вкладка
В	Повна коронка
С	Екваторна коронка
D	Напівкоронка
Е	Утримуючий кламер
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У хворого 30-ти років свіжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення відламків. Який ортопедичний а
Правильна відповідь	Фіксує
В	Вправляючий
С	Направляючий
D	Заміщаючий
Е	Формуючий
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хвора 43-х років звернулася зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: рухомість зубів I-II ступеня. Плану
Правильна відповідь	Сплав КХС

В	ЕІ-95
С	Нержавіюча сталь
D	Сплав ПД-250
Е	Сплав золота 900-ї проби
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 59-ти років скаржиться на погану фіксацію повного знімного протеза, який спадає при кусанні під час їжі. Об'єктив
Правильна відповідь	Неправильна постановка зубів
В	Неправильно визначена центральна оклюзія
С	Невірно отримано анатомічний відбиток
D	Невірно отримано функціональний відбиток
Е	Невірно відлита модель
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У хворого 40-ка років патологічне стирання зубів, викликане функціональним перевантаженням після втрати великої кілько
Правильна відповідь	Протезування із збільшенням міжальвеолярної висоти
В	Протетичним методом
С	Вкорочення зубів
D	Ортопедичним методом
Е	Апаратурно-хірургічним методом
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на відсутність зуба на верхній щелепі справа, естетичний дефект. Об'єктивно: відсутність 12
Правильна відповідь	Адгезивний мостоподібний
В	Пластмасовий мостоподібний
С	Металокерамічний мостоподібний з опорою на 14, 13
D	Металопластмасовий мостоподібний
Е	Штамповано-паяний мостоподібний
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Чоловік 55-ти років отримав удар у фронтальну ділянку нижньої щелепи. Діагностовано перелом н/щ. До травми користува

Правильна відповідь	Протези пацієнта
B	Шина Вебера
C	Шина Ванкевич
D	Апарат Збаржа
E	Шина Васильєва
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому 48-ми років планують виготовлення незнімного мостоподібного протеза на нижню щелепу з опорою на 15 і 18 зуби
Правильна відповідь	Дистальна
B	Щічна
C	Медіальна
D	Піднебінна
E	Жувальна
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворій 35-ти років, з одностороннім кінцевим дефектом зубного ряду верхньої щелепи був встановлений внутрішньокістковий протез
Правильна відповідь	1
B	1.5
C	1.75
D	2
E	1.25
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У хворого 35-ти років свіжий ментальний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення уламків. Який ортопедичний апарат слід використати для фіксації?
Правильна відповідь	Фіксує
B	Репонуючий
C	Заміщуючий
D	Формуючий
E	Комбінований
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія

Текст завдання	Пацієнт 19-ти років звернувся до клініки з діагнозом: односторонній перелом тіла нижньої щелепи між 33 і 34 зубами зі змі
Правильна відповідь	Репонуючий
B	Фіксуєчий
C	Заміщуючий
D	Направляючий
E	Формуючий
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Чоловік 47-ми років звернувся зі скаргами на утруднене вживання їжі, деформацію прикусу. В анамнезі: перелом нижньої ш
Правильна відповідь	Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом
B	Протез із шарніром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням
C	Протез із шарніром за Оксманом з односуглобним зчленуванням
D	Протез із шароамортизаційним кламером за Курляндським
E	Безшарнірний знімний протез
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий скаржиться на біль у яснах на верхній щелепі зліва, кровотечу при чищенні зубів та вживанні твердої їжі. Об'єктивн
Правильна відповідь	Зняти мостоподібний протез
B	Направити до стоматолога-терапевта
C	Провести рентгенологічну діагностику
D	Направити на клінічний аналіз крові
E	Виготовити металокерамічний мостоподібний протез
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У хворого 44-х років внаслідок несвочасного надання спеціалізованої допомоги фрагменти нижньої щелепи зрослися у
Правильна відповідь	Виготовити протез з подвійним рядом зубів
B	Виготовити незнімний мостоподібний протез з шарнірним кріпленням
C	Виправити деформацію прикусу шляхом зішліфовування зубів
D	Виправити деформацію прикусу апаратурно-хірургічним методом
E	Виготовити назубоясенну пластинку
№	крок 2017-2018



Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У хворого 57-ми років звичний вивих нижньої щелепи. Для обмеження відкривання рота виготовлений апарат Ядрової. Яким
Правильна відповідь	3 місяці
B	6 місяців
C	9 місяців
D	12 місяців
E	18 місяців
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий ВІЛ-інфікований, звернувся в клініку з метою протезування. Лікар планує виготовлення мостоподібних протезів. Як
Правильна відповідь	За спеціальною схемою
B	Без особливостей
C	В сухожаровій шафі
D	Обробка лізоформіном
E	Обробка в 3% р-ні хлораміна
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Чоловік 46-ти років звернувся до клініки для профілактичного огляду щелепно-лицевої ділянки. Об'єктивно: передні зуби в
Правильна відповідь	Ортогнатичний
B	Прогнатичний
C	Прямий
D	Відкритий
E	Косий
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Одним із станів визначення центральної оклюзії є побудова площини, що при наявності достатньої кількості зубів проходить
Правильна відповідь	Протетична
B	Сагітальна
C	Вертикальна
D	Трансверзальна
E	Франкфуртська

№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнту 20-ти років виготовляється порцелянова коронка на 21 зуб. Після виготовлення платиного ковпачка наноситься
Правильна відповідь	Глазурування
B	Нанесення емалевого шару
C	Нанесення дентинного шару
D	Нанесення прозорого шару на ріжучий край
E	Підфарбування шийки коронки
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому 62-х років для виготовлення ектопротезу необхідно отримати маску обличчя за Гіпократом. Який відбитковий ма
Правильна відповідь	Гіпс
B	Дентафоль
C	Стенс
D	Стомафлекс
E	Репін
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 47-ми років, вчитель, хворіє на генералізований пародонтит. Протягом 5-ти років користувався незнімною коронков
Правильна відповідь	Безпосередній
B	Незнімний мостоподібний
C	Знімний мостоподібний
D	Знімна шина-протез
E	Незнімна шина-протез
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 30-ти років звернувся зі скаргами на болі в ділянці передніх зубів нижньої щелепи, які пов'язує із травмою підборідд
Правильна відповідь	Гладка шина-скоба
B	Гардашнікова
C	Паяна на кільцях
D	Вебера

Е	Васильєва
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 55-ти років поступив з двостороннім переломом нижньої щелепи в межах зубного ряду. Об'єктивно: відсутні 34, 35,
Правильна відповідь	Вебера
В	Ванкевич
С	Тігерштедта
D	Гладка шина-скоба
Е	Шина Порта
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 47-ми років скаржиться на зміну кольору 11 та 21 зубів. Об'єктивно: 11, 21 зуби рожевого кольору, канали запломбс
Правильна відповідь	5°
В	0°
С	10°
D	15°
Е	20°
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 43-х років скаржиться на кровотечу з ясен, болі в яснах довкола окремих зубів, кровотечу під час чищення зубів.
Правильна відповідь	Пришліфувати оклюзійні поверхні
В	Виготовити металеві коронки
С	Виготовити металокерамічні коронки
D	Провести функціональні проби
Е	Виготовити шини-капи
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому 53-ти років планують виготовити частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу при наявності 16, 15,
Правильна відповідь	Площинний
В	Точковий
С	Лінійний діагональний

D	Лінійний трансверзальний
E	Лінійний сагітальний
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У хворого 70-ти років повна відсутність зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: верхньощелепні горби і альвеолярні відростки
Правильна відповідь	III тип за Шредером
B	III тип за Келлером
C	II тип за Шредером
D	II тип за Келлером
E	-
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому 48-ми років виготовляється протез на нижню щелепу. Об'єктивно: відсутні 48, 45, 44, 43, 35, 36, 37 зуби. 38 зуб має
Правильна відповідь	П'ятий
B	Перший
C	Третій
D	Другий
E	Четвертий
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	На медичний пункт полка поступив поранений з ознаками двобічного перелому нижньої щелепи. Яка основна задача першої
Правильна відповідь	Боротьба з шоком, кровотечею, асфіксією, транспортна іммобілізація
B	Контроль і виправлення раніше накладених пов'язок
C	Введення знеболюючих і серцевих засобів
D	Очищення порожнини рота від згортків крові, зруйнованих зубів і уламків щелеп
E	Проведення симптоматичного лікування і догляду
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Скільки ставок лікарів-ортопедів повинна мати районна лікарня міста, якщо кількість населення становить 36 тис. мешканців
Правильна відповідь	3.5
B	5.5

С	4
D	6
Е	2
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	В клініку ортопедичної стоматології з метою протезування звернувся пацієнт 55-ти років з відсутністю 11 зуба. Два тижні т
Правильна відповідь	Виготовити тимчасовий знімний протез
В	Виготовити бюгельний протез
С	Виготовити мостоподібний протез з опорою на 12, 21
D	Тимчасово відмовити в протезуванні
Е	Провести імплантацію
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий висловлює скарги на відсутність зубів, естетичний дефект. Об'єктивно: присутні 46, 43, 32, 33, 37. Зуби стійкі, корен
Правильна відповідь	Дуговий з телескопічними коронками
В	ЧЗПП
С	Дуговий з опорно-утримуючими кламерами
D	Штамповано-паяний мостоподібний
Е	Піднебінна пластинки з вестибулярною дугою
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Лікар стоматолог-ортопед, що має стаж роботи 7 років 6 місяців, за відповідності професійному стандарту, одержав I кваліфі
Правильна відповідь	10 років
В	8 років
С	9 років
D	12 років
Е	15 років
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 70-ти років звернувся до ортопеда-стоматолога зі скаргами на повну відсутність зубів. Об'єктивно: має місце незнач
Правильна відповідь	Перший

В	Третій
С	П'ятий
D	Другий
Е	Четвертий
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Чоловік 60-ти років із повною відсутністю зубів. Користується протезами 15 років. Об'єктивно: нижня третина обличчя зниж
Правильна відповідь	Функціональний декомпресійний дентафлексом
В	Повні анатомічні гіпсом
С	Повні анатомічні стомальгіном
D	Функціональний компресійний стенсом
Е	Функціональний диференційований репіном
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнтка 40-ка років звернулася з метою протезування 12, 13 зубів. Зуби 12, 13 раніше ліковані, мають рожеве забарвлення
Правильна відповідь	Спідекс
В	Репін
С	Гіпс
D	Стомальгін
Е	Ортокор
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 45-ти років на етапі виготовлення часткових знімних протезів на верхню та нижню щелепи. Одержано повні анатом
Правильна відповідь	Глутаровий альдегід 2,5% рН- 7,0-8,7
В	Дезоксон 0,1%
С	Розчин перекису водню 6%
D	Розчин фенолу 1:20
Е	-
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У хворого 56-ти років діагностовано перелом нижньої щелепи, який неправильно зрісся. Об'єктивно: на нижній щелепі наяв

Правильна відповідь	Виготовити знімний протез з подвійним зубним рядом
B	Частковий знімний пластинковий протез
C	Бюгельний протез
D	Протезування на імплантах незнімною конструкцією
E	Протезування на імплантах знімною конструкцією
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У клініку ортопедичного відділення звернувся пацієнт 43-х років із скаргами на неможливість пережовування їжі. Діагносто
Правильна відповідь	Ковзна з рівномірними контактами всіх зубів
B	Центральна
C	Захищена іклами
D	Бокова ліва
E	Задня
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У хворого 27-ми років відсутня коронкова частина 11 зуба. Об'єктивно 21 та 12 зуби інтактні, на внутрішньоротовій прицілі
Правильна відповідь	Виготовлення куксової металеві вкладки та покривної металокерамічної коронки
B	Виготовлення куксової вкладки та покривної штампованої коронки
C	Виготовлення куксової вкладки та покривної пластмасової коронки
D	Виготовлення куксової вкладки та покривної суцільнолитої металеві коронки
E	Видалити корінь 11 зуба, провести імплантацію
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	У хворого 75-ти років діагностовано перелом нижньої щелепи справа в ділянці ментального отвору. Об'єктивно: на нижній
Правильна відповідь	Шину Порта
B	Апарат Збаржа
C	Шина Ванкевич
D	Шина Васильєва
E	Апарат Рудько
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія

Текст завдання	Пацієнт 42-х років звернувся у клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об'єктивно: відсутні 34, 35, 36, 43
Правильна відповідь	0,5% розчин гіпохлориду натрію
B	3% перекис водню
C	10% перекис водню
D	Стериліум
E	3% розчин гіпохлориду натрію
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 42-х років звернувся у клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об'єктивно: відсутні 34, 35, 36, 43
Правильна відповідь	Церебральний
B	Дигестивний
C	Респіраторний
D	Змішаний
E	М'язовий
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хвора 36-ти років звернулася з приводу протезування зубів. Об'єктивно: на жувальній і мезіальній поверхнях 46 зуба каріоз
Правильна відповідь	2
B	3
C	4
D	5
E	1
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 45-ти років скаржиться на біль та хрускіт в ділянці СНЩС підчас рухів нижньої щелепи. Об'єктивно: обличчя симет
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія СНЩС
B	Ортопантомографія
C	Рентгенографія по Парма
D	Рентгенографія по Шуллеру
E	Рентгенографія по Шульцу
№	крок 2017-2018



Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 45-ти років звернувся у клініку ортопедичної стоматології у зв'язку з неможливістю закрити рот. Під час проведенн
Правильна відповідь	Повний вивих суглобової головки
В	Підвивих суглобової головки
С	Деформуючий артроз
D	Хронічний артрит
Е	Анкілоз
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	В новому мікрорайоні великого міста відкривають стоматологічну поліклініку з ортопедичним відділенням на 5 посад лікар
Правильна відповідь	Так, на 1,0 ставки
В	Так, на 0,5 ставки
С	Не потрібна
D	Визначають старшого лікаря на добровільних засадах
Е	Так, на 1,5 ставки
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому 68-ми років виготовляють часткові знімні протези. На етапі перевірки конструкції протезів спостерігається горбко
Правильна відповідь	Зафіксована передня оклюзія
В	Зафіксована бічна оклюзія
С	Неправильна побудова протетичної площини
D	Занижена висота ЦО
Е	Завищена висота ЦО
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Пацієнту 80-ти років показано виготовлення часткового знімного протеза на нижню щелепу. Як проходить його межа в діля
Правильна відповідь	Перекриває коронки на 2/3 висоти
В	Перекриває коронки на 1/3 висоти
С	Перекриває коронку на всю висоту
D	Доходить до рівня шийок зубів
Е	Проходить нижче рівня шийок зубів

№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 29-ти років звернувся з метою протезування зі скаргами на часте руйнування реставрації зуба у фронтальній ділянці
Правильна відповідь	Металокерамічна коронка на 11
B	Штампована металева коронка на 11
C	Пластмасова коронка на 11
D	Телескопічна коронка на 11
E	Коронка за Белкіним на 11
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хвора 52-х років звернулася в клініку з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрана конструкція часткової
Правильна відповідь	Ортокор
B	Гіпс
C	Віск
D	Сіласт
E	Стенс
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хвора 25-ти років, яка працює вчителем, звернулася в клініку ортопедичної стоматології із скаргами на косметичний дефект
Правильна відповідь	Інфільтраційна
B	Аплікаційна
C	Центральна провідникова
D	Туберальна
E	Спонгіозна
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 46-ти років, викладач, звернувся зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи, що утруднює відкушування їжі.
Правильна відповідь	Шина Мамлока
B	Знімна багатоланкова шина для фронтальних зубів
C	Коронково-ковпачкова шина
D	Шина з амбразурними кламерами

Е	Шина з напівкоронки
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Чоловік 45-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. З анамнезу з'ясовано, що 13, 12, 11, 21, 22,
Правильна відповідь	Бюгельний протез з фіксацією на атачменах
В	Порцелянові коронки, фіксовані на імплантатах
С	Частковий знімний протез на верхню щелепу
D	Металокерамічний мостоподібний протез
Е	Пластмасовий мостоподібний протез
№	крок 2017-2018
Тема	Ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворому 53-х років виготовлений частковий пластинковий протез на нижню щелепу. Об'єктивно: відсутні 48-43, 34-38, 18, 2
Правильна відповідь	Визначення центральної оклюзії
В	Встановлення штучних зубів
С	Виготовлення моделей
D	Виготовлення воскового базису і прикусних валиків
Е	Отримання відбитків
№	крок 2017-2018
Тема	ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хвора 45-ти років скаржиться на печіння у язичі, металевий присмак у роті. Три місяці тому був поставлений мостоподібний
Правильна відповідь	Гальванічні струми
В	Алергічна реакція
С	Неврологічні порушення
D	Хімічні фактори
Е	Механічна травма
№	крок 2017-2018
Тема	ортопедична стоматологія
Текст завдання	Хворий 46-ти років скаржиться на металевий присмак у роті, відчуття печіння і сухість на кінчику і бічних поверхнях язика
Правильна відповідь	Визначення електропотенціалів порожнини рота
В	Аналіз крові на цукор
С	Клінічний аналіз крові

D	Цитологічне дослідження з язика та нижньої губи
E	Обстеження у невропатолога
№	1. . крок 2008
Тема	<b>ТЕМА ІМПЛАНТОЛОГІЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 32-х років внаслідок спортивної травми втратив 41 та 31 зуби. Реплантація неможлива, тому що вказані зуби мають тріщини й сколи як на поверхні коронок, так і на поверхні коренів. Після клінічного та рентгенологічного обстеження визначена можливість безпосередньої імплантації. Які імплантати за матеріалом мають перевагу?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Титанові
B	<b>B.</b> Вуглецеві
C	<b>C.</b> Порцелянові
D	<b>D.</b> Платинові
E	<b>E.</b> Сапфірові
№	2. . крок 2009, 2008, 2007
Тема	<b>ТЕМА ІМПЛАНТОЛОГІЯ</b>
Текст завдання	Хворому 50-ти років для заміщення дефекту нижнього зубного ряду планується виготовлення мостоподібного протеза з опорою на імплантати. На рентгенограмі: висота масиву кісткової тканини від проекції нижньощелепного каналу до верхівки альвеолярного гребеня дорівнює 2 см. Який вид імплантату найбільш показаний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гвинтовий
B	<b>B.</b> Ендодонто-ендоосальний
C	<b>C.</b> Листоподібний
D	<b>D.</b> Підокісний
E	<b>E.</b> Конусоподібний
№	3. . крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ІМПЛАНТАЦІЯ</b>
Текст завдання	Хворий 22-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з приводу відсутності 21 зуба. 11 та 22 зуби інтактні. Яка конструкція найбільш доцільна в даному випадку, якщо з часу видалення 22 зуба минуло 2 місяці?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Двоетапна імплантація
B	<b>B.</b> Одноетапна імплантація з одночасним виготовленням металокерамічної коронки

С	С. Частковий знімний протез
D	D. Штамповано-паяний протез із опорою на 11 та 22 зуби
E	E. Металопластмасовий протез із опорою на 11 та 22 зуби
№	4. . крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА МІКРОПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 28-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на скол коронки 11 внаслідок травми, що сталася місяць тому. Об'єктивно: в 11 зубі визначається лінійний поперечний дефект коронки на 1/3 її висоти без розтину порожнини зуба. Коронка у кольорі не змінена, перкусія безболісна. ЕОД - 8 мкА. Оберіть оптимальний спосіб покращення фіксації пломби у даному випадку:
Правильна відповідь	A. Введення парапальпарних штифтів
B	B. Депульпування зуба з введенням внутрішньоканального штифта
C	C. Створення додаткової площадки на піднебінній поверхні
D	D. Створення ретенційних пунктів
E	E. Створення скосу емалі під кутом 45 градусів
№	5. . крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА МІКРОПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 38-ми років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на розцементування металокерамічної коронки, виготовленої на 23 зуб три місяці тому. Об'єктивно: коронкова частина 23 зуба низька з конусністю стінок до 10-15°. Яка причина швидкого розцементування металокерамічної коронки?
Правильна відповідь	A. Значна конусність стінок препарованого опорного зуба
B	B. Невірно визначено колір керамічного покриття
C	C. Неякісно відновлено міжзубні контакти
D	D. Неякісно відновлено ріжучий край металокерамічної коронки
E	E. Коронку фіксовано на неякісний цемент
№	6. . крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА МІКРОПРОТЕЗУВАННЯ</b>

Текст завдання	Жінка 25-ти років скаржиться на зміну кольору 12 зуба, естетичний дефект. У анамнезі: лікування даного зуба з приводу ускладненого карієсу, алергія на пластмасу. Об'єктивно: 12 зуб має темно-сірий колір, дефект відновлений пломбою. На Ro-грамі: канал кореня запломбований до верхівки. Прикус ортогнатичний. Яка з перерахованих штучних коронок показана даній хворій?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Фарфорова
B	<b>B.</b> Пластмасова
C	<b>C.</b> Металопластмасова
D	<b>D.</b> Металокерамічна
E	<b>E.</b> Лита
№	<b>7.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА МІКРОПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Студентка 17-ти років скаржиться на зміну у кольорі центрального різця на верхній щелепі справа. 1,5 місяці тому зуб був депульпований і запломбований, але змінився в кольорі. Об'єктивно: 21 запломбований, сірого кольору, стійкий, перкусія безболісна. Прикус ортогнатичний. Яка конструкція протезу найбільш доречна в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Металокерамічна коронка
B	<b>B.</b> Пластмасова коронка
C	<b>C.</b> Комбінована коронка
D	<b>D.</b> Вкладка
E	<b>E.</b> Металева коронка
№	<b>8.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА МІКРОПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 29-ти років виготовляється металічна вкладка на 26 зуб прямим методом. Об'єктивно: на 26 порожнина І класу за Блеком. ЕОД - 6 мкА. Під час огляду вкладки виявлений дефект відливки у ділянці кута зовнішньої поверхні. Які подальші дії лікаря?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Виготовити нову вкладку
B	<b>B.</b> Фіксація вкладки на цемент
C	<b>C.</b> Фіксація вкладки на пластмасу
D	<b>D.</b> Фіксація вкладки і відновлення дефекту композитом

Е	Е. Фіксація вкладки і відновлення дефекту амальгамою
№	9. крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА МІКРОПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Студент медичного інституту 22-х років скаржиться на зміну в кольорі центрального різця на верхній щелепі зліва. Рік тому зуб був депульпований і запломбований, але поступово набув сірого кольору. Зуб стійкий, перкусія безболісна. Прикус глибокий. Яке протипоказання до виготовлення фарфорової коронки є у цього пацієнта?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Глибокий прикус
В	<b>В.</b> Дефекти передніх зубів, які не можливо замінити пломбами
С	<b>С.</b> Гіоплазія емалі зі зміною форми і кольору зуба
Д	<b>Д.</b> Аномалія кольору зуба
Е	<b>Е.</b> Дефекти депульпованих зубів, які неможливо замінити вкладками
№	1. крок 2016, 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	На етапі припасування металокерамічного протезу з опорою на 13, 21, 23 відламалося керамічне обличкування з 21 зуба. Об'єктивно: поверхня металу сірого кольору, зворотня поверхня відламаного керамічного обличкування темнозелена. Каркас був відлитий з металу <i>Veron</i> . Яка причина відлому?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Відсутність необхідної якості оксидної плівки
В	<b>В.</b> Моделювання каркасу з тонкими стінками
С	<b>С.</b> Неправильна загіпсовка моделей в оклюдатор
Д	<b>Д.</b> Відливка каркасу з безоксидного металу
Е	<b>Е.</b> Утворення оксидної плівки на поверхні каркасу
№	2. крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 48ми років планують виготовлення незнімного мостоподібного протеза на нижню щелепу з опорою на 15 і 18 зуби. Об'єктивно: 18 зуб нахилений дистально /дивергує/. Яку поверхню 18 зуба необхідно зішліфувати у більшому об'ємі при препаруванні опірних зубів?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Дистальна

В	<b>В.</b> Щічна
С	<b>С.</b> Медіальна
Д	<b>Д.</b> Піднебінна
Е	<b>Е.</b> Жувальна
№	<b>3.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 50ти років звернулась в ортопедичне відділення зі скаргами на дефект твердих тканин 21, 22 зубів. Показано виготовлення металокерамічних коронок на 21 і 22 зуби. Хвора відмічає алергічну реакцію при проведенні анестезії при попередньому відвідуванні стоматолога. Яка тактика лікаря?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Проведення алергологічних лабораторних проб
В	<b>В.</b> Провести інфільтраційну анестезію анестетиком артикаїнового ряду
С	<b>С.</b> Провести скарифікаційну пробу на анестетик, яким буде проводитись знеболення
Д	<b>Д.</b> Провести знеболювання анестетиком ефірного ряду
Е	<b>Е.</b> Провести підшкірну пробу на анестетик
№	<b>4.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтові 32х років під час препарування 21 і 11 зубів під металокерамічні коронки було частково зруйновано кукси цих депульпованих зубів. За допомогою чого можна відновити кукси 21 і 11 зубів?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Анкерний штифт і композит
В	<b>В.</b> Вінір
С	<b>С.</b> Пластмасова коронка
Д	<b>Д.</b> Вкладка
Е	<b>Е.</b> Накладка
№	<b>5.</b> крок 2016, 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 32х років виготовляють металокерамічні коронки на 12, 11, 21, 22 зуби. Застосовується інфільтраційна анестезія анестетиком <i>Ultracain DS</i> . Що входить до його складу?
Правильна відповідь	<b>А.</b> 4% артикаїн з адреналіном



B	<b>B.</b> 2% мопівакаїн з адреналіном
C	<b>C.</b> 4% артикаїн без вазоконстриктора
D	<b>D.</b> 3% мепівакаїн без вазоконстриктора
E	<b>E.</b> 2% артикаїн з епінефіраном
№	<b>6.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 44х років скаржиться на косметичний дефект. Об'єктивно: коронкова частина 21 повністю відсутня, кукса підвищується над рівнем ясен на 0,5 мм. Кореневий канал запломбований, перкусія безболісна. На рентгенограмі: кореневий канал 21 запломбований на всьому протязі, стінки кореня достатньої товщини. Яку конструкцію штифтового зуба слід вибрати згідно клінічної картини?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Куксова вкладка
B	<b>B.</b> Штифтовий зуб за Логаном
C	<b>C.</b> Штифтовий зуб за Річмондом
D	<b>D.</b> Штифтовий зуб за Ахмедовим
E	<b>E.</b> Простий штифтовий зуб
№	<b>7.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтці 52-х років виготовляються штамповані металеві коронки на 26 і 27 зуби. В нормі їх краї по відношенню до ясен можуть:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Занурюватися в зубоясенну борозенку до 0,10,2 мм
B	<b>B.</b> Не доходити до ясен на 0,2 мм
C	<b>C.</b> Бути на рівні ясен
D	<b>D.</b> Занурюватися в зубоясенну борозенку на 0,60,8 мм
E	<b>E.</b> Занурюватися в зубоясенну борозенку на 1 мм
№	<b>8.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>

Текст завдання	Чоловік 28ми років, вчитель, скаржиться на естетичний недолік у фронтальній ділянці верхньої щелепи. В анамнезі: відлам коронкової частини 11 внаслідок отриманої місяць тому травми. Об'єктивно: лінія перелому на рівні ясенного краю, корінь 11 нерухомий, перкусія безболісна. На рентгенограмі кореневий канал запломбований до верхівки кореня. Яку конструкцію доцільно запропонувати хворому?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Куксова вкладка з металокерамічною коронкою
B	<b>B.</b> Порцелянова вкладка
C	<b>C.</b> Штифтовий зуб за Річмондом чи Катцом
D	<b>D.</b> Комбінована коронка за Куриленко чи Бородюком
E	<b>E.</b> Адгезивний мостоподібний протез із фотополімеру
№	<b>9.</b> крок 2016, 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 39-ти років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Після об'єктивного обстеження хворому показано виготовлення металокерамічних коронок на 13, 14 зуби. Який відбитковий матеріал потрібно використати для отримання робочого відбитка?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Спідекс
B	<b>B.</b> Репін
C	<b>C.</b> Упін
D	<b>D.</b> Кромопан
E	<b>E.</b> Ортокор
№	<b>10.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 40-ка років звернувся до лікаря ортопедичної стоматології. Скарги на відсутність коронки зуба й естетичний недолік. Об'єктивно: коронка 13 зуба відсутня. Корінь виступає над рівнем ясен на 1,4 мм. Поверхня кукси тверда, кореневий канал запломбований, прикус ортогнатичний. Яка конструкція протеза найраціональніша?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Коронковокоренева вкладка і покривна коронка
B	<b>B.</b> Видалення зуба й імплантація з подальшим протезуванням
C	<b>C.</b> Штифтовий зуб за ІльїноюМаркосян
D	<b>D.</b> Іммедіатпротез
E	<b>E.</b> Використання анкерного штифта і реставрація

№	<b>11.</b> крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту 35-ти років проводять препарування 12, 11, 21, 22 під постійні пластмасові коронки. На якому рівні по відношенню до краю ясен необхідно розташувати уступ?
Правильна відповідь	<b>А.</b> На рівні краю ясен
В	<b>В.</b> Вище краю ясен на 1,5 мм
С	<b>С.</b> Вище краю ясен на 1 мм
Д	<b>Д.</b> Нижче краю ясен на 0,5 мм
Е	<b>Е.</b> Нижче краю ясен на 1 мм
№	<b>12.</b> крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт, 38 років. Прикус ортогнатичний, глибоке різцеве перекриття: явища бруксизму. Потребує протезування 12, 11, 21, 22 зубів, має підвищені естетичні вимоги. Які коронки доцільно використовувати у даного пацієнта?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Металокерамічні з литою оральною поверхнею
В	<b>В.</b> Пластмасові
С	<b>С.</b> Комбіновані штамповані
Д	<b>Д.</b> Металопластмасові повністю обличковані пластмасою
Е	<b>Е.</b> Штамповані
№	<b>13.</b> крок 2015, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 47-ми років скаржиться на болі у ділянці 36,37 зубів, які посилюються при жуванні. Об'єктивно: зубна формула 17,16,15,14,13,12,11/21,22,23,24,25,26,27 47,46,45,44,43,42,41/31,32,33,34,35,36,37. 1/3 жувальної поверхні та дистальна стінка коронки 36 зуба відновлені пломбою, контакт з 37 зубом відсутній. Перкусія 36,37 зубів безболісна. Застосування якого зубного протеза дозволяє замінити дефект коронки 36 зуба і відновити міжзубний контакт, порушення якого обумовило захворювання пародонту?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Вкладка
В	<b>В.</b> Напівкоронка
С	<b>С.</b> Екваторна коронка

D	<b>D.</b> Повна коронка
E	<b>E.</b> Штифтовий зуб
№	<b>14.</b> крок 2015, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 56-ти років звернулася до клініки з метою протезування. Об'єктивно: коронкова частина 22 зуба зруйнована на 1/2. На рентгенограмі кореневий канал запломбований на 1/3 від верхівки. Змін у періапикальних тканинах немає. Лікар планує виготовити штифтовий зуб за Ахмедовим. Як слід препарувати над'ясенну частину коронки зуба під обрану конструкцію?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Як під штамповану комбіновану коронку
B	<b>B.</b> Вестибулярну поверхню до рівня ясни
C	<b>C.</b> Створити порожнину кубічної форми під вкладку
D	<b>D.</b> Поверхню кукси у вигляді "даху"
E	<b>E.</b> Зішліфувати тільки гострі краї кукси зуба
№	<b>15.</b> крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	До клініки ортопедичної стоматології звернувся пацієнт 6-ти років зі скаргами на відсутність зубів у фронтальній ділянці на нижній щелепі, порушення функції жування, мови, естетичний дефект. Зуби видалені 1 рік тому з приводу захворювань пародонту. У порожнині рота: відсутні 31, 32, 41, 42, 43 зуби. 44, 45, 46 рухливі I-II ступеня, 34, 36, 37 рухливі I-II ступеня. Який вид протезування найбільш раціональний у цьому випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Бюгельний протез з елементами шинування
B	<b>B.</b> Незнімний мостоподібний протез з опорою на 34, 33, 44, 45
C	<b>C.</b> Незнімний мостоподібний протез з опорою на 33, 34, 35, 44, 45, 46;
D	<b>D.</b> Зубні протези з використанням імплантатів
E	<b>E.</b> Частковий знімний протез з кламерною фіксацією на 37, 46 зуби
№	<b>16.</b> крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтові 32-х років під час препарування 21 і 11 зубів під металокерамічні коронки було частково зруйновано кукси цих депульпованих зубів. За допомогою чого можна відновити кукси 21 і 11 зубів?

Правильна відповідь	<b>A.</b> Анкерний штифт і композит
B	<b>B.</b> Вінір
C	<b>C.</b> Пластмасова коронка
D	<b>D.</b> Вкладка
E	<b>E.</b> Накладка
№	<b>17.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 26-ти років, диктор телебачення, скаржиться на естетичний недолік у фронтальній ділянці верхньої щелепи. В анамнезі: відлом коронкової частини 21 внаслідок отриманої травми місяць тому. Об'єктивно: лінія перелому на рівні ясенного краю, корінь 21 нерухомий, перкусія безболісна. На рентгенограмі - кореневий канал запломбований до верхівки кореня. Яку конструкцію доцільно запропонувати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Куксова штифтова вкладка з метало-керамічною коронкою
B	<b>B.</b> Штифтовий зуб за Річмондом чи Катцом
C	<b>C.</b> Комбінована коронка за Куриленко чи Бородюком
D	<b>D.</b> Порцелянова вкладка
E	<b>E.</b> Штифтовий зуб за Ахмедовим
№	<b>18.</b> . крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 36-ти років звернулась у клініку ортопедичної стоматології з приводу дефекту коронкової частини 11 зуба. Із анамнезу: неодноразове лікування дефекту не задовольняло вимоги хворої з точки зору естетичності та довговічності. Всі зуби наявні. Прикус ортогнатичний. Об'єктивно: відлом медіального кута 11 зуба, реставрованого композитним матеріалом. Дефект займає 1/3 коронки зуба, пульпа зуба жива. Яке лікування показане?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Виготовити керамічну або метало-керамічну коронку
B	<b>B.</b> Ще раз реставрувати композитом
C	<b>C.</b> Виготовити металеву коронку
D	<b>D.</b> Виготовити штамповано-паяну коронку
E	<b>E.</b> Виготовити комбіновану коронку за Белкіним
№	<b>19.</b> крок 2014

ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 23-х років планується виготовлення коронки з пластмаси на 21. Об'єктивно: коронка 21 має сірий колір, пломбована. Яка з нижче перерахованих пластмас буде використана?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Синма-М
B	<b>B.</b> Етакрил
C	<b>C.</b> Акрил
D	<b>D.</b> Бакрил
E	<b>E.</b> Карбодент
№	<b>20.</b> . крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 28-ми років звернулась у зв'язку з побутовою травмою обличчя. Об'єктивно: у 21 відлам 1/3 коронки зуба, зондування по лінії відламу болісне, реакція на холодний подразник - короточасний біль, перкусія безболісна. Яке дослідження необхідно провести для постановки діагнозу та вибору методу лікування?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Електроодонтометрія
B	<b>B.</b> Рентгенографія
C	<b>C.</b> Термометрія
D	<b>D.</b> Люмінесцентна діагностика
E	<b>E.</b> Вітальне фарбування
№	<b>21.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Юнак 18-ти років звернувся зі скаргами на руйнування зубів. Об'єктивно: у 11, 21 зруйновані ріжучі краї з ураженням медіальних кутів. Перкусія безболісна. З анамнезу: пацієнт страждає на алергію на пластмасу. Оберіть із запропонованих найбільш прийнятний вид конструкції:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Порцелянові коронки
B	<b>B.</b> Штамповані коронки з срібно-паладієвого сплаву
C	<b>C.</b> Штамповані коронки зі сплаву золота
D	<b>D.</b> Комбіновані коронки за Бородюком
E	<b>E.</b> Комбіновані коронки за Белкінім

№	<b>22.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 53-х років скаржиться на рухомість металокерамічного мостоподібного протезу з опорою на 33, 37. Користується протезом 9 місяців. Об'єктивно: на рентгенограмі відмічається атрофія альвеолярного паростка в ділянці 33 на 2/3 і 37 на 1/2 довжини кореня, патологічні кишечі, гінгівіт. Яка причина патологічної рухомості опорних зубів?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Функціональне перевантаження опорних зубів
В	<b>В.</b> Травмування кругової зв'язки края ми коронок
С	<b>С.</b> Депульпування опорних зубів
D	<b>D.</b> Масивне зішліфовування твердих тканин
Е	<b>Е.</b> Моделювання гірлянди у приший ковій ділянці
№	<b>23.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 36ти років при проведенні препарування 34 та 37 зубів під коронки стало погано: з'явилися нудота, шум у вухах, неясність зору, нестача повітря. Відбулась втрата свідомості, зіниці розширились, пульс рідкий. Через 1 хвилину стан хворого покращився. Клініка якого стану проявилась у хворого?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Зомління
В	<b>В.</b> Анафілактичний шок
С	<b>С.</b> Колапс
D	<b>D.</b> Гіпоглікемічна кома
Е	<b>Е.</b> Бронхіальна астма
№	<b>24.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 19-ти років скаржиться на зміну кольору 11 і 12 зубів. Об'єктивно: 11 і 12 зуби мають сіро-рожеве забарвлення, цілісність твердих тканин збережена, перкусія безболісна, слизова у ділянці цих зубів не змінена. На рентгенограмі: кореневі канали 11 і 21 запломбовані до верхівок, змін у періапикальних тканинах немає. Глибоке різцеве перекриття. Оберіть найприйнятнішу конструкцію для цього пацієнта:
Правильна відповідь	<b>А.</b> Вініри

B	<b>B.</b> Фарфорові коронки
C	<b>C.</b> Металокерамічні коронки
D	<b>D.</b> Металопластмасові коронки
E	<b>E.</b> Коронка за Белкіним
№	<b>25.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 48-ми років звернувся зі скаргами на біль при накушуванні у ділянці 25 зуба, які з'явилися після покриття його коронкою. В анамнезі лікування зуба з приводу карієсу. Об'єктивно: 25 вкритий металеву коронкою, перкусія болісна. На оклюзіограмі - передчасний контакт з антагоністами. Яка найбільш імовірна причина виникнення скарг хворого?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Передчасний оклюзійний контакт
B	<b>B.</b> Довгий край коронки
C	<b>C.</b> Ускладнення карієсу
D	<b>D.</b> Розцементування коронки
E	<b>E.</b> Неврит трійчастого нерва
№	<b>26.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 35-ти років звернулася до клініки з метою протезування. Після обстеження було прийнято рішення виготовити суцільнолітні мостоподібні протези з опорою на 14, 17 та 25, 27 зуби. Під час зняття силіконового відбитку у хворої з'явився блювотний рефлекс. Глибоке дихання через ніс не припинило рефлекс. Що слід виконати в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Видалити відбиткову ложку, провести аплікаційну анестезію
B	<b>B.</b> Низько нахилити голову пацієнта уперед
C	<b>C.</b> Перенести зняття відбитку на інше відвідування пацієнта
D	<b>D.</b> Видалити відбиткову ложку, дати ополоснути ротову порожнину розчином перманганату калію
E	<b>E.</b> Зняти відбиток за допомогою розбірної ложки
№	<b>27.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>



Текст завдання	Хвора 26-ти років звернулась з приводу протезування зубів. Об'єктивно: коронка 16 зуба зруйнована на 1/3. Планується відновлення її анатомічної форми металевою вкладкою. Який етап формування порожнини для вкладки повинен бути першим?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Видалення вражених тканин
B	<b>B.</b> Формування додаткових порожнин
C	<b>C.</b> Формування фальцу
D	<b>D.</b> Формування дна порожнини
E	<b>E.</b> Формування стінок порожнини
№	<b>28.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт зі скаргами на багаторазове розцементування метало-керамічного мостоподібного протезу з опорою на 23, 25, 26 зуби. Опорні зуби депульповані та оброблені по формі зрізаного конуса зі значною конвергенцією стінок та з круговими уступами в ділянці шийок. Жувальна поверхня опорних зубів має вигляд рівної площини. Мостоподібний протез був зацементований фосфатним цементом. Назвіть причину розцементування протезу:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Невірне препарування зубів
B	<b>B.</b> Використання фосфатного цементу
C	<b>C.</b> Наявність кругових уступів
D	<b>D.</b> Використання для опори 23 зуба
E	<b>E.</b> Наявність прямого прикусу
№	<b>29.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 43-х років звернулась з приводу протезування дефекту коронки зуба. Об'єктивно: 25 зруйнований на рівні ясен. На Ro-грамі кореневий канал запломбований до верхівки. Перкусія безболісна. Яка конструкція протеза показана хворій?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян
B	<b>B.</b> Штифтовий зуб за Ахмедовим
C	<b>C.</b> Напівкоронка
D	<b>D.</b> Екваторна коронка

Е	Е. Вкладка
№	30. крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Студент 18-ти років звернувся з метою протезування 11, 21 зубів метало-керамічною конструкцією. Протипоказань до застосування такої конструкції немає. Який матеріал для одержання відбитка найбільш доцільний?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Сіеласт
В	<b>В.</b> Стомальгін
С	<b>С.</b> Ортокор
Д	<b>Д.</b> Стенс
Е	<b>Е.</b> Репін
№	31. крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 23-х років звернувся до стоматолога з приводу естетичного дефекту металокерамічних коронок 11, 12 зубів, кровоточивості ясен і неприємного запаху з рота. При зондуванні - незадовільне крайове прилягання коронок на опорних зубах. Яка тактика лікаря-стоматолога?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Зняти старі та виготовити нові мета-локерамічні коронки
В	<b>В.</b> Провести гінгівектомію ясен 11,12 зубів
С	<b>С.</b> Провести полоскання 3% розчином перманганату калію
Д	<b>Д.</b> Провести гінгівотомію ясен 11,12 зубів
Е	<b>Е.</b> Провести полоскання відваром ромашки
№	32. крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 47-ми років скаржиться на часте випадання пломби з верхнього переднього зуба, естетичний дефект. Об'єктивно: у 21 зубі порожнина IV класу за Блеком. Ріжучий край широкий. На Ro-грамі зміни в періапикальних тканинах відсутні. Виберіть найбільш доцільний метод лікування:
Правильна відповідь	<b>А.</b> Вкладка керамічна
В	<b>В.</b> Коронка металокерамічна

С	С. Вінір
D	D. Коронка пластмасова
E	E. Коронка за Белкіним
№	33. . крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 21-го року скаржиться на естетичний дефект 22 зуба. Об'єктивно: 22 зуб змінений в кольорі після ендодонтичного лікування із застосуванням резорцинформалінової пасти. Прикус ортогнатичний. Яку ортопедичну конструкцію на 22 зуб доцільно застосувати для даної хворої?
Правильна відповідь	A. Вінір
B	B. Штампована коронка
С	С. Пластмасова коронка
D	D. Комбінована коронка за Бородюком
E	E. Комбінована коронка за Белкіним
№	34. . крок 2013, 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 22-х років скаржиться на зміну кольору 11 зуба. Об'єктивно: 11 зуб має рожеве забарвлення, цілісність твердих тканин збережена, перкусія безболісна, слизова оболонка у ділянці зуба не змінена. На рентгенограмі: кореневий канал 11 зуба запломбований до верхівки, змін у періапикальних тканинах немає. Глибоке різцеве перекриття. Яка найбільш доцільна конструкція у даній клінічній ситуації?
Правильна відповідь	A. Фарфоровий вінір
B	B. Комбінована коронка за Белкіним
С	С. Металокерамічна коронка
D	D. Металопластмасова коронка
E	E. Пластмасова коронка
№	35. крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хворому призначено заміщення дефектів коронкової частини верхніх центральних різців металокерамічними коронками. Проведено препарування зубів з формуванням під'ясненого уступу. Якому відбитковому матеріалу варто віддати перевагу при отриманні робочих відбитків?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Силікон
B	<b>B.</b> Гіпс
C	<b>C.</b> Альгінатний
D	<b>D.</b> Дентафоль
E	<b>E.</b> Стенс
№	<b>36.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 48-ми років скаржиться на дефект твердих тканин зубів у фронтальній ділянці верхньої щелепи. Хворому виготовляють металокерамічні коронки на 11, 12 без проведення депульпації зубів. Який вид знеболення слід застосувати при препаруванні зубів?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Інтралігаментарне
B	<b>B.</b> Аудіоанальгезія
C	<b>C.</b> Аплікаційне
D	<b>D.</b> Загальне знеболення
E	<b>E.</b> Знеболення охолодженням
№	<b>37.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту проводиться примірка металевого каркасу металокерамічного мостоподібного протеза. Якою повинна бути мінімальна товщина металевого ковпачка із КХС при виготовленні опорної металокерамічної коронки?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 0,3 мм
B	<b>B.</b> 0,5 мм
C	<b>C.</b> 0,1 мм
D	<b>D.</b> 0,8 мм
E	<b>E.</b> 0,4 мм
№	<b>38.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>

Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 54-х років звернувся до лікаря-стоматолога з метою підготовки до протезування для видалення коренів 26, 27, 28 зубів. Який вибір місцевої анестезії?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Туберальна та піднебінна
B	<b>B.</b> Плексуальна та піднебінна
C	<b>C.</b> Інфільтраційна та піднебінна
D	<b>D.</b> Інфраорбітальна та піднебінна
E	<b>E.</b> Торусальна та піднебінна
№	<b>39.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Юнак 19-ти років скаржиться на відсутність зуба на верхній щелепі праворуч, естетичний дефект. Із анамнезу: зуб видалений у зв'язку з ускладненим карієсом. Об'єктивно: 13, 15 інтактні, стійкі, перкусія та пальпація безболісні. Апроксимальні поверхні 13 та 15 відносно паралельні. Ортогнатичне співвідношення щелеп. Яку конструкцію протеза доцільно використовувати в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Адгезивний мостоподібний протез
B	<b>B.</b> Консольний мостоподібний протез з опорою на 15
C	<b>C.</b> Металокерамічний протез з опорою на 13, 15
D	<b>D.</b> Суцільнолитий мостоподібний протез
E	<b>E.</b> Штамповано-паяний мостоподібний протез
№	<b>40.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 23-х років, вчитель, скаржиться на естетичний недолік у фронтальній ділянці верхньої щелепи. В анамнезі: відлам коронкової частини 11 внаслідок отриманої місяць тому травми. Об'єктивно: лінія перелому 11 на рівні ясеневого краю, корінь нерухомий, перкусія безболісна. На рентгенограмі - кореневий канал запломбований до верхівки кореня. Яку конструкцію доцільно запропонувати хворій?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Куксова штифтова вкладка з метало-керамічною коронкою
B	<b>B.</b> Штифтовий зуб за Річмондом чи Катцом
C	<b>C.</b> Комбінована коронка за Куриленко чи Бородюком
D	<b>D.</b> Фарфорова вкладка

Е	Е. Адгезивний мостоподібний протез із фотополімеру
№	41. крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 46-ти років скаржиться на часте випадіння пломби в зуби на нижній щелепі справа. Об'єктивно: в 16 на жувально-апроксимальній поверхні дефект твердих тканин коронкової частини на 1/3. Зуб в кольорі не змінений, перкусія безболісна. Яка конструкція протеза показана?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Вкладка
В	<b>В.</b> Напівкоронка
С	<b>С.</b> 3/4 коронка
Д	<b>Д.</b> Пластмасова коронка
Е	<b>Е.</b> Металокерамічна коронка
№	42. крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 40-ка років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: відсутні 35, 36, 45, 46 зуби. Глибоке різцеве перекриття. Планується заміщення дефектів зубного ряду нижньої щелепи штамповано-паяними мостоподібними протезами. Яку особливість повинні мати дані протези?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Жувальна поверхня коронок лита
В	<b>В.</b> Краї коронок охоплюють шийки зубів
С	<b>С.</b> Краї коронок не заходять під ясна
Д	<b>Д.</b> Проміжна частина звужена
Е	<b>Е.</b> Проміжна частина сідлоподібної форми
№	43. крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 27-ми років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: зуби інтактні, стійкі. Ортогнатичний прикус. Планується заміщення дефекту зубного ряду верхньої щелепі металопластмасовим мостоподібним протезом. Яку пластмасу слід використати для облицювання протеза?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Синма-М
В	<b>В.</b> Норакрил

С	С. Протакрил
D	D. Акрилоксид
Е	Е. Фторакс
№	44. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 24-х років звернулася зі скаргами на дефект твердих тканин 21 зуба. Об'єктивно: 21 зруйнований на 1/3 по ріжучому краю, змінений у кольорі. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований до верхівки. Прийняте рішення виготовити пластмасову коронку. Де має знаходитися край коронки по відношенню до ясеневого краю?
Правильна відповідь	<b>A.</b> На рівні ясни
B	<b>B.</b> Не доходить до ясни на 0,5 мм
С	<b>C.</b> Не доходить до ясни на 1,0 мм
D	<b>D.</b> Під ясною на 0,5 мм
Е	<b>E.</b> Під ясною на 1,0 мм
№	45. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 18-ти років планується виготовлення металопластикової коронки на 24 зуб. Проводиться вибір відбиткових матеріалів для отримання комбінованого відбитка з верхньої щелепи. Яким матеріалом краще отримати попередній відбиток?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Стенс
B	<b>B.</b> Дентофоль
С	<b>C.</b> Ортокор
D	<b>D.</b> Віск
Е	<b>E.</b> Протакрил
№	46. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому виготовляються паяні мостоподібні протези з нержавіючої сталі. В процесі виготовлення коронок проводиться калібровка гільз. Який з перерахованих апаратів використовується?

Правильна відповідь	<b>A.</b> Самсона
B	<b>B.</b> Паркера
C	<b>C.</b> Ларина
D	<b>D.</b> Копа
E	<b>E.</b> Бромштрома
№	<b>47.</b> крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтка 32-х років звернулася зі скаргами на естетичний дефект. Об'єктивно: коронки 12, 11 та 21, 22 зубів зруйновані каріозним процесом на 2/3 висоти. Прикус ортогнатичний. На рентгенограмі: канали зубів запломбовані до верхівок, патологічних змін в періапикальних тканинах немає. Яка конструкція раціональна у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Куксові вкладки та металокерамічні коронки
B	<b>B.</b> Штучні металеві штамповані коронки
C	<b>C.</b> Реставрація коронок зубів композитними матеріалами
D	<b>D.</b> Пластмасові вкладки
E	<b>E.</b> Штифтові коронки за Річмондом
№	<b>48.</b> крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 47-ми років звернувся до клініки зі скаргою на зміну кольору 11, 21 зубів. Об'єктивно: 11, 21 змінені в кольорі, канали пломбовано до верхівки. Було прийняте рішення про виготовлення металокерамічних коронок на 11, 21. Під яким оптимальним кутом слід проводити препаровку апроксимальних поверхонь опорних зубів?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 5 – 8°
B	<b>B.</b> 15 – 20°
C	<b>C.</b> 10 – 15°
D	<b>D.</b> 20 – 25°
E	<b>E.</b> 30 – 35°
№	<b>49.</b> крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>



Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	В кріслі у стоматолога-ортопеда знаходиться пацієнт з дефектом зубного ряду 14, 15, 16. Має відбутися обробка зубів під коронки. Як необхідно обробити наконечник перед препаруванням?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 3% р-ном хлораміну двічі через 15 хвилин
B	<b>B.</b> 3% р-ном перекису водню
C	<b>C.</b> 3% р-ном хлораміну 1 раз
D	<b>D.</b> Р-ном марганцевокислого калію
E	<b>E.</b> Р-ном фурациліну
№	<b>50.</b> крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	В процесі обстеження у хворого 25-ти років при змиканні зубних рядів виявлена максимальна кількість оклюзійних контактів зубів-антагоністів, при цьому рентгенологічно суглобова головка нижньої щелепи знаходиться біля основи схилю суглобового горбка. Який вид оклюзії спостерігається?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Центральна
B	<b>B.</b> Передня
C	<b>C.</b> Бокова права
D	<b>D.</b> Бокова ліва
E	<b>E.</b> Задня
№	<b>51.</b> . крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту 67-ми років після обстеження було встановлено діагноз: карієс цементу 35. На якому пломбувальному матеріалі слід зупинити свій вибір?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Склоіономірний цемент
B	<b>B.</b> Срібна амальгама
C	<b>C.</b> Композиційний матеріал хімічного твердіння
D	<b>D.</b> Силідонт
E	<b>E.</b> Силіцин
№	<b>52.</b> крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>

Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтка 32-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на естетичний дефект 14 і 25. Планується виготовити на ці зуби металокерамічні коронки. Який відбитковий матеріал необхідно застосувати при виготовленні цих коронок?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Силіконовий
B	<b>B.</b> Твердіючий
C	<b>C.</b> Віск
D	<b>D.</b> Альгінатні
E	<b>E.</b> Цинкоксиєвгенолові
№	<b>53.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У клініці ортопедичної стоматології хворій 26-ти років під час підготовки у 35 порожнини п'ятого класу під вкладку випадково розкрили пульпу. Що могло бути найімовірнішою причиною ускладнення?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Формування плоского дна
B	<b>B.</b> Створення дивергуючих стінок
C	<b>C.</b> Створення конвергуючих стінок
D	<b>D.</b> Створення фальца
E	<b>E.</b> Відсутність додаткової порожнини
№	<b>54.</b> . крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 32-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищенні зубів. Із анамнезу з'ясовано, що хворій 2 тижні тому виготовлена металева штампована коронка. Об'єктивно: на 27 металева штампована коронка, що заходить під ясеневий край на 1-1,5 мм, при доторкуванні кровоточить. Перкусія трохи болісна. Яка тактика лікаря у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Зняти коронку і виготовити нову
B	<b>B.</b> Провести полоскання Ротоканом
C	<b>C.</b> Розкрити коронку через жувальну поверхню
D	<b>D.</b> Дати можливість хворій звикнути до протезу
E	<b>E.</b> Зняти коронку і провести лікування крайового пародонту

№	<b>55.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 25-ти років звернувся зі скаргами на косметичний дефект верхньої щелепи у фронтальному відділі ліворуч. Об'єктивно: 23 депульпований. Пломба відновлює вестибулярно-апроксимальну поверхню коронки на 1/3, щільно прилягає до стінок порожнини, стійка, не відповідає кольору зуба, зуб змінений в кольорі, перкусія безболісна. Яка оптимальна конструкція показана хворому?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Металокерамічна коронка
В	<b>В.</b> Пластмасова коронка
С	<b>С.</b> Металева штампована коронка
Д	<b>Д.</b> Напівкоронка
Е	<b>Е.</b> Вкладка
№	<b>56.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 28-ми років звернувся до клініки з метою протезування. Об'єктивно: коронка 13 зруйнована на 2/3 висоти, кукаса виступає над рівнем ясни на 2 мм. На рентгенограмі кореневий канал запломбований до верхівки. Яку конструкцію доцільно виготовити хворому?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Штифтовий зуб
В	<b>В.</b> Коронку
С	<b>С.</b> Вкладку
Д	<b>Д.</b> Екваторну коронку
Е	<b>Е.</b> Відновити фотополімером
№	<b>57.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 18-ти років звернулася з приводу протезування зубів. Об'єктивно: 21 зуб має темно-сірий колір, депульпований. Ортогнатичний прикус. Планується покриття зуба пластмасовою коронкою. Виберіть пластмасу для виготовлення даної коронки:
Правильна відповідь	<b>А.</b> Синма
В	<b>В.</b> Етакрил

С	С. Акрел
D	D. Фторакс
Е	Е. Бакрил
№	58. . крок 2009, 2008, 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворому 35-ти років виготовляється металева вкладка на 37. Об'єктивно: на жувальній поверхні 37 каріозна порожнина. Яка особливість препарування?
Правильна відповідь	A. Створення фальца
B	B. Створення допоміжного уступу
С	С. Розширення дна порожнини
D	D. Створення плаского дна
Е	Е. Створення допоміжної порожнини
№	59. крок 2009, 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Пацієнт звернувся через місяць після цементування металокерамічної коронки на 23 зуб зі скаргами на її розцементування. Об'єктивно: кукса зуба достатньої висоти, стінки кукси конвергують до вертикальної осі зуба під кутом приблизно 30 градусів. Під яким кутом треба було створити конвергенцію стінок кукси зуба по відношенню до осі зуба?
Правильна відповідь	A. До 8 градусів
B	B. 12-15 градусів
С	С. 15-18 градусів
D	D. 22-25 градусів
Е	Е. 10-12 градусів
№	60. крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий скаржиться на косметичний дефект 23. Об'єктивно: коронкова частина 23 зруйнована на 80%, корінь стійкий, канал запломбовано до верхівки. Після обстеження прийняте рішення про відновлення зруйнованого зуба литою куксово-кореневою вкладкою. На яку оптимальну глибину слід розширити канал 23?

Правильна відповідь	<b>A.</b> На 2/3 довжини каналу
B	<b>B.</b> На 1/2 довжини каналу
C	<b>C.</b> На 1/3 довжини каналу
D	<b>D.</b> На 1/4 довжини каналу
E	<b>E.</b> На всю довжину каналу
№	<b>61.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 28-ми років скаржиться на косметичний дефект у фронтальній ділянці верхньої щелепи. Об'єктивно: коронкова частина 11 зруйнована нижче рівня ясен. Корінь стійкий, перкусія безболісна. Планується протезування куксовою вкладкою з подальшим покриттям її металокерамічною коронкою. Який додатковий метод діагностики треба використати в цій клінічній ситуації?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Рентгенодіагностика
B	<b>B.</b> Електроміографія
C	<b>C.</b> Мастикаціографія
D	<b>D.</b> Гнатодинамометрія
E	<b>E.</b> Електроодонтодіагностика
№	<b>62.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 29-ти років скаржиться на відлам коронки 26 зуба. Об'єктивно: індекс руйнування зуба (ІРОПЗ) становить 0,9, тканини кореня тверді, за даними рентгенографії канал запломбовано до верхівки, хронічних запальних процесів періодонту не виявлено. Яка із перелічених конструкцій доцільніша для протезування 26 зуба?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Штифтова куксова вкладка і коронка
B	<b>B.</b> Штифтовий зуб з кільцем
C	<b>C.</b> Штифтовий зуб з вкладкою
D	<b>D.</b> Штифтовий зуб із захисною пластинкою
E	<b>E.</b> Спрощений штифтовий зуб
№	<b>63.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>

Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 54-х років скаржить на стирання 35, 36 зубів, біль від термічних і хімічних подразників. Об'єктивно: коронки 35, 36 зубів стерті на 1/3 висоти за горизонтальним типом, 24, 25, 26 зуби вкриті суцільнолитими коронками. Які коронки доцільно виготовити на 35 і 36 зуби?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Суцільнолиті
B	<b>B.</b> Комбіновані за Белкіним
C	<b>C.</b> Металічні штамповані
D	<b>D.</b> Пластмасові
E	<b>E.</b> Металокерамічні
№	<b>64.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 43-х років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: коронка 37 зуба зруйнована на 2/3, щічна і язикова стінки тонкі. На оклюзіограмі щільний контакт з антагоністами. На яку товщину необхідно зішліфувати жувальну поверхню даного зуба при препаруванні під металеву штамповану коронку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 0,28-0,3 мм
B	<b>B.</b> 0,1-0,2 мм
C	<b>C.</b> 0,5-0,6 мм
D	<b>D.</b> 0,6-0,7 мм
E	<b>E.</b> 0,7-0,8 мм
№	<b>65.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому планується виготовлення металокерамічної коронки з опорою на куксову вкладку 23 зуба. Об'єктивно: коронка 23 зуба зруйнована до ясеневого краю. Кореневий канал запломбований до верхівки. Лікар виготовив воскову композицію кукси з штифтом, відлив з металу, припасував в зубі, зафіксував вісфат-цементом, отримав робочий відбиток гіпсом. На якому етапі допущена помилка?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Отримання відбитку
B	<b>B.</b> Виготовлення воскової конструкції
C	<b>C.</b> Виготовлення литва
D	<b>D.</b> Припасовка кукси

Е	Е. Фіксація кукси
№	66. крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 57-ми років скаржиться на рухливість металокерамічного мостовидного протезу з опорою на 33, 37. Користується протезом 9 місяців. Об'єктивно: на рентгенограмі відмічається атрофія альвеолярного паростка в ділянці 33 на 2/3 і 37 на 1/2 довжини кореня, патологічні кишени, гінгівіт. Яка причина патологічної рухомості опорних зубів?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Функціональне перевантаження опорних зубів
В	<b>В.</b> Травмування кругової зв'язки краями коронок
С	<b>С.</b> Депульпування опорних зубів
Д	<b>Д.</b> Масивне зішліфування твердих тканин
Е	<b>Е.</b> Моделювання гірлянди в пришийковій ділянці
№	67. крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У пацієнта 24-х років відламалася штучна коронка 22 зуба, який 8 років тому був депульпованим і коронкова частина повністю зруйнована. Який мікропротез необхідно виготовити для відновлення коронкової частини 22 зуба?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Куксово-коренева вкладка
В	<b>В.</b> Пломба
С	<b>С.</b> Вкладка
Д	<b>Д.</b> Накладка
Е	<b>Е.</b> Штампована коронка
№	68. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 28-ми років скаржиться на незручність під час вживання їжі. В анамнезі 24 зруйнувався внаслідок ускладнень карієсу. Об'єктивно: ІРОПЗ = 0,9, стінки кукси щільні, перкусія безболісна. На рентгенограмі: кореневі канали запломбовані до верхівок, корінь рівний, змін в періапикальних тканинах немає. Яку ортопедичну конструкцію слід обрати?

Правильна відповідь	<b>A.</b> Штифтова
B	<b>B.</b> Штучна коронка
C	<b>C.</b> Вкладка
D	<b>D.</b> Напівкоронка
E	<b>E.</b> Вінір
№	<b>69.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 45-ти років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: коронка 26 зуба частково зруйнована. ШОПЗ складає 0,9. Який із зазначених зубних протезів доцільно застосувати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Штифтова конструкція
B	<b>B.</b> Пластмасова коронка
C	<b>C.</b> Металопластмасова коронка
D	<b>D.</b> Металокерамічна коронка
E	<b>E.</b> Штампована коронка
№	<b>70.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на зміну кольору 13 зуба, естетичний недолік. В анамнезі лікування даного зуба з приводу ускладнення карієсу, алергія до пластмаси. Об'єктивно: 13 зуб має темно-сірий колір, дефект відновлений пломбою. На рентгенограмі канал кореня запломбований до верхівки. Прямий прикус. Яка з перелічених штучних коронок показана цій хворій?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Металокерамічна
B	<b>B.</b> Пластмасова
C	<b>C.</b> Металопластмасова
D	<b>D.</b> Штампована
E	<b>E.</b> Лита
№	<b>71.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>



Текст завдання	Хворому виготовляється металокерамічний мостоподібний протез на 47 45 зуби. Одонтопрепарування зроблено з уступом. Який з перерахованих матеріалів дозволить отримати якісний відбиток?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Сіеласт-05
B	<b>B.</b> Стомальгін
C	<b>C.</b> Ортокор
D	<b>D.</b> Репін
E	<b>E.</b> Дентафоль
№	<b>72.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий скаржиться на біль в 25, який з'явився на другий день після фіксації штучної коронки. Об'єктивно: перкусія 25 болісна, краї металокерамічної коронки на рівні ясеневого краю. На оклюзіограмі передчасний контакт на 25 зубі. Яка найбільш вірогідна причина болю?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Супраоклюзія
B	<b>B.</b> Ускладнений карієс
C	<b>C.</b> Невралгія трійчастого нерва
D	<b>D.</b> Вживання твердої їжі
E	<b>E.</b> Пульпіт
№	<b>73.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 43-х років скаржиться на відсутність коронки зуба у фронтальній ділянці верхньої щелепи. Об'єктивно: коронка 21 повністю зруйнована, корінь стійкий, не доходить до рівня ясен на 0,5 мм, перкусія безболісна. На рентгенограмі - кореневий канал запломбований до верхівки кореня. Яку конструкцію доцільно запропонувати пацієнту?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Коронка з виготовленням штучної кукси
B	<b>B.</b> Штифтовий зуб за Річмондом
C	<b>C.</b> Штифтовий зуб за Ахмедовим
D	<b>D.</b> Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян
E	<b>E.</b> Фарфорова коронка зі штифтом (за Логаном)
№	<b>74.</b> крок 2007

ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 48-ми років звернувся зі скаргами на біль при накушуванні в ділянці 25, який з'явився через місяць після покриття його коронкою. В анамнезі - лікування зуба з приводу карієсу. Об'єктивно: 25 вкритий повністю металевою коронкою, перкусія болісна. На оклюзіограмі - передчасний контакт з антагоністами. Яка найбільш вірогідна причина виникнення болю?
Правильна відповідь	<b>А. Передчасний оклюзійний контакт</b>
В	<b>В. Ускладнення карієсу</b>
С	<b>С. Невралгія трійчастого нерва</b>
D	<b>D. Розцементування коронки</b>
Е	<b>Е. Вживання твердої їжі</b>
№	<b>75. крок 2008</b>
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 23-х років звернулася для відновлення коронки 11 зуба. Об'єктивно: корінь 11 зуба на рівні ясенного краю, стінки достатньої товщини. Лікар виготовив і припасував куксову вкладку, на яку буде зроблена металопластмасова коронка. Яка з перерахованих пластмас буде використана для обличкування?
Правильна відповідь	<b>А. Синма-М</b>
В	<b>В. Акрилоксид</b>
С	<b>С. Карбодент</b>
D	<b>D. Норакрил</b>
Е	<b>Е. Протакрил</b>
№	<b>76. крок 2016, 2014, 2010, 2008</b>
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	При об'єктивному обстеженні хворого 32х років визначається дефект твердих тканин 24 зуба. ІРОПЗ=0,8. Дефект частково відновлений пломбою, яка не відповідає вимогам. Зуб має рожеве забарвлення. На рентгенограмі не виявляється патологічних процесів. Яка конструкція показана в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>А. Штифтова конструкція</b>
В	<b>В. Штучна коронка</b>
С	<b>С. Вкладка</b>

D	<b>D.</b> Напівкоронка
E	<b>E.</b> Екваторна коронка
№	<b>77.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 40ка років звернувся зі скаргами на косметичний дефект коронки зуба зліва на нижній щелепі. Об'єктивно: дефект коронкової частини 33 зуба за індексом ІРОПЗ становить 0,8 На рентгенограмі канал запломбований, періодонтальні тканини в нормі. Вирішено виготовити куксову вкладку з наступним протезуванням. Якою має бути довжина штифта литої вкладки?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 2/3 довжини кореня
B	<b>B.</b> На всю довжину кореня
C	<b>C.</b> 1/2 довжини кореня
D	<b>D.</b> 1/3 довжини кореня
E	<b>E.</b> 1/4 довжини кореня
№	<b>78.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 37-ми років звернулася зі скаргою на естетичний дефект. Об'єктивно: 13 зруйнований на 2/3, депульпований, кореневий канал запломбований. На яку глибину необхідно розкрити кореневий канал під штифтовий зуб у даної хворої?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 2/3 кореневого каналу
B	<b>B.</b> 3/4 кореневого каналу
C	<b>C.</b> 1/3 кореневого каналу
D	<b>D.</b> 1/2 кореневого каналу
E	<b>E.</b> На всю довжину каналу
№	<b>79.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 58ми років проведена операція по укоріненню внутрішньокісткових частин гвинтоподібних імплантантів на нижню щелепу за двофазною методикою. По закінченню скількох місяців йому необхідно поєднати кореневу частину імплантанта з головою?

Правильна відповідь	<b>A.</b> 36
B	<b>B.</b> 910
C	<b>C.</b> 57
D	<b>D.</b> 12
E	<b>E.</b> 78
№	<b>80.</b> крок 2016, 2015, 2012, 2011, 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 62-х років серединний перелом нижньої щелепи з утворенням суглоба. Об'єктивно: зубна формула 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухомість відламків незначна, зміщення немає. Застосування якого протеза є найбільш доцільним?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Мостоподібний без шарніра
B	<b>B.</b> Пластинковий без шарніра
C	<b>C.</b> Пластинковий з шарніром Гаврилова
D	<b>D.</b> Пластинковий з шарніром Оксмана
E	<b>E.</b> Пластинковий з шарніром Вайнштейна
№	<b>81.</b> крок 2016, 2015, 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворій 53-х років планується резекція лівої половини нижньої щелепи разом з її гілкою. Показане виготовлення щелепного безпосереднього протезу за Оксманом. Який елемент протезу слугує для утримання фрагменту нижньої щелепи від зміщення у бік дефекту?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Знімна або незнімна похила площина
B	<b>B.</b> Фіксуюча частина у цілому
C	<b>C.</b> Багатокламерна система
D	<b>D.</b> Резекційна частина
E	<b>E.</b> Штучні зуби
№	<b>82.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>

Текст завдання	Пацієнт 45-ти років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: коронка 26 зуба частково зруйнована. ШОПЗ складає 0,9. Який із зазначених зубних протезів доцільно застосувати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Штифтова конструкція
B	<b>B.</b> Пластмасова коронка
C	<b>C.</b> Металопластмасова коронка
D	<b>D.</b> Металокерамічна коронка
E	<b>E.</b> Штампована коронка
№	<b>83.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА</b>
Текст завдання	У хворого 43-х років виявлено відсутність коронкової частини 13 зуба. Корінь виступає над рівнем ясен на 0,5-1 мм по периметру. Апікальна частина запломбована. З анамнезу: коронкова частина 13 зуба відламалась 3 тижні тому. До того зуб лікувався з приводу хронічного періодонтиту. Перкусія безболісна. Краї кореня тверді, слизова оболонка блідо-рожевого кольору, волога. Які дії лікаря?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Виготовити коронково-кореневу
B	вкладку і металокерамічну коронку
C	<b>B.</b> Видалити корінь зуба
D	<b>C.</b> Виготовити простий штифтовий зуб
E	<b>D.</b> Відреставрувати зуб за допомогою анкера та фотополімерного матеріалу
	<b>E.</b> Виготовити штифтовий зуб за Річмондом
№	<b>84.</b> крок 2010, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому проводиться ортопедичне лікування включених дефектів зубного ряду верхньої щелепи незнімними суцільнолитими зубними протезами. Під час другого візиту необхідно перевірити відповідність внутрішньої поверхні металевого каркасу майбутнього металокерамічного мостоподібного протеза поверхні препарованих зубів. Яким чином це можна здійснити?
Правильна відповідь	<b>A.</b> У порожнині рота за допомогою силіконових матеріалів
B	<b>B.</b> Візуально на моделях в артикуляторі
C	<b>C.</b> У порожнині рота за допомогою копіювального паперу
D	<b>D.</b> У порожнині рота за допомогою пластинки воску

Е	Е. У порожнині рота стоматоскопічним методом
№	85. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому виготовляються паяні мостоподібні протези з нержавіючої сталі. В процесі виготовлення коронок проводиться калібровка гільз. Який з перерахованих апаратів використовується?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Самсона
В	<b>В.</b> Паркера
С	<b>С.</b> Ларина
Д	<b>Д.</b> Копа
Е	<b>Е.</b> Бромштрома
№	86. крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому в клініці виготовили металокерамічну коронку на 21 зуб. Препаровку проводили під'ясенну. На якому етапі виготовлення проводили ретракцію?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Перед препаруванням та зняттям відбитку
В	<b>В.</b> Після припасування каркасу
С	<b>С.</b> Перед фіксацією
Д	<b>Д.</b> Після зняття відбитку
Е	<b>Е.</b> Перед припасуванням каркасу
№	1. крок 2016, 2013, 2012, 2011
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Лікар стоматолог-ортопед на щоденному прийомі під час огляду і проведення ортопедичних маніпуляцій користується стоматологічним дзеркалом. Яким чином проводять стерилізацію стоматологічних дзеркал?
Правильна відповідь	<b>А.</b> У потрібному розчині 30 хвилин
В	<b>В.</b> У 0,5% розчині сульфохлоретилу 20 хвилин
С	<b>С.</b> У 6% розчині перекису водню щоденного приготування, 6 годин
Д	<b>Д.</b> У сухожаровій шафі при температурі 180° С , 10 хвилин
Е	<b>Е.</b> У 0,01% розчині хлораміну 10 хвилин

№	<b>2.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	У стоматологічній поліклініці організується ортопедичне відділення на 3 стоматологічних крісла. Яку щонайменшу площу (у м <sup>2</sup> ) повинно мати відведене для нього приміщення?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 28
B	<b>B.</b> 21
C	<b>C.</b> 35
D	<b>D.</b> 36
E	<b>E.</b> 42
№	<b>3.</b> крок 2016, 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 58-ми років проведена операція по заглибленню внутрішньокісткових частин гвинтоподібних імплантатів на нижню щелепу за двофазною методикою. Через скільки місяців йому необхідно з'єднати кореневу частину імплантату з голівкою?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 34
B	<b>B.</b> 56
C	<b>C.</b> 910
D	<b>D.</b> 12
E	<b>E.</b> 78
№	<b>4.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 67ми років скаржився на біль у ділянці СНЩС, кровотечу з порожнини рота, порушення акту жування. В анамнезі побутова травма нижньої щелепи. Об'єктивно: зубний ряд на верхній щелепі збережений. Нижня щелепа беззуба, визначається серединний перелом. Яка конструкція найбільш раціональна у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Зубонад'ясенна шина Ванкевич
B	<b>B.</b> Над'ясенна шина Порта
C	<b>C.</b> Над'ясенна шина Гунінга
D	<b>D.</b> Зубоясенна шина Вебера

Е	Е. Стандартний комплект Збаржа
№	5. крок 2016, 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 73х років звернулась в клініку з приводу протезування. Об'єктивно: на верхній щелепі поодинокий 13 зуб II ступеня рухомості, на нижній щелепі поодинокий 31 зуб I ступеня рухомості. Як підготувати пацієнтку до протезування?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Видалити 13 зуб
В	<b>В.</b> Видалити 31 зуб
С	<b>С.</b> Видалити обидва зуба
D	<b>D.</b> Зберегти обидва зуба
Е	<b>Е.</b> Депульпувати зуби
№	6. крок 2016, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 29ти років хворіє на генералізований пародонтит. Планується виготовлення шини Альбрехта. Верхній зубний ряд інтактний, зуби віялоподібно нахилені вестибулярно, мають рухомість 12 ступеню за Ентіним. При незначному тиску позиціонуються в зубному ряду з відновленням апроксимальних контактів. Який вид тимчасового шинування необхідно провести у даної хворої для отримання робочих відбитків?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Склеювання апроксимальних контактів композитом
В	<b>В.</b> Склеювання контактних поверхонь полікарбоксилатним цементом
С	<b>С.</b> Зв'язуванням зубів поліамідною ниткою
D	<b>D.</b> Тимчасове шинування лігатурним дротом
Е	<b>Е.</b> Склеювання зубів липким воском
№	7. крок 2016, 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>



Текст завдання	Чоловік 36ти років звернувся зі скаргами на ниючі болі у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), що посилюються під час прийому твердої їжі, які з'явилися близько 2 років тому. Об'єктивно: відкривання рота обмежене незначно, при відкриванні щелепа зміщується у бік, наявний хрускіт у СНЩС. У порожнині рота відсутні моляри на нижній і верхній щелепах. На рентгенограмі визначається склероз кортикальної пластинки і деформація суглобової голівки, звуження суглобової щілини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Артрозоартрит СНЩС
B	<b>B.</b> Хронічний артрит СНЩС
C	<b>C.</b> Гострий артрит СНЩС
D	<b>D.</b> Больова дисфункція СНЩС
E	<b>E.</b> Загострення хронічного артрити СНЩС
№	<b>8.</b> крок 2016, 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 28-ми років скаржиться на гострий постійний біль у правій привушній ділянці, припухлість тканин; біль при відкриванні рота посилюється. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку попереду козелка вуха. Шкіра над СНЩС гіперемована. При відкриванні рота нижня щелепа зміщується в правий бік. При надавлюванні на підборіддя біль у правому суглобі посилюється. Для якого захворювання СНЩС дана клінічна картина характерна?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гострий артрит
B	<b>B.</b> Хронічний артрит
C	<b>C.</b> Больова дисфункція
D	<b>D.</b> Анкілоз
E	<b>E.</b> Артроз
№	<b>9.</b> крок 2016, 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 50ти років звернувся зі скаргами на біль у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) при відкриванні рота. Зубна формула: 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. При відкриванні рота нижня щелепа зміщується зигзагоподібно в бік хворого суглоба. Для якого патологічного стану ці симптоми найбільш характерні?

Правильна відповідь	<b>A.</b> М'язовосуглобова дисфункція
B	<b>B.</b> Звичний вивих СНЩС
C	<b>C.</b> Склерозуючий артроз СНЩС
D	<b>D.</b> Хронічний артрит СНЩС
E	<b>E.</b> Деформуючий артроз СНЩС
№	<b>10.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<u><b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b></u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 67-ми років виготовляються повні знімні протези верхню та нижню щелепи. На етапі перевірки постановки зубів у пацієнта спостерігається зміщення міжрізцевої лінії вправо. В ділянці бічних зубів правого боку спостерігається контакт між щічними горбиками зубів верхньої та нижньої щелепи. В ділянці бічних зубів з лівої сторони спостерігається контакт піднебінних горбків верхніх зубів з щічними горбками нижніх зубів. Причиною даної ситуації стала фіксація:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Правої бічної оклюзії
B	<b>B.</b> Лівої бічної оклюзії
C	<b>C.</b> Задньої оклюзії
D	<b>D.</b> Передньої оклюзії
E	<b>E.</b>
№	<b>11.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<u><b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b></u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 45-ти років звернувся у клініку ортопедичної стоматології у зв'язку з неможливістю закрити рот. Під час проведення комп'ютерної томографії не виявлено контакту між суглобовими поверхнями СНЩС. Який діагноз можна поставити?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Повний вивих суглобової головки
B	<b>B.</b> Підвивих суглобової головки
C	<b>C.</b> Деформуючий артроз
D	<b>D.</b> Хронічний артрит
E	<b>E.</b> Анкілоз
№	<b>12.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<u><b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b></u>

Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 70-ти років звернувся зі скаргами на клацання у скроневопідщелепних суглобах. Користується частковими знімними протезами впродовж бти років. Об'єктивно: нижня третина лиця вкорочена, відзначається значна стертість штучних зубів у протезах. Збережені природні зуби не мають антагонуючих пар. На рентгенограмі деструктивні зміни у скроневопідщелепних суглобах. Яка причина даного ускладнення?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Зниження міжальвеолярної висоти
В	<b>В.</b> Часткова відсутність зубів
С	<b>С.</b> Вік хворого
Д	<b>Д.</b> Тривале користування частковими знімними протезами
Е	<b>Е.</b> Артрит СНЩС
№	<b>13.</b> крок 2015, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	До клініки звернулася жінка 52-х років зі скаргою на рухливість зубів. Об'єктивно: зубні ряди верхньої і нижньої щелеп безперервні. 42,41,31,32 зуби мають рухливість 1 ступеня, атрофія стінок альвеол на 1/3 довжини кореня. У ділянці бічних жувальних зубів виявлена патологічна стиранистість 1 ступеня, зуби стійкі. Прикус ортогнатичний. Який вид стабілізації 42,41,31,32 зубів слід застосувати у даній клінічній ситуації?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Фронтальна
В	<b>В.</b> По дузі
С	<b>С.</b> Сагітальна
Д	<b>Д.</b> Парасагітальна
Е	<b>Е.</b> Фронтосагітальна
№	<b>14.</b> крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 25-ти років скаржитися на утруднене вживання їжі у зв'язку з відсутністю зубів на нижній щелепі зліва. Об'єктивно: незначне збільшення альвеолярного відростка в ділянці 24, 25 зубів, які знаходяться в положенні інфраоклюзії (на 1/3 висоти коронок зубів). Зменшена відстань між оклюзійною поверхнею 24, 25 і альвеолярним гребенем відсутніх зубів нижньої щелепи. На нижній щелепі 34, 35 видалені. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Дефект зубного ряду нижньої щелепи 3 клас за Кенеді, ускладнений феноменом Попова-Годона

<b>B</b>	<b>B.</b> Часткова вторинна адентія, ускладнена травматичним синдромом
<b>C</b>	<b>C.</b> Дефект зубного ряду нижньої щелепи 3 клас за Кенеді
<b>D</b>	<b>D.</b> Часткова вторинна адентія, знижений прикус
<b>E</b>	<b>E.</b> Генералізована патологічна стертість зубів верхньої щелепи
<b>№</b>	<b>15.</b> крок 2015
<b>ДИСЦИПЛІНА</b>	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
<b>Тема</b>	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
<b>Текст завдання</b>	Хвора 47-ми років скаржиться на рухливість передніх зубів. Об'єктивно: 31, 32, 33, 43, 42, 41 зуби депульповані. Мають рухливість I-II ступеня. Імобілізацію рухливих зубів планується провести шиною Мамлока. Яку стабілізацію дозволить провести дана шина?
<b>Правильна відповідь</b>	<b>A.</b> Фронтальна
<b>B</b>	<b>B.</b> Сагітальна
<b>C</b>	<b>C.</b> Кругова
<b>D</b>	<b>D.</b> Фронтально-сагітальна
<b>E</b>	<b>E.</b> Парасагітальна
<b>№</b>	<b>16.</b> крок 2015, 2012, 2010
<b>ДИСЦИПЛІНА</b>	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
<b>Тема</b>	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
<b>Текст завдання</b>	Хворий 25-ти років має двобічний перелом нижньої щелепи. Фрагмент у ділянці 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 зміщений донизу і назад. Який апарат необхідно застосувати для репозиції відламку?
<b>Правильна відповідь</b>	<b>A.</b> Поста
<b>B</b>	<b>B.</b> Однощелепна капова шина
<b>C</b>	<b>C.</b> З важелями за Курляндським
<b>D</b>	<b>D.</b> Вебера
<b>E</b>	<b>E.</b> Шура
<b>№</b>	<b>17.</b> крок 2015, 2014, 2013
<b>ДИСЦИПЛІНА</b>	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
<b>Тема</b>	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хвора 30-ти років скаржиться на обмежене відкривання рота. В анамнезі травма, яка була отримана при стиснутих щелепах. Відкривання рота обмежено до 1,5 см, прикус не порушений, при відкриванні рота нижня щелепа зміщується вліво. Пальпаторно визначається біль у ділянці лівого скронево-нижньощелепного суглоба. Рентгенологічно цілісність кістки збережена. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гострий травматичний артрит лівого СНЩС
B	<b>B.</b> Перелом суглобового відростку нижньої щелепи зліва
C	<b>C.</b> Гострий однобічний вивих СНЩС
D	<b>D.</b> Забій лівого СНЩС
E	<b>E.</b> Перелом дуги виличної кістки зліва зі зміщенням відламків
№	<b>18.</b> крок 2015, 2014, 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 48-ми років після односторонньої резекції верхньої щелепи виготовляється резекційний протез. Об'єктивно: 21, 22, 23, 24, 25, 26 зуби стійкі, тверде піднебіння широке, пласке. Яке з'єднання кламерів з базисом зменшить перекидання резекційного протезу?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Суглобове
B	<b>B.</b> Стабільне
C	<b>C.</b> Пружне
D	<b>D.</b> Жорстке
E	<b>E.</b> Не має принципового значення
№	<b>19.</b> крок 2015, 2011, 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 58-ми років діагностовано перелом нижньої щелепи з виникненням несправжнього суглоба. Об'єктивно: відсутні 38, 36, 32, 41, 43, 48. Збережені зуби інтактні, стійкі. Зміщення відламків нижньої щелепи не спостерігається. На рентгенограмі дефект кісткової тканини до 2 см. Яка конструкція протезу показана в даній ситуації?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом
B	<b>B.</b> Протез з шарніром за Оксманом з односуглобним зчленуванням
C	<b>C.</b> Протез з шарніром за Гавриловим
D	<b>D.</b> Протез з кульково-амортизаційним кламером за Курляндським

Е	<b>Е. Протез з шарніром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням</b>
№	<b>20.</b> крок 2015, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 49-ти років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: відсутні 24, 25 зуби, незначне зубоальвеолярне подовження в ділянці 34, 35 зубів. Який із перелічених методів вирівнювання оклюзійної поверхні слід застосувати?
Правильна відповідь	<b>А. Вкорочення зубів</b>
В	<b>В. Підвищення міжальвеолярної висоти</b>
С	<b>С. Ортодонтичний</b>
Д	<b>Д. Апаратурно-хірургічний</b>
Е	<b>Е. Видалення зубів</b>
№	<b>21.</b> крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту 41-го року з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба призначена центруюча лікувально-діагностична капа, що роз'єднує прикус на 3 мм. Зникнення патологічних симптомів розпочалося на 3 добу лікування. Користування тимчасовим протезом пацієнту необхідно призначити на термін, не менший:
Правильна відповідь	<b>А. 3 місяців</b>
В	<b>В. 6 днів</b>
С	<b>С. 12 днів</b>
Д	<b>Д. 2-3 тижнів</b>
Е	<b>Е. 3 років</b>
№	<b>22.</b> крок 2015, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 34-х років зі скаргами на біль, хрускіт в кінцевій фазі відкривання рота. В анамнезі "вивих ". Амплітуда максимального відкривання рота - 58 мм. До якої величини слід обмежити відкривання рота?
Правильна відповідь	<b>А. До 40-50 мм</b>
В	<b>В. До 25-30 мм</b>

С	С. До 50-60 мм
D	D. До 10-15 мм
Е	Е. До 90-100 мм
№	23. крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора скаржиться на обмежене відкривання рота. З анамнезу відомо про наявність внутрішньосуглобових розладів у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Рентгенологічне дослідження: сплющення передньоверхньої поверхні лівої суглобової голівки, наявність екзофіта в її передньому відділі та зміна форми даної ділянки. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	<b>A. Деформуючий артроз</b>
В	<b>B. Склерозуючий артроз</b>
С	<b>C. Гострий артрит</b>
D	<b>D. Кістковий анкілоз</b>
Е	<b>E. Фіброзний анкілоз</b>
№	24. крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на неможливість відкушування їжі внаслідок рухомості і болю у передніх зубах нижньої щелепи. Об'єктивно: 41, 42, 31, 32 мають рухомість III ступеня. Планується видалення рухомих зубів і формування альвеолярного відростку безпосереднім протезом. Через який термін після видалення слід накласти безпосередній протез?
Правильна відповідь	<b>A. В день видалення зубів</b>
В	<b>B. На 6-7 день після видалення</b>
С	<b>C. Через 10 днів після видалення</b>
D	<b>D. На 3-4 день після видалення</b>
Е	<b>E. На 15-й день після видалення</b>
№	25. крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хвора 54-х років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на помірно виражені болі у ділянці козелка вуха зліва, які виникають після переохолодження або тривалої розмови, хрускіт у скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС). Хворіє близько 10 місяців. Об'єктивно: обличчя симетричне. Шкірні покриви у кольорі не змінені. Відкривання рота не обмежене. На рентгенограмі лівого СНЩС визначаються ділянки звуження суглобової щілини, вогнища остеопорузу і деструкції суглобової голівки і суглобової ямки. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Хронічний артрит лівого СНЩС
B	B. Гострий післятравматичний артрит лівого СНЩС
C	C. Артроз СНЩС зліва
D	<b>D.</b> Невралгія трійчастого нерва зліва
E	E. Больова дисфункція СНЩС
№	<b>26.</b> крок 2015, 2012, 2011, 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 52-х років скаржиться на рухливість зубів, кровоточивість ясен. 44, 45, 34, 35 мають I ступінь рухливості, 43, 42, 41, 31, 32, 33 - II ступінь, набряк ясен, наявність пародонтальних кишень 5-6 мм. На рентгенограмі: деструкція кісткової тканини на 1/2 довжини коренів зубів. Діагноз: генералізований пародонтит середнього ступеня важкості. Яка ортопедична конструкція найбільш раціональна у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Шина Ельбрехта
B	B. Пластмасова капа
C	C. Шина за Мареем
D	<b>D.</b> Шина Мамлока
E	E. Виготовлення тимчасової шини за Навотним
№	<b>27.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтка 55-ти років скаржиться на болі та лускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі. Об'єктивно: обличчя симетричне, пальпація латеральних крилоподібних м'язів болісна зліва. Відкривання рота обмежене. На томограмах кісткові контури суглобових поверхонь гладенькі. Якому з вказаних захворювань відповідає даний клінічний статус?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба
B	<b>B.</b> Ревматичний артрит



С	С. еформующий артроз
D	D. Гострий післятравматичний артрит
Е	Е. Анкілоз суглоба
№	28. крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 56-ти років звернулася з метою протезування. Три місяці тому лікувалася з приводу перелому тіла нижньої щелепи зліва. Відсутні: 18, 27, 28, 38, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 зуби. Прикус перехресний лівобічний зі змиканням зубів бічними поверхнями. Який метод лікування найбільш ефективний?
Правильна відповідь	A. Знімний протез із подвійним зубним рядом
B	B. Пришліфовування з наступним протезуванням
С	С. Ортодонтичне лікування
D	D. Незнімний протез на імплантатах
Е	Е. Знімний протез із кламерами за Кемені
№	29. крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 32-х років звернувся у клініку ортопедичної стоматології з діагнозом: перелом верхньої щелепи. Для лікування перелому можливе застосування стандартного комплекту Збаржа. При цьому фіксація внутрішньоротової частини здійснюється за допомогою такої конструкції:
Правильна відповідь	A. Подвійна стандартна дуга
B	B. Алюмінієва назубна шина
С	С. Піднебінна пластинка з пластмаси
D	D. Зубо-ясенна шина Вебера
Е	Е. Паяна шина з опірними коронками
№	30. крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 49-ти років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: зубна формула

Правильна відповідь	17,16,15,14,13,12,11/21,22,23,24,25,26,27, 47 - 45,44,43,42,41/31,32,33,34,35,36,37. Шийки 47,45,44 зубів оголені, рухомість 45 зуба I ступеня. Ортогнатичний прикус. Планується заміщення дефекту зубного ряду нижньої щелепи паяним мостоподібним протезом з опорою на 47,45,44 зуби. Які фіксуючі елементи більш показані даному хворому?
B	A. Екваторні коронки
C	B. 3/4 коронки
D	C. Напівкоронки
E	D. Комбіновані коронки
	E. -
№	31. крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	У хворої 65-ти років перелом тіла нижньої щелепи зліва в ділянці ментального отвору. Об'єктивно: повна відсутність зубів. До отримання травми користувалась повними знімними протезами. Яку шину можна використати для іммобілізації відламків?
Правильна відповідь	A. Порта
B	B. Вебера
C	C. Шура
D	D. Васильєва
E	E. Ванкевич
№	32. крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Пацієнт 53-х років скаржиться на запалення ясен, рухливість зубів. Об'єктивно: зубні ряди всі інтактні, всі зуби 2 ступеня рухливості, атрофія 1/2 довжини стінок комірок. Який вид стабілізації зубів слід застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Стабілізація по дузі
B	B. Фронтальна
C	C. Фронтосагітальна
D	D. Сагітальна
E	E. Парасагітальна

№	<b>33.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 42-х років скаржиться на біль правої половини голови, обмеження рухів нижньої щелепи, клацання, періодичний спазм жувальної мускулатури. Об'єктивно: обличчя симетричне, відкриття рота обмежене. При пальпації в правому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС) відмічаються крепітація та хрускіт при рухах нижньої щелепи. При огляді порожнини рота виявлено дефект зубного ряду справа II класу за Кеннеді. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Больова дисфункція правого СНЩС
<b>B</b>	<b>B.</b> Гострий артрит правого СНЩС
<b>C</b>	<b>C.</b> Склерозуючий остеоартроз правого СНЩС
<b>D</b>	<b>D.</b> Контрактура правого СНЩС
<b>E</b>	<b>E.</b> Осифікуючий міозит
№	<b>34.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 47ми років звернувся зі скаргами на утруднене вживання їжі, деформацію прикусу. В анамнезі: перелом нижньої щелепи 2,5 місяці тому. Об'єктивно: дефект нижньої щелепи у фронтальній ділянці 1,8 мм (несправжній суглоб). По обидва боки фрагменту нижньої щелепи є 4 стійких зуба, перкусія безболісна. Яку конструкцію протеза слід використовувати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Шарнірний протез незнімної конструкції за Оксманом
<b>B</b>	<b>B.</b> Протез із шарніром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням
<b>C</b>	<b>C.</b> Протез із шарніром за Оксманом з односуглобним зчленуванням
<b>D</b>	<b>D.</b> Протез із шароамортизаційним кламером за Курляндським
<b>E</b>	<b>E.</b> Безшарнірний знімний протез
№	<b>35.</b> . крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хворий 44х років скаржиться на біль у ділянці скроневопіднижньощелепного суглоба (СНЩС) при прийманні твердої їжі. В анамнезі лікування з приводу артриту СНЩС зліва. При обстеженні виявлено локалізовану форму патологічної стертості зубів нижньої щелепи, множинні передчасні контакти зубів. Коронкова частина 36 зуба відновлена цементною пломбою. Глибоке різцеве перекриття. Яка найбільш імовірна причина виникнення захворювання СНЩС?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Передчасні контакти зубів
B	<b>B.</b> Приймання твердої їжі
C	<b>C.</b> Запалення пульпи 36 зуба
D	<b>D.</b> Запалення періодонту 36 зуба
E	<b>E.</b> Глибоке різцеве перекриття
№	<b>36.</b> . крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 47ми років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на скрутність рухів у суглобах, особливо зранку, лускіт, хруст при відкриванні рота. На рентгенограмі: деформація суглобової голівки та суглобового горба, звуження та деформація суглобової щілини. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Артроз скроневопіднижньощелепного суглоба
B	<b>B.</b> Звичний вивих
C	<b>C.</b> Несправжній суглоб
D	<b>D.</b> Артрит скроневопіднижньощелепного суглоба
E	<b>E.</b> Синдром Костена
№	<b>37.</b> . крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Чоловік 46-ти років звернувся до клініки для профілактичного огляду щелепнолицевої ділянки. Об'єктивно: передні зуби верхньої щелепи перекривають зуби нижньої щелепи на 3 мм. Щічно-мезіальний горбик верхніх перших молярів у центральній оклюзії розташовується між мезіальним і дистальним щічними горбиками нижніх перших молярів. Який вид прикусу у даного пацієнта?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Ортогнатичний
B	<b>B.</b> Прогнатичний

C	C. Прямий
D	D. Відкритий
E	E. Косий
№	38. . крок 2014, 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Одним із станів визначення центральної оклюзії є побудова площини, що при наявності достатньої кількості зубів проходить через різьчі краї центральних різців нижньої щелепи та дистальнощічні горбики останніх молярів. Яка площина будується?
Правильна відповідь	A. Протетична
B	B. Сагітальна
C	C. Вертикальна
D	D. Трансверзальна
E	E. Франкфуртська
№	39. крок 2014, 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Лікарю стоматологу-ортопеду необхідно надати спеціалізовану допомогу пацієнту 40-ка років, який хворіє на СНІД. Медичний персонал кабінету при наданні ортопедичної стоматологічної допомоги даному пацієнту повинен керуватися положеннями діючого на даний час Наказу МОЗ України "Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛінфекцію (СНІД)" від 27 травня 2000 року. Зазначте номер цього документу:
Правильна відповідь	A. 120
B	B. 100
C	C. 220
D	D. 50
E	E. 1
№	40. крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворому 56ти років потрібно шинування передніх зубів верхньої щелепи. Об'єктивно: 13, 12, 11, 21, 22, 23 зуби мають рухомість I ступеня, депульповані. Яку з наведених шин раціонально застосувати?

Правильна відповідь	<b>A.</b> Мамлока
B	<b>B.</b> Шпренга
C	<b>C.</b> Бетельмана
D	<b>D.</b> Марєя
E	<b>E.</b> Напівкоронкову
№	<b>41.</b> . крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 27ми років звернувся по допомогу до клініки ортопедичної стоматології. Діагноз: перелом альвеолярного відростка без зміщення у ділянці 24, 25, 26 зубів. Усі зуби присутні, стійкі. Яку шину необхідно застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гладенька шина-скоба
B	<b>B.</b> Тігерштедта із зачіпним гачками
C	<b>C.</b> Тігерштедта з похилою площиною
D	<b>D.</b> Тігерштедта з опорною площиною
E	<b>E.</b> Тігерштедта з розпорочним вигином
№	<b>42.</b> . крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	У військовослужбовця 22-х років діагностований оскольчастий перелом нижньої щелепи у ділянці тіла з дефектом тканини. Дефект кістки 1,5 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський)
B	<b>B.</b> Міжщелепне лігатурне зв'язування за Айві
C	<b>C.</b> Підборідна пращоподібна пов'язка
D	<b>D.</b> Дротяний шов
E	<b>E.</b> Шини Тігерштедта
№	<b>43.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Юнак 17-ти років проходить обстеження в клініці ортопедичної стоматології. Жувальну ефективність планується визначити за методом Рубінова. Якої ваги горіх слід дати досліджуваному?

Правильна відповідь	<b>A.</b> 0,8 г
B	<b>B.</b> 0,3 г
C	<b>C.</b> 0,5 г
D	<b>D.</b> 0,6 г
E	<b>E.</b> 0,7 г
№	<b>44.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 28-ми років скаржиться на утруднення при відкушуванні їжі, порушення вимови та рис обличчя внаслідок відсутності 11, 21, 22, 23. З боку порожнини рота відзначається деформація зубної дуги внаслідок зміщення 31, 41, 42 вище оклюзійної площини з одночасним розростанням альвеолярного відростку. Згідно якої класифікації можливо визначити діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> За Пономарьовою
B	<b>B.</b> За Бушаном
C	<b>C.</b> За Шредером
D	<b>D.</b> За Оксманом
E	<b>E.</b> За Катцем
№	<b>45.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 36-ти років скаржиться на біль під мостоподібним протезом. Після зняття протезу на альвеолярному відростку спостерігається виразка розміром 0,3x0,5 см, слабкоболісна, м'яка; оточуюча слизова гіперемована, підщелепні лімфовузли не збільшені. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Декубітальна виразка
B	<b>B.</b> Трофічна виразка
C	<b>C.</b> Афта Сеттона
D	<b>D.</b> Ракова виразка
E	<b>E.</b> Туберкульозна виразка
№	<b>46.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Пацієнтка 42-х років скаржиться на рухливість зубів, утруднене пережовування їжі. Об'єктивно: конфігурація обличчя не змінена. Відсутні 35, 36, 38, 44, 46, 48 зуби. 31, 32, 41, 42 зуби мають I-II ступінь рухливості. Яка конструкція протезів найбільш раціональна у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Суцільнолита шина-протез із вестибулярними кігтеподібними відростками
B	<b>B.</b> Суцільнолита шина-протез із системою кламерів Роуча і багатоланковим кламером
C	<b>C.</b> Шина Мамлока
D	<b>D.</b> Знімна пластмасова шина-капа
E	<b>E.</b> Інтердентальна шина
№	<b>47.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 30-ти років отримав травму в ділянці середньої третини обличчя. Звернувся зі скаргами на біль, припухлість м'яких тканин у ділянці верхньої щелепи, біль при закриванні рота. При обстеженні діагностовано перелом верхньої щелепи Ле-Фор III. Яку шину необхідно використовувати при лікуванні?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Апарат Збаржа
B	<b>B.</b> Шина Лімберга
C	<b>C.</b> Шина Гунінга-Порта
D	<b>D.</b> Шина Ванкевич
E	<b>E.</b> Шина Степанова
№	<b>48.</b> . крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржиться на часткову відсутність зубів, погане пережовування їжі. Об'єктивно: відсутні 48, 47, 46, 45, 44 зуби; 17, 16 та 15 зуби зміщені разом із альвеолярним відростком до альвеолярного відростка нижньої щелепи. Які причини виникнення феномену Попова-Годона?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Втрата зубів-антагоністів
B	<b>B.</b> Рахіт
C	<b>C.</b> Травма
D	<b>D.</b> Ротове дихання
E	<b>E.</b> Каріозна хвороба
№	<b>49.</b> . крок 2013



ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 63-х років скаржиться на погане пережовування їжі, косметичний дефект. Об'єктивно: присутні 16, 15, 13, 12, 11, 22, 23, 24, 26, 27, 48, 46, 45, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Зуби мають I-II ступінь рухомості. Який вид стабілізації зубних рядів необхідно застосувати?
Правильна відповідь	<b>А.</b> По дузі
В	<b>В.</b> Фронтальна
С	<b>С.</b> Сагітальна
Д	<b>Д.</b> Фронтально-сагітальна
Е	<b>Е.</b> Парасагітальна
№	<b>50.</b> . крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 46-ти років звернувся до клініки з післятравматичними скаргами на порушення змикання зубів. При обстеженні виявлений двобічний перелом верхньої щелепи з обмеженою рухливістю відламків. Зуби збережені. Який апарат показаний при лікуванні?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Апарат Шура із зустрічними позаротовими стрижнями
В	<b>В.</b> Стандартна шина Збаржа у модифікації Міргазізова
С	<b>С.</b> Шина Тігерштедта з міжщелепним витягненням
Д	<b>Д.</b> Фіксуєчий накісний апарат Рудька
Е	<b>Е.</b> Штампована пластмасова капа за Варесом
№	<b>51.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 57-ми років звернувся до клініки зі скаргами на рухливість зубів, неможливість прийому їжі. Об'єктивно: на нижній щелепі 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46 та 48 зуби відсутні; 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 47 - з рухливістю II ступеня, з низькими клінічними коронками, не вираженим екватором зубів. Визначте оптимальну конструкцію протеза при даній патології:
Правильна відповідь	<b>А.</b> Знімна суцільнолита шина-протез
В	<b>В.</b> Частковий знімний протез
С	<b>С.</b> Балочна шина за Курляндським

D	<b>D.</b> Знімна шина Биніна
E	<b>E.</b> Знімна шина з вестибулооральним кламером
№	<b>52.</b> . крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 38-ми років з хронічним генералізованим пародонтитом направлена на ортопедичне лікування. Об'єктивно: зубні ряди безперервні, 12, 11, 21, 22 зуби мають рухливість I ступеня, депульповані. Решта зубів стійкі. Яка шина найбільш естетична для шинування фронтальної групи зубів?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Мамлока
B	<b>B.</b> Кільцева
C	<b>C.</b> Зі спаяних комбінованих коронок
D	<b>D.</b> Ковпачкова
E	<b>E.</b> Капова
№	<b>53.</b> . крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 32-х років скаржиться на стирання передніх зубів. Об'єктивно: на піднебінній поверхні 12, 11, 21, 22 зубів та губній поверхні 42, 41, 31, 32 зубів ділянки стирання емалі до дентино-емалевої межі, висота коронок не змінена. В ділянці молярів і премолярів відмічається стирання жувальних горбків наполовину. Висота прикусу не змінена. Яка форма патологічного стирання у даного пацієнта?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Вертикальна, генералізована, компенсована
B	<b>B.</b> Вертикальна, локалізована, компенсована
C	<b>C.</b> Змішана, локалізована, компенсована
D	<b>D.</b> Змішана, генералізована, субкомпенсована
E	<b>E.</b> Горизонтальна, локалізована, компенсована
№	<b>54.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 55-ти років під час огляду порожнини рота виявлені сполучені дефекти твердого та м'якого піднебіння. Який з перелічених видів щелепно-лицевих апаратів показаний у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Роз'єднуючі

B	<b>B.</b> Репонуючі
C	<b>C.</b> Фіксууючі
D	<b>D.</b> Спрямовуючі
E	<b>E.</b> Формуючі
№	<b>55.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржиться на затруднене пережовування їжі внаслідок зміщення нижньої щелепи. В анамнезі - ментальний перелом 2 місяці тому. Об'єктивно: щічні горби 34, 35, 36, 37 зубів контактують із екваторами верхніх бокових зубів з піднебінної сторони. Боковий відкритий прикус. Рентгенологічно - неправильне зрощення перелому нижньої щелепи. Оберіть конструкцію протеза:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Суцільнолиті металопластмасові коронки
B	<b>B.</b> Пластмасова шина-капа
C	<b>C.</b> Протез із похилою площиною
D	<b>D.</b> Адгезивний протез
E	<b>E.</b> Протез із подвійним зубним рядом
№	<b>56.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтці 47-ми років під час ортопедичного лікування було проведено знеболювання ( <i>Ultracain Forte</i> ). Через 20 хвилин після введення препарату пацієнтки виникли: гіперемія шкірних покривів, головний біль, збільшення частоти серцевих скорочень. Раніше неодноразово їй проводилося лікування зубів з використанням даного анестетика. Яке ускладнення розвинулося у хворої?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Підвищення артеріального тиску
B	<b>B.</b> Анафілактичний шок
C	<b>C.</b> Зомління
D	<b>D.</b> Колапс
E	<b>E.</b> Напад стенокардії
№	<b>57.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хворий 24-х років надійшов до клініки з діагнозом: перелом альвеолярного відростка лівої верхньої щелепи на ділянці 25, 26, 27 зубів без зміщення. Яку шину слід застосувати для постійної іммобілізації?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гладка шина-скоба
B	<b>B.</b> Шина з зачіпними петлями
C	<b>C.</b> Шина з розпорочним вигином
D	<b>D.</b> Шина з похилою площиною
E	<b>E.</b> Шина Васильєва
№	<b>58.</b> . крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	При клінічному огляді 9-річної пацієнтки встановлений попередній діагноз: дистальний прикус. Яку діагностичну клінічну пробу потрібно застосувати для диференційної діагностики різновидностей дистального прикусу?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Проба за Ешлером-Бітнером
B	<b>B.</b> Проба за Ільїною-Маркосян
C	<b>C.</b> Жуйні проби
D	<b>D.</b> Проба за Френкелем
E	<b>E.</b> Функціональна проба ковтання
№	<b>59.</b> . крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 22-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль під час прийому їжі і відкривання рота. 2 доби тому отримав травму в ділянці обличчя. Після обстеження і встановлення діагнозу лікар вирішив застосувати шину Ванкевича, яку виготовляють з пластмаси на верхню щелепу і застосовують при переломах:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Нижньої щелепи
B	<b>B.</b> Верхньої щелепи
C	<b>C.</b> Верхньої і нижньої щелеп
D	<b>D.</b> Множинних переломах верхньої щелепи
E	<b>E.</b> Вогнепальних переломах
№	<b>60.</b> . крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>

Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 45-ти років серединний дефект твердого піднебіння розміром 2х3 см. Зубні ряди інтактні. Яку конструкцію обтуратора краще застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Піднебінна пластинка
B	<b>B.</b> Обтуратор Померанцевої-Урбанської
C	<b>C.</b> Плаваючий обтуратор
D	<b>D.</b> Обтуратор Ільїної-Маркосян
E	<b>E.</b> Пластинчастий протез із обтуруючою частиною
№	<b>61.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 32-х років, вчитель, звернувся на консультацію до ортопеда-стоматолога з приводу генералізованої форми патологічної стертості зубів I ступеня (горизонтальна форма). Об'єктивно: премоляри і моляри верхньої та нижньої щелеп депульповані. Пломби на жувальній поверхні. Яка з перерахованих конструкцій оптимальна у даного хворого?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Металеві вкладки на бокові зуби обох щелеп
B	<b>B.</b> Металеві вкладки на бокові зуби верхньої щелепи
C	<b>C.</b> Металеві вкладки на бокові зуби нижньої щелепи
D	<b>D.</b> Пластмасові вкладки на бокові зуби верхньої щелепи
E	<b>E.</b> Пластмасові вкладки на бокові зуби нижньої щелепи
№	<b>62.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 42-х років, вчительці, планується виготовлення безпосереднього протезу на нижню щелепу для заміщення фронтальної групи зубів з III ступенем рухомості. Виберіть відбиткову масу:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Стомальгін
B	<b>B.</b> Гіпс
C	<b>C.</b> Стенс
D	<b>D.</b> Репін
E	<b>E.</b> Дентафоль
№	<b>63.</b> крок 2012

ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту 41-го року, з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба, призначена центруюча лікувально-діагностична капа, що роз'єднує прикус на 3 мм. Зникнення патологічних симптомів відбулося на 3 добу лікування. На який термін слід призначити користування тимчасовим протезом?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Не менше 3-х місяців
В	<b>В.</b> Не менше 6-ти днів
С	<b>С.</b> Не менше 12-ти днів
Д	<b>Д.</b> Не менше 2-3 тижнів
Е	<b>Е.</b> Не менше 3-х років
№	<b>64.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 40-ка років на прийомі у стоматолога-ортопеда відчув нездужання. Через декілька хвилин з'явилося пригнічення свідомості, з рота - різкий запах ацетону, дихання часте, глибоке. Шкіра і слизові - сухі. З анамнезу: страждає на цукровий діабет. Встановлено діагноз: гіперглікемічна кома. Яку допомогу необхідно надати?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Припинити маніпуляцію і ввести в/в інсулін
В	<b>В.</b> Викликати спеціалізовану бригаду швидкої допомоги
С	<b>С.</b> Ввести 1% розчин адреналіну в/м
Д	<b>Д.</b> Ввести 40% розчин глюкози в/в
Е	<b>Е.</b> Нічого не робити
№	<b>65.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 50-ти років потребує шинування передніх зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: 33, 32, 31, 41, 42, 43 зуби мають рухомість I-II ступеня, депульповані. Яку з названих шин краще застосувати?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Мамлока
В	<b>В.</b> Ельбрехта
С	<b>С.</b> Курляндського
Д	<b>Д.</b> Марєя
Е	<b>Е.</b> Ван-Гіля

№	<b>66.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 43-х років скаржиться на рухомість нижніх фронтальних зубів. Об'єктивно: відсутні 48, 47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37, 38. Зуби 43, 42, 41, 31, 32, 33 мають рухомість II ступеня, слизова оболонка навколо них набрякла, з ціанотичним відтінком. Яка шинуюча конструкція оптимальна для даної хворої?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Композитна шина, армована скловолокном
B	<b>B.</b> Частковий знімний протез з вестибулярною дугою
C	<b>C.</b> Бюгельний протез з багатоланковим кламером та кігтеподібними відростками
D	<b>D.</b> Бюгельний протез з антискидачами
E	<b>E.</b> Ковпачкова шина-протез у фронтальному відділі
№	<b>67.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржиться на біль, хрускіт в скронево-нижньощелепному суглобі, надмірне відкривання рота. Об'єктивно: пальпація суглобових голівок крізь слуховий прохід болісна, відкривання рота понад 7 см. На профілактику якого ускладнення в скронево-нижньощелепному суглобі слід направити ортопедичне лікування?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Вивих
B	<b>B.</b> Артрит
C	<b>C.</b> Артроз
D	<b>D.</b> Анкілоз
E	<b>E.</b> Артрозоартрит
№	<b>68.</b> крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 70-ти років виготовляються повні знімні протези на верхню і нижню щелепи. Хворий з'явився на клінічний етап "Визначення центрального співвідношення". Для перевірки правильного визначення міжальвеолярної висоти застосували розмовну пробу. Хворому запропонували вимовити звуки "О", "І", "М". Яка відстань має бути між валиками при правильному визначенні міжальвеолярної висоти у даного хворого?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 5-6 мм
B	<b>B.</b> 9-10 мм

С	С. 3-4 мм
D	D. 1-2 мм
Е	Е. 7-8 мм
№	69. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 38-ми років скаржиться на біль попереду проєкції зовнішнього слухового проходу, клацання при відкриванні рота, "закладання" у вухах. Об'єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота за рівною траєкторією. Дефект зубного ряду I кл. за Кеннеді, відсутні 18, 17, 16, 26, 27, 28. Яке з анатомічних утворень сприймає найбільше навантаження?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Суглобовий диск (меніск)
B	<b>B.</b> Суглобова голівка
С	<b>C.</b> Дистальний скат медіального суглобового горбика
D	<b>D.</b> Дно суглобової ямки скроневої кістки
Е	<b>E.</b> Капсула суглоба
№	70. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 35-ти років рухомість зубів I ступеня, зуби мають добре виражені горбки. Лікар рекомендує зробити оклюзійне пришліфовування зубів. Який метод найбільш об'єктивний для визначення топографії пришліфовування?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Оклюзіографія
B	<b>B.</b> Мастикаціографія
С	<b>C.</b> Рентгенографія
D	<b>D.</b> Гнатодинамографія
Е	<b>E.</b> Жувальна проба за Рубіновим
№	71. крок 2010, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>



Текст завдання	Хворий 53-х років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами на рухливість зубів у бічних ділянках, часте випадіння пломб. Об'єктивно: усі моляри і премоляри на нижній щелепі мають рухливість I ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях пломби. Яку конструкцію шини доцільно застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Вкладкова шина
B	<b>B.</b> Незнімна коронкова шина-протез
C	<b>C.</b> Коронко-ковпачкова шина
D	<b>D.</b> Шини з екваторних коронок
E	<b>E.</b> Інтрадентальна шина
№	<b>72.</b> . крок 2010, 2008, 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 43-х років скаржитися на рухливість зубів фронтальної ділянки нижньої щелепи, значне оголення шийок зубів. Об'єктивно: ясна в ділянці 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 бліді з ціанотичним відтінком, кровотеча ясен відсутня. 42, 41, 31, 32 мають I-II ступінь рухливості. Скупченість 42, 41, 31, 32. Відмічається оголення шийок 42, 41, 31, 32 на 1/2; 43, 33 - на 1/4. Яку ортопедичну конструкцію доцільно застосувати в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Суцільнолита капа
B	<b>B.</b> Балочна шина за Курляндським
C	<b>C.</b> Ковпачкова шина
D	<b>D.</b> Напівкоронкова шина
E	<b>E.</b> Напівкільцева шина
№	<b>73.</b> крок 2010, 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтка з'явилася з метою протезування. Об'єктивно: нижня третина обличчя зменшена, носо-губні складки поглиблені, фронтальна група зубів верхньої та нижньої щелепи відсутня, коронки 17, 15, 26, 27, 36, 37, 45, 47 зубів стерті на 2/3 висоти, жувальні поверхні цих зубів гладенькі, пігментовані, альвеолярний відросток не гіпертрофований, міжальвеолярна висота знижена. Визначте форму патологічного стирання у даної пацієнтки:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Горизонтальна, некомпенсована, III ступеня важкості
B	<b>B.</b> Горизонтальна, компенсована, II ступеня важкості
C	<b>C.</b> Вертикальна, некомпенсована, III ступеня важкості

D	<b>D.</b> Вертикальна, компенсована, III ступеня важкості
E	<b>E.</b> Змішана, некомпенсована, III ступеня важкості
№	<b>74.</b> крок 2010, 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 36-ти років скаржиться на різкий біль, "кляцання" в правому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС), печіння в ділянці правого зовнішнього слухового проходу. Рухи нижньої щелепи східцеподібні, з короткочасними блокуючими моментами в суглобі та гострим болем. Об'єктивно: обличчя симетричне. Прикус ортогнатичний, при внутрішньоротовій пальпації латеральних крилоподібних м'язів відчувається біль з правого боку. На томограмах контури кісткових структур суглобових поверхонь рівні, гладенькі. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Дисфункція СНЩС
B	<b>B.</b> Ревматичний артрит СНЩС
C	<b>C.</b> Гострий посттравматичний артрит СНЩС
D	<b>D.</b> Деформуючий артроз СНЩС
E	<b>E.</b> Анкілоз СНЩС
№	<b>75.</b> . крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 45-ти років, викладач, звернувся за порадою до ортопеда-стоматолога з метою вибору раціонального протезування. Об'єктивно: 12, 11, 21, 22 мають рухомість III ступеню. Яка ортопедична допомога найдоцільніша?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Безпосереднє протезування
B	<b>B.</b> Раннє протезування
C	<b>C.</b> Незнімний протез
D	<b>D.</b> Віддалене протезування
E	<b>E.</b> Бюгельний протез
№	<b>76.</b> крок 2010, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Пацієнтка 47-ми років скаржиться на обмежену рухливість нижньої щелепи вранці, періодичний тупий біль в правому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС) і скутість у суглобах. Зі слів пацієнтки, скутість зникає впродовж дня після "розробки" суглобів. Об'єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене до 2,5 см, відзначається хрускіт у суглобах. Середня лінія зміщується праворуч на 3-4 мм, пальпація правої суглобової головки болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	<b>A. Артроз правого СНЩС</b>
B	B. Гострий серозний артрит правого СНЩС
C	C. Хронічний артрит правого СНЩС
D	D. Перелом правого виростка нижньої щелепи
E	E. Правобічний передній вивих нижньої щелепи
№	77. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 48-ми років звернулася зі скаргами на тупий ниючий біль у ділянці лівого СНЩС, що посилюється під час прийому твердої їжі, який з'явився близько 2,5 років тому. Об'єктивно: відкривання рота дещо обмежене, під час відкривання щелепа зміщується вбік, чути хрускіт у СНЩС. У порожнині рота - вторинна часткова адентія. На рентгенограмі визначається склероз кортикальної пластинки та звуження суглобової щілини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	<b>A. Артроз СНЩС</b>
B	B. Хронічний артрит СНЩС
C	C. Гострий артрит СНЩС
D	D. Больова дисфункція СНЩС
E	E. Загострення хронічного артрититу СНЩС
№	78. . крок 2010, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 62-х років серединний перелом нижньої щелепи з утворенням несправжнього суглоба. Об'єктивно: зубна формула: 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухливість відламків незначна, зміщення немає. На рентгенограмі: дефект кістки 0,8 см. Застосування якого протезу найбільш показано?
Правильна відповідь	<b>A. Мостоподібний протез із шарніром</b>

<b>B</b>	<b>B.</b> Пластинковий протез без шарніра
<b>C</b>	<b>C.</b> Пластинковий протез із шарніром Гаврилова
<b>D</b>	<b>D.</b> Пластинковий протез із шарніром Оксмана
<b>E</b>	<b>E.</b> Пластинковий протез із шарніром Вайнштейна
<b>№</b>	<b>79.</b> крок 2009
<b>ДИСЦИПЛІНА</b>	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
<b>Тема</b>	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
<b>Текст завдання</b>	Хвора 47-ми років звернулася зі скаргами на оголення шийок зубів верхньої та нижньої щелеп. Об'єктивно: зубні ряди інтактні, шийки зубів оголені. Виявлені передчасні контакти зубів. Проводиться вибіркоче пришліфування. Який метод слід застосувати для його контролю?
<b>Правильна відповідь</b>	<b>A.</b> Оклюзіографія
<b>B</b>	<b>B.</b> Мастикаціографія
<b>C</b>	<b>C.</b> Жувальна проба
<b>D</b>	<b>D.</b> Рентгенографія
<b>E</b>	<b>E.</b> Гнатодинамометрія
<b>№</b>	<b>80.</b> крок 2009
<b>ДИСЦИПЛІНА</b>	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
<b>Тема</b>	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
<b>Текст завдання</b>	Хворий 30-ти років, саксофоніст, скаржиться на стирання оклюзійної поверхні передніх зубів з утворенням щілини (вторинний відкритий прикус) без зміни висоти нижньої третини обличчя. Яким методом ліквідувати дану деформацію?
<b>Правильна відповідь</b>	<b>A.</b> Протетичний
<b>B</b>	<b>B.</b> Підвищення міжальвеолярної висоти
<b>C</b>	<b>C.</b> Вкорочення зубів
<b>D</b>	<b>D.</b> Ортодонтичний
<b>E</b>	<b>E.</b> Апаратурно-хірургічний
<b>№</b>	<b>81.</b> крок 2009, 2008, 2007
<b>ДИСЦИПЛІНА</b>	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
<b>Тема</b>	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Під час бокових рухів нижньої щелепи фронтальні зуби зміщуються вбік. Переміщення різцевої точки із центрального положення в сторону вимірюється величиною кута в $100 - 110^\circ$ . Що характеризує така величина зміщення різцевої точки?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Боковий різцевий шлях
B	<b>B.</b> Боковий суглобовий шлях
C	<b>C.</b> Сагітальний різцевий шлях
D	<b>D.</b> Сагітальний суглобовий шлях
E	<b>E.</b> Кут Бенета
№	<b>82.</b> . крок 2009, 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 52-х років скаржиться на значне стирання зубів на верхній та нижній щелепах. Об'єктивно: стирання зубів у бічних ділянках нижньої щелепи на рівні ясен і на 1/3 у фронтальних ділянках. Лікування проводиться в два етапи. Яку конструкцію протезів для роз'єднання прикусу і перебудови міотатичних рефлексів слід застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Зубо-ясенева шина у бічних ділянках
B	<b>B.</b> Пластмасова капа на весь зубний ряд
C	<b>C.</b> Пластмасова капа у фронтальній ділянці
D	<b>D.</b> Коронкова шина у бічних ділянках
E	<b>E.</b> Капа з еластичної пластмаси
№	<b>83.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</u>
Текст завдання	Жінка 35-ти років на другу добу після видалення зуба звернулася до щелепно-лицевого відділення зі скаргами на біль у білявушно-жувальній ділянці, відчуття, що немає контакту між зубами верхньої та нижньої щелеп праворуч. Під час огляду: підборіддя зсунуте ліворуч, рот напіввідкритий, губи зімкнуті, прикус порушений. Обмеження бічних рухів нижньої щелепи. Попереду від козелка правого вуха западання м'яких тканин. Яке дослідження найбільш інформативне при даному порушенні?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Рентгенографія СНЩС
B	<b>B.</b> Ультразвукове дослідження СНЩС
C	<b>C.</b> Рентгенографія нижньої щелепи

D	<b>D.</b> Бімануальне дослідження СНЩС
E	<b>E.</b> Симптом навантаження
№	<b>84.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 46-ти років звернулася зі скаргами на біль у привушно-жувальній ділянці зліва, порушення рухів нижньої щелепи. Об'єктивно: почервоніння шкіри над лівим скронево-нижньощелепним суглобом (СНЩС) і набряк тканин довкола. Порушення функції лівого СНЩС. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гострий гнійний лівобічний артрит СНЩС
B	<b>B.</b> Гострий серозний лівобічний артрит СНЩС
C	<b>C.</b> Артроз лівого СНЩС
D	<b>D.</b> Деформуючий артроз лівого СНЩС
E	<b>E.</b> Анкілоз лівого СНЩС
№	<b>85.</b> . крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора скаржиться на обмежене відкривання рота. З анамнезу встановлено наявність внутрішньосуглобових розладів у лівому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС). Рентгенологічне дослідження: субхондральний склероз суглобових площадок, рівномірне звуження суглобової щілини, обмеження екскурсії виросткового відростка лівого СНЩС. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Артроз лівого СНЩС
B	<b>B.</b> Деформуючий артроз лівого СНЩС
C	<b>C.</b> Анкілоз лівого СНЩС
D	<b>D.</b> Гострий гнійний лівобічний артрит СНЩС
E	<b>E.</b> Гострий серозний лівобічний артрит СНЩС
№	<b>86.</b> . крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хвора 46-ти років скаржиться на утруднене відкривання рота, підвищення температури тіла, набряк тканин довкола обох скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС). З анамнезу встановлено: 2-3 місяці тому впродовж декількох днів був нетривалий, неінтенсивний, двобічний біль у привушно-жувальних ділянках, обмеження відкривання рота, відчуття напруження та дискомфорту в ділянках лівого і правого СНЩС. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Ревматичний артрит
B	<b>B.</b> Інфекційний артрит
C	<b>C.</b> Артроз
D	<b>D.</b> Фіброзний анкілоз
E	<b>E.</b> Деформуючий артроз
№	<b>87.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 40-ка років хворіє на хронічний генералізований пародонтит. Об'єктивно: зубні ряди безперервні, 42, 41, 31, 32 мають рухомість 1 ступеню. Яка шина найбільш естетична для цієї групи зубів?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Шинування на основі <i>Glass Span</i> та фотополімерів
B	<b>B.</b> Капова шина
C	<b>C.</b> Шина зі спаяних комбінованих коронок
D	<b>D.</b> Ковпачкова шина
E	<b>E.</b> Кільцева шина
№	<b>88.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтка 38-ми років звернулася до лікаря-ортопеда зі скаргами на металевий присмак, сухість у роті та печію язика. Об'єктивно: на нижній щелепі дефекти зубних рядів заміщені паяними мостоподібними протезами із нержавіючої сталі. Який метод обстеження доцільно використати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гальванометрія
B	<b>B.</b> Мастікаціографія
C	<b>C.</b> Оклюзіографія
D	<b>D.</b> Міографія
E	<b>E.</b> Електрооднотометрія

№	<b>89.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 40-ка років звернувся до стоматолога-ортопеда зі скаргами на рухомість зубів на верхній щелепі після проведеного терапевтичного лікування. Об'єктивно: 13, 12, 11, 21, 22 депульповані, мають II ступінь рухливості, в кольорі незмінні. Виберіть конструкцію протеза:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Шина Мамлока
B	<b>B.</b> Коронкова паяна шина
C	<b>C.</b> Шина з пластмасових коронок
D	<b>D.</b> Балкова шина
E	<b>E.</b> Стрічкова шина
№	<b>90.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 38-ми років направлений до ортопедичного відділення після проведеного курсу терапевтичного лікування з приводу пародонтиту. В анамнезі часті рецидиви захворювання, при загостренні відмічаються пародонтальні абсцеси. Об'єктивно: 42, 41, 31, 32 рухливі I-II ст., 43 і 33 стійкі, шийки зубів оголені на 1/4, гіперестезія твердих тканин відсутня. Яку раціональну конструкцію постійної шини слід запропонувати хворому?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Суцільнолита колова знімна шина
B	<b>B.</b> Напівкоронкова шина
C	<b>C.</b> Шина Мамлока
D	<b>D.</b> Коронково-ковпачкова шина
E	<b>E.</b> Балкова шина за Курляндським
№	<b>91.</b> . крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 52-х років скаржиться на запалення ясен, рухливість зубів. Об'єктивно: зубні ряди інтактні, усі зуби 1-2 ступеня рухливості. Який вид стабілізації зубів слід застосувати в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Стабілізація по дузі
B	<b>B.</b> Фронтальна
C	<b>C.</b> Парасагітальна



D	<b>D.</b> Сагітальна
E	<b>E.</b> Фронтосагітальна
№	<b>92.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	До клініки ортопедичної стоматології звернувся хворий 57-ми років зі скаргами на тупий біль у ділянці правого скронево-нижньощелепного суглоба, що посилюється під час їжі. Захворювання почалося поступово зі скутості рухів нижньої щелепою зранку, мало хвилеподібний перебіг. Об'єктивно: обличчя симетричне, рот відкривається на 3 см. При відкриванні рота суглобовий шум та клацання (сходинкоподібне зміщення нижньої щелепи). Шкіра над суглобом не змінена. Пальпаторно тонус м'язів не змінений. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Артроз правого скронево-нижньощелепного суглоба
B	<b>B.</b> Гострий артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба
C	<b>C.</b> Нейромускулярний синдром
D	<b>D.</b> Оклюзійно-артикуляційний синдром
E	<b>E.</b> Підвивих нижньої щелепи
№	<b>93.</b> . крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 43-х років звернулася зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: зубний ряд інтактний. Рухомість зубів I-II ступеня. Планується імобілізація зубів єдиною для всього зубного ряду знімною шиною. Яку стабілізацію зубів дозволить провести дана шина?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Кругова
B	<b>B.</b> Передня
C	<b>C.</b> Передньобокова
D	<b>D.</b> Сагітальна
E	<b>E.</b> Поперечна
№	<b>94.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хвора 46-ти років скаржиться на утруднене відкривання рота, підвищення температури тіла, набряк тканин довкола обох скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС). З анамнезу встановлено: 2-3 місяці тому протягом декількох днів був нетривалий, неінтенсивний, двобічний біль у привушно-жувальних ділянках, обмеження відкривання рота, відчуття напруження та дискомфорту в ділянках лівого і правого СНЩС. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Ревматичний артрит
B	<b>B.</b> Інфекційний артрит
C	<b>C.</b> Артроз
D	<b>D.</b> Фіброзний анкілоз
E	<b>E.</b> Деформуючий артроз
№	<b>95.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 51-го року, лектор, звернувся до ортопедичного відділення зі скаргами на біль та рухомість фронтальних зубів нижньої щелепи. Шийки 42, 41, 31, 32 зубів оголені, рухомість III ступеня з глибокими патологічними кишнями. В який термін доцільно зафіксувати зубні протези в хворого після видалення зубів?
Правильна відповідь	<b>A.</b> В день видалення зубів
B	<b>B.</b> 16-30 днів
C	<b>C.</b> 2-3 місяці
D	<b>D.</b> 4-6 місяців
E	<b>E.</b> 5-6 днів
№	<b>96.</b> . крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 37-ми років діагностовано артроз скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). При аускультатії лікар почув патологічний шум в ділянці суглобу, а саме "кляцання", що виникає при навантаженні. Який механізм виникнення даного патологічного шуму?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Асинхронний рух диска та суглобової головки
B	<b>B.</b> Тертя кісткових поверхонь в суглобі
C	<b>C.</b> Ослаблення зв'язок СНЩС
D	<b>D.</b> Кальцифікація диску СНЩС

Е	Е. Запалення хрящової тканини диску
№	97. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 38-ми років скаржиться на біль у ділянці правої половини нижньої щелепи. Біль з'явився після падіння та удару. Об'єктивно: відкривання рота болісне, оклюзійне співвідношення порушене. Під час пальпації на ділянках відсутніх 44, 45 зубів незначна рухливість відламків. Всі решта зубів присутні, стійкі. На рентгенограмі - лінія перелому в ділянці відсутніх 44, 45 зубів. Яку шину для лікування необхідно застосувати в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Шина Тигерштедта з розпоркою
В	<b>В.</b> Шина Збаржа
С	<b>С.</b> Шина Ванкевича
Д	<b>Д.</b> Пращеподібна пов'язка
Е	<b>Е.</b> Гладенька шина-скоба
№	98. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 33-х років скаржиться на рухливість зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: 12, 11, 21, 22 - II ступінь рухливості, зуби депульповані, у кольорі не змінені. Оберіть конструкцію протезу в даному випадку:
Правильна відповідь	<b>А.</b> Шина Мамлока
В	<b>В.</b> Коронкова спаяна шина
С	<b>С.</b> Стрічкова спаяна шина
Д	<b>Д.</b> Шина зі пластмасових коронок
Е	<b>Е.</b> Балкова шина
№	99. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	До клініки ортопедичної стоматології звернувся хворий 57-ми років зі скаргами на тупий біль у ділянці правого скронево-нижньощелепного суглоба, що посилюється під час їжі. Захворювання почалося поступово зі скутості рухів нижньої щелепою зранку та мало хвилеподібний перебіг. Об'єктивно: обличчя симетричне, рот відкривається на 3 см. При відкриванні рота - суглобовий шум та клацання (сходінкоподібне зміщення нижньої щелепи). Шкіра над суглобом не змінена. При пальпації тонус м'язів не змінений. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Артроз правого скронево-нижньощелепного суглоба
B	<b>B.</b> Гострий артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба
C	<b>C.</b> Нейромускулярний синдром
D	<b>D.</b> Оклюзійно-артикуляційний синдром
E	<b>E.</b> Підвивих нижньої щелепи
№	<b>100.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 36-ти років звернувся з приводу протезування. 6 місяців тому була травма нижньої щелепи. Від операції кісткової пластики категорично відмовився. Об'єктивно: перелом, що не зрісся, нижньої щелепи в ділянці 43 зуба. На лівому відламку нижньої щелепи наявні 34, 35, 36 зуби, на малому - 45, 46. Який вид протеза на нижню щелепу найбільш прийнятний в цьому випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Знімний протез з шарніром
B	<b>B.</b> Бюгельний протез
C	<b>C.</b> Знімний пластинковий протез
D	<b>D.</b> Незнімний пластинковий протез
E	<b>E.</b> Знімний мостоподібний протез
№	<b>101.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	У пацієнта 42-х років видалено 35, 36 внаслідок ускладнення карієсу. Об'єктивно: верхній зубний ряд інтактний, прикус ортогнатичний. У якому напрямку найбільш вірогідне зміщення 37 зуба?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Мезіальний
B	<b>B.</b> дистальний
C	<b>C.</b> Вертикальний

D	<b>D.</b> Язиковий
E	<b>E.</b> Вестибулярний
№	<b>102.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт з пострезекційним дефектом верхньої щелепи, проникаючим у носову порожнину. Який протез рекомендовано виготовити в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Заміщаючий протез з обтуруючою частиною
B	<b>B.</b> Плаваючий обтуратор
C	<b>C.</b> Захисна пластинка
D	<b>D.</b> Формуючий протез
E	<b>E.</b> Заміщаючий протез
№	<b>103.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту з перехресним прикусом, який виник внаслідок перелому, що неправильно зрісся, виготовлено частковий знімний пластинковий протез з подвійним зубним рядом. До якого виду лікування можна віднести дане протезування?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Паліативне
B	<b>B.</b> Патогенетичне
C	<b>C.</b> Превентивне
D	<b>D.</b> Радикальне
E	<b>E.</b> Етіотропне
№	<b>104.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту 35-ти років виготовляються металокерамічні мостоподібні протези з опорою на девітальні 14, 16, 44, 47. Для препарування уступу лікарем була проведена аплікаційна анестезія 10% розчином лідокаїну. Через 45 хвилин препарування пацієнт поскаржився на набрякання правої щоки, язика, збільшення нижньої губи. Яка патологія розвинулася у пацієнта?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Ангіоневротичний набряк Квінке

В	<b>В.</b> Кропивниця
С	<b>С.</b> Колапс
Д	<b>Д.</b> Гіпертонічний криз
Е	<b>Е.</b> Анафілактичний шок
№	<b>105.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту 68-ми років, що страждає на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету, проводиться виготовлення повних знімних пластинкових протезів на cito! Пацієнт знаходився в клініці протягом 8-ми годин. В перервах між маніпуляціями їжі не вживав, нервував. Під час перевірки конструкції протеза на восковому базисі пацієнт став агресивно себе поводити, зблід, вкрився липким потом, знепритомнів. Діагностуйте невідкладний стан:
Правильна відповідь	<b>А.</b> Гіпоглікемічна кома
В	<b>В.</b> Колапс
С	<b>С.</b> Гостра дихальна недостатність
Д	<b>Д.</b> Гіпертонічний криз
Е	<b>Е.</b> Анафілактичний шок
№	<b>106.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 56-ти років виготовляється частковий знімний протез. В анамнезі - хвороба Боткіна. Як дезінфікувати відбитки даного пацієнта, отримані альгінатним матеріалом?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Глутаровий альдегід 2,5% - 10 хвилин
В	<b>В.</b> Автоклавування
С	<b>С.</b> Обробка лізолом - 5 хвилин
Д	<b>Д.</b> Обробка в 0,1% розчині хлораміну - 15 хвилин
Е	<b>Е.</b> Промивання 70% етиловим спиртом
№	<b>107.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>

Текст завдання	Пацієнт 32-х років звернувся до стоматолога для ортопедичного лікування 32 зуба. Після початку втручання розпочалися головний біль, запаморочення, дратівливість, короткочасне відчуття переживань при ясній свідомості (аура). Хворий непритомніє і падає. Зіниці розширені, не реагують на світло. З рота виділяється піниста слина. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Епілептичний напад
B	<b>B.</b> Зомління
C	<b>C.</b> Колапс
D	<b>D.</b> Анафілактичний шок
E	<b>E.</b> Кардіогенний шок
№	<b>108.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 43-х років скаржиться на часткову відсутність та рухомість зубів нижньої щелепи, що залишилися. Із анамнезу: зуби 47, 45, 44, 35, 36, 37 видалені 3 місяці тому. Зуби, що залишилися - I-II ступеня рухомості. Яку ортопедичну конструкцію доцільно застосувати в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Бюгельний протез з шинуючими елементами
B	<b>B.</b> Мостоподібні протези
C	<b>C.</b> Малі сідлоподібні протези
D	<b>D.</b> Частковий знімний пластинковий протез
E	<b>E.</b> Знімна капова шина за Мареем
№	<b>109.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 46-ти років скаржиться на неприємні відчуття та шум у вухах, утруднене пережовування їжі, нервозність. Об'єктивно: двобічний кінцевий дефект зубного ряду нижньої щелепи, обмежений першими премолярами, горизонтальна стертість передніх зубів, зигзагоподібне закривання рота. Для якого захворювання характерні ці прояви?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Дисфункція СНЩС
B	<b>B.</b> Часткова втрата зубів
C	<b>C.</b> Надмірна втрата зубів
D	<b>D.</b> Генералізований пародонтит

Е	Е. Неврит слухового нерва
№	110.            крок 2016, 2015, 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 40-ка років провели вибіркоче пришліфовування зубів з приводу захворювання СНЩС, зумовлене порушенням функціональної оклюзії. Через 3 дні він звернувся до лікаря-ортопеда зі скаргами на попадання між зубними ряди справа слизової оболонки щоки та її травматизацію. Яка помилка допущена при зішліфовуванні зубів?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Зішліфовування вершин опорних піднебінних горбиків верхніх зубів
В	<b>В.</b> Зішліфовування вершин опорних щічних горбиків нижніх зубів
С	<b>С.</b> Зішліфовування язикових горбиків нижніх зубів
Д	<b>Д.</b> Зішліфовування щічних горбиків верхніх зубів
Е	<b>Е.</b> Зішліфовування горбиків верхніх зубів
№	111.            крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 50-ти років звернулась в ортопедичне відділення зі скаргами на дефект твердих тканин 21, 22 зубів. Показано виготовлення металокерамічних коронок на 21 і 22 зуби. Хвора відмічає алергічну реакцію при проведенні анестезії при попередньому відвідуванні стоматолога. Яка тактика лікаря?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Проведення алергологічних лабораторних проб
В	<b>В.</b> Провести інфільтраційну анестезію анестетиком артикаїнового ряду
С	<b>С.</b> Провести скарифікаційну пробу на анестетик, яким буде проводитись знеболення
Д	<b>Д.</b> Провести знеболювання анестетиком ефірного ряду
Е	<b>Е.</b> Провести підшкірну пробу на анестетик
№	112.            крок 2016, 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	В стоматологічний кабінет медсанчастини з'явився військовослужбовець для протезування відсутніх 14, 15, 16, 24, 25, 26 зубів. Втрата якого проценту жувальної ефективності за Агаповим при переривчастому дефекті є абсолютним показанням до протезування військовослужбовця?
Правильна відповідь	<b>А.</b> 44-46%



В	<b>В.</b> 50-64%
С	<b>С.</b> 38-40%
Д	<b>Д.</b> 27-30%
Е	<b>Е.</b> 18-20%
№	<b>113.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ОРТОПЕДИЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 30-ти років скаржиться на часті вивихи нижньої щелепи. Об'єктивно: зубні ряди збережені, ортогнатичний прикус. Визначається клацання в скронево-нижньощелепному суглобі при відкриванні рота. Застосування якого з зазначених апаратів дозволить попередити вивих?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Апарат Петросова
В	<b>В.</b> Апарат Лімберга
С	<b>С.</b> Апарат Збаржа
Д	<b>Д.</b> Апарат Шура
Е	<b>Е.</b> Апарат Оксмана
№	<b>1.</b> крок 2016, 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту 67-ми років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Проводиться припасування індивідуальної ложки за методикою Гербста. Уточнюється межа ложки під'язикової ділянки, відступивши 1 см від середньої лінії. Яку пробу Гербста слід провести з цією метою?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Поперемінне дотикання язиком щоки
В	<b>В.</b> Провести язиком по червоній облямівці верхньої губи
С	<b>С.</b> Активні рухи м'язової мускулатури
Д	<b>Д.</b> Ковтання
Е	<b>Е.</b> Повільне відкривання рота
№	<b>2.</b> крок 2016, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 59ти років скаржиться на погану фіксацію повного знімного протеза, який спадає при кусанні під час їжі. Об'єктивно: верхні фронтальні зуби на 1/2 перекривають нижні. Яка допущена помилка?

Правильна відповідь	<b>A.</b> Неправильна постановка зубів
B	<b>B.</b> Неправильно визначена центральна оклюзія
C	<b>C.</b> Невірно отримано анатомічний відбиток
D	<b>D.</b> Невірно отримано функціональний відбиток
E	<b>E.</b> Невірно відлита модель
№	<b>3.</b> крок 2016, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 61го року з повною втратою зубів на верхній щелепі II тип за Шредером, нижній щелепі II тип за Келером, одним із симптомів є "стареча прогенія". Які фактори обумовлюють механізм її розвитку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Верхня щелепа базальна дуга вужча ніж альвеолярна, нижня щелепа базальна дуга ширша, ніж альвеолярна
B	<b>B.</b> Верхня щелепа базальна дуга ширша, ніж альвеолярна, нижня щелепа базальна дуга вужча, ніж альвеолярна
C	<b>C.</b> Верхня щелепа і нижня щелепа базальні дуги вужчі, ніж альвеолярні
D	<b>D.</b> Верхня щелепа і нижня щелепа базальні дуги ширші, ніж альвеолярні
E	<b>E.</b> Верхня щелепа і нижня щелепа базальні і альвеолярні дуги рівні за шириною
№	<b>4.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Для виготовлення повного знімного протеза на верхню щелепу пацієнту 73 років слід отримати функціональний відбиток. Об'єктивно: виражена рівномірна атрофія коміркового відростка верхньої щелепи, піднебіння пласке, торус різко виражений, горби верхньої щелепи атрофовані, екзостози в ділянці 13, 23 зубів розмірами 5x5 мм. Слизова оболонка в ділянці піднебінного торуса й екзостозів стоншена, атрофована, на решті протезного ложа помірно піддатлива. Який тип відбитка найдоцільніше отримати в цьому випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Диференційований функціональноприсмоктувальний
B	<b>B.</b> Компресійний функціональний
C	<b>C.</b> Декомпресійний функціональноприсмоктувальний
D	<b>D.</b> Присмоктувальний під жувальним тиском
E	<b>E.</b> Компресійний під жувальним тиском
№	<b>5.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хвора 65-ти років скаржиться на відсутність зубів верхньої і нижньої щелеп. Об'єктивно: альвеолярні відростки щелеп незначно атрофовані, слизова оболонка помірно податлива. Ортогнатичне співвідношення щелеп. Планується виготовлення повних знімних протезів з порцеляновими зубами. Який метод постановки штучних зубів краще використати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Постановка зубів за індивідуальними оклюзійними кривими
B	<b>B.</b> Постановка зубів за сферичними поверхнями радіусом 9 см
C	<b>C.</b> Постановка зубів за сферичними поверхнями радіусом 10 см
D	<b>D.</b> Анатомічна постановка по склу
E	<b>E.</b> Постановка зубів за антимоносівською кривою
№	<b>6.</b> крок 2015, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 68-ми років звернувся зі скаргами на біль в ділянці піднебіння під час користування повним знімним протезом, який виготовлено три місяці тому, та його балансування під час прийому їжі. Об'єктивно: різко виражені піднебінний торус, слизова оболонка в його ділянці гіперемована, набрякла. Яка найбільш імовірна причина даного ускладнення?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Не проведена ізоляція торусу
B	<b>B.</b> Попередній відбиток отриманий гіпсом
C	<b>C.</b> Функціональний відбиток отриманий за допомогою жорсткої індивідуальної ложки
D	<b>D.</b> Проведена анатомічна постановка зубів
E	<b>E.</b> Базис протеза виготовлений з акрилової пластмаси
№	<b>7.</b> крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворої 66-ти років при обстеженні беззубої нижньої щелепи були виявлені гострі кісткові виступи в ділянці премолярів. Наявність цих виступів несприятливо для протезування, бо є причиною балансування протезу і травмування слизової оболонки. Яка тактика лікаря в даній клінічній ситуації з метою попередження розвитку цих ускладнень?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Виготовити протез, межа якого буде проходити по верхній частині кісткового виступу
B	<b>B.</b> Провести ізоляцію кісткових виступів
C	<b>C.</b> Виготовити протез з двошаровим базисом

D	<b>D.</b> Провести ізоляцію кісткових виступів і виготовити протез з двошаровим базисом
E	<b>E.</b> Виготовити протез із обов'язковим повним перекриттям кісткових виступів
№	<b>8.</b> крок 2015
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У пацієнта 70-ти років повна відсутність зубів на верхній та нижній щелепах. Під час перевірки повних знімних протезів у порожнині рота між фронтальними зубами є щілина як при відкритій формі прикусу, у бічних ділянках - горбкове змикання. У якому положенні нижньої щелепи було зафіксовано воскові валики?
Правильна відповідь	<b>A.</b> У передній оклюзії
B	<b>B.</b> У лівій боковій оклюзії
C	<b>C.</b> У правій боковій оклюзії
D	<b>D.</b> У центральній оклюзії
E	<b>E.</b> У задній оклюзії
№	<b>9.</b> крок 2015, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 76-ти років, з повною втратою зубів, проведена постановка фронтальних зубів на приточці, зумовлена гіпертрофованим альвеолярним гребенем фронтальної ділянки. Яким методом буде проведена загіпсовка протеза в кювету?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Комбінований
B	<b>B.</b> Прямий
C	<b>C.</b> Зворотній
D	<b>D.</b> Гіпсовка в контрштамп кювети
E	<b>E.</b> Гіпсовка в кювету, заповнену мольдіном
№	<b>10.</b> крок 2015, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворой 66-ти років при обстеженні беззубої нижньої щелепи були виявлені гострі кісткові виступи в ділянці премолярів. Наявність цих виступів несприятливо для протезування, бо є причиною балансування протезу і травмування слизової оболонки. Яка тактика лікаря в даній клінічній ситуації з метою попередження розвитку цих ускладнень?

Правильна відповідь	<b>А.</b> Виготувити протез, межа якого буде проходити по верхній частині кісткового виступу
В	<b>В.</b> Провести ізоляцію кісткових виступів
С	<b>С.</b> Виготувити протез з двошаровим базисом
Д	<b>Д.</b> Провести ізоляцію кісткових виступів і виготувити протез з двошаровим базисом
Е	<b>Е.</b> Виготувити протез із обов'язковим повним перекриттям кісткових виступів
№	<b>11.</b> крок 2014, 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 65-ти років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Припасування індивідуальної ложки для отримання функціонального відбитку проводиться за допомогою проб Гербста. Під час ковтання слини ложка скидається. В якій ділянці необхідно вкоротити її край?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під'язикової лінії
В	<b>В.</b> Від ікла до ікла з вестибулярного боку
С	<b>С.</b> Від ікла до ікла з язикового боку
Д	<b>Д.</b> Уздовж щелепно-під'язикової лінії
Е	<b>Е.</b> В ділянці премолярів з язикового боку
№	<b>12.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У чоловіка 64х років з беззубими щелепами встановлено: на верхній щелепі незначна рівномірна атрофія. На нижній щелепі виражена атрофія бічних ділянок, слизова оболонка у цих ділянках вкладається у повздовжні складки, у фронтальному відділі рухомий альвеолярний гребінь. На якому етапі виготовлення повного знімного протезу слід враховувати стан нижньої щелепи?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Одержання диференційного функціонального відбитка
В	<b>В.</b> Одержання анатомічного відбитка
С	<b>С.</b> Одержання компресійного функціонального відбитка
Д	<b>Д.</b> Одержання декомпресійного функціонального відбитка
Е	<b>Е.</b> Визначення центральної оклюзії
№	<b>13.</b> крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хворому 70-ти років, з відсутніми зубами на нижній щелепі, виготовлена і припасована індивідуальна ложка. Яким термопластичним матеріалом слід оформити її краї?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Ортокор
B	<b>B.</b> Акродент
C	<b>C.</b> Стенс
D	<b>D.</b> Стомопласт
E	<b>E.</b> Термопластична маса № 3
№	<b>14.</b> крок 2014, 2012, 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 70-ти років звернувся до ортопеда-стоматолога зі скаргами на повну відсутність зубів. Об'єктивно: має місце незначна рівномірна атрофія альвеолярного відростка нижньої щелепи, яка вкрита слизовою оболонкою помірної піддатливості. Який тип беззубої щелепи за класифікацією Келера характеризується даними ознаками?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Перший
B	<b>B.</b> Третій
C	<b>C.</b> П'ятий
D	<b>D.</b> Другий
E	<b>E.</b> Четвертий
№	<b>15.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 60-ти років звернувся зі скаргами на утруднене розжовування їжі через відсутність зубів на верхній і нижній щелепах. Об'єктивно: альвеолярний відросток у фронтальній ділянці верхньої щелепи грушоподібної форми. Яку особливість при встановленні зубів необхідно враховувати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Верхні передні зуби ставлять на приточці
B	<b>B.</b> Верхню зубну дугу вкорочують на 1 зуб
C	<b>C.</b> Нижню зубну дугу вкорочують на 1 премоляр
D	<b>D.</b> Жувальні зуби міняють місцями
E	<b>E.</b> Передні зуби ставлять у прогенічному співвідношенні
№	<b>16.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>

Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 76-ти років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на погану фіксацію повного знімного протеза на нижній щелепі. При огляді альвеолярного відростка виявлена його атрофія. Яке анатомічне утворення на нижній щелепі можна використати для поліпшення фіксації цього протеза?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Ретроальвеолярний простір
B	<b>B.</b> Перехідна складка
C	<b>C.</b> Щелепно-під'язичний валик
D	<b>D.</b> Внутрішня коса лінія
E	<b>E.</b> Присінок порожнини рота
№	<b>17.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 55-ти років скаржиться на неможливість користування повними знімними протезами, які виготовили два тижні тому. Під час розмови і прийому їжі зуби стукотять, ковтання утруднене. Яка помилка допущена при виготовленні протезів?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Завищена міжальвеолярна висота
B	<b>B.</b> Використання зубів більшого розміру
C	<b>C.</b> Не враховані терміни адаптації
D	<b>D.</b> Занижена висота центральної оклюзії
E	<b>E.</b> Не дані рекомендації по догляду
№	<b>18.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 76-ти років звернувся до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. Об'єктивно: повна відсутність зубів на верхній щелепі. Планується виготовлення повного знімного пластинкового протезу на верхню щелепу. Які анатомічні орієнтири використовуються на верхній щелепі для визначення піднебінної межі базису протезу?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Піднебінні ямки
B	<b>B.</b> Лінія A
C	<b>C.</b> Піднебінний шов
D	<b>D.</b> Поперечні піднебінні складки

Е	Е. Горби верхньої щелепи
№	19. . крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 67-ми років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Для встановлення штучних зубів проводиться запис рухів нижньої щелепи. Який середній кут сагітального суглобового шляху за Гізі?
Правильна відповідь	<b>А.</b> 33°
В	<b>В.</b> 13°
С	<b>С.</b> 23°
Д	<b>Д.</b> 43°
Е	<b>Е.</b> 53°
№	20. . крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого повна відсутність зубів. При обстеженні на нижній щелепі було виявлено "розгойданий альвеолярний гребінь" за Супле. Який відбиток забезпечить виготовлення повноцінного протезу?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Функціональний декомпресійний
В	<b>В.</b> Функціональний компресійний
С	<b>С.</b> Повний анатомічний
Д	<b>Д.</b> Функціональний диференційований
Е	<b>Е.</b> Відбиток під власним жувальним тиском
№	21. крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	При обстеженні порожнини рота беззубого пацієнта на нижній щелепі виявлена різка рівномірна атрофія альвеолярного паростка. До якого типу відноситься така атрофія?
Правильна відповідь	<b>А.</b> II тип за Келером
В	<b>В.</b> I тип за Келером
С	<b>С.</b> I тип за Шредером



D	<b>D.</b> III тип за Келером
E	<b>E.</b> IV тип за Келером
№	<b>22.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 62-х років скаржиться на відсутність усіх зубів на нижній щелепі. Об'єктивно: слизова оболонка альвеолярного відростка верхньої щелепи помірно піддатлива, а нижньої щелепи - рухома, збирається в складку. До яких класів за Суппле відноситься слизова оболонка верхньої та нижньої щелеп?
Правильна відповідь	<b>A.</b> IV
B	<b>B.</b> V
C	<b>C.</b> I
D	<b>D.</b> III
E	<b>E.</b> II
№	<b>23.</b> . крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 53-х років звернувся із скаргами на втрату зубів, неможливість відкушування і пережовування їжі. Об'єктивно: повна втрата зубів на нижній щелепі, в ділянці 54 гострий кістковий виступ, болісний під час пальпації. Якою повинна бути тактика лікаря-ортопеда?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Видалення екзостозу
B	<b>B.</b> Виготовлення традиційного знімного протезу
C	<b>C.</b> Виготовлення протезу з розвантажувальним відбитком
D	<b>D.</b> Віддалення терміну протезування на 6 місяців
E	<b>E.</b> Виготовлення протезу з вкрюченими краями
№	<b>24.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 73-х років звернувся в клініку зі скаргами на погану фіксацію повних знімних протезів, які були виготовлені 10 років тому. Об'єктивно: зниження нижньої третини обличчя, значна рівномірна атрофія альвеолярних відростків. Оклюзійні поверхні штучних зубів майже повністю стерті. Який термін користування знімними протезами є оптимальним?

Правильна відповідь	<b>A.</b> 3-4 роки
B	<b>B.</b> 7-10 років
C	<b>C.</b> 1-2 роки
D	<b>D.</b> 7-8 років
E	<b>E.</b> 9-10 років
№	<b>25.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 55-ти років з повною втратою зубів на верхній та нижній щелепах планується виготовлення повних знімних протезів з фарфоровими зубами. Який метод постановки штучних зубів краще застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> По індивідуальним оклюзійним кривим
B	<b>B.</b> По сферичній поверхні радіусом 9 см
C	<b>C.</b> Анатомічна - по склу
D	<b>D.</b> По сферичній поверхні радіусом 10,4 см
E	<b>E.</b> По постановочній площадці Нападова-Сапожнікова
№	<b>26.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 62-х років виготовляють повний знімний протез для верхньої щелепи. Об'єктивно: слизова оболонка губ і щік блідо-рожева. Яку пластмасу для виготовлення базису протеза найбільш доцільно використати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Фторакс
B	<b>B.</b> Боксил
C	<b>C.</b> Редонт
D	<b>D.</b> Сінма
E	<b>E.</b> Карбопласт
№	<b>27.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>

Текст завдання	Хвора 59-ти років скаржиться на утруднене жування їжі, болі у жувальних м'язах і у СНЩС. Пацієнтка користується ПЗПП, які були виготовлені місяць тому. Об'єктивно: нижня частина обличчя подовжена, губи змикаються з напруженням, дикція порушена. Яка помилка була допущена при виготовленні ПЗПП?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Завищена міжальвеолярна висота
B	<b>B.</b> Зафіксована передня оклюзія
C	<b>C.</b> Невірно підібрані штучні зуби
D	<b>D.</b> Знижена міжальвеолярна висота
E	<b>E.</b> Невірно визначені межі протезів
№	<b>28.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 70-ти років скаржиться на стукання зубів під час користування повними знімними протезами. Об'єктивно: губи зімкнуті з напруженням, проміжок між штучними зубами верхньої та нижньої щелеп під час розмови складає 2 мм. Яка помилка була допущена під час протезування?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Завищена міжальвеолярна висота
B	<b>B.</b> Бічні зуби поставлені не по середині альвеолярного відростка
C	<b>C.</b> Неправильно визначена лінія посмішки
D	<b>D.</b> Занижена міжальвеолярна висота
E	<b>E.</b> Штучні зуби поставлені у прямому прикусі
№	<b>29.</b> . крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 70-ти років скаржиться на повну втрату зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: значна атрофія альвеолярного відростка, горби відсутні, піднебіння пласке. Перехідна складка розташована в одній горизонтальній площині з твердим піднебінням. Який тип беззубої верхньої щелепи у даної хворої (за класифікацією Шредера)?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 3
B	<b>B.</b> 4
C	<b>C.</b> 1
D	<b>D.</b> 5
E	<b>E.</b> 2

№	<b>30.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнтці 58-ми років проводиться припасування індивідуальної відбиткової ложки. При виконанні проби Гербста (втягування губ в трубочку) індивідуальна ложка скидається. Корекцію ложки необхідно провести в ділянці:
Правильна відповідь	<b>А.</b> 34 і 43 з вестибулярного боку
В	<b>В.</b> Боковій зліва
С	<b>С.</b> Вузечки язика
D	<b>D.</b> Вздовж щелепно-під'язикової лінії
Е	<b>Е.</b> 34 і 43 з орального боку
№	<b>31.</b> . крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	При виготовленні повного знімного протезу після отримання анатомічних відбитків проводиться припасування індивідуальної ложки. Який матеріал необхідно використати для функціонального оформлення її країв?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Ортокор
В	<b>В.</b> Хромопан
С	<b>С.</b> Тіодент
D	<b>D.</b> Гіпс
Е	<b>Е.</b> Стомальгін
№	<b>32.</b> . крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 75-ти років скаржиться на неможливість користування повним знімним протезом на нижній щелепі. Об'єктивно: місяць тому виготовлено протез, гострі кісткові виступи по альвеолярному відростку, виражена коса лінія. Який план лікування?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Виготовити протез з еластичною підкладкою
В	<b>В.</b> Протез з металевим базисом
С	<b>С.</b> Протез з розширеними межами
D	<b>D.</b> Протез із безколірної пластмаси

Е	Е. Протез з укороченими межами
№	33. крок 2011, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 70-ти років з повною відсутністю зубів виготовляються повні знімні протези. Проводиться постановка штучних зубів за сферичною поверхнею. Яка середня величина радіусу сферичної поверхні забезпечить щільний контакт зубів під час рухів нижньої щелепи?
Правильна відповідь	<b>А.</b> 9 см
В	<b>В.</b> 5 см
С	<b>С.</b> 7 см
Д	<b>Д.</b> 12 см
Е	<b>Е.</b> 18 см
№	34. . крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 65-ти років скаржиться на відлам трьох фронтальних фарфорових штучних зубів у знімному протезі, виготовленому 2 місяці тому. За рахунок яких пристосувань фарфорові зуби з'єднуються з пластмасовим базисом протеза?
Правильна відповідь	<b>А.</b> За допомогою клямпов
В	<b>В.</b> За допомогою клею
С	<b>С.</b> За рахунок фізико-хімічного з'єднання
Д	<b>Д.</b> За допомогою замкового кріплення
Е	<b>Е.</b> За допомогою діаторичних порожнин
№	35. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 70-ти років звернувся зі скаргами на відсутність усіх зубів верхньої і нижньої щелеп. Планується виготовлення повного знімного зубного протезу для нижньої щелепи. Об'єктивно: альвеолярний відросток нижньої щелепи атрофований тільки у фронтальній ділянці. Визначте тип атрофії нижньої щелепи за Келером:
Правильна відповідь	<b>А.</b> IV
В	<b>В.</b> II

С	С. І
D	D. III
E	E. -
№	36. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворому 75-ти років виготовляється повний знімний протез на верхню щелепу. Під час припасування індивідуальної ложки за методикою Гербста лікар виявив, що ложка скидається під час витягання губ трубочкою. На якій ділянці слід провести корекцію ложки?
Правильна відповідь	A. Вестибулярно між іклами
B	B. Дистально по лінії А
С	C. У ділянці щічних тяжів
D	D. По всьому вестибулярному краю
E	E. Позаду верхньощелепних горбів
№	37. крок 2010, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 55-ти років з'явився на повторний прийом до лікаря-стоматолога. Йому виготовляються повні знімні пластинкові протези на верхню та нижню щелепи. Під час попереднього відвідування у хворого були отримані повні анатомічні відбитки з обох щелеп і передані зубному техніку. Які маніпуляції повинен провести лікар під час наступного клінічного етапу?
Правильна відповідь	A. Припасувати індивідуальні ложки
B	B. Визначити і зафіксувати центральну оклюзію
С	C. Провести перевірку конструкції протезів у порожнині рота
D	D. Провести корекцію протезів та дати настанови хворому
E	E. Виготовити прикусні валики
№	38. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>

Текст завдання	Хворому 75 років. Під час перевірки конструкції повних знімних протезів виявлено, що контактують лише бічні штучні зуби, між фронтальними зубами - щілина. В бокових ділянках з одного боку відзначається горбиково-горбиковий міжзубний контакт, з іншої - горизонтальна щілина; центральна лінія зміщена. Яка помилка була допущена?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Визначена бокова оклюзія
B	<b>B.</b> Нерівномірно розм'якшені прикусні валики
C	<b>C.</b> Визначена передня оклюзія
D	<b>D.</b> Збільшена міжальвеолярна висота
E	<b>E.</b> Деформація воскових шаблонів під час визначення центральної оклюзії
№	<b>39.</b> крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 65-ти років скаржиться на незадовільну фіксацію повного знімного пластинкового протеза на верхній щелепі. Протез було виготовлено вперше 6 років тому. Об'єктивно: відзначається балансуювання і погана фіксація знімного протеза. Що стало причиною такого стану?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Атрофія кісткової основи тканин протезного ложа
B	<b>B.</b> Стирання штучних зубів
C	<b>C.</b> Поганий гігієнічний стан знімного протеза
D	<b>D.</b> Зміна кольору базисної пластмаси
E	<b>E.</b> Втрата окремих зубів-антагоністів
№	<b>40.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 79-ти років звернулася до лікаря з метою заміни протеза. В анамнезі - перенесений інсульт. Об'єктивно: різка нерівномірна атрофія альвеолярних відростків верхньої і нижньої щелеп, слизова оболонка порожнини рота суха, малорухома. Попередні протези не фіксуються. Яка конструкція протеза найбільш доцільна?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Протези з еластичною підкладкою
B	<b>B.</b> Протези з розширеними межами
C	<b>C.</b> Протез із металевими базисами
D	<b>D.</b> Протези з вкороченими межами
E	<b>E.</b> Протези на імплантатах

№	41. крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворому під час протезування повними знімними протезами проводиться вивірення оклюзійних співвідношень при різних рухах нижньою щелепою. Функція якого м'язу обумовлює трансверзальні рухи нижньої щелепи?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Зовнішній (латеральний) крилоподібний м'яз
B	<b>B.</b> Внутрішній (медіальний) крилоподібний м'яз
C	<b>C.</b> Скроневий м'яз
D	<b>D.</b> Жувальний м'яз
E	<b>E.</b> Двочеревцевий м'яз
№	42. крок 2008, 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 65-ти років скаржиться на біль у ділянці слизової оболонки твердого піднебіння з лівого боку, який посилюється при користуванні повним знімним протезом під час вживання їжі. Вважає себе хворим 1,5 місяця. Об'єктивно: гіперемія та набряк слизової оболонки твердого піднебіння ліворуч; на межі дистального краю протеза знаходиться виразка, краї та дно її щільні, оточуючі тканини інфільтровані. Дно виразки горбисте, вкрите фібринозним нальотом; пальпація виразки болісна. Який з методів обстеження найдоцільніше застосувати в першу чергу?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Біопсія
B	<b>B.</b> Бактеріоскопія
C	<b>C.</b> Цитологія
D	<b>D.</b> Алергологічна контактна проба на пластмасу
E	<b>E.</b> Серологічні реакції
№	43. . крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворому 70-ти років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Постановка штучних зубів проводиться за методом Васильєва. Які зуби у верхньому протезі не повинні торкатися скла?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Латеральні різці та другі моляри
B	<b>B.</b> Центральні різці та перші моляри



С	С. Перші та другі премоляри
D	D. Ікла та перші моляри
Е	Е. Другі премоляри та перші моляри
№	44. крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий звернувся в стоматологічну клініку з метою протезування. Об'єктивно: повна відсутність зубів на нижній щелепі. Різка та рівномірна атрофія альвеолярної частини. Прикріплення вуздечок та розташування складок високе. Визначте тип атрофії беззубої нижньої щелепи за Келером:
Правильна відповідь	<b>A. II тип</b>
B	<b>B. I тип</b>
С	<b>C. III тип</b>
D	<b>D. IV тип</b>
Е	<b>E. V тип</b>
№	45. крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	На етапі припасовки індивідуальної ложки проводяться проби Гербста. Які м'язи обумовлюють зміщення індивідуальної ложки при проведенні функціональної проби - поперемінний дотик кінчиком язика до правої або лівої щік?
Правильна відповідь	<b>A. Щелепно-під'язикові</b>
B	<b>B. Двочеревцеві, підборідно-під'язикові</b>
С	<b>C. Підборідні та круговий м'яз рота</b>
D	<b>D. Мімічні м'язи</b>
Е	<b>E. Жувальні м'язи</b>
№	46. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>

Текст завдання	Жінка 65-ти років, якій виготовлено повний знімний протез на нижню щелепу, скаржиться на печіння, набряк слизової оболонки. Раніше пацієнтка протезувалася пластинковими протезами із пластмаси. Об'єктивно: слизова оболонка альвеолярного відростка нижньої щелепи, губ, щік, язика гіперемована. Спостерігається набряк нижньої губи. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Алергічний протезний стоматит
B	<b>B.</b> набряк Квінке
C	<b>C.</b> Травматичний протезний стоматит
D	<b>D.</b> Реакція слизової оболонки на протезування
E	<b>E.</b> Синдром Стівенса-Джонса
№	47. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Для виготовлення повного знімного протезу на верхню щелепу хворому 65-ти років необхідно отримати функціональний відбиток. Об'єктивно: різка рівномірна атрофія альвеолярного відростка верхньої щелепи, піднебіння плоске, торус різко виражений, горби верхньої щелепи атрофовані, екзостози в ділянці 13, 23 розміром 5x5 мм. Слизова оболонка в ділянці торуса і екзостозів стоншена, атрофована, на решті протезного ложа - помірно піддатлива. Який тип відбитку найбільш доцільний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Диференційований функціонально-присмоктувальний
B	<b>B.</b> Компресійний функціональний
C	<b>C.</b> Декомпресійний функціонально-присмоктувальний
D	<b>D.</b> Присмоктувальний під жувальним тиском
E	<b>E.</b> Компресійний під жувальним тиском
№	48. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворій 47-ми років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. На етапі перевірки їх конструкції спостерігається випинання верхньої губи. На якому етапі допущена помилка?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Формування вестибулярної поверхні прикусного валика
B	<b>B.</b> Визначення висоти верхнього прикусного валика
C	<b>C.</b> Формування оклюзійної площини
D	<b>D.</b> Визначення висоти нижньої третини обличчя

Е	Е. Фіксація центральної оклюзії
№	49. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 65-ти років з повною втратою зубів на нижній щелепі та вираженою атрофією альвеолярного відростка, і у зв'язку з цим - поганою фіксацією протеза, проведена імплантація за двофазною методикою, встановлені опорні головки. Через який термін слід починати протезування даного хворого?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Через 14 днів
В	<b>В.</b> Через 5 днів
С	<b>С.</b> Через 20 днів
Д	<b>Д.</b> Через 30 днів
Е	<b>Е.</b> Через 60 днів
№	50. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 65-ти років скаржиться на неможливість пережовування їжі у зв'язку з повною відсутністю зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: альвеолярні відростки та горби атрофовані, піднебіння плоске, розташування тяжів та вуздечок посередині альвеолярного відростка, торус незначно виражений, слизова оболонка атрофована, витончена, малопіддатлива. Якому типу беззубих щелеп відповідає клінічна картина верхньої щелепи?
Правильна відповідь	<b>А.</b> 2 тип за Шредером
В	<b>В.</b> 3 тип за Шредером
С	<b>С.</b> 4 тип за Дойніковим
Д	<b>Д.</b> 1 тип за Оксманом
Е	<b>Е.</b> 2 тип за Оксманом
№	51. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 65-ти років звернулася зі скаргами на відсутність всіх зубів на верхній та нижній щелепах. При огляді ротової порожнини виявлено: альвеолярний відросток беззубої нижньої щелепи різко атрофований у фронтальній ділянці та виражений у дистальній ділянці. Який тип атрофії за класифікацією Келлера?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Четвертий

B	<b>B.</b> Другий
C	<b>C.</b> Перший
D	<b>D.</b> Третій
E	<b>E.</b> Перший та третій
№	<b>52.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 54-х років скаржиться на постійне відчуття печіння в ділянці слизової оболонки протезного ложа, сухість у роті. Об'єктивно: в порожнині рота повні знімні протези. Встановлено діагноз: алергічний стоматит. Яка клінічна картина крові підтверджує цей діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Лейкопенія, лімфоцитоз, моноцитоз
B	<b>B.</b> Лейкоцитоз, еритропенія, прискорення ШЗЕ
C	<b>C.</b> Лейкопенія, моноцитоз, прискорення ШЗЕ
D	<b>D.</b> Лейкоцитоз, лімфоцитоз, моноцитоз
E	<b>E.</b> Еритропенія, моноцитоз, прискорення ШЗЕ
№	<b>53.</b> крок 2016, 2015, 2011, 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 40-ка років звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, рухливість зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи, підвищену чутливість шийок зубів у цій ділянці. На рентгенограмі у ділянці 42, 41, 31, 32 мають місце розширена періодонтальна щілина, резорбція кісткової тканини альвеолярного відростка виражена на 1/3 довжини коренів. 42, 32 мають рухливість I ступеня, 41, 31 II ступеня. Яку тимчасову шину необхідно застосувати для фронтальної стабілізації зубного ряду?
Правильна відповідь	<b>A.</b> За Навотним
B	<b>B.</b> Мамлока
C	<b>C.</b> Треумана
D	<b>D.</b> Когана
E	<b>E.</b> Копейнина
№	<b>54.</b> крок 2016, 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ПОВНЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>

Текст завдання	Пацієнт 46ти років звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, рухливість зубів, підвищену чутливість у ділянці шийок зубів. Об'єктивно: присутні усі зуби, вони мають 12 ступінь рухливості, патологічні зубоясенні кишені з серозним вмістом. На рентгенограмі наявне розширення періодонтальної щілини, резорбція кісткової тканини альвеолярного відростка відбулася на 1/31/2 довжини кореня. Яку шину необхідно запропонувати пацієнту для стабілізації зубного ряду?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Ельбрехта
B	<b>B.</b> Тигерштедта
C	<b>C.</b> Порта
D	<b>D.</b> Ванкевич
E	<b>E.</b> Васильєва
№	<b>1.</b> крок 2016, 2014, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворий 63-х років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі, утруднене жування, гугнявість. Об'єктивно: відсутні 18, 16, 15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47 зуби, післяопераційний серединний дефект твердого піднебіння. Прийняте рішення виготовити бюгельний протез із обтуруючою частиною. На якій частині бюгельного протезу переважніше розташувати обтуруючу частину?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Дуга бюгельного протезу
B	<b>B.</b> Сітка бюгельного протезу
C	<b>C.</b> Штучні зуби
D	<b>D.</b> Базис бюгельного протезу
E	<b>E.</b> Кламери
№	<b>2.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворому 48ми років виготовляється протез на нижню щелепу. Об'єктивно: відсутні 48, 45, 44, 43, 35, 36, 37 зуби. 38 зуб має нахил в бік щоки. Межева лінія проходить високо на вестибулярній поверхні зуба і низько на оральній. Який тип кламера системи Нея слід використати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> П'ятий
B	<b>B.</b> Перший
C	<b>C.</b> Третій

D	D. Другий
E	E. Четвертий
№	3. крок 2016, 2015
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хвора 45ти років звернулась в ортопедичне відділення з приводу часткової адентії нижньої щелепи у боковій ділянці. Пацієнтка категорично відмовляється від препарування опорних зубів. Який метод обстеження є найбільш інформативним для вибору хірургічної методики і подальшого протезування?
Правильна відповідь	A. Комп'ютерна томографія
B	B. Одонтопародонтографія
C	C. Прицільна рентгенографія
D	D. Цефалометрична рентгенографія у боковій проекції
E	E. Пальпація
№	4. крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 66-ти років звернувся в клініку з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрана конструкція часткового знімного пластинкового протеза. Для зняття відбитків застосували альгінатний відбитковий матеріал "Стомальгин04". Протягом якого часу необхідно відлити модель?
Правильна відповідь	A. До 15 хвилин
B	B. До 30 хвилин
C	C. До 1 година
D	D. До 24 години
E	E. Немає значення
№	5. крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Чоловік 28-ми років звернувся до лікаря з приводу протезування. Об'єктивно: відсутні 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Коронки 18, 13, 23, 28 зубів високі, екватори виражені. Яку конструкцію протеза найдоцільніше використати в цьому випадку?
Правильна відповідь	A. Бюгельний протез

B	<b>B.</b> Адгезивні мостоподібні протези
C	<b>C.</b> Штампованоопаяні мостоподібні протези
D	<b>D.</b> Металокерамічний протез з опорою на 23, 28 та 13, 18 зуби
E	<b>E.</b> Частковий знімний пластинковий протез
№	<b>6.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворому 53х років виготовлений частковий пластинковий протез на нижню щелепу. Об'єктивно: відсутні 4843, 3438, 18, 28. Зуби інтактні, стійкі. Ортогнатичний прикус. При перевірці конструкції протезу у порожнині рота природні зуби знаходяться в оклюзії, а між штучними і верхніми зубами щілина. На якому етапі протезування була допущена помилка?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Визначення центральної оклюзії
B	<b>B.</b> Встановлення штучних зубів
C	<b>C.</b> Виготовлення моделей
D	<b>D.</b> Виготовлення воскового базису і прикусних валиків
E	<b>E.</b> Отримання відбитків
№	<b>7.</b> крок 2015, 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	На другий день після фіксації часткових пластинкових протезів хворий скаржиться на печіння в порожнині рота, неприємний присмак під час користування протезами. При огляді - слизова оболонка гіперемована. Гіперсалівація. Перед виготовленням нових протезів користувався старими 5 років. Схожих скарг не було. Яка можлива причина цього явища?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Наявність залишкового мономеру в базисі протезу
B	<b>B.</b> Алергічна реакція на компоненти базисної пластмаси
C	<b>C.</b> Порушення гігієни порожнини рота
D	<b>D.</b> Порушення правил користування протезами
E	<b>E.</b> Погана якість базисної пластмаси
№	<b>8.</b> крок 2015, 2012, 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>

Текст завдання	Хворому до видалення зубів необхідно виготовити безпосередній протез. При його виготовленні на гіпсовій моделі зрізають зуби і формують альвеолярний відросток, надаючи йому округлої форми. Який прошарок гіпсу необхідно зрізати при формуванні альвеолярного відростка?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Не більше 2 мм
B	<b>B.</b> 4 мм
C	<b>C.</b> У залежності від форми альвеолярного відростка
D	<b>D.</b> Не має значення
E	<b>E.</b> 5-6 мм
№	<b>9.</b> крок 2015, 2014, 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 35-ти років звернулась у клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об'єктивно: присутні 18, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 28 зуби. Коронки, що обмежують дефект, високі, стійкі. Для відновлення цілісності зубного ряду планується виготовлення суцільнолитого бюгельного протезу. Який вид механічного фіксатора доцільно застосувати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Балкове кріплення
B	<b>B.</b> Опорно-утримуючі кламери
C	<b>C.</b> Утримуючі кламери
D	<b>D.</b> Телескопічне кріплення
E	<b>E.</b> Дентоальвеолярні кламери
№	<b>10.</b> крок 2014, 2012
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 54-х років скаржиться на больові відчуття у бічній ділянці нижньої щелепи з язикового краю зліва, що виникають при рухах язика. 2 дні тому пацієнту був зданий частковий знімний протез на нижню щелепу з кламерною фіксацією на 47, 42, 33 зуби. На слизовій оболонці в ретроальвеолярній області визначається локалізована ділянка гіперемії, яка відповідає краю протеза. Яке анатомічне утворення визначає межу протеза в цій ділянці?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Внутрішня коса лінія
B	<b>B.</b> Зовнішня коса лінія
C	<b>C.</b> Підборідна ость



D	<b>D.</b> Крилоподібна горбистість
E	<b>E.</b> Язикова ямка
№	<b>11.</b> . крок 2014
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворому 60-ти років виготовляють частковий знімний протез на верхню щелепу. Визначена центральна оклюзія. Який наступний етап протезування?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Перевірка воскової конструкції протеза
B	<b>B.</b> Накладання протеза
C	<b>C.</b> Виготовлення гіпсових моделей
D	<b>D.</b> Корекція протеза
E	<b>E.</b> Одержання відбитків
№	<b>12.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворому 58-ми років виготовлено знімний частковий протез для верхньої щелепи. Під час оцінки якості його виготовлення виявлено дрібні булькові пори по всій товщі базису. Що спричи
Правильна відповідь	нило утворення пор?
B	<b>A.</b> Швидке зростання температури при полімеризації пластмаси
C	<b>B.</b> Використання пластмаси з минулим терміном придатності
D	<b>C.</b> Велика товщина пластмаси
E	<b>D.</b> Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси
	<b>E.</b> Мала товщина пластмаси
№	<b>13.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворий 47-ми років скаржиться на втрату зубів на нижній щелепі. Об'єктивно: 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38 зуби відсутні. Решта зубів стійкі, однак екватор слабковиражений. 45, 44, 35 зуби нахилені вестибулярно. Які кламери доцільно використати у конструкції бюгельного протезу у даного хворого?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Кламер Нея 4 типу
B	<b>B.</b> Кламер Нея 1 типу

C	C. Кламер Нея 2 типу
D	D. Кламер Нея 3 типу
E	E. Кламер Нея 5 типу
№	14. крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 45-ти років звернувся до клініки зі скаргами на відсутність зубів на нижній щелепі справа. Об'єктивно: відсутні 46, 45, 38, 48. 47 зуб рухливий (I ступінь), коронка 44 зуба зруйнована на 1/2. Яку ортопедичну конструкцію доцільно рекомендувати хворому з метою відновлення жувальної ефективності та профілактики перевантаження пародонта 47, 44 зубів?
Правильна відповідь	A. Дуговий протез із кламерною фіксацією на 47, 44, 34 зуби
B	B. Паяний мостоподібний протез із опорою на 48, 44 зуби
C	C. Металокерамічний мостоподібний протез із опорою на 47, 46 зуби
D	D. Мостоподібний протез із однобічною опорою на 47 зуб
E	E. Малий сідлоподібний протез із кламерною фіксацією на 47, 44 зуби
№	15. крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворому з частковою адентією нижньої щелепи стоматолог знімає відтиск "Стомальгіном". Після виведення відбитку з ротової порожнини лікар залишив його на столику на кілька годин. Яке фізичне явище відбулося з відбитковою масою за даний проміжок часу?
Правильна відповідь	A. Синерезис
B	B. Полімеризація
C	C. Когезія
D	D. Адгезія
E	E. Сублімація
№	16. . крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Після звільнення полімерного протезу із кювети виявлено значне прилипання шару гіпсу. Яка технологічна помилка була допущена зубним техніком при заміні воску пластмасою?

Правильна відповідь	<b>A.</b> Ненанесення ізоляційного лаку на гіпсову поверхню
B	<b>B.</b> Порушення співвідношення мономер-полімер
C	<b>C.</b> Недостатній об'єм заформованої в кювету пластмаси
D	<b>D.</b> Різкий підйом температури під час полімеризації
E	<b>E.</b> Різде охолодження після полімеризації
№	<b>17.</b> крок 2013
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хвора 48-ми років звернулася в клініку з метою протезування. Об'єктивно: відсутність 47, 46, 45. Рухомість I-II ступеня 44, 43, 42, 41. Яка ортопедична конструкція найбільш доцільна в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Умовно-знімний мостоподібний протез із опорою 44, 43, 42, 41
B	<b>B.</b> Консольний мостоподібний протез із опорою на 44, 43
C	<b>C.</b> Частковий знімний протез із опорою кламера на 44
D	<b>D.</b> Частковий знімний протез із дентоальвеолярним кламером
E	<b>E.</b> Бюгельний протез із опорою на 44
№	<b>18.</b> крок 2012, 2011
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Жінці 56-ти років виготовляється частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу. Об'єктивно: зуби інтактні, стійкі. Прикус ортогнатичний. Під час перевірки конструкції протезу в порожнині рота між природніми зубами є щілина, штучні зуби змикаються. На якому етапі протезування була допущена помилка?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Визначення центральної оклюзії
B	<b>B.</b> Отримання відбитків
C	<b>C.</b> Виготовлення моделей
D	<b>D.</b> Виготовлення воскового базису з прикусними валиками
E	<b>E.</b> Постановка штучних зубів
№	<b>19.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворому 54-х років планується виготовлення бюгельного протеза на верхню щелепу з балковою фіксацією. За якої умови вона може бути застосована?

Правильна відповідь	<b>A.</b> Високі клінічні коронки опорних зубів
B	<b>B.</b> Низькі клінічні коронки опорних зубів
C	<b>C.</b> Виражений екватор коронок опорних зубів
D	<b>D.</b> Глибоке піднутріння в ділянці опорних зубів
E	<b>E.</b> Конвергенція опорних зубів
№	<b>20.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Жінка 47-ми років звернулася з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрана конструкція часткових знімних протезів на верхню і нижню щелепи. Під час перевірки конструкції протеза виявилось, що міжзубний контакт у бічних ділянках спостерігається лише справа, зліва - щілина між зубами. Яка помилка допущена під час клінічних етапів?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Визначили бокову оклюзію
B	<b>B.</b> Отримали неточні відбитки
C	<b>C.</b> Визначили передню оклюзію
D	<b>D.</b> Завищили прикус у боковій ділянці зліва
E	<b>E.</b> Деформували базис під час визначення центральної оклюзії
№	<b>22.</b> крок 2012
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворій 45-ти років виготовлено бюгельний протез на верхню щелепу. Об'єктивно: зубна формула 17,16-13,12,11/21,22,23-28. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. При перевірці каркасу протеза для забезпечення високих функціональних цінностей оцінюється ширина розширеної дуги. Який з перелічених показників найбільш правильний?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 1,5-2 см
B	<b>B.</b> 0,5 см
C	<b>C.</b> 1 см
D	<b>D.</b> 4 см
E	<b>E.</b> 5 см
№	<b>23.</b> крок 2011, 2009

ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на відсутність 37, 36, 45, 46, 47. Об'єктивно: зуби 35, 38, 44, 48 інтактні, стійкі, коронки анатомічної форми, досить високі, відносно паралельні між собою. Межова лінія має типовий напрямок проходження по 35, 44 опорних зубах. Який фіксуючий елемент необхідно використати в бюгельному протезі з опорою на 35, 44?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Кламер Аккера
В	<b>В.</b> Кламер Роуча
С	<b>С.</b> Кламер Джексона
D	<b>D.</b> Телескопічну фіксацію
Е	<b>Е.</b> Гнутий дротяний кламер
№	<b>24.</b> крок 2011, 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 58-ми років звернувся з приводу протезування. Об'єктивно: присутній 22 зуб, стійкий, інтактний. Альвеолярний гребінь атрофований, піднебіння пласке. Планується виготовлення знімного протезу. Яка тактика лікаря по відношенню до 22 зуба?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Виготовити телескопічну коронку
В	<b>В.</b> Залишити
С	<b>С.</b> Депульпувати
D	<b>D.</b> Видалити
Е	<b>Е.</b> Виготовити куксову коронку
№	<b>25.</b> . крок 2011, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворому 39-ти років потрібно виготовити бюгельний протез на нижню щелепу з фарфоровими зубами. Яким методом потрібно користуватись при заміні воску на пластмасу, щоб уникнути грату, що в свою чергу приведе до підвищення прикусу?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Метод ливарного пресування

B	<b>B.</b> Прямий метод компресійного пресування
C	<b>C.</b> Зворотний метод компресійного пресування
D	<b>D.</b> Комбінований метод компресійного пресування
E	<b>E.</b> У воді під тиском
№	<b>26.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хвора 50-ти років звернулась з метою протезування. Об'єктивно: відсутні 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27 зуби. Стан опорних зубів задовільний. Який тип кріплення забезпечить найкращі умови для стабілізації знімного протеза?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Площинне
B	<b>B.</b> Сагітальне
C	<b>C.</b> Трансверзальне
D	<b>D.</b> Лінійне
E	<b>E.</b> Точкове
№	<b>27.</b> крок 2011, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворому 38-ми років виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу. На етапі виготовлення передбачається створення вогнетривкої моделі. Яку масу можна застосувати для дублювання?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гелін
B	<b>B.</b> Стомапласт
C	<b>C.</b> Стомальгін
D	<b>D.</b> Ортокор
E	<b>E.</b> Дентафоль
№	<b>28.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>

Текст завдання	У хворого рухомість зубів 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 I-II ступеня; 47, 46, 45, 34, 35, 36, 37 зуби відсутні. Який протез можна застосувати в даному випадку, щоб запобігти подальшому розвитку захворювання?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Бюгельний протез з багатоланковим кламером
B	<b>B.</b> Бюгельний протез з атачменами без багатоланкового кламеру
C	<b>C.</b> Мостоподібний консольний протез з опорою на 43, 42, 32, 33 і проміжною частиною 45, 35
D	<b>D.</b> Мостоподібний протез з опорою на 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 і проміжною частиною 46, 45, 34, 35, 36
E	<b>E.</b> Пластмасовий частковий знімний протез
№	<b>30.</b> крок 2011, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хвора 45-ти років звернулася з метою протезування. Працює диктором на телебаченні. Об'єктивно: зубний ряд нижньої щелепи безперервний, на верхній щелепі кінцевий та включений дефекти в бічних ділянках. Зуби, що залишилися 18, 17, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 стійкі. Які фіксуючі елементи бюгельного протезу слід застосувати з косметичною метою?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Атачмени і балкову систему
B	<b>B.</b> Телескопічні коронки
C	<b>C.</b> Кламери системи Нея
D	<b>D.</b> Кламери Джексона і Боніхарта
E	<b>E.</b> Дентоальвеолярні кламери
№	<b>31.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 45-ти років, актор, скаржиться на значну рухомість зубів, біль у нижній щелепі у фронтальній ділянці ясни, віялоподібне розходження зубів. Об'єктивно: 31, 32 - рухомість III ступеня, глибина ясеневих кишень до 5 мм. Запропоновано видалення зубів. Який вид протезування слід запропонувати хворому?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Безпосереднє

B	<b>B.</b> Тимчасове
C	<b>C.</b> Комбіноване
D	<b>D.</b> Постійне
E	<b>E.</b> Віддалене
№	<b>32.</b> . крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворий звернувся з метою протезування. Відсутні 17, 27. На нижній щелепі відсутні усі зуби, крім 47. Якому класу за Кенеді відповідає дана клінічна ситуація?
Правильна відповідь	<b>A.</b> II
B	<b>B.</b> III
C	<b>C.</b> IV
D	<b>D.</b> V
E	<b>E.</b> I
№	<b>33.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Пацієнт 52-х років скаржиться на больові відчуття у бічній ділянці нижньої щелепи з язикового краю зліва, що виникають при рухах язика. 2 дні тому пацієнту був виготовлений частковий знімний протез на нижню щелепу з кламерною фіксацією на 47, 42, 33 зубах. На слизовій оболонці в ретроальвеолярній ділянці визначається локалізована ділянка гіперемії, яка відповідає краю протеза. Яке анатомічне утворення визначає межу протеза в цій ділянці?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Внутрішня коса лінія
B	<b>B.</b> Зовнішня коса лінія
C	<b>C.</b> Підборідна ость
D	<b>D.</b> Крилоподібна горбистість
E	<b>E.</b> Язикова ямка
№	<b>34.</b> . крок 2011



ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	До клініки ортопедичної стоматології з метою протезування звернувся хворий 30-ти років, який страждає на епілептичні напади. Об'єктивно: відсутні 48, 47, 35, 36. Решта зубів інтактні. Прикус ортогнатичний. Який вид зубного протеза необхідно запропонувати хворому?
Правильна відповідь	<b>А. Незнімний металевий мостоподібний протез з опорою на 34 і 37</b>
В	<b>В. Частковий знімний пластинковий протез на нижню щелепу</b>
С	<b>С. Бюгельний протез на нижню щелепу</b>
Д	<b>Д. Адгезивний мостоподібний протез</b>
Е	<b>Е. Пластмасовий мостоподібний протез</b>
№	<b>35. крок 2010</b>
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 58-ми років внаслідок травми та опіку обличчя утворилося значне звуження ротового отвору. Хворому показане виготовлення часткового знімного протеза. Яку конструкцію протеза бажано використати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>А. Протез, що складається</b>
В	<b>В. Бюгельний протез з фіксацією на кламерах</b>
С	<b>С. Бюгельний протез з фіксацією на атачменах</b>
Д	<b>Д. Шарнірний знімний протез</b>
Е	<b>Е. Звичайний частковий знімний пластинковий протез</b>
№	<b>36. крок 2010</b>
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 60-ти років внаслідок поранення утворився великий дефект носа. Від хірургічного лікування хворий тимчасово відмовився, йому було запропоновано виготовлення ектопротезу носа, який утримується за допомогою оправки окулярів. Якою відбитковою масою необхідно отримати відбиток у даного хворого?
Правильна відповідь	<b>А. Гіпсовий з усього обличчя</b>
В	<b>В. Термопластичною з усього обличчя</b>

C	C. Еластичною з дефекту
D	D. Термопластичною з дефекту
E	E. Еластичною з усього обличчя
№	37. . крок 2010, 2009, 2008, 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Через 3 місяці після безпосереднього протезування хворий звернувся зі скаргами на балансування протезу. Об'єктивно: між краєм протезу і вестибулярною поверхнею альвеолярного відростка з'явилася щілина. Яка тактика лікаря?
Правильна відповідь	A. Виготовлення нового протезу
B	B. Корекція країв протезу
C	C. Перебазування протезу пластмасою, що швидко твердіє
D	D. Нарощування зубних рядів пластмасою, що швидко твердіє
E	E. Корекція зубних рядів
№	38. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 48-ми років 3 місяці користується частковими знімними протезами. На основі скарг пацієнта, даних об'єктивного обстеження та додаткових методів дослідження поставлено діагноз: алергічний стоматит, спричинений барвниками акрилової пластмаси протезу. Яким чином слід усунути алергічну дію барвників?
Правильна відповідь	A. Виготовити протези з безколірної пластмаси
B	B. Виготовити двошарові базиси
C	C. Заформувати пластмасу методом литва
D	D. Виготовити литі металеві базиси протезів
E	E. Виготовити штамповані металеві базиси
№	39. крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>

Текст завдання	Пацієнтці 48-ми років користування верхньощелепним бюгельним протезом на еластичних атачменах не приносить комфорту, відзначає рухливість протеза під час пережовування їжі та артикуляції. Хвора просить зробити нові протези з урахуванням вказаних недоліків. Клінічні коронки опорних зубів низькі. Яка система фіксації найбільш доцільна в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Телескопічна
B	<b>B.</b> Балочна
C	<b>C.</b> Замкова
D	<b>D.</b> Сідлоподібна
E	<b>E.</b> Кламерна
№	<b>40.</b> крок 2010, 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту виготовляються часткові знімні пластинкові протези на верхню та нижню щелепи. З обох щелеп знято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом. Визначте найдоцільніші дії лікаря:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Передати відбитки для знезараження
B	<b>B.</b> Підсушити відбитки на відкритому повітрі
C	<b>C.</b> Запросити зубного техника для сумісної оцінки відбитків
D	<b>D.</b> негайно передати відбитки до лабораторії
E	<b>E.</b> Зберігати відбитки 90 хвилин в мікротеновому пакеті
№	<b>41.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 56-ти років звернувся до клініки зі скаргами на відсутність бічних зубів на нижній щелепі з обох боків. Об'єктивно: у хворого відсутні 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Дефект зубного ряду I кл за Кеннеді
B	<b>B.</b> Дефект зубного ряду IV кл за Кеннеді
C	<b>C.</b> Дефект зубного ряду II кл за Кеннеді
D	<b>D.</b> Дефект зубного ряду III кл за Кеннеді
E	<b>E.</b> Дефект зубного ряду II кл за Бетельманом

№	42. крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	У хворого 25-ти років свіжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення відламків. Усі зуби на щелепі збережені. Яку із зазначених дротяних шин доцільно застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гладку шину-скобу
B	<b>B.</b> Гладеньку шину з розпіркою
C	<b>C.</b> Шину з крючками
D	<b>D.</b> Шину з похилою площиною
E	<b>E.</b> Шину за Померанцевою-Урбанською
№	43. . крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 19-ти років скаржитися на біль у підборідному відділі нижньої щелепи. Напередодні отримав травму. Об'єктивно: незначна припухлість тканин у ділянці підборіддя. Рот відкривається достатньо. Зуби інтактні. Слизова оболонка у ділянці центральних різців набрякла, злегка кровить. Тут визначається рухомість фрагментів нижньої щелепи. Прикус не порушений. Яким чином слід надати допомогу хворому?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гладенькою шиною-скобою
B	<b>B.</b> Шиною із розпірковим вигином
C	<b>C.</b> Шиною із похилою площиною
D	<b>D.</b> Шинами із зачіпними петлями та міжщелепною фіксацією
E	<b>E.</b> Лігатурним зв'язуванням 31, 32, 42, 41 за Айві
№	44. крок 2009, 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>

Текст завдання	Хворий 48-ми років, вчитель, звернувся зі скаргами на значну рухомість 42, 41, 31, 32. Об'єктивно: шийки 42, 41, 31, 32 оголені на 2/3, патологічна рухомість III ступеня. Показано видалення 42, 41, 31, 32. Який вид протеза доцільно використати для проведення безпосереднього протезування?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Частковий знімний пластинковий
B	<b>B.</b> Бюгельний
C	<b>C.</b> Адгезивний
D	<b>D.</b> Металокерамічний мостоподібний
E	<b>E.</b> Штамповано-паяний мостоподібний
№	45. крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворий 53-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об'єктивно: наявні 13, 24 і всі зуби на нижній щелепі. Нижня третина обличчя вкорочена, коронки 13, 24 - стерті на 2/3. Який конструкційний елемент забезпечить оптимальну фіксацію часткового знімного протезу на верхній щелепі?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Телескопічні коронки
B	<b>B.</b> Опорно-підтримуючі кламери
C	<b>C.</b> Підтримуючі кламери
D	<b>D.</b> Штанги
E	<b>E.</b> Дентоальвеолярні кламери
№	46. . крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хворому 56-ти років виготовляється частковий знімний пластинковий протез. Об'єктивно: у ротовій порожнині на верхній щелепі відсутні 17, 16, 15, 14, 25, 26, 27, 28. На які зуби повинні спиратися плечі кламерів, щоб забезпечити трансверзальну кламерну лінію?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 13 та 24
B	<b>B.</b> 13 та 18
C	<b>C.</b> 24 та 18

D	<b>D.</b> 24, 13 та 18
E	<b>E.</b> -
№	<b>47.</b> . крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	До клініки ортопедичної стоматології звернулась жінка 56-ти років зі скаргами на біль під дугою бюгельного протезу. З анамнезу з'ясовано, що бюгель було накладено тиждень тому в іншому місті. Має місце механічна травма слизової оболонки піднебінного склепіння дугою бюгельного протезу. На якій відстані від піднебіння повинна знаходитись дуга бюгельного протезу, щоб запобігти цьому ускладненню?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 0,5 мм
B	<b>B.</b> 2 - 3 мм
C	<b>C.</b> 0,2 - 0,3 мм
D	<b>D.</b> 1,5 - 2,0 мм
E	<b>E.</b> 5 - 6 мм
№	<b>48.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт скаржиться на косметичний дефект. При огляді виявлено відсутність 21 зуба, коронки 11 та 22 зубів інтактні, мають високу коронкову частину, відносно паралельні. Препарувати зуби, робити імплантацію та користуватись знімним протезом пацієнт відмовився. Яку ортопедичну конструкцію потрібно виготовити?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Адгезивний протез
B	<b>B.</b> Бюгельний протез
C	<b>C.</b> Пластинковий протез
D	<b>D.</b> Імедіат-протез
E	<b>E.</b> Протез із поліпропілену
№	<b>49.</b> крок 2008

ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 47-ми років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами на відсутність зуба в фронтальній ділянці верхньої щелепи, косметичний дефект. Об'єктивно: прикус прямий, відсутній 11. З анамнезу: інфаркт міокарда 3 місяці тому. Яку конструкцію протеза необхідно застосувати на даний момент?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Частковий знімний пластинковий протез
B	<b>B.</b> Мостоподібний протез з опорою на 21 та 12
C	<b>C.</b> Мостоподібний протез з опорою на 21
D	<b>D.</b> Бюгельний протез
E	<b>E.</b> Імплантат
№	<b>50.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Хворий 64-х років звернувся з приводу протезування зубів. Об'єктивно: в ділянці відсутнього 15 зуба гострий кістковий виступ. Планується виготовлення часткового знімного протезу з двошаровим базисом. Яку пластмасу доцільно використовувати для еластичної підкладки?
Правильна відповідь	<b>A.</b> ПМ-01
B	<b>B.</b> Фторакс
C	<b>C.</b> Акріл
D	<b>D.</b> Протакріл
E	<b>E.</b> Бакріл
№	<b>51.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	У хворого 57-ми років відсутні 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38. Планується виготовлення бюгельного протезу. 48 зуб має нахил в язиковий бік та вперед. З язикового боку 48 зуба межова лінія має діагональну форму, з щічного - проходить низько на рівні ясеневого краю. Який тип кламера системи Нея слід застосувати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Кламер V типу
B	<b>B.</b> Кламер I типу

C	C. Кламер IV типу (позаду зворотної дії)
D	D. Кламер I-II типу
E	E. Кламер II типу
№	52. . крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	Хвора скаржиться на погіршення фіксації та часті поломки часткового пластинкового знімного протеза на нижню щелепу, яким користується 5 років. Об'єктивно: альвеолярна частина у беззубих ділянках значно атрофована, протез балансує. Яка найвірогідніша причина погіршення фіксації і частих поломок протеза?
Правильна відповідь	A. Атрофія альвеолярного відростка
B	B. Неправильне зберігання протеза
C	C. Користування протезом під час сну
D	D. Вживання твердої їжі
E	E. Стирання штучних зубів
№	53. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>
Текст завдання	У пацієнта 45-ти років однібічний кінцевий дефект зубного ряду нижньої щелепи, що закінчується 45, планується замінити бюгельним протезом. Де слід розмістити оклюзійну накладку, щоб попередити функціональне перевантаження 45 зуба?
Правильна відповідь	A. У міжзубному проміжку між 44 та 45
B	B. У дистальній фісурі 44
C	C. У медіальній фісурі 44
D	D. У дистальній фісурі 45
E	E. Не має значення
№	54. крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u>
Тема	<u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u>



Текст завдання	Пацієнту 50-ти років виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Об'єктивно: присутні 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 зуби. Альвеолярний відросток у беззубих ділянках атрофованих. Яким чином треба нейтралізувати трансверзальні рухи протеза?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Застосувати безперервний кламер
B	<b>B.</b> Збільшити розміри сідла
C	<b>C.</b> Збільшити ширину дуги
D	<b>D.</b> Зменшити ширину дуги
E	<b>E.</b> Зменшити розміри сідла
№	<b>55.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворий 65-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі, утруднене жування, гугнявість. Об'єктивно: відсутні 18, 16, 15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47, післяопераційний серединний дефект твердого піднебіння. Прийняте рішення виготовити бюгельний протез з обтуруючою частиною. На якій частині бюгельного протеза бажано розмістити обтуруючу частину?
Правильна відповідь	<b>A.</b> На дузі
B	<b>B.</b> На сітці
C	<b>C.</b> На штучних зубах
D	<b>D.</b> На базисі
E	<b>E.</b> На кламерах
№	<b>56.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b><u>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</u></b>
Текст завдання	Хворий 60-ти років звернувся зі скаргами на часті поломки знімного пластинкового протеза. З анамнезу відомо, що хворий страждає на бруксизм. З якого матеріалу рекомендується виготовлення базису протеза з метою профілактики поломок знімного пластинкового протеза?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Метал (КХС)
B	<b>B.</b> Етакрил
C	<b>C.</b> Ортосил М

D	<b>D.</b> Фторакс
E	<b>E.</b> Редонт
№	<b>57.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 70-ти років звернулася з метою протезування. Об'єктивно: альвеолярні відростки рівномірно атрофовані, у ділянці 14, 43, 33 великі екзостози. Торус виражений. Кісткові виступи вкриті тонкою, прозорою, сильно атрофованою слизовою оболонкою. Решта ділянок слизової помірно піддатливі або сипкі. Якому функціональному відбитку слід надати перевагу у даному клінічному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Диференційований
B	<b>B.</b> Декомпресійний
C	<b>C.</b> Компресійний
D	<b>D.</b> Під жувальним тиском
E	<b>E.</b> Вид функціонального відбитку значення не має
№	<b>58.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЧАСТКОВЕ ЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ</b>
Текст завдання	Жінка 47-ми років звернулася з метою протезування. Після обстеження обрана конструкція часткових знімних протезів на верхню та нижню щелепи. Під час перевірки воскових репродукцій протезів виявилось, що міжзубний контакт у бічних ділянках спостерігається лише з правого боку, ліворуч - щілина між зубами. Яка помилка допущена під час клінічних етапів?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Визначили бічну оклюзію
B	<b>B.</b> Отримали неточні відбитки
C	<b>C.</b> Визначили передню оклюзію
D	<b>D.</b> Завищили міжальвеолярну висоту в бічній ділянці ліворуч
E	<b>E.</b> Деформували базис під час визначення центральної оклюзії
№	<b>59.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>

Тема	<b>ТЕМА</b>
Текст завдання	До клініки ортопедичної стоматології звернувся пацієнт 6-ти років зі скаргами на відсутність зубів у фронтальній ділянці на нижній щелепі, порушення функції жування, мови, естетичний дефект. Зуби видалені 1 рік тому з приводу захворювань пародонту. У порожнині рота: відсутні 31, 32, 41, 42, 43 зуби. 44, 45, 46 рухливі III ступеня, 34, 36, 37 рухливі III ступеня. Який вид протезування найбільш раціональний у цьому випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Бюгельний протез з елементами шинування
B	<b>B.</b> Незнімний мостоподібний протез з опорою на 34, 33, 44, 45
C	<b>C.</b> Незнімний мостоподібний протез з опорою на 33, 34, 35, 44, 45, 46
D	<b>D.</b> Зубні протези з використанням імплантатів
E	<b>E.</b> Частковий знімний протез з кламерною фіксацією на 37, 46 зуби
№	<b>1.</b> крок 2016
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Пацієнт 40ка років поступив у стаціонар з діагнозом: перелом нижньої щелепи з обмеженою рухливістю відламків. На рентгенограмі відзначається дефект кістки у фронтальній ділянці. На кожному відламку наявні по 3 стійких зуба. Який апарат доцільно застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Апарат Катца
B	<b>B.</b> Шина Вебера
C	<b>C.</b> Шина Збаржа
D	<b>D.</b> Шина Тігерштедта
E	<b>E.</b> Шина Ванкевич
№	<b>2.</b> крок 2015, 2014, 2013
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Хворий 70-ти років з повною втратою зубів на верхній щелепі і дефектом твердого піднебіння скаржить на утруднене вживання їжі, виливання рідкої їжі через ніс, часті хронічні захворювання слизової оболонки порожнини носа. Об'єктивно: альвеолярний відросток верхньої щелепи атрофований - I тип за Шредером, податливість слизової оболонки - I клас за Супле. На твердому піднебінні - рубцевозмінений дефект розміром 2x3 см. Яка конструкція протезу найбільш доречна в даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Повний знімний протез із системою внутрішнього і периферичного клапанів

<b>B</b>	<b>B.</b> Повний знімний протез із постановкою зубів на штучних яснах
<b>C</b>	<b>C.</b> М'який обтюратор і повний знімний протез
<b>D</b>	<b>D.</b> Повний знімний протез із потовщенням у ділянці дефекту
<b>E</b>	<b>E.</b> Повний знімний протез із металевим базисом і м'яким обтюратором

<b>№</b>	<b>3.</b> крок 2014
<b>ДИСЦИПЛІНА</b>	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
<b>Тема</b>	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
<b>Текст завдання</b>	Хворому 52-х років після односторонньої резекції верхньої щелепи виготовили безпосередній протез. Який термін користування ним?
<b>Правильна відповідь</b>	<b>A.</b> 1-3 місяці
<b>B</b>	<b>B.</b> 1-2 місяці
<b>C</b>	<b>C.</b> 7-12 місяців
<b>D</b>	<b>D.</b> 2-3 роки
<b>E</b>	<b>E.</b> 4-5 років

<b>№</b>	<b>4.</b> крок 2012
<b>ДИСЦИПЛІНА</b>	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
<b>Тема</b>	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
<b>Текст завдання</b>	Під час бойових дій при розгортанні зубопротезної лабораторії у спеціалізованому шпиталі для виготовлення зубних протезів виникла потреба в заміні зламаного апарату "Самсон". В якому комплекті він знаходиться?
<b>Правильна відповідь</b>	<b>A.</b> ЗТ-1
<b>B</b>	<b>B.</b> ЗТ-2
<b>C</b>	<b>C.</b> ЗТ-3
<b>D</b>	<b>D.</b> ЗП
<b>E</b>	<b>E.</b> ЗВ

<b>№</b>	<b>5.</b> крок 2012
<b>ДИСЦИПЛІНА</b>	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
<b>Тема</b>	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>

Текст завдання	Хворому 60-ти років для виготовлення ектопротезу необхідно отримати маску обличчя за Гіппократом. Який відбитковий матеріал слід використати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Гіпс
B	<b>B.</b> Дентафоль
C	<b>C.</b> Стомальгін
D	<b>D.</b> Стенс
E	<b>E.</b> Стомафлекс
№	<b>6.</b> . крок 2012, 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	При медичному огляді особового складу мотострілецького полку, дислокованого в 110 км від військового шпиталю, виявлено 19 військовослужбовців, які потребують протезування зубів. Скільки їх повинно бути для виїзду пересувного стоматологічного кабінету?
Правильна відповідь	<b>A.</b> 25 і більше
B	<b>B.</b> До 10
C	<b>C.</b> До 15
D	<b>D.</b> До 20
E	<b>E.</b> До 24
№	<b>7.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	У пацієнта 40-ка років після двостороннього перелому верхньої щелепи і неправильного зрощення відламків утворився відкритий прикус. Висота прикусу утримується тільки молярами. Між рештою зубів має місце щілина близько 1-1,5 мм. Зубні ряди безперервні. Який з методів лікування найдоцільніше застосувати у даній ситуації?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Зішліфувати моляри, покрити коронками
B	<b>B.</b> Ортодонтичне лікування
C	<b>C.</b> Апаратурно-хірургічний метод
D	<b>D.</b> Кривава репозиція
E	<b>E.</b> Протезування комбінованими коронками

№	<b>8.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	У хворого вогнепальний перелом нижньої щелепи. До поранення користувався знімними протезами (частковим пластинковим для верхньої щелепи і повним для нижньої щелепи). Які засоби транспортної іммобілізації можна використовувати у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Зубні протези пацієнта
В	<b>В.</b> Апарат Збаржа
С	<b>С.</b> Шина Ентіна
D	<b>D.</b> Шина Васильєва
Е	<b>Е.</b> Шина Тігерштедта
№	<b>9.</b> крок 2011
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Чоловік 28-ми років звернувся до клініки на 2-й день після травми обличчя зі скаргами на біль у нижній щелепі з обох боків, утруднені ковтання і дихання. Об'єктивно: незначна припухлість в ділянці молярів з двох боків, зубні ряди цілі, але щелепний фрагмент 43, 42, 41, 31, 32, 33 зміщений вниз і назад. Ручна репозиція не дає бажаного результату. Який апарат необхідно застосувати для лікування?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Поста
В	<b>В.</b> Однощелепний Катца
С	<b>С.</b> Однощелепний Курляндського
D	<b>D.</b> Бруна
Е	<b>Е.</b> Бетельмана
№	<b>10.</b> крок 2010
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>

Текст завдання	Жінка 55-ти років скаржиться на виливання рідини через ніс при вживанні рідкої їжі. Об'єктивно: у бічному відділі верхньої щелепи на рівні видаленого 16 перфораційний дефект альвеолярного відростка розміром 3x2,8 см. Від хірургічного втручання хвора категорично відмовилася. Яку конструкцію слід їй запропонувати?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Малий сідлоподібний протез з кламерною фіксацією
B	<b>B.</b> Бюгельний протез з обтуруючою частиною із еластичної пластмаси
C	<b>C.</b> Звичайний частковий знімний пластинковий протез
D	<b>D.</b> Звичайний незнімний мостоподібний протез
E	<b>E.</b> Захисна піднебінна пластинка із целулоїду
№	<b>11.</b> крок 2010, 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Хворому 69-ти років було проведено операцію повного видалення нижньої щелепи. До операції знято відбитки з верхньої та нижньої щелеп і виготовлено замісний протез нижньої щелепи. За допомогою чого забезпечується фіксація цього протезу в ротовій порожнині?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Спіральні пружини Фошара
B	<b>B.</b> Зачіпні петлі
C	<b>C.</b> Кламери
D	<b>D.</b> Магніти
E	<b>E.</b> Атачмени
№	<b>12.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b><u>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</u></b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Хворий 65-ти років звернувся до клініки ортопедичної стоматології з приводу виготовлення ектопротезу орбіти, втраченої внаслідок травми. За допомогою чого здійснюється фіксація протезу орбіти?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Окулярна оправа
B	<b>B.</b> Годинникова пружина
C	<b>C.</b> Шарнірні пристрої
D	<b>D.</b> Затискачі
E	<b>E.</b> Магніти

№	<b>13.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Хворий 60-ти років скаржиться на утруднене пережовування їжі внаслідок зміщення нижньої щелепи після нелікованого перелому. Об'єктивно: відсутні 35, 36, 38, 45, 46. Решта зубів інтактні. 43, 44, 47, 48 поза контактом з верхніми боковими та з оральним відхиленням до 1 см. Яка оптимальна конструкція протеза для нижньої щелепи показана?
Правильна відповідь	<b>А.</b> Протез із подвійним зубним рядом
В	<b>В.</b> Суцільнолитий мостоподібний протез
С	<b>С.</b> Дуговий протез
Д	<b>Д.</b> Адгезивний протез
Е	<b>Е.</b> Шина Ванкевич
№	<b>14.</b> крок 2009
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Хворий 50-ти років звернувся зі скаргами на біль у ділянці лівого СНЩС під час відкривання рота. Зубна формула: 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. Під час відкривання рота нижня щелепа зміщується зигзагоподібно у бік хворого суглоба. Для якого патологічного стану ці симптоми найбільш характерні?
Правильна відповідь	<b>А.</b> М'язово-суглобова дисфункція
В	<b>В.</b> Звичний вивих СНЩС
С	<b>С.</b> Склерозуючий артроз СНЩС
Д	<b>Д.</b> Хронічний артрит СНЩС
Е	<b>Е.</b> Деформуючий артроз СНЩС
№	<b>15.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>



Текст завдання	Чоловік 45-ти років скаржиться на виливання рідини через ніс, неможливість вишморкатися, надути щоки. Об'єктивно: у бічному відділі верхньої щелепи на рівні видаленого 26 перфораційний дефект альвеолярного відростка розміром 1x1,5 см. При видиханні повітря через ніс при зажатих ніздрях виділення пухирців в ділянці перфорації. Яку конструкцію протеза слід запропонувати хворому?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Малий сідлоподібний протез з кламерною фіксацією
B	<b>B.</b> Бюгельний протез з обтуруючою частиною
C	<b>C.</b> Звичайний частковий знімний протез
D	<b>D.</b> Звичайний мостоподібний протез
E	<b>E.</b> Захисна піднебінна пластинка
№	<b>16.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	У хворого 68-ми років дефект нижньої третини носа в результаті видалення злоякісної пухлини. Об'єктивно: спинка носа до середньої третини і зовнішні обриси ніздрів збережені. Шкіра у основи носа витончена, ерозована. Від пластичної операції хворий категорично відмовився. Який спосіб фіксації ектопротезу прийнятний у даному випадку?
Правильна відповідь	<b>A.</b> На оправі окулярів
B	<b>B.</b> За допомогою тасьми
C	<b>C.</b> Прозора липка стрічка
D	<b>D.</b> Використання анатомічної ретенції
E	<b>E.</b> Головна шапочка
№	<b>17.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Військовослужбовець 23-х років потребує ортопедичного лікування в спеціалізованому шпиталі. Діагностовано несправжній суглоб нижньої щелепи в фронтальному відділі. Зуби інтактні, стійкі, по 3 з кожного боку. Ортопедичне лікування за допомогою мостоподібного протеза в даного пацієнта можна виконати, якщо дефект щелепи не більше:
Правильна відповідь	<b>A.</b> 1 см

B	<b>B.</b> 2 см
C	<b>C.</b> 3 см
D	<b>D.</b> 3,5 см
E	<b>E.</b> 4 см

№ **18.** крок 2008

ДИСЦИПЛІНА **ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ**

Тема **ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ**

Текст завдання Хворий 36-ти років звернувся до лікаря-стоматолога через 1,5 місяця після травми нижньої щелепи зі скаргами на утруднене пережовування їжі, естетичний дефект обличчя. Об'єктивно: обличчя пропорційне, асиметричне за рахунок орального зміщення бокового фрагмента нижньої щелепи зліва. При змиканні щелеп 34, 35, 36, 37 знаходяться поза контактом з антагоністами. Від хірургічного втручання категорично відмовляється. Яке ортопедичне лікування доцільно призначити?

Правильна відповідь **A.** Протез із подвійним зубним рядом

B **B.** Механотерапія

C **C.** Міжщелепна тяга

D **D.** Коронки з оклюзійними накладками

E **E.** Вирівнювання оклюзійної поверхні

№ **19.** крок 2008

ДИСЦИПЛІНА **ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ**

Тема **ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ**

Текст завдання Хворий 48-ми років звернувся зі скаргами на післятравматичний біль в ділянці підборіддя. При обстеженні визначено: серединний перелом нижньої щелепи за наявності дефекту зубного ряду I класу за Кенеді. Хворому показано виготовлення шини Ванкевич у модифікації Степанова. Чим буде визначатися висота спрямовуючих площин даної шини?

Правильна відповідь **A.** Ступінь відкривання рота

B **B.** Довільно

C **C.** Висота центрального співвідношення щелеп

D **D.** Форма беззубих альвеолярних гребенів на нижню щелепу

E **E.** Висота молярів на верхню щелепу

№	<b>20.</b> крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Пацієнту виготовляються часткові знімні пластинкові протези. З обох щелеп знято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом "Іпін", які передані для знезараження. Вкажіть засіб для дезинфекції даних відбитків:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Глутаровий альдегід 2,5% рН 7,0-8,7
B	<b>B.</b> Гіпохлорид натрію 0,5%
C	<b>C.</b> Дезоксон 0,1%
D	<b>D.</b> Розчин перекису водню 6%
E	<b>E.</b> Розчин спирту 70%
№	<b>21.</b> . крок 2008
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржиться на утруднене пережовування внаслідок зміщення нижньої щелепи. В анамнезі ментальний перелом 2 місяці тому. Об'єктивно: відсутність 35, 36, 38 ... 45, 46. Решта зубів інтактні. 43, 44, 47, 48 поза контактом з антагоністами з оральним відхиленням 1 см. Від хірургічного втручання відмовляється. Вкажіть оптимальний вид конструкції протезу нижньої щелепи:
Правильна відповідь	<b>A.</b> Протез з подвійним зубним рядом
B	<b>B.</b> Металокерамічний мостоподібний протез
C	<b>C.</b> Паяна шина на кільцях
D	<b>D.</b> Знімний пластинковий протез
E	<b>E.</b> Адгезивний протез
№	<b>22.</b> крок 2007
ДИСЦИПЛІНА	<b>ДИСЦИПЛІНА ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ</b>
Тема	<b>ТЕМА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ОРТОПЕДІЯ</b>

Текст завдання	Жінка 26-ти років скаржиться на косметичний дефект в передній ділянці верхньої щелепи. Об'єктивно: коронка 23 зруйнована мало не до ясеневого краю, стінки кукси достатньої товщини. Кукса незначно змінена в кольорі, перкуторно безболісна. На рентгенограмі кореневий канал прямий, широкий, запломбований на всьому протязі. Назвіть конструкцію протеза, який можливо використати для заміщення дефекту?
Правильна відповідь	<b>A.</b> Штифтовий зуб
<b>B.</b>	<b>B.</b> Імедіат-протез
<b>C.</b>	<b>C.</b> Металокерамічна коронка
<b>D.</b>	<b>D.</b> Паяний мостоподібний протез
<b>E.</b>	<b>E.</b> Вкладка





























































































Сеннеді.

i

17 16  
15 14  
13 12  
11

47 46  
45 44  
43 42  
41



и маюць
ення
а
ид






НО:


сті



ь, сусідні


зся

--





м
треба
ерхньої
ь через

теріал
зою
дя.

36, 45,
ВАННО ДО
23 та 27











зуби. На
зуби. На
на
гричне,





23 зуби
28. Зуби
й протез
га

