

№	крок 2021
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	При профілактичному огляді стоматологом у пацієнта 20-ти років виявлені дефекти емалі у вигляді шорохуватих білих плям з нерівними контурами в пришийковій ділянці вестибулярної поверхні 11 і 12 зубів, які зафарбовуються 2% розчином метиленового синього. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів, V клас за Блекум
B	Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів, III клас за Блекум
C	Вогнищева гіпоплазія емалі 11 і 12 зубів
D	Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів, V клас за Блекум
E	Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів, III клас за Блекум
№	крок 2021
Тема	захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Пацієнт 22-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на різкий біль в порожнині рота при прийомі їжі, розмові, підвищене слиновиділення. Зазначає гострий початок захворювання після переохолодження, високу температуру тіла (39,5°C), загальну слабкість, головний біль. В анамнезі: хронічний тонзиліт, алергія на деякі лікарські препарати. При огляді: шкірні покриви бліді. На тильній поверхні кистей синюшно-рожеві висипання з геморагічною кіркою в центрі. Червона облямівка губ набрякла, кров'яністі кірочки. Регіонарні лімфовузли збільшені, болючі, рухливі. Вкажіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Багатоформна ексудативна еритема
B	Синдромом Стівенса-Джонсона
C	Гострий герпетичний стоматит
D	Медикаментозний стоматит
E	Акантолітична пухирчатка
№	крок 2021
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Пацієнту 44-х років після комплексного обстеження лікар-стоматолог встановив діагноз: генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг. Останнім часом хворий відзначає погіршення самопочуття, спрагу, сухість в порожнині рота, свербіж шкіри. Яке додаткове дослідження необхідно провести даному пацієнтові в першу чергу?
Правильна відповідь	Визначення вмісту цукру в крові
B	Загальний розгорнутий аналіз крові
C	Визначення вмісту вітаміну C в крові

D	Визначення вмісту заліза в крові
E	Імунологічне дослідження крові
№	крок 2021
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Пацієнту показано ендодонтичне лікування 21 зуба. Інструментальна обробка каналу проводиться ручними ендодонтичними інструментами. Як називається ендодонтичний інструмент, виготовлений шляхом спіральної конусоподібної нарізки (виточування) сталевого дроту круглого перерізу (фрезерування)?
Правильна відповідь	H-файл
B	Спредер
C	K- ример
D	Плагер
E	K-файл
№	крок 2021
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворій 39-ти років встановлений попередній діагноз: генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг. Рентгенологічно: нерівномірна резорбція міжзубних перегородок на 1/3-1/4 довжини коренів. Який хірургічний метод необхідно застосувати у комплексному лікуванні?
Правильна відповідь	Закритий кюретаж
B	Гінгівоостеопластику
C	Відкритий кюретаж
D	Клаптеву операцію
E	Гінгівотомію
№	крок 2021
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Пацієнтка віком 47-ми років скаржиться на відчуття свербіння в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних подразників. Об'єктивно: корені більшості зубів оголені до 1/3 їх довжини, ясна блідо- рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі виявлено остеосклероз кісткової тканини коміркового відростка, порушення цілісності компактної пластинки на верхівках міжкоміркових перегородок. Поставлений діагноз: пародонтоз, початковий ступінь. Для місцевого лікування системної гіперестезії зубів в даному випадку призначаються:
Правильна відповідь	Десенситайзери
B	Антисептики

C	Кератолітичні препарати
D	Кератопластичні препарати
E	Анестетики
№	крок 2021
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Пацієнту показано ендодонтичне лікування 21 зуба. Інструментальна обробка каналу проводиться ручними ендодонтичними інструментами. Як називається ендодонтичний інструмент, виготовлений шляхом спіральної конусоподібної нарізки (виточування) сталевго дроту круглого перерізу (фрезерування)?
Правильна відповідь	H-файл
B	Спредер
C	K- ример
D	Плагер
E	K-файл
№	крок 2021
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Жінка 48-ми років скаржиться на свербіж в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників. Об'єктивно: шийки зубів оголені. Ясна щільні, бліді, над'ясенні зубні відкладення в невеликій кількості. У ділянці 13, 14, 24, 25 клиноподібні дефекти. їх зондування болісне. Встановлено попередній діагноз пародонтоз. Яка рентгенологічна картина характерна для цього захворювання?
Правильна відповідь	Горизонтальна резорбція
B	Нерівномірна резорбція альвеолярної кістки
C	Утворення кісткових кишень
D	Вертикальна резорбція
E	Дифузний остеопороз
№	крок 2021
Тема	Лікування ускладнень карієсу зубів
Текст завдання	При лікуванні хворого з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту 26 зуба проведена іригація кореневих каналів антисептиком, що має здатність проникати в структури біоплівки, руйнувати їх і викликати розчинення органічних тканин. Який антисептик застосував лікар?
Правильна відповідь	Розчин гіпохлориту натрію
B	Розчин фурациліну

C	Розчин хлоргексидину
D	Розчин перекису водню
E	Фізіологічний розчин
№	крок 2021
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Жінка 20-ти років, на 22 тижні вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на чутливість верхніх передніх зубів від термічних подразників, яка з'явилася місяць тому. Поставлений діагноз: гострий початковий карієс 12, 11, 21, 22 зубів, V клас за Блекум. Гігієнічний індекс Федорова-Володкіної - 1,8. Визначте оптимальну тактику лікування:
Правильна відповідь	Проведення професійного чищення зубів і ремінералізуючої терапії
B	Проведення професійного чищення зубів і пломбування 12,11,21, 22 зубів
C	Проведення професійного чищення зубів, ремінералізуючої терапії і пломбування 12, 11, 21, 22 зубів
D	Ремінералізуюча терапія і пломбування 12,11, 21,22 зубів
E	Відтермінувати лікування до 30-го тижня вагітності
№	крок 2021
Тема	Ендодонтичний інструментарій
Текст завдання	Пацієнту 35-ти років проводиться лікування хронічного фіброзного пульпіту 25 зуба. Планується пломбування каналу методом вертикальної конденсації розігрітої гутаперчі. Який інструмент необхідний для конденсації гутаперчі?
Правильна відповідь	Плагер
B	Коренева голка
C	Ендодонтичний зонд
D	К-файл
E	Спредер
№	крок 2021
Тема	Пломбувальні матеріали
Текст завдання	Пацієнтка 27-ми років звернулася в стоматологічну клініку зі скаргами на естетичний дефект в області верхніх центральних різців. Поставлений діагноз: хронічний глибокий карієс, IV клас за Блекум. Планується естетична реставрація 11 і 21 лубів. Виберіть матеріал з найкращим поєднанням міцності і естетичних властивостей:
Правильна відповідь	Гібридні композити
B	Компомери
C	Рідкі композити
D	Макронаповнені композити

Е	Мікронаповнені композити
№	крок 2021
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить лікування хронічного гангренозного пульпіту 47-го зуба у пацієнта 28 років. Які дані під час проведення електроодонгометрії були отримані для підтвердження діагнозу: хронічний гангренозний пульпіт?
Правильна відповідь	ЕОД - 60 мкА
В	ЕОД - 2-6 мкА
С	ЕОД-10-12 мкА
Д	ЕОД - 110 мкА
Е	ЕОД - 20 мкА
№	крок 2021
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Чоловік 48 років, який впродовж декількох років хворіє на ентероколіт, скаржиться на болісні ураження, що час від часу виникають в різних місцях слизової оболонки ротової порожнини. Під час об'єктивного обстеження на слизовій оболонці виявлені одиничні ділянки порушення цілісності епітелію розміром до 5 мм у діаметрі, правильної овальної форми, з гіперемованою облямівкою по краях, укриті сіро-жовтим нальотом. Пальпація болісна. Поставте найімовірніший діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
В	Багатоформна ексудативна еритема
С	Алергічний стоматит
Д	Вторинний сифіліс
Е	Хронічний рецидивуючий герпес
№	крок 2021
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Пацієнт 28 років звернувся до стоматолога з метою санації. Об'єктивно встановлено: на жувальній поверхні 47- го зуба є глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування порожнини безболісне, на температурні подразники зуб не реагує, перкусія безболісна. ЕОД - 108 мкА. На Rtg виявлено: у кореневих каналах 47- го зуба сліди пломбувального матеріалу, періодонтальна щілина розширена й деформована в апікальній ділянці. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний періодонтит 47-го зуба
В	Хронічний гангренозний пульпіт 47-го зуба

С	Хронічний гранулюючий періодонтит 47-го зуба
D	Хронічний фіброзний пульпіт 47-го зуба
E	Хронічний гранулематозний періодонтит 47-го зуба
№	крок 2021
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Жінка 58 років скаржиться на наявність плями червоного кольору на нижній губі, яка вперше з'явилась 4 роки тому. Об'єктивно встановлено: на червоній облямівці нижньої губи є пляма червоного кольору з оксамитовою поверхнею. Елемент ураження слизової оболонки трохи западає порівняно з навколишніми тканинами. Під час натискання пляма в кольорі не змінюється. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Хвороба Боуена
В	Гемангіома
С	Лейкоплакія, проста форма
D	Ексфоліативний хейліт
E	Бородавчастий передрак
№	крок 2021
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Хворий 30 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на нижній щелепі зліва. Об'єктивно встановлено: у 34-му зубі глибока каріозна порожнина, яка точково сполучається з пульповою камерою. Зондування дна безболісне, перкусія зуба слабо болісна. Реакція на термічні подразники відсутня. На яснах, в проекції верхівки кореня 34-го зуба, виявлена нориця. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний гранулюючий періодонтит
В	Хронічний глибокий карієс
С	Хронічний фіброзний періодонтит
D	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
E	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2021
Тема	Некаріозні ураження зубів

Текст завдання	До клініки терапевтичної стоматології звернувся хворий зі скаргами на наявність поодиноких поперечних борозен на коронках фронтальних та бічних зубів. Борозни були виявлені одразу після прорізування зубів. У дитинстві до року відзначалися часті ГРВІ. Об'єктивно встановлено: на середині коронкової частини 16-го, 11-го, 21-го, 26-го зубів відзначається поодинокі заглиблення (перехват) у межах емалі. Борозни не забарвлюються метиленовим синім. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Системна гіоплазія емалі
В	Флюороз
С	Недосконалий амелогенез
Д	Ерозія твердих тканин зуба
Е	Гіперплазія емалі
№	крок 2021
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	У чоловіка 25 років скарги на короточасний біль від солодкого в зубі на нижній щелепі, затримку їжі в каріозній порожнині. Об'єктивно встановлено: на жувальній поверхні 36-го зуба виявлена каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину. Дентин м'який, каріозна порожнина не сполучається з порожниною зуба, зондування дна болісне, перкусія 36 зуба безболісна, пальпація слизової оболонки ясен у ділянці проекції верхівки кореня безболісна. Під час термодіагностики виникає біль, який швидко зникає після усунення подразника. Поставте імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс
В	Хронічний фіброзний пульпіт
С	Гіперемія пульпи
Д	Хронічний глибокий карієс
Е	Гострий середній карієс
№	крок 2021
Тема	Некаріозні ураження зубів
Текст завдання	Пацієнтка 26 років, яка працює на виробництві з хімічними речовинами, звернулась до стоматолога зі скаргами на зміну кольору зубів, наявність різкої чутливості до холодного, кислого, солодкого в зубах фронтальної групи верхньої щелепи. Об'єктивно встановлено: на вестибулярній поверхні 13-го, 12-го, 11-го, 21-го, 22-го, 23-го зубів на рівні екватору визначаються ділянки білого кольору, які поширюються до різальних країв. Під час зондування емаль у ділянці ураження шорстка та крихка. Вітальне забарвлення позитивне. Поставте клінічний діагноз:
Правильна відповідь	Некроз твердих тканин зубів

B	Гострий початковий карієс
C	Ерозія твердих тканин зубів
D	Системна гіоплазія емалі
E	Гіперестезія твердих тканин зубів
№	крок 2021
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Чоловік 52 років скаржиться на неприємні відчуття під час ковтання, появу ерозій на слизовій оболонці порожнини рота. Уперше захворів понад місяць тому. Об'єктивно встановлено: на незмінній слизовій оболонці м'якого піднебіння, щік, ясен наявні ерозії яскраво-червоного кольору з уривками пухирів. Слизова оболонка легко відшаровується. Симптом Нікольського позитивний. Які препарати необхідно призначити для лікування першочергово?
Правильна відповідь	Кортикостероїди
B	Протигрибкові засоби
C	Протеолітичні ферменти
D	Антибіотики
E	Нестероїдні протизапальні засоби
№	крок 2021
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Під час проведення епідеміологічного певних вікових груп для вивчення поширеності ознак ураження пародонта і потреб у лікуванні використовується індекс:
Правильна відповідь	СРІТН (ВООЗ)
B	ОНІ-S (Гріна-Вермільйона)
C	РІ (Рассела)
D	ІР (Рамфйорда)
E	РМА (Парма)
№	крок 2021
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота

Текст завдання	Жінка 54 років скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, яке з'явилося 6 місяців тому. Протягом останніх 20 днів воно почало різкозбільшуватися у розмірах. Об'єктивно встановлено: на червоній облямівці нижньої губи є вузол округлої форми сіро-червоного кольору, який виступає надпідлеглими тканинами на 0,5 см, відмежований, з ліycopодібним вдавленням посередині, заповненим роговими масами. Під час пальпації вузлик щільний, рухомий, безболісний. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Кератоакантома
B	Хейліт Манганотті
C	Бородавчастий передрак
D	Лейкоплакія бородавчата
E	Папілома
№	крок 2021
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Хворого протягом 2 днів турбує самовільний, нападаподібний нічний біль у 25-му зубі, що іррадіює гілками трійчастого нерву з короткими безболісними інтервалами. Об'єктивно встановлено: на медіальній поверхні 25 зуба глибока каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину. Зондування дна порожнини болісне, перкусія болісна. Термопроба 25-го зуба провокує напад болю. Поставте імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Гострий дифузний пульпіт
B	Гострий гнійний періодонтит
C	Гострий гнійний пульпіт
D	Гострий глибокий карієс
E	Невралгія трійчастого нерву
№	крок 2021
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Чоловік 48 років звернувся в клініку з метою санації порожнини рота. В анамнезі зазначено легку форму діабету. Під час об'єктивного обстеження на тлі незміненої слизової оболонки щік симетрично, переважно в ретромоллярній ділянці, виявляються білуваті папули, що трохи виступають над рівнем слизової оболонки і утворюють мереживний малюнок. На верхній щелепі два паяні мостоподібні протези, у 37-му зубі пломба з амальгами, на 36-му зубі - лита металева коронка. Поставте найімовірніший діагноз:
Правильна відповідь	Червоний плесканий лишай
B	Хронічний атрофічний кандидоз
C	Вторинний сифіліс

D	Червоний вовчак
E	Лейкоплакія
№	крок 2021
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Жінка 45 років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання твердої їжі. Об'єктивно встановлено: у фронтальній ділянці ясна нижньої щелепи гіперемовані, набряклі та кровоточать під час пальпації. Слизова оболонка порожнини рота в інших ділянках без змін. Прикус глибокий. Зуби стійкі за винятком 41-го та 31-го (I ступінь рухомості). Рентгенологічно виявлено: резорбція міжальвеолярних перегородок у ділянці 42-го, 41-го, 32-го, 31-го зубів до 1/3 довжини кореня. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Локалізований пародонтит
B	Генералізований пародонтит, початковий ступінь
C	Пародонтоз, I ступінь
D	Генералізований пародонтит, I ступінь
E	Катаральний гінгівіт
№	крок 2021
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	У чоловіка 56 років на червоній облямівці нижньої губи між кутом рота і середньою лінією виявлена ерозія овальної форми з гладенькою поверхнею насиченого червоного кольору. На поверхні ерозії кров'яні кірочки, які важко знімаються. Після зняття кірок виникає невелика кровотеча. Легке травмування ерозії в місцях, де кірки відсутні, не викликає кровотечі. Визначте вид передраку нижньої губи:
Правильна відповідь	Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті
B	Хвороба Боуена
C	Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи
D	Червоний вовчак
E	Актинічний хейліт
№	крок 2021
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	У пацієнта встановлені клінічні симптоми, що нагадують симптоми гострого герпетичного стоматиту. Наявність яких клітин за цитологічного метода дослідження підтвердить цей діагноз?
Правильна відповідь	Наявність гігантських багатоядерних клітин
B	Наявність клітин Тцанка

С	Наявність атипових мононуклеарів
D	Наявність клітин Гоше
Е	Наявність клітин Німана-Піка
№	крок 2021
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Дівчина 21 року скаржиться на короткочасний біль від температурних подразників у зубі на нижній щелепі зліва, що зникає після усунення причини. Під огляду в 47-му зубі на жувальній поверхні виявлена каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, заповнена розм'якшеним світлим дентином. Зондування дна та перкусія 47-го зуба безболісні. Зондування стінок болісне. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий середній карієс
В	Хронічний поверхневий карієс
С	Хронічний середній карієс
D	Хронічний глибокий карієс
Е	Гострий глибокий карієс
№	крок 2021
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Жінці 43 років встановлено попередній діагноз генералізований пародонтит. Яке дослідження буде найінформативнішим для визначення важкості хвороби?
Правильна відповідь	Панорамна рентгенографія
В	Проба Шиллера-Писарева
С	Визначення ступеня рухомості зубів
D	Визначення пародонтального індексу
Е	Визначення глибини пародонтальних кишень
№	крок 2021
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Пацієнт 37 років скаржиться на неприємне відчуття в яснах на нижній щелепі зліва, яке з'явилося після лікування зубів із приводу карієсу декілька місяців тому. Під час огляду в 36-му, 37-му зубах на контактних поверхнях наявні постійні пломби, край яких нависає на міжзубний ясенний сосочок. Ясна в ділянці 36-го і 37-го зубів гіперемовані, набряклі. Визначається пародонтальна кишень глибиною до 3 мм. Яке лікування в цій ситуації буде етіологічним?
Правильна відповідь	Якісне пломбування
В	Ретельна індивідуальна гігієна

С	Закритий кюретаж
D	Професійна гігієна
Е	Медикаментозне лікування
№	крок 2021
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулася жінка 28 років зі скаргами на наявність порожнини в зубі на верхній щелепі справа. Об'єктивно встановлено: на жувальній поверхні 16-го зуба каріозна порожнина з широким вхідним отвором у межах навколопульпарного дентину, заповнена щільним пігментованим дентином. Каріозна порожнина не сполучається з порожниною зуба. Зондування дна та стінок каріозної порожнини, реакція на холод, перкусія безболісні. ЕОД - 12 мкА. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Хронічний глибокий карієс
В	Хронічний фіброзний періодонтит
С	Хронічний фіброзний пульпіт
D	Хронічний гангренозний пульпіт
Е	Хронічний середній карієс
№	крок 2020
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хвора 39-ти років звернулася зі скаргами на неприємний запах з рота, кровоточивість та болочість ясен, рухомість зубів. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, нижні фронтальні зуби рухомі, I-II ступінь рухомості. Пародонтальні кишені 4-5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
В	Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
С	Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
D	Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
Е	Генералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг
№	крок 2020
Тема	Лікування ускладнень карієсу зубів
Текст завдання	Під час лікування 26 зуба з приводу глибокого карієсу стоматолог-терапевт випадково відкрив ріг пульпи. Який метод лікування слід обрати?
Правильна відповідь	Біологічний метод

B	Вітальна ампутація
C	Вітальна екстирпація
D	Девітальна екстирпація
E	Девітальна ампутація
№	крок 2020
Тема	Лікування ускладнень карієсу зубів
Текст завдання	Під час лікування хворого з приводу загостреного хронічного пульпіту 16 зуба було здійснено обтурацію системи корневих каналів способом латеральної конденсації гутаперчі. Які з перерахованих інструментів слід використати для даного методу лікування?
Правильна відповідь	Спредер
B	Штопфер
C	Каналонаповнювач
D	Плагер
E	Зонд
№	крок 2020
Тема	Лікування ускладнень карієсу зубів
Текст завдання	При лікуванні хворого з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту 26 зуба проведена іригація корневих каналів антисептиком, що має здатність проникати в структури біоплівки, руйнувати їх і викликати розчинення органічних тканин. Який антисептик застосував лікар?
Правильна відповідь	Розчин гіпохлориту натрію
B	Розчин фурациліну
C	Розчин хлоргексидину
D	Розчин перекису водню
E	Фізіологічний розчин
№	крок 2020
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Хвора 24-х років скаржиться на постійний наростаючий біль у зубі на нижній щелепі справа, що посилюється при накушуванні. Об'єктивно: 46 зуб - каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, перкусія слабо болісна, зондування стінок і дна порожнини безболісне. На рентгенограмі змін не виявлено. Поставте найімовірніший діагноз:
Правильна відповідь	Гострий серозний періодонтит

В	Гострий гнійний періодонтит
С	Загострення хронічного періодонтиту
Д	Гострий дифузний пульпіт
Е	Гострий обмежений пульпіт
№	крок 2020
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Хворий 45-ти років скаржиться на ниючий, тривалий біль в 46 зубі, який з'являється під дією температурних і хімічних подразників. При огляді 46 зуба в пришийковій ділянці на вестибулярній поверхні глибока каріозна порожнина, заповнена пігментованим розм'якшеним дентином. Зондування різко болюче в одній точці. На холодну воду з'являється повільно наростаючий ниючий біль. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний пульпіт
В	Хронічний глибокий карієс
С	Хронічний фіброзний періодонтит
Д	Хронічний гангренозний пульпіт
Е	Гострий глибокий карієс
№	крок 2020
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Жінка 48-ми років скаржиться на свербіж в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників. Об'єктивно: шийки зубів оголені. Ясна щільні, бліді, над'ясенні зубні відкладення в невеликій кількості. У ділянці 13, 14, 24, 25 клиноподібні дефекти. їх зондування болісне. Встановлено попередній діагноз пародонтоз. Яка рентгенологічна картина характерна для цього захворювання?
Правильна відповідь	Горизонтальна резорбція
В	Нерівномірна резорбція альвеолярної кістки
С	Утворення кісткових кишень
Д	Вертикальна резорбція
Е	Дифузний остеопороз
№	крок 2020
тема	Некаріозні ураження

Текст завдання	Хвора 52-х років скаржиться на косметичні дефекти зубів, які помітила декілька років тому. Об'єктивно: на вестибулярних поверхнях в пришийковій ділянці премолярів і різців є щілопоподібні дефекти в межах плащового дентину, утворені гладенькими, блискучими поверхнями. Шийки зубів оголені, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. Зондування дефектів безболісне. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Клиноподібний дефект
В	Некроз твердих тканин зуба
С	Гострий середній карієс
Д	Хронічний середній карієс
Е	Ерозія твердих тканин зубів
№	крок 2020
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	У пацієнта скарги на короткочасний біль у зубі на верхній щелепі від солодкого та холодного. Біль з'явився місяць тому. Об'єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба виявлена каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором в межах плащового дентину. Дентин дна та стінок розм'якшений, зондування в ділянці емалево-дентинної межі болісне, термопроба спричиняє біль, який після усунення подразника швидко зникає. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий середній карієс
В	Гострий початковий карієс
С	Хронічний фіброзний пульпіт
Д	Хронічний глибокий карієс
Е	Гіперемія пульпи
№	крок 2020
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	В стоматологічну клініку звернувся пацієнт 45-ти років зі скаргами на біль при накушуванні в ділянці 45 зуба. Для підтвердження діагнозу використали метод електроодонтодіагностики. Який показник електроодонтодіагностики буде вказувати на некроз пульпи і верхівковий періодонтит?
Правильна відповідь	100 мкА і більше
В	2-6 мкА
С	10-12 мкА
Д	20-40 мкА
Е	50-60 мкА
№	крок 2020

Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Пацієнтка віком 25-ти років звернулася зі скаргами на сильний біль в ділянці верхньої щелепи, що посилюються від вживання гарячої їжі та напоїв, відчуває полегшення болю від дії холодної рідини. Об'єктивно: в 24 зубі каріозна порожнина заповнена розм'якшеним дентином, зондування дна каріозної порожнини різко болісне, перкусія позитивна. ЕОД- 50 мкА. Який метод лікування найбільш доцільний?
Правильна відповідь	Вітальна екстирпація
В	Девітальна ампутація
С	Вітальна ампутація
Д	Девітальна екстирпація
Е	Біологічний метод
№	крок 2020
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хвора 23-х років скаржиться на різкий біль в яснах, неможливість прийому їжі, неприємний запах з рота, підвищення температури до 38°C, загальну слабкість. При огляді: хвора бліда, збільшені лімфовузли. Набряк, гіперемія ясенних сосочків, окремі виразки, вкриті фібринозним нальотом. Який додатковий метод дослідження необхідно провести в першу чергу?
Правильна відповідь	Загальний аналіз крові
В	Алергологічні проби
С	Панорамну рентгенограму
Д	Аналіз вмісту цукру в крові
Е	Загальний аналіз сечі
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хворий 37-ми років скаржиться на наявність на червоній облямівці білуватої плями. Об'єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи посередині між кутом рота і серединною лінією наявна ділянка ураження сірувато-білого кольору, неправильної (полігональної) форми, 7x4 мм, ледь западає відносно рівня червоної облямівки, поверхня вкрита дрібними щільно прикріпленими лусочками. Пальпація не виявляє ущільнення основи ураження, а при бічній пальпації ураження відчувається поверхневе ущільнення. Регіонарні лімфовузли - без змін. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Обмежений передраковий гіперкератоз
В	Рак нижньої губи

С	Лейкоплакія, плоска форма
D	Хейліт Манганотті
Е	Червоний плесканий лишай
№	крок 2020
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Хворому 35-ти років після об'єктивного та суб'єктивного обстеження поставлено остаточний діагноз - гострий середній карієс 26 зуба, V клас за Блекум. Для пломбування каріозної порожнини був обраний склоіономерний цемент хімічного твердіння. Яка властивість матеріалу обґрунтовує зроблений вибір?
Правильна відповідь	Виділяє іони фтору, має гідрофільні властивості
В	Не вимагає ізолювальної прокладки
С	Технологічна простота
D	Швидко твердне
Е	Відносна дешевизна
№	крок 2020
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворий 43-х років скаржиться на гострий пульсуючий біль в ділянці верхньої щелепи праворуч. Біль виник три доби тому. Об'єктивно: запальний інфільтрат округлої форми пальпується з вестибулярної сторони слизової оболонки ясен, ближче до їх маргінальної частини, в ділянці 26 зуба. Зуб інтактний, рухомість II ступеня, горизонтальна та вертикальна перкусія болючі, пародонтальні кишені 4- 5 мм. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Пародонтальний абсцес
В	Гострий серозний періодонтит
С	Періостит верхньої щелепи
D	Гострий гнійний періодонтит
Е	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2020
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	При профілактичному огляді стоматологом у пацієнта 20-ти років виявлені дефекти емалі у вигляді шорохуватих білих плям з нерівними контурами в пришийковій ділянці вестибулярної поверхні 11 і 12 зубів, які зафарбовуються 2% розчином метиленового синього. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів, V клас за Блекум
В	Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів, III клас за Блекум

С	Вогнищева гіпоплазія емалі 11 і 12 зубів
D	Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів, V клас за Блеком
E	Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів, III клас за Блеком
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Пацієнт 22-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на різкий біль в порожнині рота при прийомі їжі, розмові, підвищене слиновиділення. Зазначає гострий початок захворювання після переохолодження, високу температуру тіла (39,5°C), загальну слабкість, головний біль. В анамнезі: хронічний тонзиліт, алергія на деякі лікарські препарати. При огляді: шкірні покриви бліді. На тильній поверхні кистей синюшно-рожеві висипання з геморагічною кіркою в центрі. Червона облямівка губ набрякла, кров'янисті кірочки. Регіонарні лімфовузли збільшені, болючі, рухливі. Вкажіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Багатоформна ексудативна еритема
B	Синдромом Стівенса-Джонсона
С	Гострий герпетичний стоматит
D	Медикаментозний стоматит
E	Акантолітична пухирчатка
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	З вогнища ураження в ретромолярній ділянці взято біоптат. Патогістологічні дані: спостерігається поліморфізм клітин шипуватого шару, збільшення числа мітозів, гігантські багатоядерні клітини, акантоз, паракератоз частини клітин шипуватого шару, відзначаються "рогові перлини". Якому захворюванню відповідає дана патогістологічна картина?
Правильна відповідь	Хвороба Боуена
B	Бородавчаста форма червоного плеска-того лишая
С	Червоний вовчак
D	Кератоакантома
E	Лейкоплакія
№	крок 2020
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Пацієнту 44-х років після комплексного обстеження лікар-стоматолог встановив діагноз: генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг. Останнім часом хворий відзначає погіршення самопочуття, спрагу, сухість в порожнині рота, свербіж шкіри. Яке додаткове дослідження необхідно провести даному пацієнтові в першу чергу?

Правильна відповідь	Визначення вмісту цукру в крові
B	Загальний розгорнутий аналіз крові
C	Визначення вмісту вітаміну C в крові
D	Визначення вмісту заліза в крові
E	Імунологічне дослідження крові
№	крок 2020
тема	захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хвора 65-ти років скаржиться на утворення на верхній губі, яке повільно збільшується, безболісне. Об'єктивно: на верхній губі утворення 1x1 см у вигляді в-злика сірувато-червоного кольору, у центрі воронкоподібне вдавнення, яке заповнене щільною роговою масою. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Кератоакантома
B	Бородавчастий передрак
C	Лейкоплакія плоска
D	Шкірний ріг
T	Хвороба Боуена
№	крок 2020
Тема	Ускладнення карієсу
Текст завдання	Пацієнту показане ендодонтичне лікування 21 зуба. Інструментальна обробка каналу проводиться ручними ендодонтичними інструментами. Як називається ендодонтичний інструмент, виготовлений шляхом спіральної конусоподібної нарізки (виточування) сталевого дроту круглого перерізу (фрезерування)?
Правильна відповідь	H-файл
B	Спредер
C	K- ример
D	Плагер
E	K-файл
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Пацієнтка 60-ти років скаржиться на біль в порожнині рота, який підсилюється під час вживання їжі. В анамнезі: ішемічна хвороба серця. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору, без видимих патологічних змін. На бічній поверхні язика виразка діаметром 0,7 см, з рівними, чіткими краями, вкрита сірим нальотом, болюча при пальпації. В прилеглих тканинах запальна реакція відсутня. Поставте правильний діагноз:

Правильна відповідь	Трофічна виразка
B	Ракова виразка
C	Сифілітична виразка
D	Декубітальна виразка
E	Туберкульозна виразка
№	крок 2020
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Жінка 24-х років вагітна на III триместрі. Звернулася до стоматолога зі скаргами на виникнення білих плям на передніх зубах нижньої щелепи. При огляді на вестибулярних поверхнях у пришийкових ділянках 41, 42, 31, 32 зубів виявлено крейдоподібні плями, які зафарбовуються барвниками. Оберіть тактику лікування:
Правильна відповідь	Ремінералізуюча терапія
B	Імпрегнація нітратом срібла
C	Застосування ART-методики
D	Препарування без пломбування
E	Препарування і пломбування
№	крок 2020
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворій 39-ти років встановлений попередній діагноз: генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг. Рентгенологічно: нерівномірна резорбція міжзубних перегородок на 1/3-1/4 довжини коренів. Який хірургічний метод необхідно застосувати у комплексному лікуванні?
Правильна відповідь	Закритий кюретаж
B	Гінгівоостеопластику
C	Відкритий кюретаж
D	Клаптеву операцію
E	Гінгівотомію
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки порожнини рота

Текст завдання	Хвора 37-ми років має скарги на наявність білого утворення слизової оболонки верхньої губи, яке виявила випадково. Об'єктивно: на зубах нижньої щелепи 2 мостоподібних протези, коронка 21 зуба зруйнована на половину, зуб не лікований. В проекції 21 зуба на слизовій оболонці губи - суцільна біла бляшка 4x9 мм неправильної форми з чіткими межами, яка ледь підвищується над рівнем слизової оболонки, не зішкрябається, безболісна і без інфільтрату в основі. Регіонарні лімфовузли не пальпуються. Ваш діагноз:
Правильна відповідь	Лейкоплакія
В	Червоний вовчак
С	Кандидозний хейліт
Д	Вторинний сифіліс
Е	Червоний плесканий лишай
№	крок 2020
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Пацієнтка віком 47-ми років скаржиться на відчуття свербіння в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних подразників. Об'єктивно: корені більшості зубів оголені до 1/3 їх довжини, ясна блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі виявлено остеосклероз кісткової тканини коміркового відростка, порушення цілісності компактної пластинки на верхівках міжкоміркових перегородок. Поставлений діагноз: пародонтоз, початковий ступінь. Для місцевого лікування системної гіперестезії зубів в даному випадку призначаються:
Правильна відповідь	Десенситайзери
В	Антисептики
С	Кератолітичні препарати
Д	Кератопластичні препарати
Е	Анестетики
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Жінка 36-ти років скаржиться на сухість та лущення червоної облямівки нижньої губи. Сухість і лущення турбують протягом місяця. Змащування зволожувальним кремом ефекту не дає. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи насичено червоного кольору, помірно інфільтрована, вкрита щільно посадженими білувато-сірими лусочками, при спробі видалення яких відзначаються біль і кровотеча. На периферії вогнища визначаються ділянки помутніння епітелію у вигляді нерівномірно виражених смужок білого кольору, а в центрі вогнища - ділянки западання. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Червоний вовчак

В	Ексфоліативний хейліт
С	Лейкоплакія
Д	Кандидозний хейліт
Е	Червоний плескатий лишай
№	крок 2020
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Жінка віком 34 роки звернулася зі скаргами на короткочасний біль від температурних подразників у 34, 35 зубах. Об'єктивно: видимі поверхні 34, 35 зубів інтактні, контактні поверхні не вдається обстежити внаслідок щільного розміщення зубів. Який з наведених методів дослідження найбільш інформативний у даному випадку, якщо є підозра на наявність каріозної порожнини?
Правильна відповідь	Рентгендіагностика
В	Зондування
С	Перкусія
Д	Електроодонтодіагностика
Е	Томографія
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Жінка 28-ми років скаржиться на біль під час прийому їжі і ковтання, загальну слабкість. Захворювання почалося гостро з підйому температури тіла до 37,9°C, болю у м'язах. Об'єктивно: на фоні набряклої і гіперемованої слизової м'якого піднебіння, передніх дужок, задньої стінки глотки визначаються згруповані і поодинокі везикули з серозно-геморагічним вмістом, а також ерозовані ділянки різної величини з фестончастими краями, вкриті фібринозним нальотом, болісні під час дотику. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Герпангіна
В	Грипозний стоматит
С	Оперізуєчий лишай
Д	Гострий герпетичний стоматит
Е	Ящур
№	крок 2019
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота

Текст завдання	Пацієнтка 48-ми років звернувся зі скаргами на субфебрильну температуру та наявність виразки на слизовій оболонці ясен в ділянці молярів, яка поступово збільшується; розхитаність зубів у зоні ураження. Об'єктивно: на слизовій оболонці ясен в ділянці нижніх лівих молярів мають місце дві поверхневі, різко болючі виразки, які мають підриті краї. Дно виразок зерняткового вигляду, вкрите жовтувато-сірим нальотом. Виразки оточені горбками. Шийки зубів оголені, спостерігається патологічна рухомість зубів. Регіональні лімфатичні вузли збільшені, болісні, утворюють щільні пакети. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Туберкульоз
В	Трофічна виразка
С	Ракова виразка
Д	Сифіліс
Е	Гострий афтозний стоматит
№	крок 2019
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Жінка 29-ти років скаржиться на гострий нападоподібний біль в ділянці верхньої щелепи зліва, посилюється від холодного, іррадіюють у вухо та скроню. Рік тому сильні болючі зуби, до лікаря не зверталась. Три дні тому знову виник біль. Об'єктивно: в 26 зубі глибока каріозна порожнина, що з'єднується з порожниною зуба. Зондування відкритої ділянки різко болюче. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Загострений хронічний пульпіт
В	Загострення хронічного періодонтиту
С	Гострий дифузний пульпіт
Д	Гострий обмежений пульпіт
Е	Гострий серозний періодонтит
№	крок 2019
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хворий 18-ти років скаржиться на наявність порожнини в 27 зубі, біль під час вживання твердої їжі. В анамнезі: сильні болі в 27 зубі рік тому, до лікаря не звертався. Об'єктивно: на жувальній поверхні 27 зуба глибока каріозна порожнина, сполучена з пульповою камерою, виповнена розростанням грануляційної тканини, що охоплює майже всю каріозну порожнину. Зондування грануляції спричиняє кровоточивість та незначний біль. Перкусія безболісна. ЕОД- 45 мкА. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
В	Хронічний фіброзний періодонтит

С	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
D	Хронічний гранулюючий періодонтит
E	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2019
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Хлопець 18-ти років звернувся до лікаря - стоматолога зі скаргами на чутливість зубів при вживанні солодкого на нижній щеле-пі зліва. При огляді: на жувальній поверхні 37 зуба емаль у фісурах білого кольору, без блиску, крихка (відколюється) при зонду-ванні. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий поверхневий карієс 37 зуба
B	Хронічний початковий карієс 37 зуба
С	Гострий початковий карієс 37 зуба
D	Хронічний поверхневий карієс 37 зуба
E	Хронічний середній карієс 37 зуба
№	крок 2019
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Жінка 36-ти років скаржиться на сухість та лущення червоної облямівки нижньої гу-би. Сухість і лущення турбують протягом місяця. Змащування індиферентними ма-зями ефекту не дає. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи насичено червоно-го кольору, помірно інфільтрована, вкрита щільно посадженими білувато-сірими лусо-чками, при спробі видалення яких відзнача-ються біль і кровотеча. На периферії вогни-ща визначаються ділянки помутніння епіте-лію у вигляді нерівномірно виражених сму-жок білого кольору, а в центрі вогнища - ділянки западання. Який найбільш імовір-ний діагноз?
Правильна відповідь	Червоний вовчак
B	Кандидозний хейліт
С	Червоний плескатий лишай
D	Лейкоплакія
E	Ексфоліативний хейліт
№	крок 2019
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хворому 32-х років після ретельного до-слідження був встановлений діагноз: чорний ''волосатий'' язик. Які лікарські засоби не-обхідно призначити хворому?
Правильна відповідь	Кератолітичні

B	Противірусні
C	Антисептики
D	Кератопластичні
E	Вітаміни
№	крок 2019
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Дівчина 20-ти років скаржиться на болі-сність і виражену кровоточивість ясен під час чищення і прийомі навіть м'якої їжі. Об'єктивно: слизова оболонка ясен набря-кла, гіперемована, кровить при найменшо-му дотику. Зуби вкриті помірною кількістю м'якого зубного нальоту. Яку пасту необхі-дно рекомендувати цій хворій для чищення зубів, проводячи комплексну терапію захво-рювання?
Правильна відповідь	Пасту, що містить настої лікарських трав
B	Гелеву з мікроелементами
C	Пасту, що містить мінеральні компоненти
D	Пасту, що містить протигрибкові засоби
E	Фторвмісну пасту
№	крок 2019
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Пацієнтка скаржиться на біль від термі-чних подразників в нижній щелепі справа, що швидко зникає після їх усунення. Об'є-ктивно: на жувальній поверхні 26 зуба каріо-зна порожнина з вузьким ''вхідним'' отво-ром в межах плащового дентину. Дентин розм'якшений, світлого кольору. Перкусія 26 зуба безболісна. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий середній карієс
B	Хронічний глибокий карієс
C	Гострий глибокий карієс
D	Хронічний середній карієс
E	Хронічний поверхневий карієс
№	крок 2019
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Жінка 20-ти років, на 22 тижні вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скарга-ми на чутливість верхніх передніх зубів від термічних подразників, яка з'явилася місяць тому. Поставлений діагноз: гострий поча-тковий карієс 12, 11, 21, 22 зубів, V клас за Блеком. Гігієнічний індекс Федорова-Володкіної - 1,8. Визначте оптимальну та-ктику лікування:
Правильна відповідь	Проведення професійного чищення зубів і ремінералізуючої терапії

В	Проведення професійного чищення зубів і пломбування 12,11,21, 22 зубів
С	Проведення професійного чищення зубів, ремінералізуючої терапії і пломбування 12, 11, 21, 22 зубів
D	Ремінералізуюча терапія і пломбування 12,11, 21,22 зубів
Е	Відтермінувати лікування до 30-го тижня вагітності
№	крок 2019
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Чоловік 34-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на гострий нападоподібний самочинний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що посилюється від холодних подразників, іррадіює у вухо та скроню. Рік тому сильно болів 27 зуб, до лікаря не звертався. З дні тому знову виник біль. Об'єктивно: у 27 зубі глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування розкритої точки різко болісне. На рентгенограмі 27 зуба у ділянці верхівок коренів визначається розширення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного фіброзного пульпіту
В	Загострення хронічного фіброзного періодонтиту
С	Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту
D	Загострення хронічного гангренозного пульпіту
Е	Гострий дифузний пульпіт
№	крок 2019
Тема	Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хворий 38-ми років, електрозварник, зловживає палінням, з'явився для протезування зубів, але на нижній губі, посередині, на фоні незміненої червоної облямівки визначається чітко обмежене вогнище ураження 6x4 мм полігональної форми, сірувато-білого кольору, вкрите дрібними щільно прикріпленими лусочками і виглядає на рівні (не підвищується і не западає) червоної облямівки. Пальпація вогнища - безболісна, без ущільнення основи; при бічній пальпації - поверхня ураження ущільнена. Регіонарні лімфовузли без змін. Ваш попередній діагноз:
Правильна відповідь	Обмежений передраковий гіперкератоз
В	Червоний плесканий лишай, гіперкератотична форма
С	С Бородавчатий передрак
D	Рак нижньої губи
Е	Червоний вовчак
№	крок 2019
Тема	Захворювання пародонту

Текст завдання	Хворий 45-ти років з'явився зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після обстеження поставлений попередній діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості. Для уточнення остаточного діагнозу найбільш доцільно:
Правильна відповідь	Зробити рентгенографію
B	Визначити рухомість зубів
C	Провести пробу Кулаженко
D	Провести пробу Кетчке
E	Визначити глибину пародонтальних кишень
№	крок 2019
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Пацієнт 38-ми років звернувся до лікаря. Після збору анамнезу і проведення обстеження виявлено загострення генералізованого пародонтиту II ступеня, глибина пародонтальних кишень - 3-5 мм. Після усунення місцевих факторів, а також після проведення протизапального лікування необхідно перейти до усунення пародонтальних кишень. Який метод слід застосувати?
Правильна відповідь	Кюретаж
B	Клапикова операція
C	Гінгівектомія
D	Пластика передсінка
E	Гінгівотомія
№	крок 2019
Тема	Гістологічна будова дентину
Текст завдання	Пацієнт 30-ти років звернувся до лікаря - стоматолога зі скаргами на випадіння пломби з зуба на верхній щелепі справа. Об'єктивно: в 16 зубі глибока каріозна порожнина, виповнена щільним пігментованим дентином. Який шар дентину утворюється в результаті подразнення зуба каріозним процесом?
Правильна відповідь	Третинний
B	Вторинний
C	Гібридний
D	Первинний
E	Предентин
№	крок 2019
Тема	Захворювання пародонту

Текст завдання	Хворий 23-х років скаржиться на різку кровотечу з ясен, неприємний запах з ро-та, що з'явилися 5 дів тому. Об'єктивно: міжзубні сосочки та ясенний край повсю-ди розпушені, яскраво-червоного кольору, набряклі, болючі і інтенсивно кровоточать під час пальпації. Ясенна кишеня - 3 мм. На рентгенограмі - виражений остеопороз міжальвеолярних перегородок, розширення періодонтальної щілини навколо верхівок міжальвеолярних перегородок. Компактна пластинка не порушена. Який найбільш імо-вірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий катаральний гінгівіт
В	Гострий виразково-некротичний гінгівіт
С	Гострий лейкоз
Д	Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
Е	Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
№	крок 2019
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хворий скаржиться на наявність каріо-зної порожнини в 11 зубі. Пломба з дано-го зуба випала тиждень тому. Коронка зу-ба темного кольору, на дні каріозної по-рожнини залишки пломбувального матері-алу. Вертикальна перкусія безболісна. На рентгенограмі - резорбція кісткової тка-нини овальної форми, з чіткими контура-ми. розміром 0.4x0,3 см. Кореневий канал запломбований на 2/3 довжини. Який най-більш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гранульоматозний періодонтит
В	Радикулярна кіста
С	Хронічний гранулюючий періодонтит
Д	Хронічний фіброзний періодонтит
Е	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2019
Тема	Некаріозні ураження зубів
Текст завдання	Хвора 52-х років скаржиться на косме-тичні дефекти зубів, які помітила декілька років тому. Об'єктивно: на вестибулярних поверхнях в пришийковій області премолярів і різців щілиноподібні дефекти в межах плащового дентину, утворені гладенькими, блискучими поверхнями. Шийки зубів ого-лені, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. Зондування дефектів безболісне. Встано-віть діагноз:
Правильна відповідь	Клиноподібний дефект
В	Ерозія твердих тканин зубів
С	Некроз твердих тканин зуба
Д	Хронічний середній карієс

Е	Гострий середній карієс
№	крок 2019
Тема	Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Пацієнт 63-х років скаржиться на мно-жинні болісні висипання у порожнині рота, на шкірі обличчя і тулуба, підвищення тем-ператури. За 3-4 дні до висипань відзнача-лося печіння, а потім різкий біль, що нага-дує простріл. Пацієнт приймає цитотокси-чні препарати з приводу лейкемії. При огля-ді на червоній облямівці і слизовій оболонці губ, язика і щоки справа виявлені множинні маленькі ерозії, розташовані у вигляді лан-цюжка, з обідками гіперемії, не схильні до злиття, різко болісні при пальпації. На шкі-рі обличчя справа визначаються везикули і ерозії. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Оперізувальний лишай
В	Багатоформна ексудативна еритема
С	Вторинний сифіліс
Д	Токсико-алергічний дермато-стоматит
Е	Хронічний рецидивний герпес
№	крок 2019
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хворий 20-ти років звернувся зі скарга-ми на виникнення безпричинних больових нападів (5-7 хвилин) в ділянці 36 зуба про-тягом доби. Об'єктивно: в 36 зубі глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Зондування болісне в одній точці, холодова проба болісна, з післядією 5 хвилин. Перку-сія безболісна. На рентгенограмі кореневі канали мають незначний вигин, просвіт ка-налів чітко відображений. Зуб планується як опора для мостоподібного протеза. Який з перерахованих методів лікування є най-більш прийнятним?
Правильна відповідь	Вітальна екстирпація
В	Вітальна ампутація
С	Біологічний метод
Д	Девітальна ампутація
Е	Пломбування каріозної порожнини
№	крок 2019
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	З вогнища ураження в ретромолярній ді-лянці взято біоптат. Патогістологічні дані: спостерігається поліморфізм клітин шипу-ватого шару, збільшення числа мітозів, гі-гантські багатоядерні клітини, акантоз, паракератоз частини клітин шипуватого ша-ру, відзначаються ''рогові перлини''. Якому захворюванню відповідає дана патогістологічна картина?

Правильна відповідь	Хвороба Боуена
B	Кератоакантома
C	Лейкоплакія
D	Червоний вовчак
E	Бородавчаста форма червоного плескато-го лишаю
№	крок 2019
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хвора 67-ми років скаржиться на появу виразки на слизовій оболонці порожнини рота, біль при прийманні їжі. Із анамне-зу: страждає на декомпенсовані вади сер-ця. При огляді в задньому відділі слизової оболонки щоки зліва визначається виразка неправильної форми вкрита біло-сірим на-льотом. В навколишніх тканинах відсутня запальна реакція слизової оболонки. На-звіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Трофічна виразка
B	Декубітальна виразка
C	Виразково-некротичний стоматит
D	Ракова виразка
E	Туберкульозна виразка
№	крок 2019
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Чоловік 21-го року скаржиться на не-приємні відчуття в 26 зубі. Інколи виникає біль при вживанні їжі, частіше гарячої. Зуб змінений в кольорі. Об'єктивно: в 26 зубі глибока каріозна порожнина, яка з'єднана з порожниною зуба. Поверхнєве зондування безболісне. Реакція на тепловий подразник - повільно зростаючий та повільно затихаю-чий біль. ЕОД- 70 мкА. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний гангренозний пульпіт
B	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
C	Хронічний фіброзний періодонтит
D	Хронічний фіброзний пульпіт
E	Загострення хронічного фіброзного пуль-піту
№	крок 2019
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота

Текст завдання	Хворий 53-х років страждає на цукровий діабет, має скарги на печіння, сухість в роті, біль при вживанні їжі, виділення в'язкої слини. Впродовж 7-ми років користується знімними пластинковими протезами. Об'єктивно: на гіперерованій, набряклій слизовій оболонці щік в ділянках кутів рота, спинці язика та піднебінні незначний наліт, що важко знімається, після видалення якого оголюється ерозивна поверхня. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Хронічний атрофічний кандидоз
В	Червоний плесканий лишай, ексудативно-гіперемічна форма
С	Лейкоплакія, ерозивна форма
Д	Гострий атрофічний кандидоз
Е	Червоний плесканий лишай, ерозивно- виразкова форма
№	крок 2019
Тема	Ендодонтичний інструментарій
Текст завдання	Пацієнту 35-ти років проводиться лікування хронічного фіброзного пульпіту 25 зуба. Планується пломбування каналу методом вертикальної конденсації розігрітої гутаперчі. Який інструмент необхідний для конденсації гутаперчі?
Правильна відповідь	Плагер
В	Коренева голка
С	Ендодонтичний зонд
Д	К-файл
Е	Спредер
№	крок 2019
Тема	Пломбувальні матеріали
Текст завдання	Пацієнтка 27-ми років звернулася в стоматологічну клініку зі скаргами на естетичний дефект в області верхніх центральних різців. Поставлений діагноз: хронічний глибокий карієс, ІV клас за Блеком. Планується естетична реставрація 11 і 21 лубів. Виберіть матеріал з найкращим поєднанням міцності і естетичних властивостей:
Правильна відповідь	Гібридні композити
В	Компомери
С	Рідкі композити
Д	Макронаповнені композити
Е	Мікронаповнені композити
№	крок 2019
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота

Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на зміну кольору ясен, біль при вживанні гострої їжі, слабкість, дратівливість. Зазначає, що періодично виникають плями і бульбашки на шкірі. Тривалий час працює в гальванічно-му цеху. При огляді хворий блідий, на яснах виявлена облямівка сіро-чорного кольору, на слизовій порожнині рота поодинокі ерозії, болючі при пальпації. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Інтоксикація солями свинцю
В	Отруєння солями ртуті
С	Багатоформна ексудативна еритема
Д	Гострий лейкоз
Е	Виразково-некротичний стоматит Венсана
№	крок 2019
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Хворий 25-ти років скаржиться на наявність порожнини у зубі на нижній щеле-пі зліва, біль від солодкого, кислого і під час прийому твердої їжі. Об'єктивно: в 16 зубі глибока каріозна порожнина, виповнена світлим розм'якшеним дентином. Зондування болісне по дну каріозної порожнини, реакція на холод болісна, зникає відразу після усунення подразника. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс
В	Хронічний глибокий карієс
С	Гострий вогнищевий пульпіт
Д	Гострий середній карієс
Е	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2019
Тема	Некаріозні ураження зубів
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся зі скарга-ми на відчуття оскоми, злипання зубів при змиканні, чутливість фронтальних зубів до термічних і механічних подразників. Об'єктивно: зміна зовнішнього вигляду емалі 13, 12, 11, 21, 22, 23. Емаль матова, шорстка, на ріжучих краях відсутня. Зондування вестибулярної поверхні вказаних зубів болісне, термопроба позитивна. З анамнезу встановлено, що пацієнт працює на виробництві не-органічних кислот. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Некроз твердих тканин зуба
В	Флюороз
С	Патологічна стертість зубів
Д	Гіоплазія емалі

Е	Ерозія емалі
№	крок 2019
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворий 25-ти років скаржиться на кро-воточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно: гіперемія і набряк ясенного краю фронтальних зубів верхньої та ни-жньої щелеп, ясенні сосочки при дотику кровоточать. Пародонтальні кишені від-сутні. Рентгенологічних змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий катаральний гінгівіт
В	Генералізований пародонтит 1 ступеня
С	Хронічний катаральний гінгівіт
D	Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
Е	Гострий виразковий гінгівіт
№	крок 2019
Тема	Хейліти
Текст завдання	Чоловік 36-ти років скаржиться на свербіння, почервоніння, наявність висипки на губах та шкірі. Об'єктивно: черво-на облямівка губ, прилегла шкіра та ку-точки рота гіперемовані, набряклі. На їх фоні визначаються дрібні пухирці з серо-зним ексудатом, деякі зливаються між со-бою, деякі зруйновані і вкриті кірочками. Наявне мокнуття. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий екзематозний хейліт
В	Контактний алергічний хейліт
С	Гландулярний хейліт
D	Актинічний хейліт, ексудативна форма
Е	Ексфоліативний хейліт, ексудативна фор-ма
№	крок 2019
Тема	Захворювання губ. Хейліти
Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на бо-лісний дефект щілиноподібної форми ни-жньої губи, який з'явився місяць тому. Об'є-ктивно: встановлено сухість нижньої губи, лінійне порушення цілісності червоної обля-мівки нижньої губи, що частково перехо-дить на слизову оболонку, локалізується в середній частині, вкрита кров'янистою кір-кою. Встановіть можливий діагноз:
Правильна відповідь	Хронічна тріщина губи
В	Атопічний хейліт
С	Синдром Мелькенсона-Розенталя

D	Хронічна лімфедема губ
E	Гранулематозний хейліт Мішера
№	крок 2019
Тема	Лікування ускладнень карієсу зубів
Текст завдання	Під час лікування гострого глибокого карієсу 16 зуба у пацієнтки 18-ти років було перфоровано пульпову камеру. Перфорація у вигляді крапки в проекції рогу пульпи. Яку тактику лікування доцільно застосува-ти в даному випадку?
Правильна відповідь	Біологічний метод
B	Девітальна ампутація
C	Вітальна екстирпація
D	Накласти ізоляційну прокладку та постій-ну пломбу
E	Девітальна екстирпація
№	крок 2019
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хворий 36-ти років звернувся зі скар-гами на наявність виразки на нижній губі зліва. Три тижні тому з'явилося на губі не-значне почервоніння округлої форми, яке з часом стало інтенсивнішим і ущільненим. В центрі його утворилася виразка 2-3 дні тому, а під щелепою з'явилися множинні вузлики, які хворому не болять. Об'єктивно: на сли-зовій оболонці нижньої губи зліва виразка овальної форми розміром 1,2 см з рівними, чіткими межами. Яскраво-червоним бли-скучим дном. Краї виразки мають вигляд валика, що плавно спускається до низу, а в її основі щільний безболісний інфільтрат. Під-щелепні лімфовузли збільшені, безболісні. Шкіра над ними не змінена. Якому захворю-ванню відповідає клінічна картина?
Правильна відповідь	Сифіліс (первинний період)
B	Виразковий хейліт
C	Трофічна виразка
D	Червоний вовчак
E	Рак губи
№	крок 2019
Тема	Лікування карієсу зубів
Текст завдання	Пацієнту 25-ти років встановлений діаг-ноз: гострий глибокий карієс 13 зуба V клас за Блекум. Планується проведення естети-чної реставрації 13 зуба фотополімерним композитним матеріалом. Який матеріал слід використати для прокладки на дно ка-ріозної порожнини в даному випадку?
Правильна відповідь	Кальційвмісна паста

В	Девіталізуюча паста
С	Дентин-паста
Д	Резорцин-формалінова паста
Е	Йодоформна паста
№	крок 2019
Тема	Ендодонтичний інструментарій
Текст завдання	Пацієнту показане ендодонтичне лікування 21 зуба. Інструментальна обробка ка-налу проводиться ручними ендодонтичними інструментами. Як називається ендодонтичний інструмент, виготовлений шляхом спіральної конусоподібної нарізки (виточу-вання) сталевого дроту круглого перерізу (фрезерування)?
Правильна відповідь	Н-файл
В	Спредер
С	К-файл
Д	К-ример
Е	Плагер
№	крок 2019
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Чоловіку 32-х років встановлений діа-гноз: виразковий гінгівіт. Після антисепти-чної обробки порожнини рота під анесте-зією лікар провів видалення зубних відкла-день і некротичного нальоту. Планується закінчити відвідування накладенням ясенної пов'язки. Який препарат етіотропної дії не-обхідно ввести в склад ясенної пов'язки?
Правильна відповідь	Метронідазол
В	Метілурацил
С	Пімафуцин
Д	Контрикал
Е	Терилітин
№	крок 2019
Тема	Глосити
Текст завдання	Хворий 55-ти років скаржиться на пе-чіння, неприємні відчуття у язиці. Близько 5-ти років хворіє на гіпоацидний гастрит. Які зміни язика найбільш імовірні для цього хворого?
Правильна відповідь	Атрофія і згладженість сосочків
В	Ерозії на бічних поверхнях язика
С	Гіпертрофія сосочків

D	Складчастість язика
E	Обкладеність язика
№	крок 2019
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворий 39-ти років звернувся зі скарги на неприємний запах з рота, кровотоочивість та болючість ясен, рухомість зубів. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряк-клі, нижні фронтальні зуби рухомі, I-II ступінь рухомості. Пародонтальні кишечні 4-5 мм. На рентгенограмах: резорбція міжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
B	Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
C	Генералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг
D	Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
E	Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
№	крок 2019
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	При профілактичному огляді стоматологом у пацієнта 20-ти років виявлені дефекти емалі у вигляді шорхуватих білих плям з нерівними контурами в пришийковій області вестибулярної поверхні 11 і 12 зубів, які зафарбовуються 2% розчином метиленово-го синього. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів V клас за Блеком
B	Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів V клас за Блеком
C	Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів III клас за Блеком
D	Вогнищева гіпоплазія емалі 11 і 12 зубів
E	Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів III клас за Блеком
№	крок 2019
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	У пацієнта 41-го року, після видалення 46 зуба, на контактно-дистальній поверхні 45 зуба виявлений дефект в межах емалі з нечіткими контурами, темно-коричневого кольору, крихкий при зондуванні. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний поверхневий карієс II клас за Блеком
B	Хронічний середній карієс IV клас за Блеком
C	Хронічний поверхневий карієс IV клас за Блеком
D	Хронічний початковий карієс IV клас за Блеком

Е	Хронічний початковий карієс II клас за Блемом
№	крок 2019
Тема	Передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хворий 47-ми років, будівельник. Скар-ги на наявність на нижній губі розростання, яке з'явилося 1 місяць тому. Крім естети-чного дискомфорту нічим не турбує. Об'є-ктивно: на тлі візуально незміненої черво-ної облямівки нижньої губи - напівсферичне утворення (6мм у діаметрі, 3 мм - висота) з горбистою поверхнею синюшно-червоного кольору. Пальпаторно - утворення безболісне, помірнощільної консистенції, без інфільтрату у основі і по периферії утворення. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпую-ться. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Бородавчастий передрак червоної облямівки
В	Піогенна гранульома
С	Кератоакантома
Д	Вірусна бородавка
Е	Рак нижньої губи
№	крок 2019
Тема	Пломбувальні матеріали
Текст завдання	Хворий 57-ми років звернувся до сто-матолога зі скаргами на застрягання їжі на зубах нижньої щелепі справа. Під час опиту-вання з'ясовано, що у пацієнта є кардіостимулятор. Об'єктивно: у 44 зубі на дистальній контактній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину, виповнена зали-шками їжі. Дентин пігментований, щільний. Зондування, перкусія, термопроба - безбо-лісні. Який пломбувальний матеріал ПРО-ТИПОКАЗАНИЙ даному пацієнту?
Правильна відповідь	Фотополімерний композит
В	Силікатний цемент
С	Амальгама
Д	Склоіономерний цемент хімічного твер-діння
Е	Цинк-фосфатний цемент
№	крок 2019
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хвора 62-х років скаржиться на наяв-ність болючих пухирів, які швидко лопаю-ться й утворюють ерозивну поверхню. На об'єктивному обстеженні виявлений пози-тивний симптом Нікольського. За допомо-гою цитологічного дослідження виявлені акантолітичні клітини мальпігієвого ша-ру епідермісу (клітини Тцанка). Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Пухирчатка

В	Пемфігоїд
С	Герпетичний стоматит
D	Багатоформна ексудативна еритема
Е	ХРАС
№	крок 2019
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хворий 45-ти років скаржиться на ниючий, тривалий біль в 46 зубі, який з'являється під дією температурних і хімічних подразників. При огляді 46 зуба в пришийковій області на вестибулярній поверхні глибока каріозна порожнина, заповнена пігменто-ваним розм'якшеним дентином. Зондування різко болюче в одній точці. На холодну воду з'являється повільно наростаючий ниючий біль. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний пульпіт
В	Хронічний фіброзний періодонтит
С	Хронічний глибокий карієс
D	Хронічний гангренозний пульпіт
Е	Гострий глибокий карієс
№	крок 2019
Тема	Хронічний конкрементозний пульпіт
Текст завдання	Хворий 25-ти років скаржиться на мимовільний нападоподібний біль в лівій скро-ні. Біль спонтанно виникає ввечері. Інколи біль виникає при нахилах голови, при злетах літака. Об'єктивно: всі зуби інтактні; ого-лення шийок 24 і 36 зубів. Перкусія 24 зуба дає слабковиразний біль. На рентгеногра-мі 24 зуба в центральній частині коронкової порожнини визначається дентинової щіль-ності утворення - 0,5x0,5 мм. Запропонуйте метод лікування:
Правильна відповідь	Вітальна екстирпація пульпи 24 зуба
В	Курс новокаїнової блокади з вітаміном <i>B1</i>
С	Вітальна ампутація 24 зуба
D	Ремінералізуюча терапія пришийкових ділянок 24 і 36 зубів
Е	Електрофорез з йодидом калію в проекції верхівки 24 зуба
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворому 32-х років після ретельного дослідження був встановлений діагноз: чорний "волосатий" язик. Які лікарські засоби необхідно призначити хворому?
Правильна відповідь	Кератолітичні

B	Кератопластичні
C	Вітаміни
D	Антисептики
E	Противірусні
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 55-ти років скаржиться на печіння, неприємні почуття у язиці. Близько 5-ти років хворіє на гіпоацидний гастрит. Які зміни язика найбільш імовірні для цього хворого?
Правильна відповідь	Атрофія і згладженість сосочків
B	Гіпертрофія сосочків
C	Ерозії на бічних поверхнях язика
D	Обкладеність язика
E	Складчастість язика
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	При профілактичному огляді ротової порожнини у хворого 40-ка років виявлені зміни наступного характеру: маргінальна частина ясен валоподібно збільшена, синюшна, при дотику стоматологічним зондом помірно кровоточить, больові відчуття відсутні. При фарбуванні ясен розчином Люголя слизова оболонка забарвлюється в світло-коричневий колір. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний катаральний гінгівіт
B	Гострий катаральний гінгівіт
C	Загострення хронічного катарального гінгівіту
D	Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
E	Генералізований пародонтит
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Чоловік 26-ти років скаржиться на постійний біль у зубі на верхній щелепі справа, який посилюється при накушуванні. Три дні тому в 12 зуб була накладена арсеновмісна паста. Своєчасно на прийом пацієнт не з'явився. Об'єктивно: на медіальній поверхні 12 - герметична пов'язка, перкусія різко болісна. Лікарем-стоматологом було поставлено діагноз: гострий миш'яковистий періодонтит. Виберіть правильну тактику лікування:
Правильна відповідь	Антидот арсену залишають у кореновому каналі під герметичною пов'язкою

В	Антидот арсену залишають під герметичною пов'язкою у каріозній порожнині
С	Призначають внутрішньоканальний електрофорез з антидотом, зуб лишають відкритим
Д	Промивають антидотом кореневий канал, зуб лишають відкритим
Е	Видаляють дентинну пов'язку, призначають електрофорез з антидотом по перехідній складці
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 25-ти років скаржиться на загальне нездужання, підвищення температури тіла, різку кровоточивість, розростання ясен. В анамнезі: носові кровотечі. Об'єктивно: системне збільшення лімфатичних вузлів, блідість шкірних покривів і слизових, гіперплазія слизової ясен II-III ст., крововиливи в слизову щік, виразки, вкриті сірим нальотом. Який з методів обстеження є найбільш доцільним для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Розгорнутий аналіз крові
В	Проба Ясиновського
С	Бактеріоскопічне дослідження
Д	Імунологічне дослідження
Е	Аналіз крові на цукор
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 19-ти років скаржиться на постійний біль в 22 зубі, який підсилюється при накушуванні на зуб, відчуття "вирослого" зуба, набряк верхньої губи. В анамнезі хворий відзначає травму верхньої щелепи. Об'єктивно: 22 зуб інтактний. Вертикальна перкусія різко болісна. Верхня губа набрякла, перехідна складка в області 22 зуба почервоніла, болісна під час пальпації. Який ще метод обстеження необхідний для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Рентгенографія
В	ЕОД
С	Рентгенографія
Д	Трансілюмінація
Е	Термометрія
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія

Текст завдання	Хворий скаржиться на наявність каріозної порожнини в 11 зубі. Пломба випала тиждень тому. Коронка зуба темного кольору, на дні каріозної порожнини залишки пломбувального матеріалу. Вертикальна перкусія безболісна. На рентгенограмі - резорбція кісткової тканини овальної форми, з чіткими контурами, розміром 0,4x0,3 см. Кореневий канал запломбований на 2/3 довжини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний грануломатозний періодонтит
В	Хронічний фіброзний періодонтит
С	Хронічний гранулюючий періодонтит
Д	Радикулярна кіста
Е	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 28-ми років направлений на санацію порожнини рота. Під час огляду: на жувальній поверхні 17 зуба пломба, перкусія безболісна. Слизова оболонка в проекції верхівки кореня 17 синюшна, симптом вазопарезу позитивний. При рентгенологічному дослідженні у верхівок коренів вогнища деструкції кісткової тканини з нечіткими контурами, кореневі канали не пломбовані. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гранулюючий періодонтит
В	Хронічний фіброзний періодонтит
С	Хронічний гранулематозний періодонтит
Д	Радикулярна паста
Е	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хвора 30-ти років скаржиться на незначне печіння та сухість нижньої губи. Хвора скусує лусочки з губ. Хворіє понад 10 років. При огляді лусочки сірого кольору, розташовані на губі від лінії Клейна до середини червоної облямівки від кута до кута рота. Лусочки міцно прикріплені у центрі та дещо відстають по периферії, при насильному відторгненні їх ерозії не з'являються. Назвіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Ексфоліативний хейліт
В	Червоний вовчак
С	Метеорологічний хейліт
Д	Алергічний хейліт
Е	Екзематозний хейліт

№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	У хворого 32-х років температура тіла - 38,9° С, загальна слабкість, утруднення мови, неможливість приймати їжу. Впродовж 4-х років захворювання повторюється в осінньо-весняний період. На гіперерованій та набряклій слизовій губ, щок - міхури та ерозії, вкриті фібринозним нальотом сіруватого кольору. Симптом Нікольського негативний. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Багатоформна ексудативна еритема
В	Вульгарна пухирчатка
С	Гострий герпетичний стоматит
D	Неакантолітична пухирчатка
Е	Герпетичний дерматит Дюрінга
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Жінка 41-го року скаржиться на наявність дефектів твердих тканин на центральних та бокових різцях верхньої щелепи, які суб'єктивно їй не турбують. Зі слів хворої, дефекти з'явилися рік тому, з часом вони збільшуються. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 12, 11, 21 та 22 зубів визначаються дефекти твердих тканин кулястої форми в межах емалево-дентинного з'єднання. Дно дефектів гладеньке, блискуче, тверде. Мешкає у місцевості з вмістом фтору у питній воді - 0,7 мг/л. Яка тактика лікування є найбільш доцільною у даному випадку?
Правильна відповідь	Пломбування композитним матеріалом без препарування
В	Лікарське втручання не потрібне
С	Місцева флюоризація
D	Препарування і пломбування композитним матеріалом
Е	Ремінералізуюча терапія
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий, каменяр за фахом, скаржиться на свербіж, печіння, болісність губ, що з'являються влітку і зникають у решту пору року. Хворіє впродовж 3-х років. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи гіперерована, набрякла, на ній пухирці, ерозії діаметром 2 мм, болісні під час пальпації, кірки, тріщини. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Актинічний хейліт, ексудативна форма
В	Контактний алергічний хейліт
С	Метеорологічний хейліт

D	Екзематозний хейліт, ексудативна форма
E	Ексфолювативний хейліт, ексудативна форма
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 26-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла до $38,7^{\circ}C$, біль під час прийому їжі і ковтання, різкий неприємний запах з рота. Лімфовузли, особливо шийні, збільшені, рухливі, безболісні. Об'єктивно: генералізована гіперемія СОПР, множинні петехії, ділянки некрозу і рясний наліт у передньому відділі глотки. У крові: збільшення ШОЕ, виражений лейкоцитоз, моноцитоз, атипові мононуклеари, тромбоцитопенія. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Інфекційний мононуклеоз
B	Стоматит Венсана
C	Герпетична ангіна
D	Монобластний лейкоз
E	Гострий герпетичний стоматит
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий скаржиться на постійний біль у ділянці 25 впродовж доби. Об'єктивно: на медіальній поверхні 25 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на холод безболісна. На Ro-грамі: кісткова тканина періапикальної ділянки без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний періодонтит
B	Гострий дифузний пульпіт
C	Гострий гнійний пульпіт
D	Гострий гнійний періодонтит
E	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Жінка 51-го року скаржиться на відчуття печіння та поколювання спинки і бічних поверхонь язика, що зникає під час їжі, але посилюється увечері, сухість у роті, спотворення смакових відчуттів. Уперше подібні відчуття з'явилися рік тому після психічної травми, з плином часу відчуття посилюються. Страждає анацидним гастритом, цукровим діабетом, погано спить. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Глосодинія

B	Гангліоніт під'язикових гангліїв
C	Глосит Гентера-Міллера
D	Десквамативний глосит
E	Кандидозний глосит
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 45-ти років, скаржиться на дискомфорт в 27 зубі, виникнення ниючого болю при накушуванні. В анамнезі: при переохолодженні на яснах відкривається нориця. Об'єктивно: коронка 27 змінена в кольорі, пломба на жувальній поверхні, на слизовій оболонці ділянці зуба рубець від нориці. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гранулюючий періодонтит
B	Хронічний гангренозний пульпіт
C	Хронічний фіброзний періодонтит
D	Хронічний грануломатозний періодонтит
E	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хвора 42-х років скаржиться на різке збільшення губ, свербіж, відчуття напруги. Свій стан хвора пов'язує з використанням нової губної помади. Об'єктивно: губи дуже збільшені, напружені, під час пальпації цупкі, еластичної консистенції, безболісні, регіонарні лімфовузли не змінені. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Контактний алергічний хейліт
B	Метеорологічний хейліт
C	Ексфоліативний хейліт
D	Гландулярний хейліт
E	Актинічний хейліт
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 26-ти років, скаржиться на сильний біль у роті, підвищення температури тіла до 39° C, нездужання. Хворіє впродовж декількох років, захворювання має сезонний характер. Об'єктивно: губи вкриті геморагічними кірками, на гіперемованій та набряклій слизовій щік, дна порожнини рота - ерозії з фібринозним нальотом. Симптом Нікольського - негативний. Гіперсаливація. Регіональний лімфаденіт. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Багатоформна ексудативна еритема

В	Гострий герпетичний стоматит
С	Хронічний рецидивуючий афтозний стома-тит
Д	Акантолітична пухирчатка
Е	Вторинний сифіліс
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 35-ти років скаржиться на самовільний гострий нападоподібний біль в 25 зубі, що триває до 30 хвилин, вночі посилюється, безбольові проміжки до трьох годин. Біль виникає та посилюється при дії термічних і механічних подразників. Об'єктивно: на жувальній поверхні 25 зуба глибока каріозна порожнина, виповнена розм'якшеним дентином, пульпова камера закрита, зондування різко болоче в одній точці в місці проекції рогу пульпи. ЕОД- 25 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий обмежений пульпіт
В	Гострий гнійний пульпіт
С	Загострення хронічного періодонтиту
Д	Гіперемія пульпи
Е	Гострий дифузний пульпіт
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 50-ти років, працівник типографії, звернувся з скаргами на неприємний запах з рота, та значне збільшення кількості слини. Об'єктивно: на фоні гіперемованих та дещо набряклих ясен спостерігається синьо-чорна облямівка по краю ясен в ділянці зубів нижньої щелепи, та у фронтальній ділянці верхньої щелепи. Наявні значні зубні відкладення. Який стоматит у пацієнта?
Правильна відповідь	Свинцевий
В	Ртутний
С	Вісмутовий
Д	Катаральний
Е	Виразково-некротичний
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія

Текст завдання	Хворий 21-ого року, встановлено діагноз: хронічний катаральний генералізований гінгівіт, легкого ступеню важкості, загострення. Має місце скупчення нижніх фронтальних зубів. ПІ=3,1. Який з нижченаведених засобів необхідно призначити хворій для профілактики утворення нальоту?
Правильна відповідь	Хлоргексидин
В	Перекис водню
С	Хімопсин
D	Альобуцид
Е	Фурацилін
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 42-х років з'явився зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після обстеження встановлений попередній діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості. Оцінка результату якого дослідження найбільш інформативна для встановлення остаточного діагноза?
Правильна відповідь	Рентгенографія
В	Глибина пародонтальних кишень
С	Рухливість зубів
D	Проба Кулаженко
Е	Проба Кетчке
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Жінка 28-ми років скаржиться на біль під час прийому їжі і ковтання, загальну слабкість. Захворювання почалося гостро з підйому температури тіла до $37,9^{\circ}C$, болів у м'язах. Об'єктивно: на фоні набряклої і гіперемованої слизової м'якого піднебіння, передніх дужок, задньої стінки глотки визначаються згруповані і поодинокі везикули з серозно-геморагічним вмістом, а також ерозовані ділянки різної величини з фестончастими краями, вкриті фібринозним нальотом, слабо болісні під час дотику. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Герпангіна
В	Грипозний стоматит
С	Оперізуючий лишай
D	Гострий герпетичний стоматит
Е	Ящур
№	крок 2017-2018

Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Жінка 29-ти скаржить на свербіж, печіння, болісність червоної облямівки губ, що з'являється навесні і влітку, і зникають в інші пори року. Хворіє впродовж 5-ти років. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи гіперемована, набрякла, на цьому фоні визначаються дрібні міхурці, ерозії діаметром до 3 мм, вкриті кірками, болісні під час дотику, поодинокі тріщини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Актинічний хейліт, ексудативна форма
В	Метеорологічний хейліт
С	Гострий екзематозний хейліт
Д	Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма
Е	Ерозивна форма червоного вовчаку червоної облямівки губ
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 19-ти років звернувся зі скаргами на наявність косметичного дефекту всіх зубів, який з'явився відразу після прорізування зубів. Об'єктивно: на вестибулярній та жувальних поверхнях всіх зубів верхньої та нижньої щелепи дефекти емалі, наявність темно-бурого забарвлення коронок. Перкусія та зондування болісне. В області проживання вміст фтору в воді - 2,6 мг/л. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Флюороз
В	Системна гіпоплазія
С	Хронічний початковий карієс
Д	Ерозія емалі
Е	Хронічний поверхневий карієс
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на відчуття оскомини, чутливість фронтальних зубів до термічних і механічних подразників. Об'єктивно: зміна зовнішнього вигляду емалі 13, 12, 11, 21, 22, 23. Емаль матова, шорстка, на різьблених краях відсутня. Зондування вестибулярної поверхні вказаних зубів болісне, термопроба позитивна. З анамнезу встановлено, що пацієнт працює на виробництві неорганічних кислот. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Некроз твердих тканин зуба
В	Флюороз
С	Ерозія емалі
Д	Патологічна стертість зубів

Е	Гіпоплазія емалі
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	При лікуванні пульпіту у хворого 32-х років, ВІЛ-інфікованого, лікар-стоматолог випадково пошкодив шкіру руки. Як повинен вчинити лікар в даному випадку?
Правильна відповідь	Витиснути кров з пошкодженої ділянки, обробити 70% розчином спирту
В	Промити пошкоджену ділянку водою
С	Обробити пошкоджену ділянку 2% розчином борної кислоти
Д	Обробити пошкоджену ділянку 0,01% розчином перманганату калію
Е	Обробити пошкоджену ділянку 0,05% розчином хлоргексидину
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 37-ми років скаржиться на наявність на червоній облямівці білястої плями. Об'єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи посередині між кутом рота і серединною лінією ділянки ураження сірувато-білого кольору, неправильної (полігональної) форми, 7х4 мм, ледь западає відносно рівня червоної облямівки, поверхня вкрита дрібними щільно прикріпленими лусочками. Пальпація не виявляє ущільнення основи ураження, а при бічній пальпації ураження відчувається поверхнєве ущільнення. Регіонарні лімфовузли - без змін. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Обмежений передраковий гіперкератоз
В	Лейкоплакія, плоска форма
С	Хейліт Манганотті
Д	Червоний плоский лишай
Е	Рак нижньої губи
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 47-ми років, будівельник. Скарги на наявність на нижній губі розростання, яке з'явилося 1 місяць тому. Крім естетичного дискомфорту нічим не турбує. Об'єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи - утворення (6 мм у діаметрі, 3 мм - висота) з гладенькою поверхнею синюшно-червоного кольору. Пальпаторно - утворення безболісне, помірно-щільної консистенції, без інфільтрату у основі і по периферії утворення. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Бородавчастий передрак червоної облямівки

В	Вірусна бородавка
С	Кератоакантома
Д	Рак нижньої губи
Е	Піогенна гранульома
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 46-ти років скаржиться на швидко-минутий біль і на естетичну неповноцінність фронтальних зубів. Дефекти почали проявлятися близько 10 років тому. В пришийковій ділянці на вестибулярній поверхні 23, 24, 44, 45 зубів дефекти твердих тканин зубів у вигляді двох площин, які сходяться під кутом у формі клину. Дно і стінки дефектів гладкі, блискучі, краї рівні. Який пломбувальний матеріал доцільно застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	Гібридний склоіономерний цемент
В	Композит хімічного затвердіння
С	Силіко-фосфатний цемент
Д	Композит світлового затвердіння
Е	Силікатний цемент
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 68-ми років скаржиться на безболісне збільшення ясен. В анамнезі: епілепсія, тривалий прийом гідантоїну. Об'єктивно: ясна на всьому протязі обох щелеп гіпертрофована, щільна, болісна при пальпації, вкриває коронки зубів до половини їх висоти. Виявлені ясенні кишні глибиною 5 мм. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
В	Вірусні бородавки
С	Фіброматоз ясен
Д	Гіперпластичний синдром при лейкозі
Е	Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Під час огляду порожнини рота на жувальній поверхні 37 зуба виявлена каріозна порожнина у межах плащового дентину. Дентин світлий, розм'якшений, нависаючі краї емалі. Зондування стінок каріозної порожнини - болісне. Перкусія 37 зуба - безболісна. ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий середній карієс

В	Гострий глибокий карієс
С	Хронічний середній карієс
D	Ерозія емалі
Е	Гострий поверхневий карієс
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить лікування карієсу в 37 зубі (І клас за Блекум) у пацієнта 28-ти років. Об'єктивно: у дистальній фігурі 37 визначається невелика каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим розм'якшеним дентином, решта фісур "закриті", глибокі, важкодоступні, пігментовані. Оберіть оптимальну тактику лікування 37 у даному випадку:
Правильна відповідь	Профілактичне пломбування з інвазивним закриттям фісур
В	Метод "профілактичного розширення" за Блекум
С	ART-методика препарування і пломбування
D	Профілактичне пломбування з неінвазивним закриттям фісур
Е	Щадне препарування за принципом "біологічної доцільності" Лукомського
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Вагітна (36 тижнів) скаржиться на кровоточивість ясен, рясне утворення зубного нальоту, незважаючи на ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота. Об'єктивно: ясеневі сосочки і маргінальний край ясен пухкі, кровоточать під час дотику. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,7 бали. Яку пасту слід рекомендувати цій хворій після проведення професійної гігієни порожнини рота?
Правильна відповідь	Що містить хлоргексидин
В	Що містить мінералізуючі препарати
С	Що містить рослинні препарати
D	Фторвмісну
Е	Гелеву
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хвора звернулась зі скаргами на біль у яснах, неприємний запах з рота, утруднене споживання їжі, загальну слабкість, субфебрильну температуру. Об'єктивно: ясна гіперемовані, звиразковані місцями, вкриті некротичним нальотом. При мікроскопічному дослідженні виявлено фузоспірохетоз. Визначте препарат для етіотропного лікування:

Правильна відповідь	Метронідазол
B	Кератолін
C	Галаскорбін
D	Хлоргексидин
E	Хімотрипсин
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий скаржиться на кровоточивість ясен впродовж останніх 2 років. Об'єктивно: дифузний хронічний катаральний гінгівіт, рухомість зубів I ст., кишень 2-3 мм з незначним серозним ексудатом, виражена травматична оклюзія. На рентгенограмі порушення цілісності компактної пластинки, розширення періодонтальної щілини навколо вершин міжальвеолярних перегородок, остеопороз, резорбція міжальвеолярних перегородок у межах 1/3 висоти. Ваш діагноз:
Правильна відповідь	Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
B	Хронічний катаральний гінгівіт
C	Пародонтоз, I ступінь
D	Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
E	Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 23-х років скаржиться на різку кровотечу з ясен, неприємний запах з рота, що з'явилися 5 днів тому. Об'єктивно: міжзубні сосочки та ясенний край повсюди розпушені, яскраво-червоного кольору, набряклі, болючі і інтенсивно кровоточать під час пальпації. Ясенна кишенька - 3 мм. На рентгенограмі - виражений остеопороз міжальвеолярних перегородок, розширення періодонтальної щілини навколо верхівок міжальвеолярних перегородок. Компактна пластинка не порушена. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий катаральний гінгівіт
B	Гострий лейкоз
C	Гострий виразково-некротичний гінгівіт
D	Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
E	Гіповітаміноз С
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія

Текст завдання	Хвора 29-ти років скаржиться на короткочасний біль в області передніх зубів від температурних, механічних і хімічних подразників. Страждає на захворювання щитоподібної залози. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів дефекти, по краях емаль крейдяного кольору, шорстка, підвищеної ламкості, відколюється екскаватором. Дентин пігментований. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Некроз твердих тканин зуба
В	Ерозія твердих тканин зуба
С	Клиноподібний дефект
D	Гострий середній карієс
Е	Гіпоплазія емалі
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 53-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних подразників. Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, корені оголені до 1/3 довжини. Незначна кількість зубних відкладень. В 15, 14, 24 зубах - клиноподібні дефекти. Зондування оголених шийок та дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Пародонтоз I ступеня важкості
В	Катаральний гінгівіт
С	Пародонтит II ступеня важкості
D	Пародонтит I ступеня важкості
Е	Виразковий гінгівіт
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 23-ти років скаржиться на біль в яснах, що посилюється при прийомі їжі, неприємний запах з рота, погане самопочуття. Температура тіла - 37° С. Занедужав 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, легко кровоточить при зондуванні. По ясенному краю в ділянці 36, 37 і 38 зубів - виразки, вкриті брудно-сірим нальотом. Значні зубні відкладення. У мазку - фузоспірилярна флора. Який остаточний діагноз?
Правильна відповідь	Виразковий гінгівіт
В	Гіпертрофічний гінгівіт
С	Фіброматоз ясен
D	Генералізований пародонтит
Е	Катаральний гінгівіт
№	крок 2017-2018

Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 48-ми років з'явився до лікаря зі скаргами на розростання ясен ("ясна напливають на зуби"). Хворий страждає на епілепсію і приймає протисудомні препарати. Об'єктивно: ясенні сосочки нормального кольору, щільні, з горбистою поверхнею, при зондуванні не кровоточать та перекривають нижні фронтальні зуби до ріжучого краю. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма III ступеня
B	Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма III ступеня
C	Фіброматоз ясен
D	Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма II ступеня
E	Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма II ступеня
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 60-ти років скаржиться на свербіж ясен, підвищену чутливість зубів до хімічних, термічних та механічних подразників. Вважає себе хворим близько 20 років. Супутні захворювання: атеросклероз. Об'єктивно: ясна анемічні, атрофовані, оголення коренів зубів 3-4 мм, зуби стійкі. Пародонтальні кишени відсутні. Які дослідження потрібні для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Рентгендіагностика
B	Ехоостеометрія
C	Проба Шиллера-Писарева
D	Цитологія
E	Мікробіологічне дослідження
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 39-ти років звернувся зі скаргами на неприємний запах з рота, кровоточивість та болочість ясен, рухомість зубів. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, нижні фронтальні зуби рухомі, I-II ступінь рухомості. Пародонтальні кишени 4-5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
B	Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
C	Генералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг
D	Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг

Е	Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 30-ти років скаржиться на біль у зубі при вживанні гарячого і холодного, який іррадіює у вухо, скроню. Раніше в цьому зубі турбував самовільний нічний біль. Об'єктивно: в 37 зубі на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, що в одній точці сполучається з порожниною зуба. Реакція на зондування в точці сполучення, на холододовий подразник різко болісна, біль довго не вщухає. ЕОД- 55 мкА. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Загострення хронічного пульпіту
В	Гострий дифузний пульпіт
С	Гострий гнійний пульпіт
D	Хронічний конкрементозний пульпіт
Е	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	У хворого віком 28-ти років після сеансу внутрішньоканального електрофорезу 46 зуба 5% розчином йоду на слизовій оболонці твердого піднебіння справа з'явилася ділянка ураження у вигляді штрихів з біло-сірою поверхнею. Що з переліченого могло б бути причиною такого ураження?
Правильна відповідь	Електротравма
В	Механічна травма
С	Гальванізм
D	Хімічна травма
Е	Термічна травма
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий віком 21 рік звернувся до стоматолога зі скаргами на загальну слабкість, біль у м'язах, підвищення температури тіла до 38,3° С, розлади травного тракту, підвищене слиновиділення та висипання в роті, носі, сечівнику, а також на шкірі крил носа і міжпальцевих складок. Вказані симптоми з'явилися після споживання молока в селі. Який найімовірніший діагноз?
Правильна відповідь	Ящур
В	Герпетичний стоматит
С	Оперізувальний лишай

D	Синдром Бехчета
E	Інфекційний мононуклеоз
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий віком 28-ми років скаржиться на наявність безболісної виразки в роті, яка не зникає після самолікування. Об'єктивно: регіонарні лімфатичні вузли з лівого боку збільшені, безболісні. На слизовій оболонці лівої щоки округла виразка діаметром 1 см з піднятими краями та хрящоподібним інфільтратом в основі. Поверхня виразки - м'ясо-червоного кольору, пальпація не болюча. Встановіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Первинний сифіліс
B	Рак
C	Вторинний сифіліс
D	Туберкульозний вовчак
E	Декубітальна виразка
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хвора 27-ти років скаржиться на біль в зубі, який виник вперше. Тривалість болю до 2 хвилин. Об'єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина. Зондування дна чутливе. Перкусія безболісна. ЕОД- 12 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гіперемія пульпи
B	Гострий обмежений пульпіт
C	Гострий дифузний пульпіт
D	Гострий періодонтит
E	Загострення хронічного пульпіту
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнтка 22-х років звернулась до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Під час огляду ротової порожнини виявлено дефект твердих тканин у пришийковій ділянці в межах плащового дентину у 22 зубі. Дентин щільний, пігментований. Реакція на перкусію та зондування відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
B	Клиноподібний дефект
C	Гострий глибокий карієс

D	Гострий середній карієс
E	Некроз твердих тканин зуба
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Чоловік 36-ти років скаржиться на свербіж, почервоніння, наявність висипки на губах та шкірі. Об'єктивно: червона облямівка губ, прилегла шкіра та куточки рота гіперемовані, набряклі. На їх фоні визначаються дрібні пухирці з серозним ексудатом, деякі зливаються між собою, деякі зруйновані і вкриті кірочками. Наявне мокнуття. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий екзематозний хейліт
B	Актинічний хейліт, ексудативна форма
C	Контактний алергічний хейліт
D	Хронічний рецидивуючий герпес
E	Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	В процесі лікування 11 зуба з приводу пульпіту стоматолог проводить obturaцію кореневого каналу методом бічного ущільнення холодної гутаперчі. Оберіть інструмент для конденсації у каналі гутаперчі у даному випадку:
Правильна відповідь	Спредер
B	Вертикальний конденсатор
C	Гутта-конденсор
D	Плагер
E	Ендодонтичний зонд
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Лікар-стоматолог закінчує розширення кореневого каналу 32 зуба у чоловіка 45-ти років, використовуючи для цього "Step Back"-техніку. Апікальна частина каналу розширена до 30 розміру файла. Для вирівнювання стінок кореневого каналу лікар використав обертальні рухи H-файла 25 розміру. У процесі роботи відбувся відлам інструменту. Яка помилка допущена лікарем у процесі роботи?
Правильна відповідь	Не дотримано техніки роботи інструментом
B	Неправильно обраний розмір файла
C	Цей етап не передбачає роботу з H-файлом

D	При цій методиці Н-файл не використовується
E	Неправильно обраний метод інструментальної обробки каналу
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування 12 зуба з приводу хронічного періодонтиту. Рентгенологічно в ділянці верхівки кореня 12 визначається осередок деструкції розміром - 0,3x0,4 см без чітких контурів. Виберіть оптимальний матеріал для використання в якості силеру у даній клінічній ситуації:
Правильна відповідь	Із вмістом гідроксиду кальцію
B	На основі резорцин-формалінової смоли
C	На основі епоксидних смол
D	Склоіономірний цемент
E	Цинкооксидевгенольний цемент
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу санації. При об'єктивному обстеженні виявлено: в 16 зубі каріозна порожнина на жувальній поверхні в межах плащового дентину, дентин щільний, пігментований; зондування, перкусія безболісні, на температурні подразники зуб не реагує. Який додатковий метод діагностики буде найбільш інформативним для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Рентгенологічний
B	Транслюмінісцентна діагностика
C	Вітальне фарбування
D	Репародонтографія
E	Стоматоскопія
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хвора 32-х років скаржиться на наявність білих і пігментованих плям на зубах. Мешкає в місцевості із вмістом фтору у питній воді - 1,7 мг/л. Був поставлений діагноз: флюороз, крейдяно-крапчаста форма. Використання яких паст показане в даній ситуації?
Правильна відповідь	Кальційфосфатвмісні
B	Фторвмісні
C	Високоабразивні

D	Що містять рослинні екстракти
E	Триклозанвмісні
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	У пацієнта 28-ти років на жувальній поверхні 36 зуба виявлено пляму білого кольору без блиску. Який додатковий метод обстеження доцільно провести?
Правильна відповідь	Кольорові тести з барвниками
B	ЕОД
C	Визначення індексів гігієни
D	Проба Олдріча
E	Рентгенографія
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	До стоматолога звернулася пацієнтка 23-х років зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,5° С, головний біль, загальну слабкість, болісність при прийому їжі, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Об'єктивно: ясенний край виглядає начебто зрізаний, з нерівними контурами; поверхня його вкрита сірувато-жовтим нальотом, що легко знімається; при знятті оголюються ерозії та виразки, що кровоточать. У зскрібку з поверхні виразок виявляється велика кількість веретеноподібних фузобактерій та спірохет. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Виразково-некротичний стоматит Венсана
B	Третинний сифіліс
C	Цукровий діабет
D	Гострий лейкоз
E	Хвороба Верльгофа
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хвора звернулася зі скаргами на сильні болі в ділянці верхньої щелепи, що посилюються від гарячої їжі, біль при накушуванні та полегшення болю від дії холодної рідини. Об'єктивно: в 24 зубі каріозна порожнина заповнена розм'якшеним дентином, зондування дна різко болісне, перкусія позитивна. Який метод лікування слід застосувати для даного зуба?
Правильна відповідь	Вітальна екстирпація
B	Вітальна ампутація

С	Девітальна екстирпація
D	Комбінований метод
Е	Біологічний метод
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 25-ти років, кореспондент, скаржиться на мимовільний нападаподібний біль в лівій скроні. Біль спонтанно виникає ввечері. Інколи біль виникає при нахилі голови, при злетах та посадках літака. Об'єктивно: всі зуби інтактні. Оголення шийок 24 і 36 зубів. Перкусія 24 дає слабковиразний біль. Для встановлення діагнозу необхідно провести таке дослідження:
Правильна відповідь	Рентгенографія зубів лівої половини обох щелеп
B	ЕОД зубів лівої половини обох щелеп
С	Термодіагностика 24 і 36
D	Діагностична блокада II гілки <i>n.V</i>
Е	Діафаноскопія
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 25-ти років, кореспондент, скаржиться на мимовільний нападаподібний біль в лівій скроні. Біль спонтанно виникає ввечері. Інколи біль виникає при нахилах голови, при злетах літака. Об'єктивно: всі зуби інтактні; оголення шийок 24 і 36 зубів. Перкусія 24 дає слабковиразний біль. На рентгенограмі 24 центральній частині коронкової порожнини визначається дентинової щільності утворення - 0,5x0,5 мм. Запропонуйте метод лікування:
Правильна відповідь	Вітальна екстирпація пульпи 24
B	Курс новокаїнової блокади з вітаміном <i>B₁</i>
С	Вітальна ампутація 24
D	Електрофорез з йодидом калію в проекції верхівки 24
Е	Ремінералізуюча терапія пришийкових ділянок 24 і 36
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Медична комісія, до складу якої входить стоматолог, проводить диспансеризацію пацієнтів, які тривалий час мешкали у радіаційно забрудненій місцевості. З метою найбільш швидкого виведення з організму радіонуклідів надають рекомендації щодо раціонального харчування. Які продукти, що містять значну кількість пектинів, необхідно збільшити в раціоні харчування?

Правильна відповідь	Овочі та фрукти
B	М'ясні продукти
C	Макаронні вироби
D	Молочні продукти
E	Хлібобулочні вироби
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнтка 48-ми років скаржиться на біль під час прийому їжі та холодної води в 27 зубі. Біль зникає після усунення подразників. Об'єктивно: в 27 глибока каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину. Зондування болісне по всьому дну. Перкусія безболісна. Термодіагностика - біль зникає після усунення подразника. ЕОД- 16 мкА. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс
B	Гострий середній карієс
C	Гострий обмежений пульпіт
D	Гострий дифузний пульпіт
E	Гіперемія пульпи
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнту 20-ти років під час препарування каріозної порожнини випадково перфорували дно пульпової камери та оголили ріг пульпи. В ділянці дна каріозної порожнини видно крапкоподібний отвір, який оточений обідком білого предентину. Крізь перфоровану ділянку просвічується рожева пульпа, її зондування різко болісне. Яке лікування слід провести пацієнту?
Правильна відповідь	Біологічний метод
B	Вітальна ампутація
C	Вітальна екстирпація
D	Девітальна ампутація
E	Девітальна екстирпація
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія

Текст завдання	Жінка 37-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на швидкоминучий біль від солодкого в зубі. Об'єктивно: виявлена неглибока каріозна порожнина в межах емалі. Дно і стінки шорсткі при зондуванні, термопроба негативна. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий поверхневий карієс
B	Ендемічний флюороз
C	Гіоплазія емалі
D	Гострий середній карієс
E	Хронічний середній карієс
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 24-х років звернулася в стоматологічний кабінет зі скаргами на наявність крейдоподібних плям на зубах в фронтальній ділянці. Об'єктивно: на 13, 12, 11, 21, 22, 23 зубах - крейдоподібні плями, між якими є ділянки здорової незміненої емалі. Поверхня плям шорстка, термопроба негативна. Дитинство проводив в місцевості з вмістом фтору в питній воді - 1,8 мг/л. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Ендемічний флюороз
B	Гіоплазія емалі
C	Гіперплазія емалі
D	Гострий поверхневий карієс
E	Хронічний поверхневий карієс
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хвора скаржиться на гострий, мимовільний, нападаподібний біль, майже без періоду інтермісій, з іррадіацією в скроню; біль трохи слабшає від холодної води. Об'єктивно: глибока каріозна порожнина в 26 зубі, яка не сполучається з порожниною зуба. Зондування різко болісне по дну каріозної порожнини, вертикальна перкусія чутлива. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий гнійний пульпіт
B	Гострий дифузний пульпіт
C	Гіперемія пульпи
D	Хронічний фіброзний пульпіт
E	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
№	крок 2017-2018

Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Чоловік 78-ми років скаржиться на болісну виразку в порожнині рота, яка не загоюється протягом 2-х місяців. Хворий курить. Об'єктивно: на слизовій оболонці правої щоки неглибока виразка з горбистим дном, нерівними краями, розміром до 1,5 см. По периферії жовтуваті зернинки. Пальпація болісна, консистенція м'яка. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні, утворюють пакети. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Туберкульозна виразка
B	Ракова виразка
C	Декубітальна виразка
D	Трофічна виразка
E	Сифілітична виразка
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 48-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий короткочасний зубний біль від температурних, механічних і хімічних подразників, який припиняється відразу після припинення їх дії. Під час огляду 36 зуба визначається глибока каріозна порожнина 5 класу за Блемом із вузьким вхідним отвором, заповнена великою кількістю розм'якшеного дентину. Зондування болісне по дну каріозної порожнини, сполучення каріозної порожнини з порожниною зуба немає. Перкусія і пальпація 36 безболісні. ЕОД- 11 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс 36
B	Гострий частковий пульпіт 36
C	Гіперемія пульпи 36
D	Хронічний простий пульпіт 36
E	Клиноподібний дефект 36
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 32-х років скаржиться на затримку їжі та періодичний, постійний ниючий біль у зубі на верхній щелепі зліва. Об'єктивно: в 25 зубі композитна пломба, контактний пункт не відновлений. Міжзубний проміжок заповнений залишками їжі. Пародонтальна кишеня глибиною 2 мм із серозним ексудатом. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Локалізований пародонтит I ступеня
B	Хронічний катаральний гінгівіт
C	Хронічний катаральний папіліт
D	Генералізований пародонтит I ступеня

Е	Локалізований пародонтит II ступеня
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Жінка 36-ти років, яка користується кардіостимулятором, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. На огляді ясна застійно гіперемовані, набряклі. Ясенні кишень глибиною 4-5 мм. Зуби рухомі 1-2 ступенів, на зубах визначається велика кількість над- і під'ясенного зубного каменю. Діагностовано хронічний генералізований пародонтит II ступеня. Який метод усунення зубних відкладень ПРОТИПОКАЗАНИЙ у цій клінічній ситуації?
Правильна відповідь	Ультразвуковий
В	Комбінований
С	Інструментальний
D	Хімічний
Е	Ферментний
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 63-х років скаржиться на множинні болісні висипання у порожнині рота, на шкірі обличчя і тулуба, підвищення температури. За 3-4 дні до висипань відзначалося печіння, а потім різкий біль, що нагадує простріл. Пацієнт приймає цитотоксичні препарати з приводу лейкомії. При огляді на червоній облямівці і слизовій оболонці губ, язика і щоки справа виявлені множинні афти, розташовані у вигляді ланцюжка, з обідками гіперемії, не схильні до злиття, різко болісні при пальпації. На шкірі обличчя справа визначаються еритематозні плями, везикули і ерозії. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Оперізувальний лишай
В	Токсико-алергічний дермато-стоматит
С	Багатоформна ексудативна еритема
D	Вторинний сифіліс
Е	Хронічний рецидивуючий герпес
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнту проводять ендодонтичне лікування 11 зуба. Лікар провів інструментальну обробку кореневого каналу. Для пломбування каналу обрав методику гарячої вертикальної конденсації гутаперчі. Оберіть інструмент для конденсації філера:
Правильна відповідь	Плагер

B	К-файл
C	Гутаконденсор
D	Інжектор
E	Коренева голка
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	У пацієнта 34-х років постійні ниючі болі у зубі, що посилюються під час накушування. Тиждень тому зуб лікований з приводу глибокого карієсу. Об'єктивно: на жувальній поверхні 36 зуба пломба, перкусія болісна, супраконтакт у ділянці 36. На рентгенограмі - періодонт без змін. Яка помилка була допущена під час пломбування 36 зуба?
Правильна відповідь	Пломба, що завищує прикус
B	Пломбування без ізолюючої прокладки
C	Порушення крайового прилягання
D	Ізолююча прокладка виходить за межі емалево-дентинного сполучення
E	Пломбування без лікувальної прокладки
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнт 35-ти років скаржиться на постійний біль в 24 зубі, що посилюється при накушуванні. Об'єктивно: на жувально-дистальній поверхні 24 зуба виявлена глибока каріозна порожнина, заповнена залишками їжі. Зондування дна каріозної порожнини безболісне, реакція на температурні подразники безболісна. Перкусія 24 зуба різко болюча. На рентгенограмі: периапікальні тканини в ділянці верхівок коренів 24 зуба - без патологічних змін. Який найімовірніший діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний періодонтит
B	Гострий гнійний періодонтит
C	Гострий гнійний пульпіт
D	Гострий дифузний пульпіт
E	Загострений хронічний періодонтит
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія

Текст завдання	Хворий 22-х років скаржиться на рвучий, пульсууючий, постійний наростаючий біль у зубі на лівій верхній щелепі. Зуб болить 4-ту добу. Об'єктивно: у 26 зубі глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування безболісне. Перкусія різко болісна. Зуб рухливий. Пальпація перехідної складки у ділянці 26 зуба болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний періодонтит
В	Гострий серозний періодонтит
С	Гострий гнійний пульпіт
Д	Загострення хронічного періодонтиту
Е	Гострий обмежений пульпіт
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Пацієнтка 22-х років звернулася зі скаргами на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи. Плями помітила два тижні тому. Об'єктивно: в 12, 11, 21, 22 зубах на вестибулярних поверхнях в пришийковій ділянці гладкі крейдоподібні плями з нечіткими контурами. Перкусія і реакція на холод безболісні. Забарвлюються 2% розчином метиленового синього в блакитний колір. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс
В	Гострий поверхневий карієс
С	Клиноподібні дефекти
Д	Гіпоплазія емалі
Е	Кислотний некроз
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 57-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на застрягання їжі на зубах нижньої щелепі справа. Під час опитування з'ясовано, що у пацієнта є кардіостимулятор. Об'єктивно: у 44 зубі на дистальній контактній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину, виповнена залишками їжі. Дентин пігментований, щільний. Зондування, перкусія, термопроба - безболісні. Який пломбувальний матеріал ПРОТИПОКАЗАНИЙ даному пацієнту?
Правильна відповідь	Фотополімерний композит
В	Амальгама
С	Склоіономерний цемент хімічного твердіння
Д	Силікатний цемент
Е	Цинк-фосфатний цемент

№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хворий 33-х років, слюсар, звернувся зі скаргами на біль, кровотечу з ясен, які посилюються під час чищення зубів, свербіж ясен. Захворів 1 рік тому. Об'єктивно: ясна в ділянці нижніх і верхніх зубів фронтальної групи гіперемовані, набряклі, з ціанотичним відтінком. На зубах спостерігається велика кількість мінералізованих відкладень, визначаються незначні серозні виділення з пародонтальних кишень глибиною 3 мм. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
B	Локалізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
C	Генералізований пародонтит II ступеня, загострення
D	Локалізований пародонтит II ступеня, гострий перебіг
E	Генералізований пародонтоз I ступеня
№	крок 2017-2018
Тема	Терапевтична стоматологія
Текст завдання	Хвора 38-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття печіння, біль та кровоточивість ясен. Об'єктивно: ясна набряклі, гіперемовані, пастозні, при легкому дотику кровоточать. Зубо-ясеневе прикріплення не зруйноване. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий катаральний гінгівіт
B	Хронічний катаральний гінгівіт
C	Локалізований пародонтит
D	Генералізований пародонтит
E	Гіпертрофічний гінгівіт
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хворому 32-х років після ретельно-го дослідження був встановлений діагноз: чорний "волосатий" язик. Які лікарські засоби необхідно призначити хворому?
Правильна відповідь	Кератолітичні
B	Кератопластичні
C	Вітаміни
D	Антисептики
E	Противірусні
№	крок 2017

Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Чоловік 26-ти років скаржиться на постійний біль у зубі на верхній щелепі справа, який посилюється при накушуванні. Три дні тому в 12 зуб була накладена арсеновмісна паста. Своєчасно на прийом пацієнт не з'явився. Об'єктивно: на медіальній поверхні 12 - герметична пов'язка, перкусія різко болісна. Лікарем-стоматологом було поставлено діагноз: гострий миш'яковистий періодонтит. Виберіть правильну тактику лікування:
Правильна відповідь	Антидот арсену залишають у кореновому каналі під герметичною пов'язкою
B	Антидот арсену залишають під герметичною пов'язкою у каріозній порожнині
C	Призначають внутрішньоканальний електрофорез з антидотом, зуб лишають відкритим
D	Промивають антидотом кореневий канал, зуб лишають відкритим
E	Видаляють дентинну пов'язку, призначають електрофорез з антидотом по перехідній складці
№	крок 2017
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Чоловік 36-ти років скаржиться на ниючий біль у ділянці 26 зуба, що посилюється при накушуванні. 26 у минулому лікований. Об'єктивно: слизова оболонка альвеолярного відростка верхньої щелепи з вестибулярного боку на рівні 26 зуба пастозна. На рентгенограмі 26 зуба визначається вогнище просвітління у верхівки медіального щічного кореня з чіткими контурами діаметром до 0,5 см. Встановіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Загострення хронічного грануломатозного періодонтиту 26
B	Хронічний фіброзний періодонтит 26
C	Хронічний гранулюючий періодонтит 26
D	Кістогранульома
E	Локальний пародонтит
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	У хворого 32-х років температура тіла - $38,9^{\circ}C$, загальна слабкість, утруднення мови, неможливість приймати їжу. Впродовж 4-х років захворювання повторюється в осінньо-весняний період. На гіперемованій та набряклій слизовій губ, щок - міхури та ерозії, вкриті фібринозним нальотом сіруватого кольору. Симптом Нікольського негативний. Який з перерахованих діагно-зів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Багатоформна ексудативна еритема
B	Вульгарна пухирчатка
C	Гострий герпетичний стоматит
D	Неакантолітична пухирчатка

Е	Герпетичний дерматит Дюрінга
№	крок 2017
Тема	Некаріозні ураження твердих тканин
Текст завдання	Жінка 41-го року скаржиться на наявність дефектів твердих тканин на центральних та бокових різцях верхньої щелепи, які суб'єктивно її не турбують. Зі слів хворої, дефекти з'явилися рік тому, з часом вони збільшуються. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 12, 11, 21 та 22 зубів визначаються дефекти твердих тканин кулястої форми в межах емалево-дентинного з'єднання. Дно дефектів гладеньке, блискуче, тверде. Мешкає у місцевості з вмістом фтору у питній воді - 0,7 мг/л. Яка тактика лікування є найбільш доцільною у даному випадку?
Правильна відповідь	Пломбування композитним матеріалом без препарування
В	Лікарське втручання не потрібне
С	Місцева флюоризація
Д	Препарування і пломбування композитним матеріалом
Е	Ремінералізуюча терапія
№	крок 2017
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хворий скаржиться на постійний біль у ділянці 25 впродовж доби. Об'єктивно: на медіальній поверхні 25 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на холод безболісна. На R-грамі: кісткова тканина періапікальної ділянки без патологічних змін. Який най-більш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний періодонтит
В	Гострий дифузний пульпіт
С	Гострий гнійний пульпіт
Д	Гострий гнійний періодонтит
Е	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Жінка 51-го року скаржиться на відчуття печіння та поколювання спинки і бічних поверхонь язика, що зникає під час їжі, але посилюється увечері, сухість у роті, спотворення смакових відчуттів. Уперше подібні відчуття з'явилися рік тому після психічної травми, з плином часу відчуття посилюються. Страждає анацидним гастритом, цукровим діабетом, погано спить. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Глосодинія
В	Гангліоніт під'язикових гангліїв

С	Глосит Гентера-Міллера
D	Десквамативний глосит
Е	Кандидозний глосит
№	крок 2017
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хворий 45-ти років, скаржиться на дискомфорт в 27 зубі, виникнення ниючого болю при накушуванні. В анамнезі: при переохолодженні на яснах відкривається нориця. Об'єктивно: коронка 27 змінена в кольорі, пломба на жувальній поверхні, на слизовій оболонці в ділянці зуба рубець від нориці. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гранулюючий періодонтит
В	Хронічний гангренозний пульпіт
С	Хронічний фіброзний періодонтит
D	Хронічний грануломатозний періодонтит
Е	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2017
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хворий 35-ти років скаржиться на само-вільний гострий нападоподібний біль в 25 зубі, що триває до 30 хвилин, вночі посилюється, безбольові проміжки до трьох годин. Біль виникає та посилюється при дії термічних і механічних подразників. Об'єктивно: на жувальній поверхні 25 зуба глибока каріозна порожнина, виповнена розм'якшеним дентином, пульпова камера закрита, зондування різко болюче в одній точці в місці проекції рогу пульпи. ЕОД- 25 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий обмежений пульпіт
В	Гострий гнійний пульпіт
С	Загострення хронічного періодонтиту
D	Гіперемія пульпи
Е	Гострий дифузний пульпіт
№	крок 2017
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворий 18-ти років, встановлено діагноз: хронічний катаральний генералізований гінгівіт, легкого ступеню важкості, загострення. Має місце скупчення нижніх фронтальних зубів. ПІ=3,1. Який з нижче-наведених засобів необхідно призначити хворій для профілактики утворення нальоту?
Правильна відповідь	Хлоргексидин

В	Перекис водню
С	Хімопсин
Д	Альобуцид
Е	Фурацилін
№	крок 2017
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворий 42-х років з'явився зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після обстеження встановлений попередній діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості. Оцінка результату якого дослідження найбільш інформативна для встановлення остато-чного діагноза?
Правильна відповідь	Рентгенографія
В	Глибина пародонтальних кишень
С	Рухливість зубів
Д	Проба Кулаженко
Е	Проба Кетчке
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Жінка 28-ми років скаржиться на біль під час прийому їжі і ковтання, загальну слабкість. Захворювання почалося гостро з підйому температури тіла до $37,9^{\circ}C$, болей у м'язах. Об'єктивно: на фоні набряклої і гіперемованої слизової м'якого піднебін'я, передніх дужок, задньої стінки глотки визначаються згруповані і поодинокі ве-икули з серозно-геморагічним вмістом, а також ерозовані ділянки різної величини з фестончастими краями, вкриті фібрино-ним нальотом, слабо болісні під час до-ику. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Герпангіна
В	Грипозний стоматит
С	Оперізуєчий лишай
Д	Гострий герпетичний стоматит
Е	Ящур
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота

Текст завдання	Хворий 37-ми років скаржиться на наявність на червоній облямівці білястої плями. Об'єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи посередині між кутом рота і серединною лінією ділянки ураження сірувато-білого кольору, неправильної (полігональної) форми, 7x4 мм, ледь западає відносно рівня червоної облямівки, поверхня вкрита дрібними щільно прикріпленими лусочками. Пальпація не виявляє ущільнення основи ураження, а при бічній пальпації ураження відчувається поверхнєве ущільнення. Регіонарні лімфовузли - без змін. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Обмежений передраковий гіперкератоз
В	Лейкоплакія, плоска форма
С	Хейліт Манганотті
D	Червоний плоский лишай
Е	Рак нижньої губи
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Хворий 47-ми років, будівельник. Скарги на наявність на нижній губі розростання, яке з'явилося 1 місяць тому. Крім естетичного дискомфорту нічим не турбує. Об'єктивно: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи - утворення (6 мм у діаметрі, 3 мм - висота) з гладенькою поверхнею синюшно-червоного кольору. Пальпаторно - утворення безболісне, помірно-щільної консистенції, без інфільтрату у основі і по периферії утворення. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Бородавчастий передрак червоної облямівки
В	Вірусна бородавка
С	Кератоакантома
D	Рак нижньої губи
Е	Піогенна гранульома
№	крок 2017
Тема	Некаріозні ураження твердих тканин
Текст завдання	Хворий 46-ти років скаржиться на швидкоминуший біль і на естетичну неповноцінність фронтальних зубів. Дефекти почали проявлятися близько 10 років тому. В пришийковій ділянці на вестибулярній поверхні 23, 24, 44, 45 зубів дефекти твердих тканин зубів у вигляді двох площин, які сходяться під кутом у формі клину. Дно і стінки дефектів гладкі, блискучі, краї рівні. Який пломбувальний матеріал доцільно застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	Гібридний склоіономерний цемент
В	Композит хімічного затвердіння

C	Силіко-фосфатний цемент
D	Композит світлового затвердіння
E	Силікатний цемент
№	крок 2017
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворий 68-ми років скаржиться на безболісне збільшення ясен. В анамнезі: епілепсія, тривалий прийом гідантоїну. Об'єктивно: ясна на всьому протязі обох щелеп гіпертрофовані, щільні, болісні при пальпації, вкривають коронки зубів до половини їх висоти. Виявлені ясенні кишени глибиною 5 мм. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
B	Вірусні бородавки
C	Фіброматоз ясен
D	Гіперпластичний синдром при лейкозі
E	Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма
№	крок 2017
Тема	Некаріозні ураження твердих тканин
Текст завдання	Хвора 29-ти років скаржиться на короткочасний біль в області передніх зубів від температурних, механічних і хімічних подразників. Страждає на захворювання щитоподібної залози. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів дефекти, по краям емаль крейдяного кольору, шорстка, підвищеної ламкості, відколюється екскаватором. Дентин пігментований. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Некроз твердих тканин зуба
B	Ерозія твердих тканин зуба
C	Клиноподібний дефект
D	Гострий середній карієс
E	Гіпоплазія емалі
№	крок 2017
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворий 53-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних подразників. Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, корені оголені до 1/3 довжини. Незначна кількість зубних відкладень. В 15, 14, 24 зубах - клиноподібні дефекти. Зондування оголених шийок та дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Пародонтоз I ступеня важкості
B	Катаральний гінгівіт

С	Пародонтит II ступеня важкості
D	Пародонтит I ступеня важкості
E	Виразковий гінгівіт
№	крок 2017
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Пацієнт 23-ти років скаржиться на біль в яснах, що підсилюється при прийомі їжі, неприємний запах з рота, погане самопочуття. Температура тіла - $37^{\circ}C$. Занедужав 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: слизова оболонка ясен гіперемована, набрякла, легко кровоточить при зондуванні. По ясенному краю в ділянці 36, 37 і 38 зубів - виразки, вкриті брудно-сірим нальотом. Значні зубні відкладення. У мазку - фузо-спірилярна флора. Який остаточний діагноз?
Правильна відповідь	Виразковий гінгівіт
B	Гіпертрофічний гінгівіт
С	Фіброматоз ясен
D	Генералізований пародонтит
E	Катаральний гінгівіт
№	крок 2017
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворий 39-ти років звернувся зі скар-гами на неприємний запах з рота, кровоточивість та болочість ясен, рухомість зубів. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, нижні фронтальні зуби рухомі, I-II ступінь рухомості. Пародонтальні кишені 4-5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжзубних перегородок до 1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
B	Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
С	Генералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг
D	Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
E	Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
№	крок 2017
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хворий 30-ти років скаржиться на біль у зубі при вживанні гарячого і холодного, який іррадіює у вухо, скроню. Раніше в цьому зубі турбував самовільний нічний біль. Об'єктивно: в 37 зубі на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, що в одній точці сполучається з порожниною зуба. Реакція на зондування в точці сполучення, на холодний подразник різко болісна, біль довго не вщухає. ЕОД- 55 мкА. Визначте діагноз:

Правильна відповідь	Загострення хронічного пульпіту
B	Гострий дифузний пульпіт
C	Гострий гнійний пульпіт
D	Хронічний конкрементозний пульпіт
E	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2017
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Пацієнтка 22-х років звернулась до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Під час огляду ротової порожнини виявлено дефект твердих тканин у пришийковій ділянці в межах плащового дентину у 22 зубі. Дентин щільний, пігментований. Реакція на перкусію та зондування відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
B	Клиноподібний дефект
C	Гострий глибокий карієс
D	Гострий середній карієс
E	Некроз твердих тканин зуба
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	Чоловік 36-ти років скаржить на свербіж, почервоніння, наявність висипки на губах та шкірі. Об'єктивно: червона облямівка губ, прилегла шкіра та куточки рота гіперемовані, набряклі. На їх фоні визначаються дрібні пухирці з серозним ексудатом, деякі зливаються між собою, деякі зруйновані і вкриті кірочками. Наявне мокнуття. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий екзематозний хейліт
B	Актинічний хейліт, ексудативна форма
C	Контактний алергічний хейліт
D	Хронічний рецидивуючий герпес
E	Ескфоліатичний хейліт, ексудативна форма
№	крок 2017
Тема	Карієс зубів

Текст завдання	Дівчина 18-ти років звернулася до стоматолога з метою контролю якості герметизації фісур, яка була проведена рік тому. Об'єктивно: у 17, 16, 26, 27, 37 і 47 зубах - герметик повністю зберігся. У 36 і 46 - силант не виявлений, у дистально-поздовжніх фісурах цих зубів при зондуванні визначається розм'якшена емаль. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 2,5 бали. Яка тактика лікаря-стоматолога у відношенні і 46 у даному клінічному випадку?
Правильна відповідь	Профілактичне пломбування
В	Повторна неінвазивна герметизація
С	Інвазивна герметизація
Д	Аплікації фторвмісним гелем
Е	Електрофорез з кальційвмісним розчином
№	крок 2017
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування 12 зуба з приводу хронічного періодонтиту. Рентгенологічно в ділянці верхівки кореня 12 визначається осередок деструкції розміром - 0,3x0,4 см без чітких контурів. Виберіть оптимальний матеріал для використання в якості силеру у даній клінічній ситуації:
Правильна відповідь	Із вмістом гідроксиду кальцію
В	На основі резорцин-формалінової смоли
С	На основі епоксидних смол
Д	Склоіономірний цемент
Е	Цинкоксидевгенольний цемент
№	крок 2017
Тема	Некаріозні ураження твердих тканин
Текст завдання	Хвора 32-х років скаржиться на наявність білих і пігментованих плям на зубах. Мешкає в місцевості із вмістом фтору у питній воді - 1,7 мг/л. Був поставлений діагноз: флюороз, крейдіано-крапчаста форма. Використання яких паст показане в даній ситуації?
Правильна відповідь	Кальційфосфатвмісні
В	Фторвмісні
С	Високоабразивні
Д	Що містять рослинні екстракти
Е	Триклозанвмісні
№	крок 2017
Тема	Карієс зубів

Текст завдання	У пацієнта 18-ти років на жувальній поверхні 36 зуба виявлено пляму білого кольору без блиску. Який додатковий метод обстеження доцільно провести?
Правильна відповідь	Кольорові тести з барвниками
B	ЕОД
C	Визначення індексів гігієни
D	Проба Олдріча
E	Рентгенографія
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота
Текст завдання	До стоматолога звернулася пацієнтка 23-х років зі скаргами на підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}C$, головний біль, загальну слабкість, болісність при прийому їжі, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Об'єктивно: ясенний край виглядає начебто зрізаний, з нерівними кон-турами; поверхня його вкрита сірувато-жовтим нальотом, що легко знімається; при знятті оголюються ерозії та виразки, що кровоточать. У зскрібку з поверхні виразок виявляється велика кількість веретеноподібних фузобактерій та спірохет. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Виразково-некротичний стоматит Венсана
B	Третинний сифіліс
C	Цукровий діабет
D	Гострий лейкоз
E	Хвороба Верльгофа
№	крок 2017
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хвора звернулася зі скаргами на сильні болі в ділянці верхньої щелепи, що посилюються від гарячої їжі, біль при накушуванні та полегшення болю від дії холодної рідини. Об'єктивно: в 24 зубі каріозна порожнина заповнена розм'якшеним дентином, зондування дна різко болісне, перкусія позитивна. ЕОД- 50 мкА. Який метод лікування слід застосувати для даного зуба?
Правильна відповідь	Вітальна екстирпація
B	Вітальна ампутація
C	Девітальна екстирпація
D	Комбінований метод
E	Біологічний метод
№	крок 2017

Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Хворий 25-ти років, кореспондент, скаржиться на мимовільний нападаподібний біль в лівій скроні. Біль спонтанно виникає ввечері. Інколи біль виникає при нахилах голови, при злетах літака. Об'єктивно: всі зуби інтактні; оголення шийок і 36 зубів. Перкусія 24 дає слабковиразний біль. На рентгенограмі 24 в центральній частині коронкової порожнини визначається дентинової щільності утворення - 0,5x0,5 мм. Запропонуйте метод лікування:
Правильна відповідь	Вітальна екстирпація пульпи 24
В	Курс новокаїнової блокади з вітаміном ^B 1
С	Вітальна ампутація 24
D	Електрофорез з йодидом калію в проекції верхівки 24
Е	Реміналізуюча терапія пришийкових ділянок 24 і 36
№	крок 2017
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Хвора 34-х років скаржиться на наявність темних коричневих плям на зубах фронтальної ділянки верхньої щелепи. З анамнезу захворювання: плями утворилися біля 18 місяців тому. Об'єктивно: на контактній поверхні 22, 23 зубів наявні пігментовані ділянки емалі коричневого кольору з чіткими межами. Зондування безболісне, поверхня плям шорстка, зонд не затримується. Після висушування пестером поверхня плям втратила блиск, стала матовою. Пальпація і перкусія безболісні. Термоді-агностика безболісна. ЕОД- 4 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний початковий карієс 22, 23
В	Хронічний поверхневий карієс 22, 23
С	Наліт курця 22, 23
D	Флюороз
Е	Тетрациклінові зуби 22, 23
№	крок 2017
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Пацієнт 48-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий короткочасний зубний біль від температурних, механічних і хімічних подразників, який припиняється відразу після припинення їх дії. Під час огляду 36 зуба визначається глибока каріозна порожнина 5 класу за Блеком із вузьким вхідним отвором, заповнена великою кількістю розм'якшеного дентину. Зондування болюче по дну каріозної порожнини, сполучення каріозної порожнини з порожниною зуба немає. Перкусія і пальпація 36 безболісні. ЕОД- мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс 36
В	Гострий обмежений пульпіт 36

С	Гіперемія пульпи 36
D	Хронічний фіброзний пульпіт 36
E	Клиноподібний дефект 36
№	крок 2017
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Жінка 36-ти років, яка користується кардіостимулятором, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. На огляді ясна застійно гіперемовані, набряклі. Ясенні кишені глибиною 4-5 мм. Зуби рухомі 1-2 ступенів, на зубах визначається велика кількість над- і під'ясенного зубного каменю. Діагностовано хронічний генералізований пародонтит II ступеня. Який метод усунення зубних відкладень ПРОТИПОКАЗАНИЙ у цій клінічній ситуації?
Правильна відповідь	Ультразвуковий
B	Комбінований
С	Інструментальний
D	Хімічний
E	Ферментний
№	крок 2017
Тема	Ускладнення карієсу зубів
Текст завдання	Пацієнту проводять ендодонтичне лікування 11 зуба. Лікар провів інструментальну обробку кореневого каналу. Для пломбування каналу обрав методику гарячої вертикальної конденсації гутаперчі. Оберіть інструмент для конденсації філера:
Правильна відповідь	Плагер
B	К-файл
С	Гутаконденсор
D	Інжектор
E	Коренева голка
№	крок 2017
Тема	Карієс зубів
Текст завдання	Хворий 57-ми років звернувся до стоматолога зі скаргами на застрягання їжі на зубах нижньої щелепі справа. Під час опитування з'ясовано, що у пацієнта є кардіостимулятор. Об'єктивно: у 44 зубі на дистальній контактній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину, ви-повнена залишками їжі. Дентин пігментований, щільний. Зондування, перкусія, термопроба - безболісні. Який пломбувальний матеріал ПРОТИПОКАЗАНИЙ даному пацієнту?
Правильна відповідь	Фотополімерний композит

В	Амальгама
С	Склоіономерний цемент хімічного твердіння
Д	Силікатний цемент
Е	Цинк-фосфатний цемент
№	крок 2017
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хворий 33-х років, слюсар, звернувся зі скаргами на біль, кровотечу з ясен, які посилюються під час чищення зубів, свербіж ясен. Захворів 1 рік тому. Об'єктивно: ясна в ділянці нижніх і верхніх зубів фронтальної групи гіпереровані, набряклі, з ціанотичним відтінком. На зубах спостерігається велика кількість мінералізованих відкладень, визначаються незначні серозні виділення з пародонтальних кишень глибиною 3 мм. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
В	Локалізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
С	Генералізований пародонтит II ступеня, загострення
Д	Локалізований пародонтит II ступеня, гострий перебіг
Е	Генералізований пародонтоз I ступеня
№	крок 2017
Тема	Захворювання пародонту
Текст завдання	Хвора 38-ми років звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття печіння, біль та кровоточивість ясен. Об'єктивно: ясна набряклі, гіпереровані, пастозні, при легкому дотику кровоточать. Зубо-ясеневе прикріплення не зруйноване. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий катаральний гінгівіт
В	Хронічний катаральний гінгівіт
С	Локалізований пародонтит
Д	Генералізований пародонтит
Е	Гіпертрофічний гінгівіт
№	1. крок 2015
Тема	ТЕМА ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Текст завдання	При організації стоматологічної поліклініки планується використання 3-х стоматологічних установок в одному приміщенні. Мінімальна площа цього приміщення має бути НЕ МЕНШ :
Правильна відповідь	А. 28 ²
В	В. 30 ²

C	C. 42 ²
D	D. 14 ²
E	E. 21 ²
№	2. . крок 2012
Тема	ТЕМА ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Текст завдання	Після прийому пацієнта стало відомо, що він ВІЛ-інфікований. Як буде проводитись обробка інструментарію, що використовувався для лікування даного пацієнта?
Правильна відповідь	A. За спеціальною схемою
B	B. Вдвічі збільшити експозицію в дезрозчині
C	C. Вдвічі збільшити час стерилізації
D	D. Знищити інструменти
E	E. Автоклавування протягом двох годин
№	3. крок 2010
Тема	ТЕМА ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Текст завдання	Планується організація стоматологічного кабінету на 3 крісла. Яка повинна бути загальна площа кімнати?
Правильна відповідь	A. Не менше 28 ²
B	B. Не менше 21 ²
C	C. Не менше 30 ²
D	D. Не менше 42 ²
E	E. Не менше 18 ²
№	4. крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Текст завдання	Під час ремонту стоматологічного кабінету вирішено освітлювати його люмінесцентними лампами. Яким має бути рівень освітленості кабінету в люксах?
Правильна відповідь	A. 500 лк
B	B. 400 лк
C	C. 300 лк
D	D. 200 лк
E	E. 100 лк
№	5. . крок 2010, 2008

Тема	ДИСЦИПЛІНА ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Текст завдання	До обласної санепідемстанції звернувся лікар-стоматолог за дозволом на відкриття приватного стоматологічного кабінету на дві стоматологічні універсальні установки. Площа приміщення, де стоматолог планує вести прийом пацієнтів, складає 26 ² . Яку площу повинно мати приміщення за існуючим положенням для двох універсальних стоматологічних установок?
Правильна відповідь	A. 14 ² на 1 установку та 10 ² додатково
B	B. 10 ² на 1 установку та 10 ² додатково
C	C. 10 ² на 1 установку та 7 ² додатково
D	D. 7² на 1 установку та 7² додатково
E	E. 20 ² на 1 установку та 12 ² додатково
№	6. крок 2009, 2008, 2007
Тема	ТЕМА ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Текст завдання	В стоматологічному кабінеті після робочої зміни на стерильному столику залишилися невикористані стоматологічні інструменти. Які заходи необхідно провести для забезпечення стерильності цього стоматологічного інструментарію?
Правильна відповідь	A. Стерилізація без попередньої обробки
B	B. Дезинфекція, стерилізація
C	C. Дезинфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація
D	D. Передстерилізаційне очищення, стерилізація
E	E. Тільки дезинфекція
№	7. крок 2008
Тема	ТЕМА ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Текст завдання	При фарбуванні стін і підлоги стоматологічного кабінету використовували рекомендовані світлі відтінки. Яким має бути коефіцієнт відображення від стін, стелі і підлоги?
Правильна відповідь	A. 60
B	B. 35
C	C. 30
D	D. 25
E	E. 20
№	8. крок 2007
Тема	ТЕМА

Текст завдання	Студентка 20-ти років скаржиться на біль в жувальних м'язах, якій виникає зранку, стертість горбів жувальних зубів, явища гіперестезії. Біль у жувальних м'язах і явища гіперестезії підсилюються під час екзаменаційної сесії. Об'єктивно: у ділянці нижніх жувальних зубів 36, 37 спостерігається кратероподібна стертість жувальної поверхні, обмежена тонким шаром емалі. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	A. Бруксизм
B	B. Патологічна стертість
C	C. Ерозія емалі
D	D. Дисфункція СНЩС
E	E. Клиноподібний дефект
№	1. крок 2016, 2015
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	Жінка звернулася до клініки зі скаргами на болі від термічних і хімічних подразників у зубах верхньої і нижньої щелеп. При об'єктивному обстеженні у пришийковій ділянці 14, 15, 24, 25, 31, 32, 41, 42 виявлені дефекти твердих тканин зуба з поверхнями, що сходяться під кутом, у межах середньої третини дентину. Стінки гладенькі, щільні, поліровані. Вкажіть тактику ведення цієї хворої:
Правильна відповідь	A. Пломбування компомером без попереднього препарування
B	B. Лікарського втручання не потребує
C	C. Місцева флюоризація
D	D. Препарування з послідовним пломбуванням композитними матеріалами
E	E. Ремінералізуюча терапія
№	2. крок 2016
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	Чоловік 43х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до температурних подразників, неприємні відчуття при вживанні солодкої і кислої їжі. Об'єктивно: стертість всіх поверхонь верхніх і нижніх зубів до утворення контактних площадок на поверхні верхніх і нижніх різців. Міжальвеолярна висота і висота нижньої третини обличчя знижена на 56 мм. Всі зуби стійкі. Визначте найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	A. Патологічне стирання, генералізована форма, змішаний тип, 2 ступінь
B	B. Патологічне стирання, локалізована форма, горизонтальний тип, 12 ступінь
C	C. Патологічне стирання, генералізована форма, вертикальний тип, 1 ступінь
D	D. Прикус, що знижується, 12 ступінь
E	E. Симптомокомплекс Костена

№	3. крок 2016, 2015, 2013, 2012
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність світлокоричневої плями в передньому зубі на верхній щелепі. Об'єктивно: у пришийковій ділянці 23 виявляється поодиноким пляма світло-коричневого кольору, під час зондування поверхня гладенька. Реакція на холод та зондування безболісна. Встановіть найбільш вірогідний діагноз:
Правильна відповідь	A. Хронічний початковий карієс
B	B. Флюороз
C	C. Місцева гіоплазія емалі
D	D. Гострий початковий карієс
E	E. Хронічний поверхневий карієс
№	4. крок 2016
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Дівчина 18ти років звернулася зі скаргами на наявність плям на зубах верхньої і нижньої щелеп, які існують з моменту прорізування зубів. Народилася і проживає у місцевості з вмістом фтору у питній воді 2,2 мг/л. Об'єктивно: емаль усіх зубів має крейдоподібний матовий відтінок з окремими світлокоричневими плямами і невеликими округлої форми дефектами емалі темного кольору. Лікар встановив діагноз: флюороз. Визначте форму флюорозу у цієї хворої:
Правильна відповідь	A. Крейдоподібнокрапчаста
B	B. Штрихова
C	C. Плямиста
D	D. Ерозивна
E	E. Деструктивна
№	5. крок 2015
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Чоловік 43-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до температурних подразників, неприємні відчуття при вживанні солодкої і кислої їжі. Об'єктивно: стертість всіх поверхонь верхніх і нижніх зубів до утворення контактних площадок на поверхні верхніх і нижніх різців. Міжальвеолярна висота і висота нижньої третини обличчя знижена на 5-6 мм. Всі зуби стійкі. Визначте найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	A. Патологічне стирання, генералізована форма, змішаний тип, 2 ступінь
B	B. Патологічне стирання, локалізована форма, горизонтальний тип, 1-2 ступінь
C	C. Патологічне стирання, генералізована форма, вертикальний тип, 1 ступінь
D	D. Прикус, що знижується, 1-2 ступінь

Е	Е. Симптомокомплекс Костена
№	6. крок 2015
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність дефектів у зубах верхньої щелепи, підвищену чутливість до механічних, хімічних і температурних подразників. В анамнезі вживання великої кількості цитрусових, соків, а також використання жорсткої зубної щітки. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні фронтальних зубів, вище екватора, дефекти у межах дентину овальної форми, дно і стінки гладенькі, блискучі, тверді. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Ерозія твердих тканин
В	В. Клиноподібний дефект
С	С. Хронічний середній карієс
D	D. Гіоплазія
Е	Е. Кислотний некроз емалі
№	7. крок 2015
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хворий 45-ти років, оператор цеху по виробництву азотних хімічних речовин, відзначає відчуття оскоми, підвищеної чутливості до температурних і механічних подразників. При огляді емаль зубів фронтальної групи матова, шорстка, брудно-сірого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Кислотний некроз емалі
В	В. Ерозія емалі
С	С. Гіоплазія емалі
D	D. Флюороз
Е	Е. Поверхневий карієс
№	8. . крок 2014, 2008
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хворий 20-ти років звернувся до лікаря із скаргами на відчуття оскоми в зубах на верхній щелепі протягом 2-х тижнів. При огляді в пришийковій ділянці 11 та 21 зубів визначаються білуваті плями з матовим відтінком і нечіткими контурами, що інтенсивно сприймають барвники. Яким має бути лікування 11-го та 21-го зубів?
Правильна відповідь	А. Ремінералізуюча терапія
В	В. Препарування та пломбування
С	С. Зішліфовування плям
D	D. Обробка антисептиками

Е	Е. Імпрегнація нітратом срібла
№	9. . крок 2014
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хвора 42х років скаржиться на біль в передніх зубах від температурних, хімічних подразників, відчуття оскомини. Із анамнезу: працює на хімічному підприємстві у гальванічному цеху. Біль у зубах та косметичний дефект з'явилися через 2 роки після початку роботи на цьому підприємстві. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні і ріжучих краях фронтальних зубів емаль частково відсутня, з нерівними фестончастими краями. Біль при зондуванні та на температурні подразники. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Некроз твердих тканин зуба
В	В. Ерозія твердих тканин зуба
С	С. Клиноподібний дефект
Д	Д. Гострий поверхневий карієс
Е	Е. Флюороз, деструктивна форма
№	10. . крок 2014
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Пацієнт 63х років звернувся до стоматолога зі скаргами на появу оскомини під час чищення зубів і прийому кислої їжі (лимона). Останні 10 років спостерігається у пародонтолога з приводу пародонтозу. Об'єктивно: в 15, 14, 13, 23, 24, 25, 35, 34, 33, 43, 44, 45 на вестибулярних поверхнях біля шийок зубів порожнини з гладкими поверхнями, що утворюють кут. Зондування дна болісне. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Клиноподібний дефект
В	В. Гіпоплазія емалі
С	С. Хронічний глибокий карієс
Д	Д. Гострий середній карієс
Е	Е. Хронічний середній карієс
№	11. . крок 2014
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хвора 23х років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність естетичного дефекту у вигляді світлих плям на зубах. За місцем проживання наявність фтору у питній воді складає 1 мг/л. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні коронок 11, 12, 21, 22 і горбах 16, 26, 36, 46 зубів крейдоподібні плями з блискучою поверхнею, які існують з моменту прорізування зубів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Системна гіпоплазія емалі

B	B. Ерозія емалі
C	C. Недосконалий амелогенез
D	D. Множинний початковий карієс
E	E. Ендемічний флюороз
№	12. крок 2013
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хвора 47-ми років звернулася зі скаргами на неможливість прийому холодної та гарячої їжі, а також інтенсивний біль у зубах від кислого, солодкого і солоного. Об'єктивно: незначний збуток емалі на молярах і різцях. Зондування і холодова проба різко болісні. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Гіперестезія твердих тканин зуба
B	B. Ерозія емалі
C	C. Некроз емалі
D	D. Гіпоплазія емалі
E	E. Патологічна стиранисть твердих тканин зуба
№	13. крок 2011, 2010
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хвора 20-ти років скаржиться на неестетичний вигляд 24 з моменту прорізування. Об'єктивно: в 24 емаль частково відсутня, дентин забарвлений в жовтий колір. В дитинстві 64 неодноразово лікували, проте, зважаючи на часті загострення, появу набряків, нориці на яснах, 64 вимушено видалили в 9 років. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Локальна гіпоплазія
B	B. Початковий карієс
C	C. Флюороз
D	D. Системна гіпоплазія
E	E. Аплазія емалі
№	14. . крок 2013
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хворий 44-х років скаржиться на косметичний дефект 12, 11, 21, 22 зубів, болі від температурних подразників. З опитування встановлено, що хворий вживає велику кількість цитрусових та їх соків. При огляді у пришийковій ділянці вестибулярної поверхні зубів дефекти емалі овальної форми. Дно гладеньке, блискуче, тверде. Короткочасний біль на холодну воду. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ерозія емалі

B	B. Гіпоплазія емалі
C	C. Клиноподібний дефект
D	D. Некроз емалі
E	E. Поверхневий карієс
№	15. крок 2010
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хворий 50-ти років звернувся зі скаргою на наявність косметичного дефекту в ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Після ретельного обстеження встановлено діагноз: клиноподібний дефект 11, 12, 13, 21, 22, 23. Який пломбувальний матеріал є оптимальним у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Компомер
B	B. Силікатний цемент
C	C. Склоіономірний цемент
D	D. Композитний матеріал хімічного твердіння
E	E. Силікофосфатний цемент
№	16. крок 2010
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хвора 36-ти років скаржиться на естетичний дефект верхніх передніх зубів. З анамнезу: знаходиться на обліку у ендокринолога з приводу тиреотоксикозу. Дефекти емалі з'явилися кілька років тому, поступово збільшувалися у розмірах. Об'єктивно: у 12, 11, 21, 22 зубах в поперечному напрямку на вестибулярних поверхнях дефекти емалі овальної форми. Зондування і реакція на холододивний подразник безболісні, дно дефектів гладеньке, блискуче, тверде. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ерозія твердих тканин зуба
B	B. Гострий поверхневий карієс
C	C. Клиноподібні дефекти
D	D. Системна гіпоплазія
E	E. Некроз твердих тканин зубів
№	17. крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ

Текст завдання	Хвора 44-х років скаржиться на відчуття оскоми в різцях верхньої щелепи, яке з'явилося 1,5 роки тому. Об'єктивно: на найбільш випуклій частині вестибулярних поверхонь коронок 12, 11, 21, 22 зубів виявляються круглої форми дефекти з гладенькою, блискучою, щільною поверхнею, що в глибину сягають дентину. Глибина дефектів поступово зменшується від центру до периферії. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ерозія емалі
B	B. Клиноподібний дефект
C	C. Гіоплазія системна
D	D. Хронічний середній карієс
E	E. Флюороз, деструктивна форма
№	18. крок 2007
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хворий 47-ми років працює на хімічному підприємстві, звернувся зі скаргами на біль у зубах від хімічних та температурних подразників. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні верхніх фронтальних зубів емаль матова з крейдоподібними плямами, а також дефекти з відколеною емаллю і оголеним темним дентином. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Некроз твердих тканин
B	B. Множинний карієс
C	C. Ерозія емалі
D	D. Клиноподібний дефект
E	E. Гіоплазія емалі
№	19. крок 2015
Тема	ТЕМА НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на наявність дефектів у зубах верхньої щелепи, підвищену чутливість до механічних, хімічних і температурних подразників. В анамнезі вживання великої кількості цитрусових, соків, а також використання жорсткої зубної щітки. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні фронтальних зубів, вище екватора, дефекти у межах дентину овальної форми, дно і стінки гладенькі, блискучі, тверді. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ерозія твердих тканин
B	B. Клиноподібний дефект
C	C. Хронічний середній карієс
D	D. Гіоплазія
E	E. Кислотний некроз емалі

№	1. крок 2016
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 20ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на наявність порожнини в 35 зубі та біль при вживанні солодкого. Порожнина з'явилась декілька місяців тому. Об'єктивно: каріозна порожнина на жувальній поверхні 35 зуба в межах плащового дентину; виповнена розм'якшеним, непігментованим дентином, який легко видаляється. Зондування стінок каріозної порожнини болоче по емалеводентинній межі, зондування дна каріозної порожнини неболоче. Реакція на температурні подразники зникає зразу після припинення дії подразника. ЕОД 3 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий середній каріес
B	B. Хронічний середній каріес
C	C. Гострий глибокий каріес
D	D. Ерозія твердих тканин
E	E. Гострий обмежений пульпіт
№	2. крок 2016, 2012, 2011
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	До стоматолога звернулася вагітна 24х років у терміні 6 місяців. Скарги на швидке руйнування зубів, випадіння старих пломб. Діагностований активно протікаючий системний (множинний) каріес. Лікар закінчує санацію порожнини рота. Цій хворій для чищення зубів на період вагітності і лактації необхідно рекомендувати зубну пасту, що містить:
Правильна відповідь	A. Мінеральні компоненти
B	B. Настояі лікарських трав
C	C. Сольові добавки
D	D. Метронідазол
E	E. Протигрибкові засоби
№	3. крок 2016
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 47ми років скаржиться на наявність порожнини в 44 зубі. Про огляді виявлено на апроксимальномедіальній поверхні 44 каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, виповнена пігментованим, щільним дентином. Зондування та перкусія безболісні, ЕОД 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний глибокий каріес
B	B. Хронічний середній каріес
C	C. Гіперемія пульпи

D	D. Хронічний фіброзний пульпіт
E	E. Гострий глибокий карієс
№	4. крок 2016
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт, що страждає на епілепсію. Для лікування 16 зуба з приводу хронічного середнього карієсу була обрана ARTметодика. Який матеріал слід обрати для пломбування каріозної порожнини у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Склоіономерний цемент
B	B. Світлостверджувальний композит
C	C. Срібна амальгама
D	D. Силікофосфатний цемент
E	E. Композит хімічного ствердження
№	5. крок 2016
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Пацієнт 23-х років скаржиться на косметичний недолік та чутливість 13, 14 зубів від солодких подразників. Об'єктивно: в пришийковій ділянці 13, 14 крейдоподібні поодинокі матові плями. Емаль щільна. Зондування безболісне. ЕОД 4 мкА. Плями зафарблюються розчином метиленового синього. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий початковий карієс
B	B. Гострий поверхневий карієс
C	C. Ерозія емалі
D	D. Флюороз
E	E. Гіоплазія емалі
№	6. крок 2015
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 29-ти років звернувся зі скаргами на руйнування 21 зуба, естетичний недолік. Об'єктивно: на медіальній поверхні 21 зуба каріозна порожнина, ріжучий край частково зруйнований. До якого класу за класифікацією Блека відноситься дана порожнина?
Правильна відповідь	A. IV
B	B. I
C	C. II
D	D. III

Е	Е. V
№	7. крок 2015
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулась пацієнтка 20-ти років зі скаргами на підвищену чутливість в ділянці нижньої щелепи зліва під час прийому солодкої і кислої їжі. Об'єктивно: при огляді 35 зуба в пришийковій ділянці виявлено пляму крейдоподібного кольору, без блиску, при зондуванні чутлива. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Гострий початковий карієс
В	В. Кислотний некроз емалі
С	С. Плямиста форма
D	D. Флюороз
Е	Е. Клиноподібний дефект
№	8. крок 2015
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Пацієнт 30-ти років звернувся зі скаргами на короткочасний біль від холодового подразника, який зникає після його усунення. Об'єктивно: на жувальній поверхні 37 глибока каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином, зондування дна болюче, термопроба болюча. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	С. Гострий глибокий карієс
В	D. Хронічний фіброзний пульпіт
С	Е. Гіперемія пульпи
D	Ф. Гострий середній карієс
Е	Г. Гострий обмежений пульпіт
№	9. крок 2015
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Пацієнт 27-ми років скаржиться на застрягання їжі в 36 зубі. Об'єктивно: у 36 зубі виявлена каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дно і стінки щільні, пігментовані. Зондування та термопроби безболісні, перкусія негативна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Хронічний середній карієс
В	В. Гострий глибокий карієс
С	С. Гострий середній карієс
D	D. Хронічний глибокий карієс
Е	Е. Гострий початковий карієс

№	10. крок 2015, 2013
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить лікування 16 зуба з приводу хронічного середнього карієсу у хворого на епілепсію. Вибрана ART-методика препарування каріозної порожнини. Який матеріал слід обрати для пломбування каріозної порожнини у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Склоіономерний цемент
B	B. Срібна амальгама
C	C. Композит хімічного твердіння
D	D. Світлотвердіючий композит
E	E. Силікофосфатний цемент
№	11. крок 2015, 2014
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить лікування карієсу в 37 зубі (I клас за Блекум) у пацієнта 29-ти років. Об'єктивно: у дистальній фісурі 37 визначається невелика каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим розм'якшеним дентином, решта фісур "закриті", глибокі, важкодоступні, пігментовані. Оберіть оптимальну тактику лікування 37 у даному випадку:
Правильна відповідь	A. Профілактичне пломбування з інвазивним закриттям фісур
B	B. Метод "профілактичного розширення" за Блекум
C	C. ART-методика препарування і пломбування
D	D. Профілактичне пломбування з неінвазивним закриттям фісур
E	E. Щадне препарування за принципом "біологічної доцільності" Лукомського
№	12. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Пацієнтці 60-ти років проводиться лікування 11 та 21 з приводу хронічного глибокого карієсу (III клас за Блекум). В анамнезі: операція видалення катаракти. Оберіть оптимальний матеріал для пломбування каріозних порожнин у даному випадку:
Правильна відповідь	A. Композит хімічного твердіння
B	B. Гібридний склоіономер
C	C. Компомер
D	D. Світлотвердіючий композит
E	E. Силікатний цемент

№	13. крок 2014
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	У хворої 27-ми років при лікуванні середнього карієсу 35 зуба (V клас за Блекум) випадково оголена коронкова пульпа. Якою повинна бути тактика лікаря?
Правильна відповідь	A. Накласти пасту з гідроокисом кальцію
B	B. Провести вітальну ампутацію пульпи
C	C. Провести вітальну екстирпацію пульпи
D	D. Провести девітальну екстирпацію пульпи
E	E. Накласти муміфікуючу пасту
№	14. крок 2014
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 27-ми років звернулась зі скаргами на короткочасний біль при попаданні твердої їжі в 46 зуб. Вказані скарги з'явилися кілька місяців тому. Після усунення подразника біль одразу зникає. Об'єктивно: на апроксимально-дистальній поверхні 46 зуба каріозна порожнина в зоні плащового дентину. Вхідний отвір великий. Дентин твердий, пігментований, важко знімається, зондування дна та стінок каріозної порожнини безболісне. Вертикальна та горизонтальна перкусія 46 зуба безболісна. ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний середній карієс
B	B. Гострий середній карієс
C	C. Хронічний глибокий карієс
D	D. Гострий глибокий карієс
E	E. Хронічний періодонтит
№	15. . крок 2014
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Пацієнт 22х років звернувся зі скаргами на короткочасний біль від дії холодого подразника, який зникає відразу після його усунення. Об'єктивно: на жувальній поверхні 37 зуба глибока каріозна порожнина, заповнена світлим розм'якшеним дентином, зондування дна порожнини незначно болісне, термопроба позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий глибокий карієс
B	B. Гострий вогнищевий пульпіт
C	C. Гострий дифузний пульпіт
D	D. Гіперемія пульпи

Е	Е. Гострий середній карієс
№	16. крок 2014
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Жінка 25ти років звернулася до лікарястоматолога зі скаргами на гострий біль у ділянці верхньої щелепи зліва, який виникає під час приймання їжі. Об'єктивно: на апроксимальнодистальній поверхні 26 визначається каріозна порожнина, виповнена світлим м'яким дентином. Зондування слабо болісне по дентиномалевому з'єднанню, перкусія безболісна. Від холодної води спостерігається біль, який швидко минає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Гострий середній карієс
В	В. Хронічний середній карієс
С	С. Гострий глибокий карієс
D	D. Хронічний фіброзний пульпіт
Е	Е. Хронічний глибокий карієс
№	17. . крок 2014
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	У пацієнта 39ти років під час об'єктивного обстеження на жувальній поверхні 46 зуба виявили каріозну порожнину в межах плащового дентину. Каріозна порожнина заповнена залишками їжі, стінки та дно заповнені пігментованим дентином, зондування дна та стінок не викликає болі, термопроба неbolюча, ЕОД 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Хронічний середній карієс
В	В. Гострий середній карієс
С	С. Хронічний глибокий карієс
D	D. Гострий початковий карієс
Е	Е. Хронічний фіброзний пульпіт
№	18. крок 2014
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	У хворого 38-ми років під час огляду порожнини рота на жувальній поверхні 37 зуба виявлена каріозна порожнина у межах плащового дентину. Дентин світлий, розм'якшений; нависаючі краї емалі. Зондування стінок каріозної порожнини болісне, перкусія 37 зуба безболісна. ЕОД 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Гострий середній карієс
В	В. Гострий глибокий карієс
С	С. Хронічний середній карієс

D	D. Ерозія твердих тканин
E	E. Гострий поверхневий карієс
№	19. крок 2013
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 26-ти років скаржиться на біль у 24 зубі при попаданні холодної чи гарячої їжі. Об'єктивно: глибока каріозна порожнина в 24 на медіальній поверхні в межах навколопульпарногодентину, заповнена розм'якшеним слабо пігментованим дентином. Зондування дна каріозної порожнини та реакція на холодний подразник болючі, біль минає одразу після припинення дії подразника. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий глибокий карієс
B	B. Хронічний глибокий карієс
C	C. Гострий середній карієс
D	D. Хронічний середній карієс
E	E. Гострий вогнищевий пульпіт
№	20. крок 2013
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Юнак 18-ти років скаржиться на чутливість до солодкого та кислого в ділянці 14, 13, 12, 23, 24. Об'єктивно: в пришийковій ділянці поодинокі крейдоподібні матові плями з нечіткими краями. Який метод обстеження найбільш точно підтвердить діагноз?
Правильна відповідь	A. Вітальне забарвлення
B	B. Рентгенографія
C	C. Зондування
D	D. Електрооднотометрія
E	E. Термометрія
№	21. . крок 2013
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 18-ти років скаржиться на короткочасний біль у 37 зубі від солодкого та холодного. Об'єктивно: на жувальній поверхні 37 неглибока каріозна порожнина. Дентин світлий, пухкий, нависаючі краї емалі. Біль при зондуванні стінок каріозної порожнини. ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий середній карієс
B	B. Гострий глибокий карієс
C	C. Хронічний середній карієс

D	D. Ерозія емалі
E	E. Гострий поверхневий карієс
№	22. . крок 2013
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Під час огляду порожнини рота у пацієнта 27-ми років на шийці 22 зуба виявлено дефект твердих тканин в межах плащового дентину. Дентин щільний, пігментований. Зондування і перкусія безболісні. На холодний подразник – незначний біль, який швидко минає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний середній карієс
B	B. Флюороз, деструктивна форма
C	C. Клиноподібний дефект
D	D. Ерозія твердих тканин зуба
E	E. Гострий середній карієс
№	23. . крок 2013
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить лікування середнього карієсу в 46 зубі (V клас за Блеком) у чоловіка 36-ти років. Яким чином можна поліпшити ретенцію пломби у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Створити легку конвергенцію стінок порожнини
B	B. Ввести парапульпарні штифти
C	C. Використати матеріал підвищеної міцності
D	D. Створити скіс емалі
E	E. Створити кут між дном і стінками порожнини, що дорівнює 90°
№	24. крок 2012, 2011, 2009
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Під час профілактичного огляду у пацієнта 18-ти років після зняття зубних відкладень на вестибулярній поверхні 22 та 41 виявили крейдоподібні плями у пришийковій ділянці, безболісні під час зондування. Тест емалевої резистентності 7 балів. Які морфологічні зміни характерні для даного захворювання?
Правильна відповідь	A. Підповерхнева демінералізація емалі
B	B. Зміни у плащовому дентині
C	C. Пошкодження дентиномалевого сполучення
D	D. Поверхнева демінералізація емалі
E	E. Дегенеративні зміни одонтобластів

№	25. . крок 2012
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 27-ми років скаржиться на швидкоминучий біль у 16 зубі від солодкої та холодної їжі впродовж декількох тижнів. Об'єктивно: на апроксимальній поверхні 16 зуба порожнина в межах плащового дентину, виповнена розм'якшеним слабкопігментованим дентином. Після некректомії дно каріозної порожнини щільне, безболісне. Препарування стінок дефекту чутливе в ділянці емалево-дентинної межі. 16 зуб реагує на силу струму 5 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий середній карієс
B	B. Гострий глибокий карієс
C	C. Хронічний середній карієс
D	D. Хронічний глибокий карієс
E	E. Хронічний періодонтит
№	26. крок 2012
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий, що проживає у місцевості з вмістом фтору у воді 0,7 мг/л, висловлює скарги на чутливість від солодкого і кислого у 12, 13, 14, 23, 24. Об'єктивно: у пришийковій ділянці вказаних зубів виявлені крейдоподібні, матові плями, шорсткі під час зондування. Які з нижчеперерахованих методів дослідження найбільш точно підтвердять діагноз?
Правильна відповідь	A. Вітальне забарвлення
B	B. Рентгенографія
C	C. Термопроба
D	D. Електроодонтометрія
E	E. Перкусія
№	27. . крок 2012
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 28-ми років скаржиться на короткочасний біль у 15 зубі від хімічних, термічних і механічних подразників, які зникають після їх усунення. Об'єктивно: в 15 велика каріозна порожнина з нависаючими краями емалі, заповнена сіруватим розм'якшеним і слабкопігментованим дентином. Зондування дна порожнини болісне. Реакція на холодну воду позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий глибокий карієс
B	B. Хронічний фіброзний пульпіт
C	C. Гострий обмежений пульпіт

D	D. Гострий середній карієс
E	E. Гіперемія пульпи
№	28. . крок 2012
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить лікування 46 зуба з приводу хронічного середнього карієсу у пацієнта з тяжким психічним захворюванням. Який варіант препарування каріозної порожнини доцільно вибрати у даному випадку?
Правильна відповідь	A. ART-методика
B	B. За принципом "біологічної доцільності"(за Лукомським)
C	C. Метод "профілактичного розширення"(за Black)
D	D. Метод мінімального інвазивного лікування
E	E. -
№	29. . крок 2012
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить у пацієнта 35-ти років лікування хронічного глибокого карієсу 24 зуба, що має медіооклюзійнодистальну порожнину. Що має зробити лікар для попередження відколу горбів?
Правильна відповідь	A. Зішліфувати горби
B	B. Ввести парапульпарні штифти
C	C. Використати матеріал підвищеної міцності
D	D. Створити ретенційні борозенки у ділянці емалеводентинного сполучення
E	E. Створити широкий скіс емалі
№	30. крок 2012
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 40-ка років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність порожнини у 17. При обстеженні: велика каріозна порожнина на жувальній поверхні, стінки порожнин витончені, пігментовані, зондування безболісне. ЕОМ - 4 мкА. Встановлено діагноз: хронічний середній карієс 17. Оберіть постійний пломбувальний матеріал для відновлення 17:
Правильна відповідь	A. Композит
B	B. Склоіономер
C	C. Мінеральний цемент
D	D. Амальгама
E	E. Полікарбоксилатний цемент

№	31. крок 2011
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Під час профілактичного огляду у хворого 45-ти років у 23 виявлена каріозна порожнина у межах плащового дентину. Дно і стінки виповнені щільним, різко пігментованим дентином; зондування, реакція на холод безболісні, перкусія 23 безболісна. ЕОМ - 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний середній карієс
B	B. Гострий середній карієс
C	C. Хронічний глибокий карієс
D	D. Гострий глибокий карієс
E	E. Хронічний періодонтит
№	
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Дівчина 20-ти років скаржитися на біль від солодкого, кислого. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 11 крейдоподібна пляма, шорстка під час зондування. У центрі плями визначається дефект у межах емалі. Індекс Федорова-Володкіної 2,5 бали (ГІ). Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий поверхневий карієс
B	B. Гострий середній карієс
C	C. Гіоплазія емалі
D	D. Початковий карієс
E	E. Некроз емалі
№	33. крок 2011, 2009, 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворому 35-ти років поставлено діагноз: хронічний середній карієс 36. Порожнина II класу за Блеком з ураженням жувальної поверхні. Який матеріал краще використати для пломбування?
Правильна відповідь	A. Композитний мікрогібридний матеріал світлової полімеризації
B	B. Склоіономірний цемент
C	C. Силікофосфатний цемент
D	D. Текучий композит світлової полімеризації
E	E. Мікрофільований композит світлової полімеризації
№	34. . крок 2011
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ

Текст завдання	Хворий 20-ти років звернувся з метою санації. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 11 і 12 декілька крейдоподібних плям діаметром 2х3 мм напівовальної форми, поверхня шорстка під час зондування. Який тест буде найінформативнішим у проведенні диференційної діагностики даної патології?
Правильна відповідь	A. Вітальне забарвлення
B	B. ЕОД
C	C. Зондування
D	D. Термодіагностика
E	E. ТЕР-тест
№	35. . крок 2011
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	У хворого 30-ти років виявлена каріозна порожнина в 11 в межах біляпульпарного дентину з ушкодженням кута зуба та ріжучого краю. Якому пломбувальному матеріалу слід надати перевагу для відновлення анатомічної форми зуба?
Правильна відповідь	A. Композиційний матеріал світлового затвердіння
B	B. Силікатний цемент
C	C. Склоіономірний цемент світлового затвердіння
D	D. Композиційний матеріал хімічного затвердіння типу "паста-паста"
E	E. Композиційний матеріал хімічного затвердіння типу "порошок-рідина"
№	36. . крок 2011
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 26-ти років скаржитися на біль у 16 зубі від температурних подразників. Біль проходить після усунення подразника. Об'єктивно: глибока каріозна порожнина в 16, дентин світло-жовтий, розм'якшений. При зондуванні дна порожнини - підвищена чутливість. Перкусія 16 безболісна. ЕОД- 16-12 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий глибокий карієс
B	B. Гострий середній карієс
C	C. Гіперемія пульпи
D	D. Хронічний фіброзний пульпіт
E	E. Хронічний глибокий карієс
№	37. . крок 2011, 2010, 2008, 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ

Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність світло-коричневої плями в передньому зубі на верхній щелепі. Об'єктивно: у пришийковій ділянці 23 виявляється поодиноким пляма світло-коричневого кольору, під час зондування поверхня гладенька. Реакція на холод та зондування безболісні. Встановіть найбільш вірогідний діагноз:
Правильна відповідь	A. Хронічний початковий карієс
B	B. Флюороз
C	C. Місцева гіпоплазія емалі
D	D. Гострий початковий карієс
E	E. Хронічний поверхневий карієс
№	38. крок 2011
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить лікування 26 зуба з приводу гострого глибокого карієсу у пацієнта 22-х років. У якості лікувальної прокладки обраний кальційсаліцилатний цемент "Life", у якості постійного пломбувального матеріалу світлотверднучий конденсуємий композит "Solitaire-2". Чим необхідно покрити лікувальну прокладку у даному випадку?
Правильна відповідь	A. Скклоіономірний цемент
B	B. Адгезивна система композиту
C	C. Ізолюючий лак
D	D. Фосфатний цемент
E	E. Цинк-евгенольний цемент
№	39. крок 2011
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Дівчина 21-го року скаржиться на наявність каріозної порожнини у 26 зубі. Об'єктивно: у 26 каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину, дентин щільний, пігментований, больова реакція на холодний подразник позитивна, перкусія і зондування безболісні. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний глибокий карієс
B	B. Хронічний фіброзний пульпіт
C	C. Хронічний середній карієс
D	D. Гострий глибокий карієс
E	E. Гострий середній карієс
№	40. крок 2011
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ

Текст завдання	У пацієнта 19-ти років після зняття бляшки нальоту у пришийковій ділянці 11 та 21 виявлено дві білі плями. На холодний подразник реакція відсутня. При висушуванні розмір плями збільшується. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Початковий карієс
B	B. Флюороз
C	C. Місцева гіоплазія
D	D. Некроз емалі
E	E. Недосконалий амелогенез
№	41. . крок 2010
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	У хворого 30-ти років скарги на короткочасний біль у зубі на верхній щелепі від солодкого та холодного. Біль з'явився місяць тому. Об'єктивно: в 26 - каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором в межах плащового дентину. Дентин дна і стінок м'який, зондування по емалево-дентинній межі болісне, перкусія безболісна, термодіагностика - біль, який швидко зникає після усунення подразника. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий середній карієс
B	B. Гострий початковий карієс
C	C. Гіперемія пульпи
D	D. Гострий глибокий карієс
E	E. Хронічний фіброзний пульпіт
№	42. . крок 2010
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Жінка 27-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль від холодного у 35, який швидко минає після усунення подразника. Об'єктивно: у пришийковій ділянці 35 виявлений дефект твердих тканин у межах емалі. Краї дефекту крихкі, білого кольору. ЕОД - 5 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий поверхневий карієс
B	B. Місцева гіоплазія емалі
C	C. Гострий початковий карієс
D	D. Некроз емалі
E	E. Ерозія емалі
№	43. крок 2010
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ

Текст завдання	Пацієнту 67-ми років після обстеження було встановлено діагноз: карієс цементу 35. На якому пломбувальному матеріалі слід зупинити свій вибір?
Правильна відповідь	A. Склоіономірний цемент
B	B. Срібна амальгама
C	C. Композиційний матеріал хімічного твердіння
D	D. Силідонт
E	E. Силіцин
№	44. . крок 2010
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 44. Об'єктивно: на жувальній поверхні 44 глибока каріозна порожнина, щільний пігментований дентин. Зондування та перкусія безболісні. ЕОД - 12 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний глибокий карієс
B	B. Хронічний середній карієс
C	C. Хронічний фіброзний періодонтит
D	D. Хронічний фіброзний пульпіт
E	E. Гострий глибокий карієс
№	45. крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Пацієнт 60-ти років санує порожнину рота перед оперативним втручанням з приводу катаракти. Після обстеження було встановлено діагноз: хронічний середній карієс 22 (V клас за Блеком). Який пломбувальний матеріал НЕ СЛІД застосовувати у цього хворого?
Правильна відповідь	A. Мікрогібридний матеріал світлового твердіння
B	B. Мікрогібридний матеріал хімічного твердіння
C	C. Склоіономірний цемент хімічного твердіння
D	D. Силікатний цемент
E	E. Макронаповнений композит хімічного твердіння
№	46. . крок 2010
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ

Текст завдання	Хворому 20-ти років поставлено діагноз: хронічний глибокий карієс 12. Об'єктивно: на апроксимально-дистальній поверхні 12 глибока каріозна порожнина. Каріозним процесом також вражено і дистальний кут коронки 12. Оберіть матеріал для усунення вказаного дефекту:
Правильна відповідь	A. Композитний матеріал світлового затвердіння
B	B. Склоіономірний цемент хімічного затвердіння
C	C. Склоіономірний цемент світлового затвердіння
D	D. Полікарбосилатний цемент
E	E. Алюмосілікатний цемент
№	47. крок 2010, 2008
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить пломбування каріозної порожнини II класу за Блеком у 36 зубі методом сендвіч-техніки в одне відвідування у чоловіка 35-ти років. Який з склоіономірних цементів слід обрати в даному випадку в якості базової прокладки?
Правильна відповідь	A. Гібридний
B	B. Водотвердіючий
C	C. Класичний
D	D. Конденсувальний
E	E. Зміцнений
№	48. крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Для пломбування каріозної порожнини середньої глибини в 37 (II клас за Блеком) у чоловіка 35-ти років лікар обрав техніку пошарової реставрації. Яким з композитів у даному випадку слід вкрити дно і стінки каріозної порожнини для створення початкового суперадаптивного шару?
Правильна відповідь	A. Текучий
B	B. Конденсуємий
C	C. Макронаповнений
D	D. Мікрогібридний
E	E. Мікронаповнений
№	49. . крок 2009
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ

Текст завдання	Жінка 31-го року звернулася до стоматолога з метою санації зубів. Об'єктивно: у пришийковій ділянці 13 та 23 виявлені дефекти твердих тканин неправильної форми у межах глибоких шарів емалі. Дно дефектів шорстке, краї крейдоподібно змінені. Яка тактика лікаря по відношенню до цих дефектів?
Правильна відповідь	A. Препарування і пломбування
B	B. Пломбування композитом без препарування
C	C. Ремінералізуюча терапія
D	D. Зішліфовування дефектів
E	E. Сріблення дефектів
№	50. . крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Жінка 51-го року звернулася зі скаргами на застрягання їжі у зубі на нижній щелепі з правого боку. Об'єктивно: на дистально-жувальній поверхні 45 визначається глибока каріозна порожнина, виповнена щільним пігментованим дентином; не сполучається з порожниною зуба. Було встановлено діагноз: хронічний глибокий каріес. На підставі якого дослідження лікарем було виключено хронічний періодонтит?
Правильна відповідь	A. Електрооднотометрія
B	B. Зондування
C	C. Пальпація проекції верхівки кореня
D	D. Перкусія
E	E. Холодова проба
№	51. . крок 2009
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 35-ти років скаржиться на наявність порожнини у зубі на нижній щелепі зліва, болю від солодкого, кислого і під час прийому твердої їжі. Під час обстеження у 36 виявлена глибока каріозна порожнина, що виповнена світлим розм'якшеним дентином. Зондування болісне по дну каріозної порожнини, реакція на холод болісна, швидко минула. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий глибокий каріес
B	B. Гострий вогнищевий пульпіт
C	C. Хронічний фіброзний пульпіт
D	D. Гострий середній каріес
E	E. Хронічний глибокий каріес
№	52. . крок 2009

Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржиться на часте випадіння пломби з зуба. Об'єктивно: у 46 каріозна порожнина (1 клас за Блекум). Вирішено відновити анатомічну форму зуба металеву вкладкою. Яка особливість препарування порожнини під вкладку у даного хворого?
Правильна відповідь	A. Створення фальца
B	B. Створення додаткового уступу
C	C. Розширення дна порожнини
D	D. Препарування під парапульпарні штифти
E	E. Заглиблення порожнини
№	53. . крок 2009
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 23-х років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 15, яку помітив рік тому. При огляді на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба, виповнена щільним пігментованим дентином. Зондування, реакція на холод та перкусія - безболісні. ЕОД- 10 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний глибокий карієс
B	B. Хронічний фіброзний періодонтит
C	C. Хронічний фіброзний пульпіт
D	D. Хронічний середній карієс
E	E. Хронічний гранулематозний періодонтит
№	54. . крок 2009, 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора скаржиться на біль від кислого та солодкого в 11. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці 11, на фоні крейдоподібно зміненої емалі, має місце дефект у межах емалево-дентинної межі зі світлим дном. Зондування болісне, перкусія і холодова проба безболісні. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Гострий поверхневий карієс
B	B. Гострий початковий карієс
C	C. Гострий середній карієс
D	D. Гіоплазія емалі
E	E. Флюороз
№	55. крок 2009

Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 30-ти років, звернувся до стоматолога зі скаргами на косметичний дефект та незначну болючість 44 під час чищення зубів. Об'єктивно: виявлено каріозну порожнину V-го класу за Блеком в межах плащового дентину. Зондування стінок порожнини викликає незначну болючість, термопроба - позитивна. Який пломбувальний матеріал доцільно обрати для реставрації даної порожнини?
Правильна відповідь	A. Компомер
B	B. Композитний матеріал хімічного твердіння
C	C. Амальгама
D	D. Полікарбоксилатний цемент
E	E. Кермет
№	56. . крок 2009
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 18-ти років скаржиться на короткочасний біль у 37 від солодкого і холодного. Об'єктивно: на жувальній поверхні 37 каріозна порожнина межах плащового дентину, заповнена розм'якшеним дентином, зондування стінок каріозної порожнини болісне області емалево-дентинної ділянки, ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий середній карієс
B	B. Гострий поверхневий карієс
C	C. Гострий глибокий карієс
D	D. Хронічний фіброзний пульпіт
E	E. Гіперемія пульпи
№	57. крок 2009
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Вагітна жінка 24-х років звернулася зі скаргами на появу за останній час декількох каріозних порожнин, випадіння раніше встановлених пломб. Під час об'єктивного обстеження встановлено: індекс КПУ=16, гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,3 бали. Оберіть оптимальний матеріал для пломбування каріозних порожнин у даному випадку:
Правильна відповідь	A. Склоіономірний цемент
B	B. Срібна амальгама
C	C. Композит хімічного твердіння
D	D. Композит світлового твердіння
E	E. Силікофосфатний цемент

№	58. крок 2009
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить лікування 26 зуба з приводу гострого глибокого карієсу у пацієнтки 22-х років. У якості лікувальної прокладки обраний кальційсаліцилатний цемент "Life". Чим доцільно ізолювати лікувальну прокладку в цьому випадку?
Правильна відповідь	A. Склоіономірний цемент
B	B. Ізолюючий лак
C	C. Адгезивна система композиту
D	D. Цинк-фосфатний цемент
E	E. Цинк-євгенольний цемент
№	59. крок 2008
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 22. Об'єктивно: на медіальній поверхні 22 глибока каріозна порожнина, при зондуванні незначний біль. Який оптимальний матеріал для пломбування 22?
Правильна відповідь	A. Композиційний матеріал світлового затвердіння
B	B. Алюмо-силікатний цемент
C	C. Склоіономерний цемент світлового затвердіння
D	D. Склоіономерний цемент хімічного затвердіння
E	E. Силіко-фосфатний цемент
№	60. крок 2008
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Жінка 28-ми років скаржиться на гострий біль у ділянці верхньої щелепи зліва під час прийому їжі. 6 днів тому був видалений 28, після чого і з'явився біль. Хвора вважає, що під час видалення 28 був "порушений" сусідній зуб. Об'єктивно: комірка 28 у стадії загоєння. На дистальній поверхні 27 - каріозна порожнина у пришийковій ділянці, що не сполучається з порожниною зуба. Від холодого подразника - швидкоминаючий біль. Дентин дна і стінок світлий, розм'якшений. Зондування болісне по всьому дну. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий глибокий карієс
B	B. Гострий обмежений пульпіт
C	C. Гострий дифузний пульпіт
D	D. Хронічний глибокий карієс
E	E. Хронічний фіброзний пульпіт

№	61. . крок 2008
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий звернувся зі скаргами на біль, який виникає при дії холодного, кислого, солодкого в 45 зубі. Біль проходить після зняття подразника. Об'єктивно: каріозна порожнина на жувальній поверхні в межах плащового дентину, виповнена залишками їжі та розм'якшеним дентином, нависаючі краї емалі крейдоподібні. Який діагноз поставив лікар?
Правильна відповідь	A. Гострий середній карієс
B	B. Хронічний середній карієс
C	C. Гострий поверхневий карієс
D	D. Гострий глибокий карієс
E	E. Хронічний глибокий карієс
№	62. крок 2008, 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Після застосування методики тотального протравлювання та просушування твердих тканин у процесі реставрації каріозної порожнини II класу за Блеком 25, лікар помітив, що поверхня емалі набула крейдоподібного вигляду, а дентин став повністю сухим. Як слід обробити поверхню емалі та дентину для подальшого проведення реставрації за технікою "wet – Bonding" (вологого бондінгу)?
Правильна відповідь	A. Дентинзволожуючим агентом
B	B. Емаль і дентин протравлюючим гелем знову
C	C. Емаль і дентин адгезивною системою
D	D. Емаль і дентин пероксидом водню
E	E. Емаль і дентин спиртом
№	63. крок 2008
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на біль у зубі на верхній щелепі зліва, який виникає під час прийому їжі від дії термічних (особливо від холодної води), механічних та хімічних подразників і зникає відразу після їх усунення. Об'єктивно: глибока каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором в межах біляпульпарного дентину. Зондування болісне по дну каріозної порожнини. Термодіагностика різко болюча, зникає відразу після усунення подразника. ЕОД- 15 мкА. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий глибокий карієс
B	B. Гіперемія пульпи зуба

С	С. Гострий частковий пульпіт
D	D. Гострий середній карієс
Е	Е. Хронічний простий пульпіт
№	64. крок 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Чоловік 28-ми років скаржиться на біль у ділянці фронтальних верхніх зубів при вживанні холодної їжі, що з'явилася 1,5 місяці тому після травми. Об'єктивно: відсутній кут коронки 21, відлом ріжучого краю 11 у межах дентину. Зондування 11, 21 безболісне, реакція на холод - болісна, короткочасна. ЕОД-7 мкА. Який з пломбувальних матеріалів доцільно використати в даній клінічній ситуації?
Правильна відповідь	A. Мікрогібридний композит
B	B. Компомер
С	С. Макронаповнений композит
D	D. Силікатний цемент
Е	Е. Склоіономірний цемент
№	65. крок 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	У хворого 25-ти років скарги на короткочасний біль від солодкого в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно: в 36 каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, в межах навколопульпарного дентину. Дентин м'який, каріозна порожнина з порожниною зуба не сполучається, зондування дна чутливе, перкусія 36 безболісна, термодіагностика - біль, який одразу зникає після усунення подразника. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий глибокий карієс
B	B. Гострий середній карієс
С	С. Гіперемія пульпи
D	D. Хронічний фіброзний пульпіт
Е	Е. Хронічний глибокий карієс
№	66. крок 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	У хворого 30-ти років скарги на наявність каріозної порожнини, яка з'явилася 5 місяців тому. При об'єктивному обстеженні в 26 каріозна порожнина з широким вхідним отвором, в межах плащового дентину. Каріозна порожнина не сполучається з порожниною зуба. Дентин дна і стінок каріозної порожнини твердий, пігментований. Який найбільш вірогідний діагноз?

Правильна відповідь	A. Хронічний середній карієс
B	B. Хронічний поверхневий карієс
C	C. Гострий середній карієс
D	D. Гострий глибокий карієс
E	E. Хронічний глибокий карієс
№	67. крок 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Жінка 18-ти років скаржиться на чутливість зубів до солодкого, кислого, косметичний дефект. Об'єктивно: у пришийковій ділянці 14, 13 поодинокі крейдоподібні плями з матовим відтінком без ушкодження емалі, безболісні під час зондування, забарвлюються 2% розчином метиленового синього, ЕОД-2 мкА. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	A. Початковий карієс
B	B. Флюороз, плямиста форма
C	C. Локалізована гіпоплазія
D	D. Поверхневий карієс
E	E. Ерозія емалі
№	68. крок 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворій 25-ти років з хронічним глибоким карієсом 46 було поставлено пломбу зі срібної амальгами, що мала прокладку на дні товщиною 0,5 мм з фосфат-цементу. Через добу з'явився короткочасний біль від термічних подразників. Які негативні якості амальгами спричинили появу болю?
Правильна відповідь	A. Висока теплопровідність
B	B. Відсутність адгезії
C	C. Токсична дія ртуті
D	D. Токсична дія окислів
E	E. Тривале твердіння пломби
№	69. крок 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	У хворого при обстеженні порожнини рота виявлена каріозна порожнина у 11 в межах біляпульпарного дентину з пошкодженням кута зуба та ріжучого краю. Якому пломбувальному матеріалу слід надати перевагу?
Правильна відповідь	A. Композитний матеріал світлового затвердіння
B	B. Склоіономірний цемент світлового затвердіння

С	С. Композитний матеріал хімічного затвердіння типу паста-паста
D	D. Композитний матеріал хімічного затвердіння типу порошок-рідина
E	E. Силікатний цемент
№	70. крок 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Жінка 42-х років скаржиться на наявність каріозної порожнини у 23, косметичний дефект. Об'єктивно: у пришийковій ділянці 23 визначається велика каріозна порожнина, що глибоко заходить під ясна. Порожнина розташована у середніх шарах дентину. Дентин на дні та стінках - щільний, темно-коричневого кольору. Колір зуба не змінений. Який матеріал оптимальний для пломбування в даному клінічному випадку?
Правильна відповідь	A. Склоіономірний цемент
B	B. Композит хімічного затвердіння
С	С. Силікатофосфатний цемент
D	D. Силікатний цемент
E	E. Композит світлового затвердіння
№	71. крок 2007
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий 20-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність крейдоподібних плям 11, 12, 21, 22 зуба, відчуття оскоми від хімічних подразників під час приймання їжі. Об'єктивно: у пришийковій ділянці 11,12, 21, 22 зубів виявлені білі плями розміром 0,2 x 0,3 см, з шорсткою поверхнею, які забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий початковий карієс
B	B. Хронічний початковий карієс
С	С. Гострий поверхневий карієс
D	D. Гіоплазія емалі
E	E. Флюороз
№	1. крок 2016
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 38ми років скаржиться на ниючий біль у ділянці 46 зуба впродовж 2х діб. Об'єктивно: на дистальній поверхні 46го каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, зондування дна безболісне, вертикальна перкусія позитивна, слизова оболонка навколо 46 зуба гіперемована. ЕОД 115 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий серозний періодонтит

B	B. Гострий гнійний пульпіт
C	C. Гострий гнійний періодонтит
D	D. Загострення хронічного періодонтиту
E	E. Гострий локалізований пародонтит
№	2. крок 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 44-х років звернувся до хірурга-стоматолога зі скаргами на гострий постійний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що посилюється під час змикання щелеп. Біль відзначає впродовж 3х діб. Об'єктивно: обличчя симетричне, рот відкриває вільно. Коронка 26 зруйнована наполовину. Зондування каріозної порожнини безболісне. Перкусія 26 різко болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 26 набрякла, гіперемована. 26 раніше лікований. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний періодонтит 26, що загострився
B	B. Гострий гнійний періодонтит 26
C	C. Гострий пульпіт 26
D	D. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва від 26
E	E. Пародонтит 26, 27, 28
№	3. крок 2016
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 20ти років скаржиться на напади гострого самовільного болю в 35, що триває 1020 хвилин. Напади виникають одинтри рази в день, підсилюються вночі. Зуб болить 2 дні. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий обмежений пульпіт
B	B. Гострий дифузний пульпіт
C	C. Гострий гнійний пульпіт
D	D. Гострий глибокий карієс
E	E. Гіперемія пульпи
№	4. крок 2016, 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 24х років звернувся зі скаргами на ниючий біль у ділянці 11, що посилюється при накушуванні. Два дні тому зуб запломбований з приводу пульпіту. Об'єктивно: в 11 пломба. Температурна проба безболісна, вертикальна перкусія слабкоболісна. На рентгенограмі 11 ендодонтична пломба виведена за верхівку кореня на 1 мм. Який з нижче перерахованих методів буде найбільш ефективним для ліквідації ускладнення?

Правильна відповідь	A. Флюктуоризація
B	B. УВЧтерапія
C	C. Послаблюючий розріз
D	D. 1% розчин гідрокортизону субмукозно
E	E. Призначення анальгетиків
№	5. крок 2016, 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий скаржиться на постійний біль у ділянці 25 впродовж доби. Об'єктивно: на медіальній поверхні 25 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на холод безболісна. На Рограмі: кісткова тканина періапікальної ділянки без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий серозний періодонтит
B	B. Гострий дифузний пульпіт
C	C. Гострий гнійний пульпіт
D	D. Гострий гнійний періодонтит
E	E. Загострення хронічного періодонтиту
№	6. крок 2016, 2015, 2012, 2011, 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Чоловік 34-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на гострий нападоподібний самочинний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що посилюється від холодних подразників, іррадіює у вухо та скронею. Рік тому сильно болів 37, до лікаря не звертався. 3 дні тому знову виник біль. Об'єктивно: у 37 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування розкритої точки різко болісне. На рентгенограмі 37 у ділянці верхівок коренів визначається розширення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний пульпіт, що загострився
B	B. Хронічний гранулематозний періодонтит, що загострився
C	C. Хронічний фіброзний періодонтит, що загострився
D	D. Гострий дифузний пульпіт
E	E. Гострий гнійний пульпіт
№	7. крок 2016, 2015, 2013, 2012, 2011
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ

Текст завдання	Хвора 35-ти років скаржиться на наростаючий пульсууючий біль 26. Об'єктивно: у 26 каріозна порожнина, що виповнена розм'якшеним дентином, порожнина зуба закрита, зондування дна безболісне, перкусія різко болісна. Відзначається рухомість зуба I ступеня. Рентгенологічно змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний періодонтит
B	B. Гострий гнійний пульпіт
C	C. Гострий серозний періодонтит
D	D. Загострення хронічного періодонтиту
E	E. Гострий дифузний пульпіт
№	8. крок 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Чоловік 27-ми років скаржиться на тривалий ниючий біль у 15 зубі під час приймання їжі, особливо холодної. Іноді відмічає біль при зміні температури. Об'єктивно: в 15 зубі на дистальній поверхні каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином. При зондуванні відмічається біль. Електрозбудливість пульпи 35 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний фіброзний пульпіт
B	B. Гострий глибокий карієс
C	C. Хронічний глибокий карієс
D	D. Гіперемія пульпи
E	E. Загострений хронічний пульпіт
№	9. крок 2016
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Чоловік 28ми років звернувся до лікарястоматолога зі скаргами на біль в ділянці верхньої щелепи зліва при вживанні холодної води, який швидко минає. Об'єктивно: на жувальній поверхні 26 зуба визначається каріозна порожнина з нависаючими краями емалі, виповнена світлим розм'якшеним дентином. Зондування дна порожнини болуче, перкусія безболісна. ЕОД 68 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий глибокий карієс
B	B. Хронічний середній карієс
C	C. Хронічний глибокий карієс
D	D. Гіперемія пульпи
E	E. Хронічний фіброзний пульпіт
№	10. крок 2016

Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	В процесі лікування 11 зуба з приводу пульпіту стоматолог проводить обтурацію кореневого каналу методом бічного ущільнення холодної гутаперчі. Оберіть інструмент для конденсації у каналі гутаперчі у даному випадку:
Правильна відповідь	A. Спредер
B	B. Вертикальний конденсатор
C	C. Гуттаконденсор
D	D. Плагер
E	E. Ендодонтичний зонд
№	11. крок 2016
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Лікар-стоматолог закінчує розширення кореневого каналу 32 зуба у чоловіка 45ти років, використовуючи для цього "Step Back"техніку. Апікальна частина каналу розширена до 30 розміру файла. Для вирівнювання стінок кореневого каналу лікар використав обертальні рухи Hфайла 25 розміру. У процесі роботи відбувся відлам інструменту. Яка помилка допущена лікарем у процесі роботи?
Правильна відповідь	A. Не дотримано техніки роботи інструментом
B	B. Неправильно обраний розмір файла
C	C. Цей етап не передбачає роботу з Hфайлом
D	D. При цій методиці Hфайл не використовується
E	E. Неправильно обраний метод інструментальної обробки каналу
№	12. крок 2016
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 33х років скаржиться на відчуття розпирання і болю в 35 зубі, які виникають від гарячої їжі та неприємний запах при відсмоктуванні із зуба. Зуб раніше реагував на термічні подразники, інколи в ньому виникав спонтанний ниючий біль. Об'єктивно: в 35 зубі велика і глибока каріозна порожнина, яка при зондуванні має сполучення з порожниною зуба; зондування порожнини безболісне, а зондування устя каналу болісне, з ниючим болем. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гангренозний пульпіт
B	B. Гострий гнійний пульпіт
C	C. Гострий обмежений пульпіт
D	D. Хронічний конкрементозний пульпіт
E	E. Хронічний фіброзний пульпіт

№	13. крок 2016
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 25-ти років, кореспондент, скаржиться на мимовільний нападаподібний біль в лівій скроні. Біль спонтанно виникає ввечері. Інколи біль виникає при нахилі голови, при злетах та посадках літака. Об'єктивно: всі зуби інтактні. Оголення шийок 24 і 36 зубів. Перкусія 24 дає слабковиразний біль. Для встановлення діагнозу необхідно провести таке дослідження:
Правильна відповідь	A. Рентгенографія зубів лівої половини обох щелеп
B	B. ЕОД зубів лівої половини обох щелеп
C	C. Термодіагностика 24 і 36
D	D. Діагностична блокада II гілки <i>n.V</i>
E	E. Діафаноскопія
№	14. крок 2015, 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 38-ми років скаржиться на ниючий біль у ділянці 46 зуба впродовж 2-х діб. Об'єктивно: на дистальній поверхні 46-го каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, зондування дна безболісне, вертикальна перкусія позитивна, слизова оболонка навколо 46 зуба гіперемована. ЕОД - 115 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий серозний періодонтит
B	B. Гострий гнійний пульпіт
C	C. Гострий гнійний періодонтит
D	D. Загострення хронічного періодонтиту
E	E. Гострий локалізований пародонтит
№	15. крок 2015
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 36 у жінки 53-х років. Медіальні канали важкопрохідні. Який з перерахованих засобів необхідно обрати для полегшення проходження кореневих каналів у цієї хворої?
Правильна відповідь	A. 20% р-н етилендіамінтетраоцтової кислоти
B	B. 2% р-н трипсину
C	C. 10% р-н перекису водню
D	D. 10% р-н хлоридної кислоти
E	E. 40% р-н формальдегіду

№	16. крок 2015
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на напади гострого самовільного болю в 35, що триває 10-20 хвилин. Напади виникають один три рази в день, підсилюються вночі. Зуб болить 2 дні. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий обмежений пульпіт
B	B. Гострий дифузний пульпіт
C	C. Гострий гнійний пульпіт
D	D. Гострий глибокий карієс
E	E. Гіперемія пульпи
№	17. крок 2015, 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 24-х років звернувся зі скаргами на ниючий біль у ділянці 11, що посилюється при накушуванні. Два дні тому зуб запломбований з приводу пульпіту. Об'єктивно: в 11 - пломба. Температурна проба безболісна, вертикальна перкусія слабкоболісна. На рентгенограмі 11 - ендодонтична пломба виведена за верхівку кореня на 1 мм. Який з нижче перерахованих методів буде найбільш ефективним для ліквідації ускладнення?
Правильна відповідь	A. Флюктуоризація
B	B. УВЧ-терапія
C	C. Послаблюючий розріз
D	D. 1% розчин гідрокортизону субмукозно
E	E. Призначення анальгетиків
№	18. крок 2015
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий звернувся зі скаргами на біль у 26, що виникає при прийомі гарячої їжі, неприємний запах з роти. В анамнезі: періодично виникає самовільний біль. Об'єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Перкусія чутлива, зондування, термодіагностика безболісні. ЕОД - 70 мкА. Який з методів лікування буде оптимальний в даному випадку?
Правильна відповідь	A. Вітальної екстирпації
B	B. Вітальної ампутації
C	C. Девітальної екстирпації
D	D. Девітальної ампутації
E	E. Консервативний

№	19. крок 2015
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Під час лікування хронічного фіброзного періодонтиту 36 у хворого 30-ти років лікар ненавмисно перфорував дно порожнини зуба. Яка подальша лікарська тактика у цьому випадку?
Правильна відповідь	A. Закриття перфорації склоіономерним цементом
B	B. Закриття перфорації пастою з гідроокисом кальцію
C	C. Електрофорез йодиду калію
D	D. Видалення зуба
E	E. Закриття перфораційного отвору цинк-евгеноловою пастою
№	20. крок 2015
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	У хворого 21-ми років при лікуванні гострого глибокого карієсу 46 зуба під час препарування випадково відкрито медіально-щічний ріг пульпи. Який метод лікування найбільш показаний?
Правильна відповідь	A. Біологічний метод
B	B. Метод вітальної екстирпації
C	C. Метод девітальної ампутації
D	D. Метод девітальної екстирпації
E	E. Метод вітальної ампутації
№	21. крок 2015, 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	У хворого на гемофілію 24-х років діагностовано загострення хронічного пульпіту 11 зуба. Оберіть оптимальний метод лікування зуба у цьому випадку:
Правильна відповідь	A. Девітальна екстирпація
B	B. Біологічний метод лікування
C	C. Вітальна ампутація
D	D. Девітальна ампутація
E	E. Вітальна екстирпація
№	22. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ

Текст завдання	Хворому 56-ти років при лікуванні пульпіту 47 з метою девіталізації пульпи була використана миш'яковиста паста. У призначений час пацієнт для продовження лікування не з'явився. Розвинувся токсичний "миш'яковистий"періодонтит. Який з перелічених фізіотерапевтичних методів доцільно застосувати для ліквідації ускладнення, що виникло?
Правильна відповідь	A. Електрофорез йодиду калію
B	B. УВЧ
C	C. д'Арсонвалізація
D	D. Флюктуоризація
E	E. Гальванізація
№	23. крок 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворого протягом 2-х днів турбує мимовільний нападopodobний нічний іррадіюючий біль з короткими безболісними проміжками. На основі скарг хворого визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	A. Гострий дифузний пульпіт
B	B. Гострий глибокий карієс
C	C. Загострення хронічного періодонтиту
D	D. Гострий обмежений пульпіт
E	E. Гострий гнійний пульпіт
№	24. крок 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	До лікаря звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на постійний ниючий біль, який посилюється під час накушування. Біль з'явився близько 3 доби тому. Під час огляду порожнини рота на слизовій оболонці альвеолярного відростка в межах 34 зуба виявляється гіперемія ясни. Коронка 34 зуба зруйнована на 2/3. Перкусія його різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного періодонтиту
B	B. Гострий гнійний періодонтит
C	C. Гострий остеомієліт
D	D. Гострий гнійний пульпіт
E	E. Гострий періостит
№	25. крок 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ

Текст завдання	Хворий 34-х років скаржиться на наявність зруйнованого зуба на нижній щелепі. Об'єктивно: коронка 26 зруйнована на 2/3, каріозна порожнина сполучається з порожниною зуба, реакція на холод та зондування безболісна, перкусія безболісна. На слизовій оболонці в області проекції кореня рубець від нориці. На рентгенограмі ділянки деструкції в області верхівок коренів з нечіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гранулюючий періодонтит
B	B. Хронічний гангренозний пульпіт
C	C. Хронічний фіброзний пульпіт
D	D. Хронічний фіброзний періодонтит
E	E. Хронічний гранульоматозний періодонтит
№	26. крок 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 26-ти років скаржиться на гострий біль у ділянці 35 зуба, що посилюється при накушуванні. На рентгенограмі: в періапикальній ділянці кореня 35 зуба спостерігається зона деструкції кісткової тканини з нерівними краями. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту
B	B. Гострий гнійний пульпіт, ускладнений гострим періодонтитом
C	C. Хронічний пульпіт, ускладнений періодонтитом
D	D. Гострий дифузний пульпіт
E	E. Хронічний фіброзний періодонтит
№	27. крок 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвору 33-х років турбують мимовільні короткочасні болі впродовж 15-ти хвилин, болі від холодного, солодкого, що не вщухають після припинення дії подразника. Об'єктивно: в 35 зубі на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, дентин дна і стінок твердий, пігментований. Зондування дна порожнини болісне в одній точці. Реакція на холод болісна, довго не вщухаюча після усунення подразника, ЕОД - 35 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий обмежений пульпіт
B	B. Гострий дифузний пульпіт
C	C. Гіперемія пульпи
D	D. Загострення хронічного пульпіту
E	E. Гострий гнійний пульпіт
№	28. . крок 2014

Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 25ти років скаржиться на болі пульсууючого характеру в 15 зубі та болі при накушуванні. Об'єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином, зондування безболісне, перкусія різко болісна, зуб рухомий. Регіонарний лімфаденіт. На рентгенограмі змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний періодонтит
B	B. Загострення хронічного періодонтиту
C	C. Загострення хронічного пульпіту
D	D. Гострий періостит
E	E. Гострий серозний періодонтит
№	29. крок 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 26ти років скаржиться на біль від гарячого та відчуття розпирання у зубі впродовж 3х місяців. Об'єктивно: в 24 зубі велика каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою. Перкусія 24 безболісна. Глибоке зондування болісне. ЕОД 80 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гангренозний пульпіт
B	B. Хронічний фіброзний пульпіт
C	C. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
D	D. Гострий гнійний пульпіт
E	E. Хронічний періодонтит
№	30. крок 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	У хворого на гемофілію 24х років діагностовано загострення хронічного пульпіту 11 зуба. Оберіть оптимальний метод лікування зуба в цьому випадку:
Правильна відповідь	A. Девітальна екстирпація
B	B. Біологічний метод лікування
C	C. Вітальна ампутація
D	D. Девітальна ампутація
E	E. Вітальна екстирпація
№	31. крок 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ

Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на виділення крові з порожнини в зубі на верхній щелепі під час прийому їжі. Об'єктивно: в 27 зубі на апроксимальножувальній поверхні глибока каріозна порожнина, заповнена розростанням м'яких тканин багряно-червоного кольору, що легко кровить при доторкуванні зондом. Зондування і реакція на холододовий подразник слабкоболісні. ЕОД 60 мкА. На рентгенограмі патологічних змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
B	B. Гіпертрофічний папіліт
C	C. Хронічний гранулюючий періодонтит
D	D. Хронічний фіброзний періодонтит
E	E. Хронічний гангренозний пульпіт
№	32. . крок 2014
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 45-ти років скаржиться на гострий, самочинний, нічний біль у зубі на верхній щелепі справа. Біль триває 3 доби, має пульсуєючий характер, іррадіює у вилічну ділянку і практично не вщухає. Об'єктивно: у 15 зубі глибока каріозна порожнина. Дентин брудносірого кольору, м'якої консистенції. Зондування болісне по всьому дну. Холодовий подразник зменшує інтенсивність болю. ЕОД 55 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний пульпіт
B	B. Гострий обмежений пульпіт
C	C. Гострий дифузний пульпіт
D	D. Гострий гнійний періодонтит
E	E. Гострий серозний періодонтит
№	33. крок 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 48-ми років скаржиться на гострий нападopodobний сильний самовільний біль у зубі на верхній щелепі справа, що іррадіює у скроню. Хворіє дві доби. Зуб раніше гостро болів, але впродовж місяця хвору турбує ниючий біль від потрапляння в порожнину зуба їжі. Об'єктивно: на дистально-апроксимальній поверхні 25 зуба глибока каріозна порожнина, виповнена розм'якшеним дентином, з'єднана з порожниною зуба. Зондування пульпи болісне. Перкусія трохи болісна. Слизова блідо-рожевого кольору. ЕОД - 50 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного пульпіту
B	B. Гострий гнійний пульпіт
C	C. Гострий дифузний пульпіт

D	D. Гострий періодонтит
E	E. Загострення хронічного періодонтиту
№	34. . крок 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий висловлює скарги на самочинний нападаподібний біль у зубах зліва, що іррадіює по ходу гілок трійчастого нерва у вухо. Зуб болить 2 доби. Об'єктивно: у 36 глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування різко болісне по всьому дну, реакція на холод різко болісна, перкусія слабкоболісна. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий дифузний пульпіт
B	B. Гострий гнійний пульпіт
C	C. Гострий вогнищевий пульпіт
D	D. Гострий серозний пульпіт
E	E. Загострення хронічного пульпіту
№	35. крок 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий скаржиться на інтенсивний самовільний пульсуючий біль у ділянці нижньої щелепи зліва. Вказати причинний зуб не може. Біль практично не припиняється, деколи стає слабкішим. В останні години від холодного біль дещо зменшується. Об'єктивно: в 47 - глибока каріозна порожнина, зондування дна болюче, порожнина зуба закрита. Який метод лікування найбільш показаний?
Правильна відповідь	A. Вітальна екстирпація
B	B. Девітальна екстирпація
C	C. Девітальна ампутація
D	D. Видалення зуба
E	E. Вітальна ампутація
№	36. крок 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Жінка 42-х років звернулася зі скаргами на болі у 36 під час прийому їжі, особливо гарячої, неприємний запах при відсмоктуванні із зуба. Біль носить ниючий характер і поступово вщухає. Зуб непокоїть впродовж 3-х місяців. Раніше не лікувалася. Об'єктивно: у 36 - глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. На Ro-грамі у ділянці верхівок коренів 36 визначається розширення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гангренозний пульпіт

В	В. Хронічний фіброзний пульпіт
С	С. Загострення хронічного пульпіту
Д	Д. Хронічний фіброзний періодонтит
Е	Е. Загострення хронічного періодонтиту
№	37. . крок 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий скаржиться на гострий самочинний короткочасний біль нападоподібного характеру в ділянці 36, який посилюється при вживанні їжі. Об'єктивно: в 36 глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Порожнина зуба закрита, зондування болоче в одній точці. Від холодового подразника виникає біль, що зберігається впродовж 10-ти хвилин після усунення подразника. Реакція на перкусію безболісна. Встановіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	А. Гострий обмежений пульпіт
В	В. Гіперемія пульпи
С	С. Гострий дифузний пульпіт
Д	Д. Загострення хронічного пульпіту
Е	Е. Гострий глибокий карієс
№	38. . крок 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	При плановій санації порожнини рота у хворого 35-ти років на дистальній жувальній поверхні 45 зуба виявлено каріозну порожнину, на дні залишки пломбувального матеріалу. Перкусія 45 безболісна. На слизовій ясен - нориця. На Ro-грамі навколо верхівки кореня 45 – вогнище деструкції кісткової тканини у вигляді язиків полум'я, кореневий канал запломбований на 2/3 довжини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Хронічний гранулюючий періодонтит
В	В. Хронічний гранулематозний періодонтит
С	С. Радикулярна кіста
Д	Д. Загострення хронічного періодонтиту
Е	Е. Хронічний фіброзний періодонтит
№	39. крок 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 20-ти років скаржиться на нападоподібний самочинний біль впродовж останньої доби у 26 зубі. Об'єктивно: у 26 зубі на жувальній поверхні виявлена глибока каріозна порожнина. При обстеженні дна випадково розкритий ріг пульпи у ділянці переднього щічного горба. Зондування розкритої точки різко болісне. Оберіть метод лікування:

Правильна відповідь	A. Біологічний
B	B. Вітальна ампутація
C	C. Девітальна ампутація
D	D. Вітальний комбінований
E	E. Вітальна екстирпація
№	40. крок 2013
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 27-ми років звернулася до стоматолога зі скаргами на незначну рухливість 11, 21 зубів, біль у цих зубах при відкушуванні їжі. 3 дні тому хвора отримала травму 11, 21 зубів. При обстеженні встановлено, що електророзбудливість пульпи вищевказаних зубів більше 100 мкА. Яке з нижче зазначених ускладнень у хворої?
Правильна відповідь	A. Травматичний періодонтит
B	B. Пародонтит
C	C. Остеомієліт верхньої щелепи
D	D. Періостит
E	E. Радикулярна кіста
№	41. крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворому 36-ти років поставили діагноз: хронічний фіброзний пульпіт. Проведено препарування, екстирпацію пульпи, інструментальну та медикаментозну обробку каналів. Як необхідно провести пломбування каналів?
Правильна відповідь	A. До фізіологічної верхівки
B	B. До рентгенологічної верхівки
C	C. За верхівку
D	D. До анатомічної верхівки
E	E. Не доходячи 0,5 см до верхівки
№	42. крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Чоловік 50-ти років скаржитися на постійний біль у ділянці 25 впродовж доби. Об'єктивно: на медіальній поверхні 25 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на температурні подразники безболісна, ЕОД- 100 мкА. На Ro-грамі: кісткова тканина періапікальної ділянки без змін. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий серозний періодонтит
B	B. Загострення хронічного періодонтиту

С	С. Гострий гнійний періодонтит
D	D. Гострий дифузний пульпіт
Е	Е. Гострий гнійний пульпіт
№	43. . крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 42-х років скаржиться на постійний ниючий біль у 45, що підсилюється при накушуванні. Об'єктивно: перкусія 45 різко болісна, перехідна складка в ділянці зуба набрякла, гіперемована, болісна під час пальпації. Після зондування з вічка каналу з'явився гній. Який метод дослідження необхідно використати для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	A. Рентгенологічне дослідження
B	B. Термопроба
С	С. Люмінесцентне дослідження
D	D. Електроодонтодіагностика
Е	Е. Бактеріологічне дослідження
№	44. . крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворому 23-х років встановлено діагноз: гострий пульпіт 15 зуба, ускладнений гострим фокальним періодонтитом. Який із методів лікування повинен обрати лікар?
Правильна відповідь	A. Вітальна екстирпація пульпи
B	B. Девітальна екстирпація пульпи
С	С. Вітальна ампутація пульпи
D	D. Біологічний метод
Е	Е. Девітальна ампутація
№	45. . крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	У хворого 20-ти років під час лікування гострого глибокого карієсу 36 випадково відкрито медіальнощічний ріг пульпи. Який метод лікування є доцільним?
Правильна відповідь	A. Біологічний
B	B. Вітальна ампутація
С	С. Девітальна ампутація
D	D. Вітальна екстирпація
Е	Е. Девітальна екстирпація

№	46. . крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 37-ми років звернулася зі скаргами на наявність порожнини в 34 зубі. Порожнину відмічає впродовж року. Об'єктивно: в 34 зубі глибока каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. Зондування та перкусія безболісні. Рентгенологічні дані свідчать про деформацію періодонтальної щілини, розширення останньої біля верхівки кореня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний фіброзний періодонтит
B	B. Хронічний гранулюючий періодонтит
C	C. Хронічний гранулематозний періодонтит
D	D. Хронічний фіброзний пульпіт
E	E. Хронічний гангренозний пульпіт
№	47. крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 37-ми років скаржиться на неприємні відчуття в 46 зубі. Інколи виникає біль під час приймання їжі, частіше гарячої. Зуб змінений в кольорі. Об'єктивно: в 46 глибока каріозна порожнина, що з'єднана з порожниною зуба. Поверхнєве зондування безболісне, глибоке - болісне. Реакція на тепловий подразник - повільно зростаючий та повільно затихаючий біль. ЕОД - 80 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гангренозний пульпіт
B	B. Хронічний фіброзний пульпіт
C	C. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
D	D. Загострення хронічного фіброзного пульпіту
E	E. Гострий вогнищевий пульпіт
№	48. . крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 25-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на постійний пульсуючий біль, що триває 2 доби, біль при накушуванні. При огляді каріозна порожнина на жувальній поверхні 26 зуба з порожниною зуба не сполучається, зондування дна безболісне, вертикальна та горизонтальна перкусії різко болісні, зуб рухомий. На рентгенограмі змін в тканинах періодонту немає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний періодонтит
B	B. Гострий серозний періодонтит
C	C. Загострення хронічного періодонтиту

D	D. Гострий гнійний пульпіт
E	E. Загострення хронічного пульпіту
№	49. . крок 2012, 2011, 2009
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Пацієнт скаржиться на нападоподібний біль у зубі на верхній щелепі зліва, що підсилюється вночі та від дії різних подразників, іррадіює у ліву скроню та око. Подібні напади були три місяці тому, лікування не проводилося. Об'єктивно: в 25 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування в точці сполучення різко болісне, вертикальна перкусія слабо болісна, горизонтальна - безболісна. Слизова оболонка в проекції верхівки кореня 25 без змін, пальпація безболісна. Термодіагностика різко болісна, напад болю довготривалий. ЕОД- 60 мкА. Рентгенодіагностика - незначне розширення періодонтальної щілини біля верхівки кореня 25. Який найбільш імовірний
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного пульпіту
B	B. Гострий загальний пульпіт
C	C. Гострий гнійний пульпіт
D	D. Гострий гнійний періодонтит
E	E. Загострення хронічного періодонтиту
№	50. крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 39-ти років скаржиться на гострий, самочинний нічний біль у зубі на верхній щелепі справа. Біль триває 3 доби, має пульсуючий характер, іррадіює у виличну ділянку і практично не зникає. Об'єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина. Дентин брудно-сірого кольору, м'якої консистенції. Зондування болісне по всьому дну, перкусія болісна. Холодовий подразник зменшує інтенсивність болю. ЕОД - 55 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний пульпіт
B	B. Гострий дифузний пульпіт
C	C. Гострий гнійний періодонтит
D	D. Гострий обмежений пульпіт
E	E. Гострий серозний пульпіт
№	51. крок 2011
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 19-ти років звернувся до поліклініки зі скаргами на відлам коронки 21 зуба внаслідок травми. Об'єктивно: медіальний кут 21 відсутній. За лінією відколу в одній точці просвічується пульпа. Зондування в цій точці болісне, перкусія безболісна. ЕОД - 25 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	A. Гострий травматичний пульпіт
B	B. Хронічний фіброзний пульпіт
C	C. Гіперемія пульпи
D	D. Гострий обмежений пульпіт
E	E. Гострий глибокий карієс
№	52. крок 2011
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Пацієнт 47-ми років впродовж 2-х місяців скаржиться на періодичні самочинні напади болю в ділянці нижньої щелепи зліва. Біль поширюється на тіло нижньої щелепи, іррадіює у вухо, потилицю. Біль інколи виникає при рухах головою. Об'єктивно: зуби інтактні, жувальні поверхні дещо стерті. Який із методів обстеження буде найінформативнішим для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	A. Рентгенографія
B	B. Електроодонтодіагностика
C	C. Термодіагностика
D	D. Трансілюмінація
E	E. Реографія пульпи
№	53. крок 2011
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий скаржиться на тривалі напади болю, що провокуються різними подразниками; біль виникає також самочинно вночі, іррадіює у праве вухо. Проміжки між нападами 30-40 хвилин. Давність захворювання - 2 доби. Об'єктивно: у 45 глибока каріозна порожнина, стінки та дно її мають м'який світлий дентин. На холодну воду виникає різкий тривалий напад болю. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий дифузний пульпіт
B	B. Гострий обмежений пульпіт
C	C. Гострий гнійний пульпіт
D	D. Загострення хронічного фіброзного пульпіту
E	E. Конкрементозний пульпіт
№	54. крок 2011
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ

Текст завдання	Жінка 29-ти років скаржиться на гострий нападоподібний біль у ділянці верхньої щелепи зліва, які посилюються від холодного, іррадіюють у вухо та скроню. Рік тому сильно болів 27, до лікаря не зверталась. Три дні тому знову виник біль. Об'єктивно: в 27 глибока каріозна порожнина, що з'єднується з порожниною зуба. Зондування відкритої ділянки різко болюче. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного пульпіту
B	B. Гострий серозний періодонтит
C	C. Гострий дифузний пульпіт
D	D. Загострення хронічного періодонтиту
E	E. Гострий обмежений пульпіт
№	55. крок 2011
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 47-ми років скаржиться на постійний біль у 27, що підсилюється при накушуванні. Об'єктивно: шкіра звичайного кольору, обличчя симетричне, рот відкривається вільно, слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 27 набрякла, гіперемована. В 27 глибока каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою. Перкусія 27 різко болісна. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного періодонтиту 27
B	B. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи у ділянці 27
C	C. Гострий гнійний періодонтит 27
D	D. Гострий загальний гнійний пульпіт 27
E	E. Хронічний одонтогенний гайморит зліва
№	56. крок 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Чоловік 37-ми років скаржиться на болі у 46 під час прийому їжі, особливо гарячої, неприємний запах з рота під час відсмоктування з зуба. Біль носить ниючий характер, виникає відчуття розпирання у зубі. Поступово біль стихає. Зуб непокоїть впродовж 2-х місяців, раніше не лікувався. Об'єктивно: обличчя симетричне, на медіально-жувальній поверхні 48 визначається глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. На рентгенограмі: розширення періодонтальної щілини у ділянці верхівок коренів 46. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гангренозний пульпіт
B	B. Загострення хронічного періодонтиту
C	C. Загострення хронічного пульпіту
D	D. Хронічний фіброзний періодонтит

Е	Е. Хронічний фіброзний пульпіт
№	57. крок 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий скаржиться на інтенсивний пульсуючий біль у ділянці нижньої щелепи зліва, причинний зуб вказати не може. Біль практично не припиняється, деколи трохи послаблюється, проте нападаподібно підсилюється від подразників. В останні години від холодного біль дещо зменшується. Об'єктивно: в 17 глибока каріозна порожнина, зондування дна болісне, пульпова камера закрита. Який метод лікування показаний?
Правильна відповідь	А. Вітальна екстирпація
В	В. Девітальна екстирпація
С	С. Девітальна ампутація
D	D. Біологічний
Е	Е. Вітальна ампутація
№	58. крок 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий скаржиться на гострий біль постійного характеру, що посилюється при накушуванні, відчуття вирослого зуба на правій верхній щелепі. При огляді в 15 глибока каріозна порожнина, що сполучена з порожниною зуба. Зуб під час перкусії різко болісний, під час зондування біль не виникає, слизова оболонка в проекції верхівки кореня зуба гіперемована, під час пальпації болісна. На рентгенограмі змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Гострий гнійний періодонтит
В	В. Гострий дифузний пульпіт
С	С. Загострення хронічного періодонтиту
D	D. Гострий серозний періостит
Е	Е. Гострий одонтогенний остеомієліт
№	59. крок 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Жінці 27-ми років проводилося лікування пульпіту методом девітальної екстирпації. У 15 було залишена арсеновіста паста. На вторинний прийом хвора прийшла лише на четверту добу. Виник токсичний періодонтит. Який оптимальний засіб необхідно вжити для обробки кореневого каналу?
Правильна відповідь	А. Унітіол
В	В. Крезофен
С	С. Трипсин

D	D. Евгенол
E	E. Емульсія гідрокортизону
№	60. крок 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Чоловік 30-ти років скаржиться на наявність у зубі каріозної порожнини. Об'єктивно: колір 16 змінений, глибока каріозна порожнина, що з'єднана з порожниною зуба. Зондування та перкусія безболісні. ЕОД - 100 мкА. На рентгенограмі - розширення періодонтальної щілини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний фіброзний періодонтит
B	B. Хронічний гранулюючий періодонтит
C	C. Хронічний гранулематозний періодонтит
D	D. Хронічний гангренозний пульпіт
E	E. Хронічний глибокий карієс
№	61. крок 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 35-ти років скаржиться на постійний ниючий біль у 25, що підсилюється під час накушування. Об'єктивно: на жувальній поверхні 25 каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Перехідна складка в ділянці 25 набрякла, гіперемована, болісна під час пальпації, перкусія 25 різко болісна. Після зондування з каналу з'явився гній. Який метод дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	A. Рентгенологічне дослідження
B	B. Електроодонтодіагностика
C	C. Термопроба
D	D. Бактеріологічне дослідження
E	E. Глибоке зондування
№	62. крок 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 22-х років скаржиться на короткочасний нападopodobний біль у 26 з тривалими періодами відсутності болю. Зуб заболів вперше. Об'єктивно: каріозна порожнина на жувальній поверхні 26, порожнина зуба не відкрита, при зондуванні біль у зоні проекції рога пульпи, на температурні подразники різкий біль, перкусія зуба безболісна, регіональні лімфовузли не пальпуються. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий обмежений пульпіт
B	B. Гострий глибокий карієс

C	C. Гострий дифузний пульпіт
D	D. Гострий гнійний пульпіт
E	E. Загострення хронічного пульпіту
№	63. крок 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	У хворого 28-ми років з'явилися скарги на постійний локалізований біль, що посилюється під час накушування. Об'єктивно: в 46 глибока каріозна порожнина, яка з'єднується з порожниною зуба. Під час зондування дна каріозної порожнини біль відсутній, перкусія болісна, на рентгенограмі змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий серозний періодонтит
B	B. Загострення хронічного пульпіту
C	C. Гострий гнійний періодонтит
D	D. Гострий дифузний пульпіт
E	E. Загострення хронічного періодонтиту
№	64. . крок 2010
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 23-х років скаржитися на наявність каріозної порожнини в 16. Об'єктивно: в 16 глибока каріозна порожнина, що з'єднується з порожниною зуба, зондування безболісне, перкусія безболісна. На яснах в ділянці проєкції верхівки кореня 16 виявлено норицю. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гранулюючий періодонтит
B	B. Хронічний гангренозний пульпіт
C	C. Хронічний фіброзний періодонтит
D	D. Хронічний фіброзний пульпіт
E	E. Хронічний гранулематозний періодонтит
№	65. крок 2009
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 45-ти років скаржитися на біль від температурних подразників, самочинний біль у 26 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пульпіту. Об'єктивно: 26 під пломбою, перкусія чутлива, реакція на температурний подразник - біль, який повільно підсилюється, тривалий. На рентгенограмі - піднебінний канал запломбовано на 2/3, в щічних каналах матеріал не прослідковується. Що із перерахованого є вірогідною причиною даного ускладнення?
Правильна відповідь	A. Неповна екстирпація пульпи
B	B. Неадекватне пломбування каналів

C	C. Розвиток інфекції
D	D. Розвиток запалення в періодонті
E	E. Травма тканини періодонта
№	66. крок 2009
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на мимовільний короткочасний локалізований біль в 26 впродовж однієї доби. Об'єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина першого класу за Блемом, дентин стінок і дна непігментований, розм'якшений, каріозна порожнина не з'єднується з порожниною зуба. Зондування різко болісне в одній точці, реакція на холод болісна, тривала. Який метод лікування найбільш доцільний у цьому випадку?
Правильна відповідь	A. Біологічний метод
B	B. Вітальна ампутація
C	C. Вітальна екстирпація
D	D. Девітальна екстирпація
E	E. Девітальна ампутація
№	67. крок 2009
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 29-ти років скаржиться на появу гострого нападоподібного болю в ділянці верхньої щелепи зліва, лівих верхньощелепової пазухи, ока, скроні. Біль тривалий (2-3 години), підсилюються вночі. Нещодавно переніс гостре респіраторне захворювання. Об'єктивно: в 26 - каріозна порожнина, зондування дна болісне, реакція на температурні подразники - тривалий біль, реакція на перкусію - незначний біль. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий дифузний пульпіт
B	B. Гострий вогнищевий пульпіт
C	C. Гострий верхівковий періодонтит
D	D. Запалення верхньощелепової пазухи
E	E. Загострення хронічного періодонтиту
№	68. . крок 2009
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини у зубі на правій верхній щелепі. Об'єктивно: у 16 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, зондування у розкритій точці безболісне, перкусія 16 слабо болісна. На ясні у ділянці проекції верхівки кореня 16 виявлена нориця. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гранулюючий періодонтит

B	B. Хронічний фіброзний періодонтит
C	C. Хронічний гранулематозний періодонтит
D	D. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
E	E. Хронічний гангренозний пульпіт
№	69. . крок 2009
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 27-ми років скаржиться на гострий біль в ділянці 34, що посилюється при накушуванні. Рентгенографічно в періапикальній ділянці кореня 34 спостерігається зона деструкції кісткової тканини з нерівними краями. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту
B	B. Гострий гнійний пульпіт, ускладнений періодонтитом
C	C. Загострення хронічного пульпіту
D	D. Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту
E	E. Гострий серозний періодонтит
№	70. . крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 47-ми років скаржиться на постійний біль у 27 зубі, що посилюється під час накушування. Об'єктивно: обличчя симетричне, шкірні покриви звичайного кольору, рот відкривається у повному обсязі, слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 27 зуба набрякла, гіперемована. У 27 зубі глибока каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою. Перкусія 27 зуба різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного періодонтиту 27
B	B. Хронічний періодонтит 27
C	C. Гострий загальний гнійний пульпіт 27
D	D. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 27
E	E. Хронічний одонтогенний гайморит зліва
№	71. крок 2009
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на біль та кровоточивість в ділянці 36 при вживанні твердої їжі. Об'єктивно: на медіально-жувальній поверхні 36 велика каріозна порожнина, виповнена м'ясистим пухлиноподібним утворенням, під час зондування виникає кровотеча та болючість в ділянці сполучення каріозної порожнини з пульповою камерою. Перкусія безболісна. ЕОД- 40 мкА. Рентгенологічних змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	A. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
B	B. Епуліс
C	C. Гіпертрофічний папіліт
D	D. Хронічний гангренозний пульпіт
E	E. Хронічний фіброзний пульпіт
№	72. крок 2009
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 35-ти років скаржиться на наростаючий пульсуючий біль 26. Об'єктивно: у 26 каріозна порожнина, що виповнена розм'якшеним дентином, порожнина зуба - закрита, зондування дна - безболісне, перкусія - різко болісна. Відзначається рухомість зуба I ступеня. Рентгенологічно змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний періодонтит
B	B. Гострий гнійний пульпіт
C	C. Гострий серозний періодонтит
D	D. Загострення хронічного періодонтиту
E	E. Гострий дифузний пульпіт
№	73. крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 45-ти років скаржиться на біль від температурних подразників, самочинний біль в 26 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пульпіту. Об'єктивно: 26 під пломбою, перкусія чутлива, реакція на температурний подразник - біль, який повільно підсилюється, тривалий. На рентгенограмі - піднебінний канал запломбовано на 2/3, в щічних каналах матеріал не прослідковується. Що із перерахованого є вірогідною причиною даного ускладнення?
Правильна відповідь	A. Неповна екстирпація пульпи
B	B. Неадекватне пломбування каналів
C	C. Розвиток інфекції
D	D. Розвиток запалення в періодонті
E	E. Травма тканини періодонта
№	74. . крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ

Текст завдання	Хвора 22-х років звернулася до клініки зі скаргами на зміну кольору коронки 11. Рік тому зуб був лікований з приводу хронічного глибокого карієсу. Одразу після лікування непокоїли незначні больові відчуття. До лікаря не зверталася. На рентгенограмі - розширення періодонтальної щілини у ділянці верхівки кореня 11. Перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний фіброзний періодонтит
B	B. Хронічний глибокий карієс
C	C. Хронічний гранулюючий періодонтит
D	D. Хронічний гранулематозний періодонтит
E	E. Хронічний фіброзний пульпіт
№	75. крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 26-ти років скаржитися на відчуття важкості в зубі та біль від гарячого, неприємний запах з рота. Об'єктивно: коронки 46 сірого кольору, глибока каріозна порожнина сполучається з порожниною зуба, поверхнєве зондування безболісне, глибоке - болісне, перкусія чутлива, слизова оболонка без патологічних змін. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гангренозний пульпіт
B	B. Хронічний фіброзний пульпіт
C	C. Загострення хронічного періодонтиту
D	D. Хронічний конкрементозний пульпіт
E	E. Хронічний гранулюючий періодонтит
№	76. крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Пацієнт скаржитися на біль в 51, що посилюється при накушуванні. Із анамнезу: хворий лікувався з приводу пульпіту 51, було накладено девіталізуючу пасту, на повторний прийом не з'явився. Об'єктивно: каріозна порожнина 51 закрита пов'язкою із дентину. Реакція на перкусію болісна. Слизова оболонка в проекції верхівки кореня 51 гіперемована, набрякла, болюча під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий миш'яковистий періодонтит
B	B. Гострий інфекційний періодонтит
C	C. Пульпіт, ускладнений фокальним періодонтитом
D	D. Загострення хронічного періодонтиту
E	E. Гострий гнійний пульпіт

№	77. крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 48-ми років звернулася зі скаргами на біль протягом року в 45 при накушуванні. Раніше 45 був лікований. Об'єктивно: слизова оболонка в ділянці даного зуба гіперемована, з ціанотичним відтінком. 45 рожевого кольору, пломба випала. Який метод обстеження необхідний для визначення лікувальної тактики?
Правильна відповідь	A. Рентгенографія
B	B. Термометрія
C	C. Пальпація ясен
D	D. Зондування
E	E. ЕОД
№	78. крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий скаржиться на тривалі больові напади в зубах нижньої щелепи зліва протягом доби. Біль іррадіює у вухо і потилицю, а також посилюється при вживанні холодної та гарячої їжі. Об'єктивно: в 36 на апроксимально-медіальній поверхні глибока каріозна порожнина. Зондування болісне по всьому дну і викликає напад болю. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий дифузний пульпіт
B	B. Гострий обмежений пульпіт
C	C. Гострий гнійний пульпіт
D	D. Хронічний конкрементозний пульпіт
E	E. Гострий глибокий карієс
№	79. крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 46-ти років скаржиться на біль і кровотечу із каріозної порожнини в 27 під час їжі. Раніше був самочинний біль. При огляді в 27 зубі на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, вивонена тканиною червоного кольору, при зондуванні біль і кровотеча. Який з перерахованих методів лікування доцільний?
Правильна відповідь	A. Вітальна екстирпація
B	B. Девітальна екстирпація
C	C. Девітальна ампутація
D	D. Вітальна ампутація
E	E. Біологічний метод

№	80. крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий скаржитись на самовільний біль впродовж 2-х днів в ділянці 15 зуба. Біль посилюється від дії термічних подразників і триває до 30 хвилин. Об'єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина, виповнена світлим розм'якшеним дентином, зондування дна болюче в одній точці, реакція на термічні подразники позитивна, перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий обмежений пульпіт
B	B. Гострий дифузний пульпіт
C	C. Гіперемія пульпи
D	D. Гострий глибокий карієс
E	E. Загострення хронічного пульпіту
№	81. . крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворій 23-х років проводилось лікування пульпіту 16 зуба. При ендодонтичному втручанні виявився непрохідний дистальний щічний канал. Які засоби можна застосувати для хімічного розширення кореневого каналу?
Правильна відповідь	A. 10-20% розчини натрієвих солей ЕДТА
B	B. Резорцин-формалінова рідина
C	C. 30% розчин нітрату срібла
D	D. Ефірні олії
E	E. Медикаменти з антибактеріальною та протизапальною дією
№	82. крок 2008
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	До кардіологічного відділення лікарні запросили стоматолога до хворого після інфаркту міокарда. Було встановлено діагноз - хронічний фіброзний пульпіт 36 зуба в стадії загострення. Який метод лікування пульпіту треба застосувати лікарю, враховуючи важкий загальний стан пацієнта?
Правильна відповідь	A. Девітальна ампутація
B	B. Вітальна екстирпація
C	C. Вітальна ампутація
D	D. Девітальна екстирпація
E	E. Консервативний метод
№	83. . крок 2007

Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 22-х років звернулася зі скаргами на гострий самочинний нападаподібний біль у 16 зубі, що віддає в праве око та ділянку скроні. Хворіє протягом доби. Напади болю тривають близько години. Об'єктивно: на медіальній поверхні 16 глибока каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину. Дентин розм'якшений, пухкий. При зондуванні визначається болючість по всьому дну каріозної порожнини. Реакція на холодові подразники в 16 зубі різко болісна. Перкусія чутлива. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий дифузний пульпіт
B	B. Гострий гнійний періодонтит
C	C. Гострий обмежений пульпіт
D	D. Гострий серозний періодонтит
E	E. Загострення хронічного періодонтиту
№	84. крок 2007
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Пацієнт скаржиться на постійний наростаючий біль у зубі на лівій верхній щелепі, що посилюється при накушуванні. Зуб непокоїть 2 дні. Об'єктивно: у 25 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, перкусія зуба незначно болісна, зондування дна та стінок безболісне. На Ro-грамі 25 – змін у періапикальних тканинах не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий серозний періодонтит
B	B. Гострий дифузний пульпіт
C	C. Гострий вогнищевий пульпіт
D	D. Загострення хронічного періодонтиту
E	E. Гострий гнійний періодонтит
№	85. крок 2007
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Жінка 21-го року скаржиться на тривалий гострий самочинний нападаподібний біль у зубі на верхній щелепі праворуч, що посилюється вночі та від холодного. Зуб болить два дні. Об'єктивно: на дистально-жувальній поверхні в 17 визначається глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне по всьому дну, перкусія болісна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий дифузний пульпіт
B	B. Гострий серозний періодонтит
C	C. Гострий обмежений пульпіт

D	D. Гострий гнійний пульпіт
E	E. Загострення хронічного пульпіту
№	86. крок 2007
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	При лікуванні гострого обмеженого пульпіту в хворого 45-ти років методом вітальної екстирпації лікар визначив, що 25 має широкий прямий канал. Який варіант пломбування кореневого каналу слід вважати найкращим?
Правильна відповідь	A. Пломбування до фізіологічного звуження кореня
B	B. Пломбування до рентгенологічної верхівки кореня
C	C. Виведення матеріалу за рентгенологічну верхівку на 1 мм
D	D. Недопломбування на 3 мм
E	E. -
№	87. крок 2007
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий скаржиться на постійний ниючий біль, відчуття "вирослого зуба" протягом останніх 3-х днів. Об'єктивно: в 26 каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Вертикальна та горизонтальна перкусія різко болісні. Зуб має рухомість II ст. Слизова оболонка в ділянці проекції верхівки кореня гіперемована, пальпація болісна. Назвіть найбільш раціональний шлях створення відтоку ексудату:
Правильна відповідь	A. Через кореневі канали
B	B. Через розріз по перехідній складці
C	C. Через комірку видаленого зуба
D	D. Через періодонтальну щілину
E	E. -
№	88. крок 2007
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 33-х років скаржиться на інтенсивний пульсуючий біль, що триває три доби. Об'єктивно: каріозна порожнина у 26 не сполучається з порожниною зуба, зондування безболісне, зуб рухомий, перкусія різко болісна у всіх напрямках, слизова оболонка в ділянці 26 набрякла. На рентгенограмі - змін у тканинах періодонту немає. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний періодонтит
B	B. Гострий серозний періодонтит
C	C. Гострий гнійний пульпіт

D	D. Загострення хронічного пульпіту
E	E. Загострення хронічного періодонтиту
№	89. крок 2007
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 35-ти років скаржиться на дискомфорт в 11 та зміну його кольору. Об'єктивно: в 11 з медіально-апроксимальної поверхні глибока каріозна порожнина. Камера зуба відкрита. Зондування безболісне, реакція на термічні подразники відсутня. Рентгенологічно: кореневий канал не пломбований. Біля верхівки 11 вогнище деструкції кісткової тканин з чіткими межами, округлої форми, розміром 0,5 x 0,5 см в діаметрі. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гранулематозний періодонтит
B	B. Хронічний фіброзний періодонтит
C	C. Хронічний гранулюючий періодонтит
D	D. Хронічний гангренозний пульпіт
E	E. Хронічний фіброзний пульпіт
№	90. крок 2007
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Чоловік 27-ми років звернувся зі скаргами на сильний пульсуючий біль у верхній щелепі ліворуч, який поширюється на щоку та вухо. Під час полоскання порожнини рота холодною водою біль зникає. Об'єктивно: глибока каріозна порожнина в 27 зубі. Зондування дна каріозної порожнини та перкусія 27 зуба - болісні. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний пульпіт
B	B. Гострий обмежений пульпіт
C	C. Гострий дифузний пульпіт
D	D. Гострий серозний періодонтит
E	E. Пульпіт, ускладнений періодонтитом
№	1. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА
Текст завдання	Хворий 63х років скаржиться на наявність ерозії на червоній облямівці нижньої губи, яка існує давно, інколи спонтанно епітелізується, а потім з'являється на тому самому місці. Хворий страждає на хронічний гіперацидний гастрит, палить. Об'єктивно: на червоній облямівці нижньої губи збоку визначається ерозія неправильної форми, з гладенькою, ніби полірованою, поверхнею, насиченочервоного кольору. При пальпації безболісна, ущільнення тканин в основі відсутнє. Лімфатичні вузли не збільшені. Вкажіть найбільш імовірний попередній діагноз:

Правильна відповідь	A. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті
B	B. Ерозивна форма лейкоплатії
C	C. Ерозивновиразкова форма червоного вовчака
D	D. Ерозивновиразкова форма червоного плескатого лишая
E	E. Хронічний рецидивуючий герпес
№	2. крок 2016, 2015, 2013, 2012, 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 25ти років скаржиться на появу тиждень тому сильної кровоточивості ясен, болю в порожнині рота, слабкість, стомленість, підвищення температури тіла до 38° С . Об'єктивно: хворий блідий, адинамічний. На слизовій оболонці порожнини рота множинні геморагії, ясна пухкі, на вершинах ясеневих сосочків ділянки некрозу, лімфатичні вузли збільшені, м'які, безболісні. Симптомом якого захворювання може бути ураження слизової оболонки порожнини рота у хворого?
Правильна відповідь	A. Гострий лейкоз
B	B. Хронічний лейкоз
C	C. Виразковонекротичний стоматит Венсана
D	D. Гіповітаміноз С
E	E. Отруєння солями важких металів
№	3. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 22х років звернувся до лікарястоматолога з метою лікування зруйнованих зубів. Об'єктивно: на піднебінних дужках, м'якому піднебінні, мигдаликах, язиці круглі безболісні папули з гіперемованим, інфільтрованим вінчиком розміром 7 мм у діаметрі. Регіонарні лімфовузли збільшені, щільноеластичної консистенції, безболісні, рухомі. Яка повинна бути тактика лікаря?
Правильна відповідь	A. Направити на консультацію до венеролога
B	B. Провести бактеріологічне обстеження
C	C. Направити на консультацію до ЛОРлікаря
D	D. Провести санацію порожнини рота
E	E. Провести цитологічне дослідження
№	4. крок 2016, 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Чоловік 26ти років звернувся зі скаргами на наявність висипань у порожнині рота. Об'єктивно: на слизовій м'якого піднебіння і дужок визначаються папули розміром близько 1 см у діаметрі, які ледь виступають над поверхнею слизової, вкриті сіруватим нальотом і оточені вузьким гіперемованим вінчиком. При пошкрябуванні шпателем наліт знімається, після чого виникає м'ясо-червоного кольору ерозія. Підщелепні лімфовузли збільшені, безболісні під час пальпації. Які додаткові методи дослідження необхідно провести даному хворому?
Правильна відповідь	A. Мікроскопія та серологічні реакції
B	B. Люмінесцентний та біопсія
C	C. Мікроскопія та посів на поживні середовища
D	D. Стоматоскопія та цитологія
E	E. Цитологія та люмінесцентний
№	5. крок 2016, 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий, каменяр за фахом, скаржиться на свербіж, печіння, болісність губ, що з'являються влітку і зникають у решту року. Хворіє впродовж 3х років. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи гіперемована, набрякла, на ній пухирці, ерозії діаметром 2 мм, болісні під час пальпації, кірки, тріщини. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Актинічний хейліт, ексудативна форма
B	B. Контактний алергічний хейліт
C	C. Метеорологічний хейліт
D	D. Екзематозний хейліт, ексудативна форма
E	E. Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма
№	6. крок 2016, 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА
Текст завдання	У робочого алюмінієвого заводу 55-ти років, що страждає на хронічний холецистит, на слизовій оболонці щоки ближче до кута рота горбисте утворення білого кольору, що зіймається над оточуючою слизовою, з безболісним ущільненням в основі. Порожнина рота не санована. Що з переліченого є першочерговим у тактиці стоматолога?
Правильна відповідь	A. Направлення на консультацію в онкодиспансер
B	B. Призначення кератолітичних засобів
C	C. Проведення кріодеструкції вогнища
D	D. Направлення на консультацію до гастроентеролога
E	E. Санація порожнини рота
№	7. крок 2016

Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 45ти років скаржиться на печію та сухість в роті. Печія підсилюється під час їжі. Об'єктивно: набряк язика, спинка язика вкрита білим нальотом, який частково знімається шпателем. Близько 10ти років хворіє на цукровий діабет. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний кандидоз
B	B. Глосодинія
C	C. Десквамативний глосит
D	D. Лейкоплакія
E	E. Червоний плескатиий лишай
№	8. крок 2016, 2011, 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворі 56-ти років ерозія червоної облямівки нижньої губи овальної форми, з гладкою поверхнею, насиченого червоного кольору. На поверхні ерозії кров'яні кірочки, які знімаються з утрудненням. Після зняття кірок виникає невелика кровотеча. Легке травмування ерозії у місцях, де кірки відсутні, не викликає кровотечі. Визначте вид передраку нижньої губи:
Правильна відповідь	A. Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті
B	B. Бородавчастий передрак червоної облямівки губи
C	C. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи
D	D. Хвороба Боуена
E	E. Еритроплазія
№	9. крок 2016, 2015, 2013, 2012, 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 55-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність у ділянці червоної облямівки нижньої губи пухлиноподібного утворення округлої форми діаметром близько 1 см. Об'єктивно: пухлиноподібне утворення виступає над оточуючою червоною облямівкою на 5 мм, щільнуватої консистенції, сірувато-червоного кольору, на поверхні утворення наявні тонкі лусочки, які знімаються з утрудненням. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Бородавчастий передрак червоної облямівки губи
B	B. Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті
C	C. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки
D	D. Хвороба Боуена
E	E. Еритроплазія Кейра

№	10. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 26ти років, скаржиться на сильний біль у роті, підвищення температури тіла до 39° С , нездужання. Хворіє впродовж декількох років, захворювання має сезонний характер. Об'єктивно: губи вкриті геморагічними кірками, на гіперерованій та набряклій слизовій щік, дна порожнини рота ерозії з фібринозним нальотом. Симптом Нікольського негативний. Гіперсалівація. Регіональний лімфаденіт. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Багатоформна ексудативна еритема
В	В. Гострий герпетичний стоматит
С	С. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
Д	Д. Акантолітична пухирчатка
Е	Е. Вторинний сифіліс
№	11. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 53х років впродовж кількох місяців скаржиться на відчуття печії, поколювання спинки і бокових поверхонь язика, сухість в роті, порушення смаку. Ці неприємні відчуття зменшуються під час приймання їжі. Хвора страждає на панкреатит, цукровий діабет, погано спить. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Глосодинія
В	В. Кандидозний глосит
С	С. Десквамативний глосит
Д	Д. Неврит язикового нерва
Е	Е. Глосит ГентераМіллера
№	12. крок 2016, 2015, 2011, 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 42-х років, будівельник, скаржиться на наявність на нижній губі бородавчастого розростання, яке виникло 1,5 місяці тому і за останній тиждень почало значно збільшуватись у розмірах. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи синюшночервоного кольору, інфільтрована, з поодинокими щільно прикріпленими лусочками. В центрі чітко обмежене напівсферичної форми утворення, діаметром 8 мм, висотою 4 мм, сіруватосинюшночервоного кольору, з шорсткою поверхнею за рахунок тонких лусочок, що щільно прикріплені до його поверхні та ущільнені в основі. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, рухомі, безболісні, щільні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Рак нижньої губи
В	В. Бородавчатий перерак

C	C. Піогенна гранульома
D	D. Кератоакантома
E	E. Вірусна бородавка
№	13. крок 2016, 2015, 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 63х років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність пухлини на нижній губі. Під час огляду виявлено на нижній губі близько до лівого кута рота пухлину конусоподібної форми, до 1 см, сіруватого кольору, на широкій основі, тверду, безболісну, нерухому. Який попередній діагноз можна встановити хворому?
Правильна відповідь	A. Шкірний ріг
B	B. Бородавчастий передрак
C	C. Папілома губи
D	D. Верукозна лейкоплакія
E	E. Хвороба Боуена
№	14. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворого віком 18 років після сеансу внутрішньоканального електрофорезу 46 зуба 5% розчином йоду на слизовій оболонці твердого піднебіння справа з'явилася ділянка ураження у вигляді штрихів з білосірою поверхнею. Що з переліченого могло б бути причиною такого ураження?
Правильна відповідь	A. Електротравма
B	B. Механічна травма
C	C. Гальванізм
D	D. Хімічна травма
E	E. Термічна травма
№	15. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 35-ти років скаржиться на періодично виникаючі "виразки" в порожнині рота. Хворіє впродовж 3-х років. Рецидиви повторюються 4-5 разів на рік. Виразки загоюються через 7-8 днів. Об'єктивно: на боковій поверхні язика зліва визначається елемент ураження круглої форми 0,5 см в діаметрі з чіткими рівними краями, покриті сіруватими нашаруваннями. Навкруги виразки гіперемія. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
B	B. Хронічний рецидивуючий герпес

С	С. Вторинний рецидивний сифіліс
D	D. Травматична виразка
Е	Е. Багатоформна ексудативна еритема
№	16. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на кровоточивість ясен, зміну їх вигляду. Переніс ГРВІ в тяжкій формі. Об'єктивно: ясенні сосочки набрякли, синюшно-червоного кольору, вкривають коронки зубів на 1/2, дуже кровоточать. На слизовій оболонці порожнини рота множинні петехіальні крововиливи, в окремих ділянках по краю ясен виразки. В крові змін немає. Які поєднання вітамінів необхідно призначити в комплексній терапії хворого?
Правильна відповідь	A. Аскорбінова кислота + рутин
B	B. Ретинола ацетат + рибофлавін
С	С. Піридоксин + тіамін бромід
D	D. Рутин + нікотинова кислота
Е	Е. Ціанокобаламін + тіамін бромід
№	17. крок 2015, 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 46-ти років скаржиться на біль у порожнині рота при прийомі їжі та від різних подразників, погане загальне самопочуття. Об'єктивно: на слизовій оболонці рота болісні ерозії, по краю яких уривки оболонок пухирів. Навкруги слизова оболонка помірно запалена. На шкірі спини відмічає ерозії, болісні при доторканні одязі. Яке додаткове обстеження є необхідним для визначення остаточного діагнозу?
Правильна відповідь	A. Цитологічне дослідження
B	B. Вірусологічне дослідження
С	С. Імунологічне обстеження
D	D. Клінічний аналіз крові
Е	Е. Бактеріологічне обстеження
№	18. крок 2015, 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 22-х років звернувся до лікаря-стоматолога з метою лікування зруйнованих зубів. Об'єктивно: на піднебінних дужках, м'якому піднебінні, мигдаликах, язиці круглі безболісні папули з гіперемованим, інфільтрованим вінчиком розміром 7 мм у діаметрі. Регіонарні лімфовузли збільшені, щільно-еластичної консистенції, безболісні, рухомі. Яка повинна бути тактика лікаря?

Правильна відповідь	A. Направити на консультацію до венеролога
B.	Провести бактеріологічне обстеження
C.	Направити на консультацію до ЛОР-лікаря
D.	Провести санацію порожнини рота
E.	Провести цитологічне дослідження
№	19. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Встановлено заключний діагноз: виразково-некротичний стоматит Венсана. При медикаментозній обробці поверхні виразок наліт важко видаляється. Які лікарські препарати доцільно використати?
Правильна відповідь	A. Протеолітичні ферменти
B.	Кератопластичні засоби
C.	Антисептики
D.	Противірусні препарати
E.	Протигрибкові препарати
№	20. крок 2015, 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 54-х років скаржиться на біль, печіння язика під час прийому твердої, кислої, гарячої їжі, порушення смакових відчуттів. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, на спинці і кінчику язика яскраво-червоні плями, болісні під час пальпації. У крові: НЬ- 100 г/л, ер.- 2, $5 \cdot 10^{12}$ /л, анізоцитоз, пойкилоцитоз, КП- 1,4, лейк.- 4, $2 \cdot 10^9$ /л, (паличкоядерні нейтрофіли - 1%, сегментоядерні - 36%, базофіли - 2%, моноцити - 4%, еозинофіли - 4%, лімфоцити - 53%), тромбоцити - $180 \cdot 10^9$ /л, ШЗЕ- 20 мм/год. З яким попереднім діагнозом хвору слід направити на консультацію до гематолога?
Правильна відповідь	A. B_{12} -фолієводефіцитна анемія
B.	Залізодефіцитна анемія
C.	Гіпопластична анемія
D.	Гострий лейкоз
E.	Хвороба Верльгофа
№	21. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Хворий 45-ти років скаржиться на млявість, головний біль, підвищення температури до 39°С, пекучий невралгічний біль у нижній щелепі справа. Об'єктивно: на гіперемованій шкірі підборіддя справа висипання пухирців діаметром від 1 до 6 мм. Подібні пухирці спостерігаються на гіперемованій слизовій ротової порожнини справа. Вони швидко руйнуються з утворенням ерозій, вкритих фібринозним нашаруванням. Регіонарний лімфаденіт. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	A. Оперізувальний лишай
B	B. Гострий герпетичний стоматит
C	C. Алергічний стоматит
D	D. Пухирчатка
E	E. Багатоформна ексудативна еритема
№	22. крок 2015, 2014, 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Під час огляду у робочого хімічного підприємства 38-ми років, що страждає на хронічний ентероколіт, палить, на спинці язика у задній третині по середній лінії виявлена ділянка, позбавлена сосочків, розміром 2x1 см, трохи ущільнена під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ромбоподібний глосит
B	B. Десквамативний глосит
C	C. Хронічний атрофічний кандидоз
D	D. Вторинний сифіліс
E	E. Глосит Гентера-Меллера
№	23. крок 2015, 2012, 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворого в ділянці нижньої губи є щільна безболісна пухлина розміром 2,5x0,8 см, в центрі якої виразка, дно її вкрито активними грануляціями. У підборідній ділянці під час пальпації виявлено збільшений безболісний лімфовузол. Хворіє протягом 3 місяців. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Ракова виразка
B	B. Туберкульозна виразка
C	C. Кератоакантома
D	D. Актиномікоз
E	E. Трофічна виразка
№	24. крок 2015, 2014

Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 28-ми (25-ти) років звернувся зі скаргами на наявність виразки на язиці. Об'єктивно: відмічається щільний інфільтрат, ерозія червоного кольору з гладким блискучим дном, діаметром близько 1,5 см, чітко окреслена, з рівними краями, безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Первинний сифіліс
B	B. Туберкульозна виразка
C	C. Актиномікоз язика
D	D. Абсцес язика
E	E. Декубітальна виразка
№	25. крок 2015, 2011, 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 33-х років звернувся зі скаргами на виразку дна порожнини рота, яка розташована під язиком, на рівні від 43 до 33. При огляді виразка має підриті фестончасті краї, її дно неглибоке, сіро-жовтого кольору, вкрито дрібними грануляціями, які легко кровоточать. Інфільтрація виразки відсутня. Визначте клінічний діагноз:
Правильна відповідь	A. Туберкульозна виразка дна порожнини рота
B	B. Декубітальна виразка дна порожнини рота
C	C. Ракова виразка дна порожнини рота
D	D. Гумозна виразка дна порожнини рота
E	E. Мігруюча гранульома дна порожнини рота
№	26. крок 2015, 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворого 52-х років виявлені на слизовій оболонці щік, язиці, м'якому піднебінні численні виразки з нерівними підритими краями, які мають схильність до повзучого росту по периферії. Дно і краї виразок мають зернистий характер, вкриті жовто-сірим нальотом; по периферії виявляються зерна Треля. Лімфовузли збільшені, спаяні в пакети, еластичні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Міліарно-виразковий туберкульоз
B	B. Туберкульозний вовчак
C	C. Лепра
D	D. Коліквативний туберкульоз
E	E. Третинний сифіліс
№	27. крок 2015

Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 39-ти років поступив до лікарні у тяжкому стані. Захворювання почалося 2 доби тому з раптового підвищення температури та болі в суглобах. Лікувався народними засобами. Протягом останньої доби динаміка захворювання різко погіршилася. При огляді на шкірі, переважно кінцівок та обличчя, на губах, слизовій оболонці щік, язика, м'якого піднебіння, зіву, горла пухирі і ерозії, що кровоточать. Симптом Нікольського негативний. Консультація очного лікаря: двобічний кон'юнктивіт, кератит. Консультація ЛОР-лікаря: риніт. Консультація гінеколога: виразковий вульвовагініт. Який діагноз поставили лікарі?
Правильна відповідь	A. Синдром Стивенса-Джонсона
B	B. Епідермальний токсичний некроліз
C	C. Системний червоний вовчак
D	D. Синдром Бехчета
E	E. Бульозний пемфігоїд
№	28. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 39-ти років скаржитися на відчуття шорсткості слизової оболонки у правого кута рота, яке з'явилося 4 місяці тому. Об'єктивно: коронки 14, 13 та 44 зубів зруйновані, з гострими краями. На слизовій оболонці правого кута рота по лінії змикання зубів на тлі суцільної білої бляшки, яка не знімається при зішкрібанні, виявляється щільне горбисте утворення, висотою 3 мм молочно-білого кольору, яке щільно спаяне з підлеглими тканинами. Регіонарні лімфовузли без змін. Яка лікувальна тактика після усунення травмуючих факторів і протезування?
Правильна відповідь	A. Кріодеструкція
B	B. Вітамін А місцево
C	C. Спостереження і цитологічний контроль через кожні 6 місяців
D	D. Лікування в онкодиспансері
E	E. Некролітичні засоби
№	29. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Чоловік 54-х років скаржитися на появу близько місяця тому білої плями на слизовій оболонці нижньої губи, відчуття стягнутості. Об'єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи по центру визначається пляма сірувато-білого кольору полігональної форми з чіткими контурами розміром 1,0x0,7 см. Навколишня слизова видимо не змінена. При поскобленні пляма не знімається, больових відчуттів немає. При люмінесцентному дослідженні виявлене блакитне світіння. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	A. Лейкоплакія, плоска форма
B	B. Обмежений передраковий гіперкератоз
C	C. Гострий псевдомембранозний кандидоз
D	D. Типова форма червоного плоского лишая
E	E. Типова форма червоного вовчаку
№	30. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 48-ми років звернувся зі скаргами на наявність пухлиноподібного утворення у ділянці нижньої губи, яке з'явилося 1-1,5 місяці тому. Об'єктивно: на червоній облямівці нижньої губи справа пухлиноподібне утворення округлої форми діаметром до 1 см з валикоподібними краями, припіднятими над рівнем червоної облямівки. У центрі утворення - кірочка бурого кольору, після видалення якої у центрі утворення відзначається воронкоподібне заглиблення. Не кровить. Безболісне. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Кератоакантома
B	B. Рак нижньої губи
C	C. Папілома нижньої губи
D	D. Фіброма нижньої губи
E	E. Вузликовий (бородавчастий) передрак
№	31. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Чоловік 67-ми років скаржиться на наявність на губі малоболісної "виразки", що існує близько двох місяців, періодично загоюється і з'являється знову. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи суха, на ній ерозія яскраво-червоного кольору з гладенькою полірованою поверхнею, овальної форми 1x0,8 см, безболісна під час пальпації. Ущільнення в основі не визначається. Слизова порожнини рота без видимих патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хейліт Манганотті
B	B. Ерозивна форма червоного вовчаку
C	C. Хронічний рецидивуючий герпес
D	D. Ерозивна форма лейкоплакії
E	E. Твердий шанкер
№	32. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на біль при вживанні їжі, кровоточивість ясен, асиметрію обличчя, збільшення верхньої губи. Об'єктивно: односторонній птоз, набряк верхньої губи, згладженість носогубної складки зліва, складчастий язик яскраво-червоного кольору, гіперемія, набряк слизової ясен. У крові: еозинофілія, лімфоцитоз, тромбоцитопенія. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	A. Синдром Мелькерсон-Розенталя
B	B. Синдром Мішера
C	C. Емфангіаз губи
D	D. Набряк Квінке
E	E. Кавернозна гемангіома губи
№	33. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 45-ти років скаржиться на наявність виразки на спинці язика. З анамнезу стало відомо, що тривалий час до появи виразки існував горбковий інфільтрат, який поступово збільшувався, потім утворилась виразка. Об'єктивно: на спинці язика наявна неглибока видовжена виразка, болюча, оточена горбками, з підритими краями. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Туберкульозна виразка
B	B. Первинний сифіліс
C	C. Актиномікоз язика
D	D. Абсцес язика
E	E. Декубітальна виразка
№	34. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 58-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність пухлиноподібного утворення у ділянці червоної облямівки нижньої губи. Об'єктивно: на червоній облямівці нижньої губи зліва виявлене округле пухлиноподібне утворення діаметром близько 0,5 см з гладенькою поверхнею. На тонкій ніжці, рухливе, безболісне, м'якої консистенції. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Папілома нижньої губи
B	B. Шкірний ріг
C	C. Лейкоплакія
D	D. Бородавчастий передрак червоної облямівки нижньої губи
E	E. Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті

№	35. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 56-ти років скаржиться на відчуття печіння на кінчику язика, яке зникає під час їди, сухість у порожнині рота. Подібні відчуття з'явилися три місяці тому без видимої причини. Звернулася до дільничого лікаря, був діагностований анацидний гастрит. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота бліда, язик звичайного розміру, спинка язика вкрита невеликою кількістю білого нальоту, що не знімається. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Глосодинія
B	B. Глосит Гентера-Меллера
C	C. Десквамативний глосит
D	D. Кандидозний глосит
E	E. Пелларгоїдний глосит
№	36. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 49-ти років скаржиться на постійне печіння у язиці, сухість у порожнині рота. Три місяці тому був встановлений мостоподібний протез із золота з опорою на 16 і 13 зуби. Під час огляду: язик трохи набряклий, кінчик і бічні поверхні гіперемовані. У 36 і 37 амальгамові пломби. Яка найбільш імовірна причина даного стану?
Правильна відповідь	A. Гальванічні струми
B	B. Алергія на золото
C	C. Грибкова інфекція
D	D. Механічна травма протезом
E	E. Неврологічні порушення
№	37. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворого 43х років при огляді порожнини рота на слизовій оболонці щічних ділянок справа та зліва визначаються плями білуватого кольору по лінії змикання зубів, які не підвищуються над прилеглими запаленими та набряклими тканинами. Поверхневі шари утворення не знімаються при зішкрябуванні. Пацієнт палить впродовж 20ти років, в середньому по три пачки цигарок у день. Яке ураження слизової оболонки має місце у хворого?
Правильна відповідь	A. Плоска лейкоплакія
B	B. Ерозивна лейкоплакія
C	C. Пухирчатка
D	D. Лейкоплакія Гапейнеракурців

Е	Е. Червоний плоский лишай
№	38. . крок 2014, 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворого 55ти років внаслідок постійного і тривалого куріння з'явилася виразка на нижній губі. Лікувався консервативно протягом 2х місяців, але покращення не наступило. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	А. Цитологічне дослідження
В	В. Пункція утворення
С	С. Рентгенографія
Д	Д. Зіскоб з виразки
Е	Е. Аспіраційна біопсія
№	39. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 54х років скаржиться на наявність щільних білуватих утворень на слизовій лівій щоки, незначну болісність і печіння під час прийому їжі. Об'єктивно: на слизовій оболонці лівій щоки ближче до кута рота визначаються щільні, безболісні, під час пальпації горбисті утворення білого кольору з чіткими контурами, що різко підвищуються над рівнем оточуючих тканин. Слизова оболонка навколо вогнища ураження не змінена. Коронки 34, 35, 36 зубів значно зруйновані, з гострим краями. Який найбільш імовірний попередній діагноз?
Правильна відповідь	А. Верукозна лейкоплакія
В	В. Рак щоки, екзофітний ріст
С	С. Хронічний гіпертрофічний кандидоз
Д	Д. Червоний плоский лишай
Е	Е. Вторинний сифіліс
№	40. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 38ми років звернулася зі скаргами на болісність нижньої губи протягом півроку, утруднення при прийомі їжі та вимові звуків. Зверталася по допомогу за місцем проживання, призначене лікування виявилось малоефективним. При огляді по центру нижньої губи виявлена глибока тріщина, що охоплює червону облямівку і частину слизової оболонки губи, вкрита коричневою кіркою, після зняття якої виникає кровотеча. Краї тріщини з гіперкератозом, інфільтровані. Оберіть оптимальну лікувальну тактику:
Правильна відповідь	А. Висічення тріщини

B	B. Аплікації кератопластичних засобів
C	C. Опромінення гелійнеоновим лазером
D	D. Змащування кортикостероїдною маззю
E	E. Змащування маззю з антибіотиком
№	41. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 36ти років скаржиться на періодичну появу на слизовій оболонці порожнини рота виразочок. Страждає на панкреатит, ентероколіт. Об'єктивно: на бічній поверхні язика зліва визначається ерозія овальної форми, вкрита білувато-жовтим нальотом, оточена гіперемованим обідком, болісна під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
B	B. Хронічний рецидивуючий герпетичний стоматит
C	C. Афта Сеттона
D	D. Вторинний сифіліс
E	E. Травматична ерозія
№	42. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Чергового лікаря-стоматолога викликали у інфекційне відділення до хворого 36-ти років госпіталізованого добу тому назад. Два дні тому вживав молочні продукти, куплені на базарі. Скаржиться на печіння, біль у ротовій порожнині, утруднений прийом їжі, сильний головний біль, біль у м'язах, нудоту, диспепсію. Об'єктивно: температура 39° C , слизова оболонка порожнини рота гіперемована, безліч везикул різних розмірів, болісні ерозії, виражена гіперсалівація. На шкірі між пальцями - везикульозний висип. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Ящур
B	B. Гострий герпетичний стоматит
C	C. Синдром Бехчета
D	D. Оперізувальний лишай
E	E. Герпетиформний дерматит Дюрінга
№	43. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Хвора 48-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність виразки на боковій поверхні язика, яка з'явилася близько 6 місяців тому. Появу виразки зв'яже з тим, що язик в цьому місці часто травмується об зламану коронку 47 зуба. Об'єктивно: на бічній поверхні язика в середній третині - виразка розміром 1,5x2,0x0,5 см з підритими, кратероподібними краями. Праві піднижньощелепні лімфатичні вузли збільшені, малорухомі. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Рак язика
B	B. Декубітальна виразка язика
C	C. Ураження язика при лейкозі
D	D. Туберкульозна виразка язика
E	E. Сифілітична виразка язика
№	44. крок 2013, 2012, 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла, слабкість, біль під час прийому їжі та ковтання. При огляді слизової оболонки порожнини рота, на тлі еритеми, визначаються численні петехії. Зів гіперемований. Регіонарні лімфовузли збільшені, рухливі, безболісні. У крові: лейкоцитоз, моноцитоз, атипові мононуклеари, ШЗЕ- 30 мм/год. Що з перерахованого є провідним у розвитку захворювання?
Правильна відповідь	A. Вірусна інфекція
B	B. Бактеріальна інфекція
C	C. Аутоімунні порушення
D	D. Алергічна реакція негайного типу
E	E. Алергічна реакція уповільненого типу
№	45. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 52-х років скаржиться на наявність утворення на нижній губі. Об'єктивно: на червоній облямівці нижньої губи патологічне вогнище полігональної форми розміром 0,5x1,0 см, дещо западає, покрите щільними лусочками, сірувато-білого кольору, по периферії – зона зроговіння. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Обмежений передраковий гіперкератоз
B	B. Лейкоплакія плоска форма
C	C. Лейкоплакія верукозна форма
D	D. Червоний вовчак

Е	Е. Червоний плескатий лишай
№	46. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 44-х років скаржиться на підвищену втомлюваність і головний біль, оніміння кінцівок, відчуття сухості в порожнині рота, печіння та біль в язиці. Об'єктивно: блідість шкірних покривів і слизової оболонки порожнини рота. В кутах рота - болючі тріщини. Спинка язика гладенька, полірована, з яскраво-червоними смугами. У крові: Нв- 70 г/л, ер.- 1, $5 \cdot 10^{12}$ /л, КП- 1,6, лейкопенія, тромбоцитопенія, лімфоцитоз. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Анемія Аддісона-Бірмера
В	В. Хронічна постгеморагічна анемія
С	С. Хлороз пізній
Д	Д. Залізодефіцитна анемія
Е	Е. Апластична анемія
№	47. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Пацієнтка 27-ти років скаржиться на наявність виразки на язиці, яку помітила два тижні тому. До лікаря не зверталась, лікувалась самостійно, але безрезультатно. При обстеженні на спинці язика на незміненому фоні розташована виразка діаметром біля 6 мм з рівними краями. Дно гладеньке, м'ясо-червоного кольору. Пальпація безболісна, основа ущільнена. Підщелепні лімфатичні вузли щільні, безболісні. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	А. Первинна сифілома язика
В	В. Декубітальна виразка
С	С. Трофічна виразка
Д	Д. Ракова виразка
Е	Е. Туберкульозна виразка
№	48. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Чоловік 46-ти років скаржиться на наявність білуватих нашарувань на слизовій оболонці обох щік, які помітив близько 2 місяців тому. Суб'єктивних відчуттів немає. Об'єктивно: на слизовій оболонці щік ближче до кутів рота визначаються ділянки у вигляді щільнуватих горбистих розростань білуватого кольору з чіткими контурами, що підвищуються над рівнем слизової, безболісні під час пальпації. Слизова оболонка, що оточує вогнище, не змінена. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Верукозна форма лейкоплакії

B	B. Гіперкератотична форма червоного плескатоного лишая
C	C. Гіперпластичний кандидоз
D	D. Червоний вовчак
E	E. М'яка лейкоплакія
№	49. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворого внаслідок куріння з'явилася виразка на нижній губі. Лікувався консервативно впродовж 2-х місяців, покращення стану немає. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	A. Цитологічне дослідження
B	B. Висічення
C	C. Пункція утворення
D	D. Аспіраційна біопсія
E	E. Зіскоб з поверхні виразки
№	50. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на свербіж, печіння, почервоніння губ. Дані відчуття виникли через декілька годин після нанесення на губи нової губної помади. Об'єктивно: спостерігається незначна гіперемія, сухість, стягнутість губ, лущення, легкий набряк червоної облямівки, на межі з шкірою дрібні тріщини. Пальпація губ болюча, регіональні лімфатичні вузли не змінені. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Контактний алергічний хейліт
B	B. Ексфолювативний хейліт
C	C. Актинічний хейліт
D	D. Метеорологічний хейліт
E	E. Атопічний хейліт
№	51. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Пацієнт звернувся зі скаргами на стягнутість та шорсткість слизової оболонки щік. Об'єктивно: на слизовій оболонці щік в ділянці кутів рота обмежені осередки помутніння слизової білуватого кольору з втратою блиску, при спробі видалити - не знімаються. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Лейкоплакія
B	B. Кандидоз

C	C. Червоний плескатий лишай
D	D. Червоний вовчак
E	E. Папульозний сифілід
№	52. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Чоловік 56-ти років скаржиться на виразку в під'язиковій ділянці. Відкривання рота вільне. Хворий користується повним знімним протезом на нижню щелепу. В ділянці лівого щелепно-язикового жолоба відмічається болісна виразка з підритими краями до 1,5 см, вкрита жовто-сірим нальотом. В лівій піднижньоощелепній ділянці пальпуються декілька збільшених лімфатичних вузлів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Туберкульозна виразка дна порожнини рота
B	B. Рак слизової оболонки дна порожнини рота
C	C. Декубітальна виразка дна порожнини рота
D	D. Третинний сифіліс (гумозна виразка)
E	E. Актиномікоз дна порожнини рота
№	53. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 28-ми років скаржиться на болісність губ, особливо при змиканні, наявність корок. Об'єктивно: на червоній облямівці губ від зони Клейна до червоної облямівки - кірки жовтувато-коричневого кольору, після зняття яких оголюється яскраво-червона гладенька волога поверхня без ерозування. Слизова оболонка у зоні Клейна дещо гіперемована і набрякла. З метою виявлення механізмів розвитку даної патології необхідно дослідити функцію:
Правильна відповідь	A. Щитоподібної залози
B	B. Кори наднирників
C	C. Паращитоподібних залоз
D	D. Підшлункової залози
E	E. Статевих залоз
№	54. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворому 18-ти років встановлено діагноз: складчастий язик. Симптомом якого синдрому може бути ця аномалія розвитку?
Правильна відповідь	A. Синдром Мелькерсона-Розенталя
B	B. Синдром Стивенсона-Джонсона

C	C. Синдром Бехчета
D	D. Синдром Гріншпана
E	E. Синдром Шегрена
№	55. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворому 49-ти років під час санації порожнини рота було встановлено діагноз: ромбоподібний глосит, папіломатозна форма. Хворий відмічає прогресування процесу. Яка лікувальна тактика?
Правильна відповідь	A. Хірургічне лікування
B	B. Консервативне лікування
C	C. Фізіотерапевтичні процедури
D	D. Променева терапія
E	E. Ретельні гігієнічні заходи
№	56. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 60-ти років, хвора на цукровий діабет, скаржиться на сухість, печіння слизової оболонки порожнини рота, больові відчуття при прийомі їжі. 15 років користується повними знімними протезами. При огляді слизова гіперемована, набрякла, на спинці язика незначна кількість білуватого нальоту, після зняття якого оголюється ерозивна поверхня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний атрофічний кандидоз
B	B. Лейкоплакія, ерозивна форма
C	C. Алергічний протезний стоматит
D	D. Червоний плоский лишай, ексудативно-гіперемічна форма
E	E. Червоний плоский лишай, ерозивно-виразкова форма
№	57. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 38-ми років скаржиться на свербіж, почервоніння, наявність висипань на губах і шкірі. Об'єктивно: червона облямівка губ гіперемована, набрякла. На цьому фоні визначаються дрібні міхурці, виповнені серозним ексудатом, деякі зливаються між собою, деякі луснуті, визначається мокнуття, а також наявність лусочок і кірок. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий екзематозний хейліт
B	B. Актинічний хейліт, ексудативна форма

C	C. Контактний алергічний хейліт
D	D. Хронічний рецидивуючий герпес
E	E. Екзофоліативний хейліт, ексудативна форма
№	58. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 52-х років, працівник друкарні, скаржиться на головний біль, дратівливість, біль у животі, слабкість, неприємні відчуття, солодкуватий запах з рота. Об'єктивно: блідість, слизова оболонка ясен набрякла, гіперемована, по краю ясен спостерігається синьо-чорна облямівка. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Свинцевий гінгівіт
B	B. Ртутний гінгівіт
C	C. Вісмутовий гінгівіт
D	D. Хронічний катаральний гінгівіт
E	E. Виразково-некротичний гінгівіт
№	59. . крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	У хворого 20-ти років під час лікування гострого глибокого карієсу 36 випадково відкрито медіальнощічний ріг пульпи. Який метод лікування є доцільним?
Правильна відповідь	A. Біологічний
B	B. Вітальна ампутація
C	C. Девітальна ампутація
D	D. Вітальна екстирпація
E	E. Девітальна екстирпація
№	60. . крок 2012
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хворий, що проживає у місцевості з вмістом фтору у воді 0,7 мг/л, висловлює скарги на чутливість від солодкого і кислого у 12, 13, 14, 23, 24. Об'єктивно: у пришийковій ділянці вказаних зубів виявлені крейдоподібні, матові плями, шорсткі під час зондування. Які з нижчеперахованих методів дослідження найбільш точно підтвердять діагноз?
Правильна відповідь	A. Вітальне забарвлення
B	B. Рентгенографія
C	C. Термопроба
D	D. Електроодонтометрія

Е	Е. Перкусія
№	61. . крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хвора 37-ми років звернулася зі скаргами на наявність порожнини в 34 зубі. Порожнину відмічає впродовж року. Об'єктивно: в 34 зубі глибока каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. Зондування та перкусія безболісні. Рентгенологічні дані свідчать про деформацію періодонтальної щілини, розширення останньої біля верхівки кореня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Хронічний фіброзний періодонтит
В	В. Хронічний гранулюючий періодонтит
С	С. Хронічний гранулематозний періодонтит
D	D. Хронічний фіброзний пульпіт
Е	Е. Хронічний гангренозний пульпіт
№	63. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 35-ти років скаржиться на підвищену чутливість зубів до термічних подразників та періодичне відчуття ломути в яснах. Об'єктивно регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Слизова оболонка ясен бліда, щільна, не болюча. Ясна не кровлять при зондуванні, пародонтальні кишечі відсутні. Корені зубів оголені. В ділянці шийок 15, 14, 13, 23, 24, 25 клиноподібні дефекти. Віялоподібне розходження зубів фронтальної групи. Травматична оклюзія. На ортопантограмі - резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 (горизонтальний тип). Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Пародонтоз II ступеня
В	В. Пародонтоз I ступеня
С	С. Хронічний генералізований пародонтит II ст.
D	D. Хронічний генералізований пародонтит I ст.
Е	Е. Хронічний генералізований пародонтит III ст.
№	64. . крок 2012
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 28-ми років скаржиться на короткочасний біль у 15 зубі від хімічних, термічних і механічних подразників, які зникають після їх усунення. Об'єктивно: в 15 велика каріозна порожнина з нависаючими краями емалі, заповнена сіруватим розм'якшеним і слабкопігментованим дентином. Зондування дна порожнини болісне. Реакція на холодну воду позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	A. Гострий глибокий карієс
B	B. Хронічний фіброзний пульпіт
C	C. Гострий обмежений пульпіт
D	D. Гострий середній карієс
E	E. Гіперемія пульпи
№	65. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінку 33-х років турбують виразки в порожнині рота та біль, особливо під час їжі. Із загальних захворювань відзначає хронічний бронхіт, хронічний коліт. Об'єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи та перехідної складки поодинокі ерозії круглястої форми, розміром 5-6 мм в діаметрі, покриті жовтувато-білим фібринозним нальотом, що важко знімається, та оточуванні гіперемованим вінчиком, болісні при пальпації. Який діагноз поставив лікар?
Правильна відповідь	A. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
B	B. Хронічний рецидивуючий герпес
C	C. Вторинний сифіліс
D	D. Синдром Бехчета
E	E. Травматичні ерозії
№	66. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 53-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на асиметрію обличчя, сухість в ротовій порожнині, сухість в очах і відчуття попадання піску в очі, болі в суглобах. Об'єктивно: привушні слинні залози збільшені у розмірах, щільні, горбисті, незначно болючі під час пальпації. Відкриття рота вільне. Слизова ротової порожнини суха. При масуванні залоз - виділення слини майже відсутнє. Множинний карієс. Виражені явища кератокон'юнктивіту. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Синдром Шегрена
B	B. Вірусний паротит
C	C. Саркоїдоз слинних залоз
D	D. Хвороба Мікуліча
E	E. Актиномікоз привушних слинних залоз
№	67. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	До стоматолога амбулаторії звернувся хворий 40-ка років зі скаргами на болісну виразку в роті. Під час огляду в ротовій порожнині на слизовій оболонці піднебіння різко болісна виразка, розміром 1,5x2 см, вкрита жовтуватим нальотом, з м'якими підритими краями та ободком запалення блідо-червоного кольору. Дно виразки нерівне, сірого кольору. Назвіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	A. Туберкульозна виразка
B	B. Актиномікоз
C	C. Рак слизової оболонки піднебіння
D	D. Сифілітична виразка
E	E. Виразково-некротичний стоматит
№	68. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 52-х років скаржиться на сухість у роті, незвичний вигляд ясен, печіння під час прийому їжі та розмови, наявність тріщин в кутиках рота. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота слабо зволожена, тьмяна. Ясна гіперемовані, дещо набряклі; спостерігаються множинні ерозивні поверхні. В кутах рота - щілопоподібні виразки, болючі під час пальпації, вкриті сірим нальотом, який легко знімається. Глюкоза крові - 8,2 ммоль/л. Яке захворювання може бути імовірною причиною таких змін слизової оболонки порожнини рота?
Правильна відповідь	A. Цукровий діабет
B	B. Мікседема
C	C. Хвороба Іценко-Кушінга
D	D. Аддісонова хвороба
E	E. Гіпотиреоз
№	69. . крок 2012
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 39-ти років скаржиться на гострий, самочинний нічний біль у зубі на верхній щелепі справа. Біль триває 3 доби, має пульсуючий характер, іррадіює у вилічну ділянку і практично не зникає. Об'єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина. Дентин брудно-сірого кольору, м'якої консистенції. Зондування болісне по всьому дну, перкусія болісна. Холодовий подразник зменшує інтенсивність болю. ЕОД - 55 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий гнійний пульпіт
B	B. Гострий дифузний пульпіт
C	C. Гострий гнійний періодонтит
D	D. Гострий обмежений пульпіт

Е	Е. Гострий серозний пульпіт
№	70. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий після гострого респіраторного захворювання скаржиться на загальну слабкість, інтенсивний біль у яснах, кровоточивість, неприємний запах з рота. Об'єктивно: лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації, ясна гіперемована, набрякла, множинні виразки, вкриті фібринозним нальотом. Яке дослідження обов'язково має провести лікар?
Правильна відповідь	А. Загальний аналіз крові
В	В. Алергологічні проби
С	С. Капіляроскопія
D	D. Цитологічне дослідження
Е	Е. Імунограма
№	71. . крок 2012
Тема	ТЕМА КАРІЕС ЗУБІВ
Текст завдання	Хвора 40-ка років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність порожнини у 17. При обстеженні: велика каріозна порожнина на жувальній поверхні, стінки порожнин витончені, пігментовані, зондування безболісне. ЕОМ - 4 мкА. Встановлено діагноз: хронічний середній карієс 17. Оберіть постійний пломбувальний матеріал для відновлення 17:
Правильна відповідь	А. Композит
В	В. Склоіономер
С	С. Мінеральний цемент
D	D. Амальгама
Е	Е. Полікарбоксилатний цемент
№	72. . крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 44-х років скаржиться на болючі тріщинки в куточках рота, сухість порожнини рота, зниження апетиту. Об'єктивно: слизова оболонка бліда, суха, чиста. Язик обкладений, атрофія сосочків на кінчику язика, тріщинки кутиках рота. Емаль зубів тьмяно-матового відтінку. Індекс КПУ=18. У крові: Нв- 81 г/л, ер.- 3, 2 · 10 ¹² /л, КП- 0,7, сироватковий феритин - 12 нг/л, лейкоц.-4, 4 · 10 ⁹ /л, тромб.- 300 · 10 ⁹ /л. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Залізодефіцитна анемія
В	В. Поліцитемія

C	C. B ₁₂ -фолієводефіцитна анемія
D	D. Постгеморагічна анемія
E	E. Апластична анемія
№	73. . . крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 42-х років скаржиться на набряк нижньої губи. Набряк з'явився добу тому після прийому таблетки аспірину. Об'єктивно: нижня губа значно набрякла, колір шкіри та слизової оболонки не змінений, під час пальпації губа безболісна, при натисканні на неї ямки не залишається. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ангіоневротичний набряк Квінке
B	B. Гландулярний макрохейліт
C	C. Синдром Мелькерсона-Розенталя
D	D. Синдром Ашера
E	E. Синдром Мішера
№	74. . . крок 2011
Тема	ТЕМА УСКЛАДНЕННЯ КАРІЕСУ
Текст завдання	Хворий 19-ти років звернувся до поліклініки зі скаргами на відлам коронки 21 зуба внаслідок травми. Об'єктивно: медіальний кут 21 відсутній. За лінією відколу в одній точці просвічується пульпа. Зондування в цій точці болісне, перкусія безболісна. ЕОД - 25 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий травматичний пульпіт
B	B. Хронічний фіброзний пульпіт
C	C. Гіперемія пульпи
D	D. Гострий обмежений пульпіт
E	E. Гострий глибокий карієс
№	75. . . крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 39-ти років скаржиться на наявність виразок і горбиків м'якої консистенції на слизовій оболонці порожнини рота, кровоточивість ясен, біль і розхитування зубів. Об'єктивно: на слизовій оболонці язика, ясен наявні поодинокі виразки з м'якими малоболісними краями, покриті жовтим нальотом. Регіонарні лімфовузли збільшені, м'які, безболісні, не спаяні з оточуючими тканинами. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Туберкульозний вовчак
B	B. Лепра

C	C. Сифіліс (третинний період)
D	D. Скрофулодермія
E	E. Афта Сеттона
№	76. . крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 45-ти років скаржиться на наявність розростань у задній третині язика, патологія виявлена випадково. Об'єктивно: у ділянці задньої третини язика по середній лінії на спинці наявне вогнище овальної форми шириною 0,5 см і довжиною 1,5 см, гладке, чітко відмежоване від оточуючих тканин. Пальпаторно вогнище ущільнене. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ромбоподібний глосит
B	B. Географічний язик
C	C. Чорний "волохатий"язик
D	D. Десквамативний глосит
E	E. Гострий катаральний глосит
№	77. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен, швидку стомлюваність, нездужання. Симптоми з'явилися нещодавно. Об'єктивно: шкіра та слизова оболонка порожнини рота бліді. Ясна при доторкуванні кровоточать. На слизовій щік, губ та піднебінні петехії. Яке лабораторне дослідження необхідно першочергово провести для визначення діагнозу?
Правильна відповідь	A. Загальний аналіз крові
B	B. Аналіз крові на цукор
C	C. Визначення вітаміну С у крові
D	D. Визначення часу кровотечі
E	E. Імунограма
№	78. . крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дівчина 18-ти років скаржиться на шорсткість на бічній поверхні язика. Впродовж 4-х років стоїть на диспансерному обліку з приводу компенсованої форми цукрового діабету. Об'єктивно: на бічній поверхні язика зліва і на слизовій оболонці щоки справа ділянки помутніння слизової оболонки, вирізняється малюнок у вигляді мережива. При пошкрябуванні шпателем "плівка"не знімається. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?

Правильна відповідь	A. Червоний плескатий лишай
B.	Лейкоплакія, плоска форма
C.	Червоний вовчак
D.	Кандидозний стоматит
E.	Вторинний сифіліс
№	79. . крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 43-х років скаржиться на наявність білих шорстких плям на слизовій оболонці кутів рота. Ці зміни з'явилися 7 місяців тому. Об'єктивно: на зубах - щільний коричневий наліт курця. Білого кольору ділянки не знімаються при поскоблюванні. Слизова оболонка, що межує з ними, без змін. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Лейкоплакія
B.	Червоний плескатий лишай
C.	Кандидоз
D.	Червоний вовчак
E.	Сифіліс
№	80. . крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Чоловік 50-ти років скаржиться на наявність "виразочки" на слизовій оболонці під'язикової ділянки. При патоморфологічному дослідженні біоптату визначено: поліморфізм клітин шипоподібного шару аж до атипії, збільшення кількості мітозів, гігантські та багатоядерні клітини, акантоз, гіпер- та паракератоз, збереження базальної мембрани та базального шару. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хвороба Боуена
B.	Лейкоплакія, ерозивна форма
C.	Червоний плескатий лишай, гіперкератотична форма
D.	Червоний вовчак, ерозивно-виразкова форма
E.	Декубітальна виразка
№	81. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Чоловік 43-х років скаржиться на підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразнень, свербіж у яснах. Об'єктивно: корені зубів оголені до 1/3 довжини, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. Незначна кількість зубних відкладень. У ділянці 15, 14, 24, 25, 44, 34 клиноподібні дефекти у межах дентину. Зондування оголених шийок зубів та клиноподібних дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз
B	B. Атрофічний гінгівіт
C	C. Генералізований пародонтит
D	D. Рецесія ясен
E	E. Локалізований пародонтит
№	82. . крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на наявність виразки на бічній поверхні язика. Об'єктивно: на бічній поверхні язика зліва визначається виразка округлої форми, безболісна під час пальпації, до 1 см у діаметрі, з рівними і дещо припіднятими над поверхнею слизової краями. У основи її хрящоподібний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Сифіліс
B	B. Туберкульоз
C	C. Травматична виразка
D	D. Актиномікоз
E	E. Трофічна виразка
№	83. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 34-х років звернувся до стоматолога із скаргами на наявність виразки на твердому піднебінні, яка з'явилася приблизно місяць тому. Лікувався полосканнями відварів трав, але виразка поступово "повзе". Об'єктивно: на слизовій оболонці твердого піднебіння є неглибока болісна виразка з нерівними підритими краями, м'якої консистенції, дно містить грануляції. На периферії виразки видно жовтуваті зернини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Туберкульозна виразка
B	B. Трофічна виразка
C	C. Ракова виразка
D	D. Первинна сифілома
E	E. Актиномікоз

№	84. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Пацієнту 53-х років встановлено діагноз лейкоплакія курців Таппейнера. Який патогістологічний процес переважає у гістологічній картині даного захворювання?
Правильна відповідь	A. Гіперкератоз
B	B. Акантоз
C	C. Дискератоз
D	D. Паракератоз
E	E. Папіломатоз
№	85. . крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 16-ти років звернувся зі скаргами на біль у порожнині рота, появу виразок, підвищення температури до 38°C, головний біль. Об'єктивно: слизова порожнини рота гіперемована, набрякла. На твердому піднебінні, яснах, губах велика кількість ерозій, які зливаються, з поліциклічними обрисами, що вкриті сірувато-білим нальотом. Який найбільш імовірний попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий герпетичний стоматит
B	B. Багатоформна ексудативна еритема
C	C. Вульгарна пухирчатка
D	D. Ящур
E	E. Алергічний стоматит
№	86. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дівчина 19-ти років скаржиться на болючість губ, особливо при їх змиканні, наявність кірок. Об'єктивно: на червоній облямівці губ від зони Клейна до середини червоної облямівки кірки жовтувато-коричневого кольору, після зняття яких з'являється яскраво-червона гладенька поверхня без ерозій. Слизова оболонка в зоні Клейна дещо гіперемована і набрякла. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма
B	B. Актинічний хейліт, ексудативна форма
C	C. Акантолітична пухирчатка
D	D. Метеорологічний хейліт
E	E. Екзематозний хейліт

№	87. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 50-ти років скаржиться на відчуття стягнутості слизової щоки, шорсткість на боковій поверхні язика. Знаходиться на диспансерному обліку з приводу компенсованої форми цукрового діабету. Об'єктивно: на слизовій оболонці щоки справа та боковій поверхні язика білувато-сірі ділянки у вигляді мереживного малюнка. Поверхня елементів ураження не зіскоблюється. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Червоний плескатий лишай
B	B. Вторинний сифіліс
C	C. Червоний вівчак
D	D. Псевдомембранозний кандидоз
E	E. Лейкоплакія
№	88. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У пацієнта 28-ми років захворювання розвивається без продромальних явищ і проявляється висипом 1-2 елементів ураження розміром 5-8 мм, округлої форми, оточених вінчиком гіперемії та вкритих нальотом жовто-сірого кольору. Рецидиви часті з певною закономірністю - 3-4 рази на рік. Для якого захворювання це характерно?
Правильна відповідь	A. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
B	B. Червоний плескатий лишай
C	C. Хронічний рецидивний герпес
D	D. Багатоформна ексудативна еритема
E	E. Папульозний сифіліс
№	89. крок 2010, 2008, 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 36-ти років скаржиться на сухість та лущення губи протягом місяця. Застосування індиферентних мазей неефективне. Об'єктивно: червона облямівка нижньої губи насичено-червоного кольору, помірно інфільтрована білувато-сірими лусочками, що щільно сидять, при намаганні видалення їх відзначається болісність та кровотеча. По периферії вогнища - помутніння епітелію у вигляді смужок білого кольору, а в центрі - ділянка западання. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Червоний вівчак
B	B. Кандидозний хейліт
C	C. Червоний плескатий лишай

D	D. Лейкоплакія
E	E. Ексфоліативний хейліт
№	90. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 47-ми років скаржиться на відчуття стороннього тіла на язиці, утруднення при розмові, сухість в порожнині рота. Об'єктивно: на спинці язика - видовжені до 5 мм темного кольору ниткоподібні сосочки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Чорний "волохатий"язик
B	B. Ромбоподібний глосит
C	C. Десквамативний глосит
D	D. Складчастий язик
E	E. Гострий глосит
№	91. . крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 24-х років скаржиться на сильний біль у роті, підвищення температури до 38°C, нездужання. Подібний стан виникає періодично після застуди протягом кількох років. Об'єктивно: губи вкриті кров'янистими кірочками, на різко гіперемованій та набряклій слизовій оболонці губ та щік - пухирі, що розкрилися, та ерозії, вкриті фібринозним нальотом. Гіперсалівація. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Багатоформна ексудативна еритема
B	B. Вульгарна пухирчатка
C	C. Герпетиформний дерматит Дюринга
D	D. Пухирчатка Пашкова
E	E. Хронічний рецидивний герпес
№	92. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Чоловік 33-х років скаржиться на біль у язиці справа, що посилюється під час прийому їжі та при розмові. Об'єктивно: на боковій поверхні язика, ближче до кореня, болісна виразка розміром 0,6 см у діаметрі. Дно вкрите сірим нальотом. Коронка 47 зруйнована. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Декубітальна виразка
B	B. Трофічна виразка
C	C. Твердий шанкр

D	D. Туберкульозна виразка
E	E. Ракова виразка
№	93. . крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Монтажник-висотник, який має великий стаж роботи, звернувся до стоматолога з скаргами на сухість, печіння та незначний набряк губ. Такі ж симптоми були восени рік тому. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Метеорологічний хейліт
B	B. Контактний хейліт
C	C. Гландулярний хейліт
D	D. Хейліт Манганотті
E	E. Ексфоліативний хейліт
№	94. . крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Пацієнтка звернулася до стоматолога зі скаргами на біль у порожнині рота, печіння та сухість. При огляді виявлена вогняно-червона суха слизова. Язик малиново-червоного кольору, сухий, блискучий, ниткоподібні сосочки атрофовані. В складках язика визначається невелика кількість нальоту, що важко знімається. Пацієнтка знаходиться на лікуванні з приводу пневмонії, приймає антибіотики. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий атрофічний кандидоз
B	B. Фіксована еритема
C	C. Пелагроїдний глосит
D	D. Гіповітаміноз B ₂
E	E. Десквамативний глосит
№	95. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Пацієнт 18-ти років скаржиться на появу виразкувань у порожнині рота спонтанну кровоточивість слизової оболонки, болісність під час вживання їжі та розмові, носові кровотечі. З анамнезу: погіршення загального стану, слабкість, підвищення температури тіла до 39°C, головний біль, ломота у суглобах. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?
Правильна відповідь	A. Клінічний аналіз крові
B	B. Аналіз крові на цукор
C	C. Імунограма

D	D. Аналіз на ВІЛ
E	E. Алергологічні проби
№	96. . крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла, слабкість, біль під час прийому їжі та ковтанні. При огляді слизової оболонки порожнини рота, на тлі еритеми, визначаються численні петехії. Зів гіперемований. Регіонарні лімфовузли збільшені, рухливі, безболісні. У крові: лейкоцитоз, моноцитоз, атипові мононуклеари, ШЗЕ- 30 мм/год. Що з нижче перерахованого є провідним у розвитку захворювання?
Правильна відповідь	A. Вірусна інфекція
B	B. Бактеріальна інфекція
C	C. Аутоімунні порушення
D	D. Алергічна реакція негайного типу
E	E. Алергічна реакція уповільненого типу
№	97. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 23-х років скаржиться на наявність виразочки на червоній облямівці нижньої губи, яка не піддається самолікуванню впродовж двох тижнів. Об'єктивно: на незмінній червоній облямівці нижньої губи - виразка круглої форми діаметром 2 мм з піднятими, рівними краями, дно її - м'ясочервоного кольору, щільне, лискуче, з "сальним нальотом"; під час пальпації язва безболісна, з хрящоподібним інфільтратом. Регіонарний лімфовузол збільшений, щільноеластичної консистенції, безболісний, рухомий. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Первинний сифіліс
B	B. Декубітальна виразка
C	C. Ракова виразка
D	D. Червоний вівчак
E	E. Туберкульозна виразка
№	98. . крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Чоловік 31-го року скаржиться на сухість, печіння спинки язика, що виникли близько тижня тому та посилюються під час прийому подразнюючої їжі. Напередодні переніс пневмонію. Два тижні тому знаходився у стаціонарі, приймав антибіотики. Зараз ліків не приймає. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемована, суха, лискуча. На спинці язика і піднебінні сіро-білі плівки, що легко знімаються. Слина тягнеться нитками за шпателем. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий псевдомембранозний кандидоз
B	B. Хронічний гіперпластичний кандидоз
C	C. Гострий атрофічний кандидоз
D	D. Медикаментозний стоматит
E	E. Хронічний атрофічний кандидоз
№	99. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 64-х років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність дещо болісної виразки на бічній поверхні язика, яка з'явилася більше 2-х місяців тому. Об'єктивно: на бічній поверхні язика виразка з припіднятими краями, навколо неї тканини інфільтровані. Визначаються збільшені, спаяні один з одним і з навколишніми тканинами підщелепні лімфовузли. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Рак язика
B	B. Сифіліс (твердий шанкер)
C	C. Туберкульозна виразка
D	D. Декубітальна виразка
E	E. Виразково-некротичне ураження при захворюваннях крові
№	100. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Студент 18-ти років звернувся зі скаргами на шорсткість, сухість слизової оболонки порожнини рота. Постійно скушує, не контролюючи себе, слизову по лінії змикання зубів. Страждає на хронічний холецистит, палить. ПІ-2,3. Об'єктивно: слизова по лінії змикання зубів пухка, набрякла, має білувате забарвлення. Що з нижче перерахованого є провідним у виникненні цього захворювання?
Правильна відповідь	A. Звичне кусання слизової оболонки порожнини рота
B	B. Незадовільна гігієна порожнини рота
C	C. Соматична патологія
D	D. Ксеростомія

Е	Е. Паління
№	101. . крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 57-ми років скаржиться на сухість та відчуття печіння на боковій поверхні язика, яке зникає під час прийому їжі. Подібні відчуття виникли три місяці тому. В анамнезі: гастрит зі зниженою секреторною функцією. Об'єктивно: слизова оболонка язика та порожнини рота без особливостей. Спинка язика вкрита незначною кількістю білого нальоту. Регіонарні лімфовузли під час пальпації не визначаються. Порожнина рота санована. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Глосодинія
В	В. Неврит язикового нерва
С	С. Кандидоз
Д	Д. Десквамативний глосит
Е	Е. Глосит Гунтера-Міллера
№	102. . крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 32-х років скаржиться на біль у роті, підвищення температури тіла до 38, 5° С, нездужання. Подібний стан виникає періодично впродовж кількох років після застуди. Об'єктивно: губи вкриті кров'янистими кірками, на гіперемованій слизовій оболонці губ і щік - ерозії, покриті фібринозними плівками. Гіперсаливація. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Багатоформна ексудативна еритема
В	В. Вульгарна пухирчатка
С	С. Рецидивний герпес
Д	Д. Герпетиформний дерматит Дюрінга
Е	Е. Синдром Стівенса-Джонсона
№	103. . крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий звернувся зі скаргами на печіння, свербіж та збільшення нижньої губи впродовж тривалого часу. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок згладженості носогубної складки. Нижня губа набрякла, в кольорі не змінена, під час пальпації безболісна. Складчастий язик. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Синдром Мелькерсона-Розенталя
В	В. Набряк Квінке

C	C. Лімфангіома
D	D. Гемангіома
E	E. Гранульоматозний хейліт Мішера
№	104. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 52-х років звернувся зі скаргами на наявність виразки на нижній губі, що тривало не загоюється. Палить. До лікаря не звертався. У ділянці червоної облямівки нижньої губи зліва виразка округлої форми діаметром до 2 см. Краї виразки дещо припідняті у вигляді валика білуватого кольору, ущільнені. У лівій піднижньощелепній ділянці пальпуються збільшені безболісні щільні лімфовузли обмеженої рухливості. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Рак нижньої губи
B	B. Лейкоплакія, верукозно-виразкова форма
C	C. Кератоакантома
D	D. Фіброма нижньої губи
E	E. Сифілітична виразка
№	105. . крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 25-ти років скаржиться на різкий біль у роті, головний біль, біль у суглобах, підвищення температури тіла до 38, 6° C. На червоній облямівці губ геморагічні кірки, на слизовій порожнини рота великі ерозії та виразки, вкриті сіруватим нальотом. Кон'юнктивіт. На шкірі кистей рук еритематозні плями 1-1,5 см у діаметрі з міхурцем у центрі. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Синдром Стивенса-Джонсона
B	B. Синдром Бехчета
C	C. Синдром Лайла
D	D. Багатоформна ексудативна еритема
E	E. Медикаментозний стоматит
№	106. . крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Чоловік 62-х років скаржиться на наявність безболісного утворення на язиці, яке з'явилося декілька місяців тому. Об'єктивно: велика кількість каріозних і повністю зруйнованих зубів, на бічній поверхні язика - безболісне утворення, розміром 10x5 мм, білуватого кольору, з нерівною поверхнею у вигляді бородавок. Гістологічно: потовщення рогового шару епітелію з переміжним типом зроговіння. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	A. Верукозна форма лейкоплакії
B	B. Бородавчастий передрак
C	C. Гіперпластична форма кандидозу
D	D. Гіперкератотична форма червоного плескатоного лишая
E	E. Кератоакантома
№	107. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 49-ти років скаржиться на біль у порожнині рота, ускладнений прийом їжі. Страждає на ІХС. При об'єктивному обстеженні задишка, набряк кінцівок. Порожнина рота не санована. На слизовій оболонці щоки з правого боку виразка з нерівними краями, вкрита сірувато-білим некротичним нальотом, з маловиразною запальною реакцією навколо. Неприємний запах з рота. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Трофічна виразка
B	B. Травматична виразка
C	C. Туберкульозна виразка
D	D. Ракова виразка
E	E. Виразково-некротичний стоматит
№	108. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 20-ти років, без постійного місця проживання та роботи, скаржиться на підвищення температури тіла до 39 ⁰ С протягом 10-ти днів, біль при прийомі їжі та ковтанні, носові кровотечі. Об'єктивно: на губах герпетична висипка, на слизовій оболонці порожнини рота ерозії неправильної форми, вкриті фібринозним нальотом; плівчасті нальоти на мигдаликах. Печінка збільшена та ущільнена. У крові: ер.- 4, 5 ·10 ¹² /л, Нь- 120 г/л, ШЗЕ- 25 мм/год, лейк.-10 · 10 ⁹ /л, е.- 0; п.- 2; с.- 31; л.- 41; м.-10; атипові мононуклеари - 14%, плазматичні клітини - 2. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Інфекційний мононуклеоз
B	B. Гострий герпетичний стоматит
C	C. Дифтерія ротоглотки
D	D. СНІД
E	E. Гострий лейкоз
№	109. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Хвора 45-ти років звернулася для санації порожнини рота. В анамнезі: легка форма діабету. Об'єктивно: на фоні незміненої слизової оболонки шік симетрично, переважно в ретромолярній ділянці, виявляються білуваті папули, що ледь здіймаються над рівнем слизової оболонки і утворюють мереживний малюнок. На верхній щелепі два паяні мостоподібні протези, в 47 - пломба із амальгамами; на 46 - коронка із сталі. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Червоний плескатий лишай
B	B. Вторинний сифіліс
C	C. Лейкоплакія
D	D. Хронічний атрофічний кандидоз
E	E. Червоний вівчак
№	110. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 67-ми років скаржиться на наявність у ділянці червоної облямівки нижньої губи часто рецидивуючої ерозії. Ерозія овальної форми, розміром 0,8x1,3 см, вкрита тонкими кірками, при знятті яких на фоні блискучої поверхні визначаються точкові крововиливи. Відзначаються ділянки атрофії червоної облямівки. Елементів інфільтрації немає. Піднижньощелепні лімфовузли не збільшені. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	A. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті
B	B. Ерозивно-виразкова форма лейкоплакії
C	C. Кератоакантоз
D	D. Хвороба Боуена
E	E. Гландулярний хейліт
№	111. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У чоловіка 63-х років скарги на біль під час прийому їжі, обмеження рухомості язика, наявність виразки в задньому відділі дна порожнини рота зліва, втрату ваги. Об'єктивно: хворий користується частковим знімним протезом на нижню щелепу. В ділянці лівого щелепно-язикового жолоба відмічається виразка у вигляді щілини до 1,6 см по довжині з вивернутими краями, вкрита сіро-жовтим нальотом, інтимно спаяна з інфільтратом, що виявляється при бімануальній пальпації. В лівій піднижньощелепній і верхньобоковій ділянках шиї пальпуються декілька збільшених малорухомих лімфовузлів. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Рак слизової оболонки дна порожнини рота
B	B. Туберкульозна виразка дна порожнини рота
C	C. Декубітальна виразка дна порожнини рота

D	D. Третинний сифіліс (гумозна виразка)
E	E. Актиномікоз дна порожнини рота
№	112. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 55-ти років скаржиться на виразки на слизовій порожнини рота, біль під час приймання їжі та розмові. Захворювання почалось раптово більше місяця тому. Об'єктивно: на незміненій слизовій оболонці ясен, м'якого піднебіння та піднебінних дужок великі ерозії яскраво-червоного кольору. Неушкоджена слизова легко відшаровується при незначному терті з утворенням ерозій, невеликих кровотеч. Яка діагностична ознака є провідною в диференційній діагностиці захворювання?
Правильна відповідь	A. Клітини Тцанка в мазках-відбитках
B	B. Позитивний симптом Нікольського
C	C. Наявність пухирів в порожнині рота
D	D. Наявність сітки Уікхема
E	E. Наявність макрофагів у мазках-відбитках
№	113. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 35-ти років скаржиться на періодичне виникнення виразок у ротовій порожнині. Хворіє протягом 5-ти років, рецидиви повторюються 4-5 разів на рік. Виразки гояться протягом 10-ти днів. Об'єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи елемент ураження округлої форми, розміром 0,5 см, вкритий білим нальотом, оточений вінцем гіперемії, різко болючий під час дотику. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
B	B. Травматична ерозія
C	C. Вторинний сифіліс
D	D. Хронічний рецидивний герпес
E	E. Герпетиформний дерматит Дюрінга
№	114. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Молода жінка звернулася до лікаря зі скаргами на виникнення в порожнині рота пухирів, болісних виразок, особливо під час розмови та їжі, біль в м'язах, суглобах, підвищення температури, нездужання, слабкість. Захворіла раптово 2 доби тому. Об'єктивно: t^{0} -38, 4^{0} C, червона облямівка губ вкрита кров'янистими кірками, що злипаються та утруднюють відкривання рота. В порожнині рота, на фоні гіперемованої та набряклої слизової губ, щік, дна, язика та м'якого піднебіння, визначаються окремі пухирі та великі болісні ерозії, що вкриті фібринозним нальотом. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні. Гіперсалівація. Симптом Нікольського негативний. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Багатоформна ексудативна еритема
B	B. Акантолітична пухирчатка
C	C. Вторинний сифіліс
D	D. Гострий герпетичний стоматит
E	E. Неакантолітична пухирчатка
№	115. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 42-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на появу на спинці язика білого сирнистого нальоту та відчуття печіння. З анамнезу відомо, що хворий лікувався в стаціонарі з приводу пневмонії. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий псевдомембранозний кандидоз
B	B. Типова форма лейкоплакії
C	C. Червоний плескатий лишай
D	D. Скарлатина
E	E. Червоний вівчак
№	116. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на часті кровотечі зі слизової оболонки порожнини рота та носа, вказує що такі ж проблеми були у батька. Об'єктивно: наявні множинні телеангіектазії та ангіматозні утворення на шкірі обличчя та слизової оболонки носа, щік, губ. Аналіз крові в межах норми. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хвороба Рендю-Ослера
B	B. Хвороба Верльгофа
C	C. Хвороба Вакеза
D	D. Хвороба Іценка-Кушинга

Е	Е. Хвороба Аддісона-Бірмера
№	117. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	При огляді хворого 23-х років виявлено хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота, генералізована лімфоаденопатія. В анамнезі: протягом року хворіє на герпес. Температура тіла постійно підвищується до 37, 4 –37, 5 ⁰ С, вага тіла за останній місяць зменшилася на 8 кг. Про яке захворювання може свідчити зазначений симптомокомплекс?
Правильна відповідь	А. СНІД
В	В. Інфекційний мононуклеоз
С	С. Гострий лейкоз
Д	Д. Хронічний лейкоз
Е	Е. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота
№	118. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	До хірурга-стоматолога звернувся хворий 58-ми років зі скаргами на наявність болісної виразки на боковій поверхні язика. Об'єктивно: на бічній поверхні язика зліва визначається виразка округлої форми з підритими м'якими краями, що нависають, болісна під час пальпації, дно виразки незначно кровоточить, вкрите жовтуватими вузликами. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	А. Туберкульоз
В	В. Сифіліс
С	С. Травматична виразка
Д	Д. Актиномікоз
Е	Е. Трофічна виразка
№	119. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 24-х років звернулася зі скаргами на відчуття поколювання, печіння язика під час прийому гострої їжі. Об'єктивно: на спинці та бокових поверхнях язика визначаються ділянки округлої та овальної форми, яскраво-червоного кольору, позбавлені сосочків і оточені білуватим вінчиком, безболісні під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	А. Десквамативний глосит ("географічний язик")
В	В. "Бляшка скошеного луку"(вторинний сифіліс)

C	C. Глосит Гентера-Меллера (В ₁₂ -фолієводефіцитна анемія)
D	D. Хронічний атрофічний кандидозний глосит
E	E. "Кардинальський язик"(гіповітаміноз PP)
№	120. . крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 24-х років скаржиться на різкий біль у роті, загальну слабкість, головний біль, біль у суглобах, підвищення температури тіла до 38, 9 ⁰ С. Захворів 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: губи набрякли, на червоній облямівці - геморагічні кірки. На слизовій оболонці порожнини рота, на фоні розлитої гіперемії, - великі зливні ерозії та виразки, вкриті жовтувато-сірим нальотом, різко болісні, кровоточать під час дотику. Кон'юнктивіт. На шкірі кистей і передпліч - еритематозні плями до 1,5 см у діаметрі з пухирцями в центрі. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Синдром Стівенса-Джонса
B	B. Медикаментозний стоматит
C	C. Багатоформна ексудативна еритема
D	D. Синдром Бехчета
E	E. Синдром Лайелла
№	121. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворого протягом 5-ти років кожної осені захворювання починається з підвищення температури, болю в суглобах. На шкірі верхніх та нижніх кінцівок синюшно-рожеві плями діаметром 1-2 см з пухирцем в центрі. На слизовій порожнини рота, на фоні поширеної еритеми та набряку, різко болісні ерозії; на губах геморагічні кірки. Симптом Нікольського негативний. У крові: лейк.- 12 · 10 ⁹ /л, ер.- 4 · 10 ¹² /л, ШЗЕ-40 мм/год. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:
Правильна відповідь	A. Багатоформна ексудативна еритема
B	B. Хронічний рецидивний герпес
C	C. Неакантолітична пухирчатка
D	D. Виразково-некротичний стоматит Венсана
E	E. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
№	122. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 24-х років скаржиться протягом 2-х тижнів на біль у язиці при прийомі їжі та розмові. Об'єктивно: на слизовій оболонці бокової поверхні язика праворуч виразка неправильної форми, вкрита некротичним нальотом. Краї виразки гіперемовані, болісні під час пальпації. Коронки 46, 47 зруйновані. Які першочергові дії лікаря-стоматолога?

Правильна відповідь	A. Усунення травмуючих факторів
B	B. Знеболення вогнища ураження
C	C. Застосування протизапальних засобів
D	D. Застосування кератопластичних засобів
E	E. Хірургічне лікування
№	123. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Рільник 27-ми років після переохолодження звернувся зі скаргами на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38, 5 ⁰ С, кашель, нежить, біль під час ковтання. Об'єктивно: на набряклій і гіперемованій слизовій оболонці порожнини рота посилення судинного малюнка, геморагії, наліт та десквамація епітелію на язиці, численні пухирці, що містять прозорий ексудат. Що з перерахованого є етіотропним лікуванням?
Правильна відповідь	A. Протівірусні препарати
B	B. Антигістамінні препарати
C	C. Антибіотики
D	D. Сульфаніламідні препарати
E	E. Аналгетики
№	124. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Жінка 35-ти років скаржиться на відчуття печіння в порожнині рота, біль під час приймання їжі. 1,5 тижні тому було призначено курс антибіотиків. Об'єктивно: на слизовій оболонці порожнини рота відзначається утворення плівок, нальоту молочно-білого кольору, які легко знімаються ватним тампоном. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий псевдомембранозний кандидоз
B	B. Алергічний стоматит
C	C. Червоний плескатий лишай
D	D. Хронічний атрофічний кандидоз
E	E. Лейкоплакія, м'яка форма
№	125. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Хворий 65-ти років скаржиться на біль у ділянці останнього зуба нижньої щелепи з лівого боку, утруднене відкривання рота. Об'єктивно: коронка 48 торкається ерозованої поверхні слизової щоки, краї ерозії щільні, вкриті зернистими грануляціями, безболісні, злегка кровоточать; збільшені безболісні підщелепні лімфовузли. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Рак слизової оболонки щоки
B	B. Декубітальна виразка
C	C. Травматична виразка
D	D. Лейкоплакія щоки
E	E. Перикоронарит
№	126. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворої 53-х років на слизовій оболонці правої щоки визначається білувато-рожева пляма неправильної форми розмірами 2,5x1,5 см. На фоні плями мають місце бородавчасті розростання, тріщини, ерозії. Визначте вид ураження слизової оболонки щоки:
Правильна відповідь	A. Ерозивна форма лейкоплакії
B	B. Плоска лейкоплакія
C	C. Верукозна лейкоплакія
D	D. Хвороба Боуена
E	E. Еритроплазія Кейра
№	127. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 30-ти років скаржиться на наявність виразки на язиці. Об'єктивно: на спинці язика з правого боку виразка блюдцеподібної форми 1 см у діаметрі, з припіднятими краями, з щільним інфільтратом навколо, під час пальпації безболісна. Лімфовузли на боці ураження збільшені, щільні, безболісні. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	A. Первинний сифіліс
B	B. Ракова виразка
C	C. Афта Сеттона
D	D. Декубітальна виразка
E	E. Міліарно-виразковий туберкульоз
№	128. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Жінка 55-ти років скаржиться на печіння язика, болісність під час прийому їжі, порушення смакових відчуттів, загальну слабкість, головний біль. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, на спинці та кінчику язика яскраво-червоні плями, болісні під час пальпації. У крові: ер.- 2, $2 \cdot 10^{12}$ /л, Нь- 70 г/л, КП- 1,4, анізо-пойкілоцитоз, лейкоц.-4, $2 \cdot 10^9$ /л, п.- 1%, с.- 36%, б.- 2%, э.-4%, лімф.- 53%, м.- 4%, тр.- $160 \cdot 10^9$ /л, ШЗЕ- 20 мм/год. На фоні введення яких препаратів необхідно проводити місце-ву симптоматичну терапію цій хворій?
Правильна відповідь	A. Вітамін В ₁₂ і фолієва кислота
B	B. Препарати заліза і вітамін С
C	C. Амінокапронова кислота і хлорид кальцію
D	D. Кортикостероїдні гормони
E	E. Нікотинова кислота і тіамін
№	129. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хворий 62-х років звернувся зі скаргами на наявність виразкового дефекту слизової нижньої губи, яка періодично самостійно загоюється та без наявних причин знову з'являється. Таку картину хворий спостерігає протягом 2-х років. Об'єктивно: на червоній облямівці нижньої губи ерозія подовженої форми, з гладенькою, полірованою поверхнею, яскраво-червоного кольору. Запальний інфільтрат виражений дуже слабо. Пальпація злегка болісна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Абразивний преанцерозний хейліт Манганотті
B	B. Метеорологічний хейліт
C	C. Лейкоплакія, ерозивна форма
D	D. Хвороба Боуена
E	E. Ексфоліативний хейліт
№	130. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хворого 45-ти років в анамнезі хронічна травма слизової оболонки щоки з правого боку гострими краями зубів. Об'єктивно: на слизовій оболонці щоки по лінії змикання зубів має місце білувата пляма, що не підвищується над навколишніми набряклими та запальними тканинами; поверхневі шари утворення не знімаються при зішкрябанні. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Плоска лейкоплакія
B	B. Верукозна форма лейкоплакії
C	C. Травматична виразка слизової щоки

D	D. Папіломатоз
E	E. Верукозно-ерозивна форма лейкоплакії
№	131. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	До стоматолога звернувся хворий 18-ти років зі скаргами на загальне нездужання, підвищення температури тіла, біль під час ковтання. Об'єктивно: запалення слизової оболонки порожнини рота в ділянці зіва, піднебінних дужок та язичка, набряк мигдаликів. Масивний фібринозний плівчастий нальот щільно спаяний з тканинами та поширюється на м'яке та тверде піднебіння. Плівки розміщуються також на яснах і язичі. Підщелепні та шийні лімфатичні вузли збільшені, болісні. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	A. Дифтерійний стоматит
B	B. Виразковий стоматит Венсана
C	C. Алергічний стоматит
D	D. Агранулоцитоз
E	E. Гонорейний стоматит
№	1. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий скаржиться на розростання, кровоточивість та біль ясен протягом року. Об'єктивно: в області нижніх фронтальних зубів ясенні сосочки збільшені, перекривають коронки зубів на 1/2 їх висоти. Ясна у вигляді яскравочервоних грануляцій, болючі під час пальпації. На зубах значне відкладення зубного каменю. Рентгенологічно змін альвеолярного відростка не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гіпертрофічний гінгівіт
B	B. Виразковий гінгівіт
C	C. Локалізований пародонтит
D	D. Генералізований пародонтит
E	E. Катаральний гінгівіт
№	2. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 37ми років скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, рухомість зубів, утруднене пережовування їжі. Об'єктивно: ясна синюшночервоного кольору, пародонтальні кишені 6 мм з серозним вмістом, рухомість зубів II ст., на зубах помірне відкладення над і під'ясенного зубного каменю, гігієнічний індекс 3 бали, травматична оклюзія визначається по всій протяжності зубних дуг. Який попередній діагноз?

Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
B	B. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
C	C. Гіпертрофічний гінгівіт
D	D. ГістіоцитозХ
E	E. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
№	3. крок 2016, 2015, 2013, 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	При рентгенологічному дослідженні ротової порожнини виявлено, що повсюди виразно простежується порушення цілісності компактної пластинки, слабо виразний остеопороз вершин міжальвеолярних перегородок та розширення періодонтальної щілини навколо шийок зубів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
B	B. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
C	C. Хронічний катаральний гінгівіт
D	D. Пародонтоз, I ступінь
E	E. Пародонтоз, початковий ступінь
№	4. крок 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 28-ми років впродовж тижня скаржиться на неприємні відчуття в яснах, кровотечу і біль, особливо під час їжі. Об'єктивно: набряк та інтенсивна гіперемія ясен, особливо в межах 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубів, м'які нашарування та зубний камінь, ясеневі борозенки до 2 мм. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий катаральний гінгівіт
B	B. Хронічний катаральний гінгівіт
C	C. Гіпертрофічний гінгівіт
D	D. Генералізований пародонтит початкового ступеня, хронічний перебіг
E	E. Генералізований пародонтит початкового ступеня, загострений перебіг
№	5. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Пацієнт 35ти років звернувся зі скаргами на відчуття свербіння в яснах та біль в зубах від холодної та гарячої їжі. Об'єктивно: ясна щільні, анемічні. Рентгенологічно відмічається чергування вогнищ остеопорозу та остеосклерозу. Рівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок у межах 1/3. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз I ступеня

B	B. Пародонтоз початкового ступеня
C	C. Пародонтит I ступеня
D	D. Пародонтит початкового ступеня
E	E. Атрофічний гінгівіт
№	6. крок 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Пацієнт 23-х років скаржиться на незначне оголення коренів зубів і кровоточивість ясен під час чищення зубів, свербіж у яснах. Об'єктивно: мають місце відкладення над і під'ясенного зубного каменя. Ясна гіперемовані, набряклі, кишені глибиною 3,5 мм. На рентгенограмі: резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/3. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
B	B. Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг
C	C. Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг
D	D. Генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг
E	E. Пародонтоз II ступеня
№	7. крок 2016, 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Вагітна (36 тижнів) скаржиться на кровоточивість ясен, рясне утворення зубного нальоту, незважаючи на ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота. Об'єктивно: ясеневі сосочки і маргінальний край ясен пухкі, кровоточать під час дотику. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною 3,7 бали. Яку пасту слід рекомендувати цій хворій після проведення професійної гігієни порожнини рота?
Правильна відповідь	A. Що містить хлоргексидин
B	B. Що містить мінералізуючі препарати
C	C. Що містить рослинні препарати
D	D. Фторвмісну
E	E. Гелеву
№	8. крок 2016
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Лікар-стоматолог впродовж 4х днів проводить лікування гострого виразкового гінгівіту чоловіку 30ти років. Об'єктивно: ясна злегка набряклі, гіперемовані, звиразковані поверхні очистилися від некротичного нальоту. Препарати якої групи слід включити у план лікування на цьому етапі?
Правильна відповідь	A. Кератопластики

В	В. Антибіотики
С	С. Кортикостероїди
Д	Д. Інгібітори протеолізу
Е	Е. Протеолітичні ферменти
№	9. крок 2016, 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 32-х років скаржиться на незначну болючість під час їжі в ділянці 36 зуба, кровоточивість ясен. При огляді в 36 зубі на дистальній поверхні пломба, контактний пункт між 37 та 36 зубами відсутній, міжзубний ясенний сосочок атрофований, глибина пародонтальної кишені 4 мм. На рентгенограмі резорбція верхівки міжальвеолярної перегородки між 37 та 36 зубами, явища остеопорозу, в інших ділянках змін немає. Що є першопричиною даного захворювання?
Правильна відповідь	А. Нераціональне пломбування
В	В. Вірулентна мікрофлора
С	С. Травматична оклюзія
Д	Д. Недостатня гігієна
Е	Е. Зниження місцевої резистентності
№	10. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на відчуття свербіж у яснах, чутливість зубів до тактильних, термічних і хімічних подразників. Під час огляду ясна щільна, блідо-рожевого кольору. На зубах клиноподібні дефекти. Корені зубів оголені на 2/3 довжини, зуби стійкі. Рентгенографічно визначається горизонтальна деструкція (атрофія) міжзубних перегородок на 2/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Пародонтоз III ступеня
В	В. Пародонтоз II ступеня
С	С. Пародонтит II ступеня
Д	Д. Атрофічний гінгівіт
Е	Е. Пародонтит III ступеня
№	11. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	Пацієнт 50-ти років скаржиться на підвищену чутливість усіх зубів при дії холодного, під час чищення зубів, свербіж у яснах. Об'єктивно: виявлені клиноподібні дефекти у межах емалі і плащового дентину, ясенний край витончений, ясна бліді, пальпація безболісна, корені зубів оголені до 1/2 їх довжини. На рентгенограмі - зниження висоти міжзубних перегородок на 1/2, їх остеосклероз. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз II ступеня важкості
B	B. Генералізований пародонтит II ступеня важкості
C	C. Атрофічний гінгівіт
D	D. Генералізований пародонтит I ступеня важкості
E	E. Пародонтоз I ступеня важкості
№	12. крок 2015, 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Парубок 18-ти років скаржиться на болісність ясен під час прийому їжі. Захворів гостро три дні тому, коли після переохолодження з'явилися субфебрильна температура і болі у яснах. Об'єктивно: порожнина рота санована, ясна на верхній і нижній щелепах гіперемована, набрякла, легко кровить під час дотику інструментом. У ділянці 21, 22, 23, 24 та 25 на міжзубних сосочках визначається брудносіре нашарування, після зняття якого утворюється кровоточива звиразкована поверхня. Видалення нашарувань різко болісне. Яке додаткове дослідження необхідно провести хворому в першу чергу?
Правильна відповідь	A. Загальний розгорнутий аналіз крові
B	B. Аналіз крові на цукор
C	C. Мікроскопія нашарувань з сосочка
D	D. Обстеження на ВІЛ-інфекцію
E	E. Рентгенографія щелеп
№	13. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на розростання і кровоточивість ясен під час чищення зубів. Слизова ясен набрякла з ціанотичним відтінком. Ясенні сосочки збільшені в розмірі й перекривають коронки зубів на 1/3, легко кровоточать при дотику. Яке додаткове дослідження необхідне для визначення остаточного діагнозу?
Правильна відповідь	A. Рентгенографія
B	B. Проба Кулаженко
C	C. Проба Шиллера-Писарєва
D	D. Реопародонтографія

Е	Е. Мікробіологічне дослідження
№	14. крок 2015, 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Жінка 43-х років скаржиться на свербіж, неприємні відчуття у яснах, підвищену чутливість зубів до різних подразників. Після ретельного дослідження встановлений діагноз: пародонтоз I ступеня важкості. Який з фізіотерапевтичних впливів доцільно включити в комплексний план лікування цієї хвороби?
Правильна відповідь	А. Дарсонвалізація
В	В. Гелійнеоновий лазер
С	С. Діадинамічні струми
D	D. УВЧ-терапія
Е	Е. Флюктуоризація
№	15. крок 2015
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчина 18-ти років звернулася до пародонтолога зі скаргами на розростання і кровоточивість ясен. Об'єктивно: скупченість зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи; ясенні сосочки яскраво-червоного кольору, округлої форми, вкривають коронки зубів на 1/2 їх висоти, кровоточать під час пальпації, рясні відкладення зубного каменя. На рентгенограмі змін кісткової тканини міжальвеолярних перегородок не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма II ступеня
В	В. Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма I ступеня
С	С. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма I ступеня
D	D. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма ступеня
Е	Е. Фіброматоз ясен
№	16. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Чоловікові 30-ти років діагностовано гострий виразково-некротичний гінгівіт середнього ступеня важкості. Препарат якої групи необхідно використати на заключному етапі лікування?
Правильна відповідь	А. Кератопластики
В	В. Антибіотики
С	С. Антиоксиданти
D	D. Кератолітики
Е	Е. Протеолітичні ферменти

№	17. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 35ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно: гіперемія, набряк, ціаноз ясен верхньої та нижньої щелепи, над і під'ясенний зубний камінь. Глибина пародонтальних кишень 46 мм. Який найбільш імовірний попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг
B	B. Катаральний гінгівіт
C	C. Гіпертрофічний гінгівіт
D	D. Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг
E	E. Пародонтоз II ступеня
№	18. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Пацієнтці 47ми років встановлено діагноз: генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг. Лікар-стоматолог провів розтин пародонтального абсцесу в ділянці 11 і 21 зубів. В анамнезі у хворої гіперацидний гастрит, гіпотонія. Що з фізіотерапевтичних процедур можна призначити цій хворій?
Правильна відповідь	A. КУФтерапія
B	B. Мікрохвильова (НВЧ) терапія
C	C. УВЧтерапія
D	D. Діатермія
E	E. Електрофорез з трипсином
№	19. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	У парубка 20-ти років діагностований генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг. Виявлені відкладення зубного каменю у міжзубних проміжках під ясною. Проведена професійна гігієна порожнини рота. Який з перерахованих предметів догляду за порожниною рота слід рекомендувати використовувати цьому хворому додатково?
Правильна відповідь	A. Зубні флоси
B	B. Жувальна гумка
C	C. Зубні йоржики
D	D. Міжзубні стимулятори
E	E. Електрична зубна щітка

№	20. крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	У жінки 49ти років діагностований генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг. При проведенні комплексної терапії рухливі фронтальні зуби нижньої щелепи були захищені волоконною адгезивною шиною. Який з предметів догляду за порожниною рота слід рекомендувати цій хворій додатково?
Правильна відповідь	A. Зубні йоржики
B	B. Жувальна гумка
C	C. Зубні флоси
D	D. Міжзубні стимулятори
E	E. Електрична зубна щітка
№	21. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчина 18ти років звернулася до пародонтолога зі скаргами на розростання і кровоточивість ясен. Об'єктивно: скупченість зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи; ясенні сосочки яскраво-червоного кольору, округлої форми, вкривають коронки зубів на 1/2 їх висоти, кровоточать під час пальпації, рясні відкладення зубного каменя. На рентгенограмі змін кісткової тканини міжальвеолярних перегородок не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма II ступеня
B	B. Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма I ступеня
C	C. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма I ступеня
D	D. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма II ступеня
E	E. Фіброматоз ясен
№	22. . крок 2014
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Пацієнтка 50ти років скаржиться на підвищену чутливість зубів до температурних і хімічних подразників. Об'єктивно: ясна щільні, анемічні, корені зубів оголені на 34 мм, є клиноподібні дефекти в межах дентину. На рентгенограмі виявлено рівномірне зниження висоти міжальвеолярних перегородок в межах 1/2 їх висоти і остеосклероз тканин альвеолярного відростка. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз II ступеня
B	B. Пародонтоз I ступеня
C	C. Атрофічний гінгівіт
D	D. Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг

Е	Е. Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
№	23. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Чоловік 41-го року звернувся два тижні тому до пародонтолога. Встановлений діагноз: генералізований пародонтит II ступеня важкості, загострений перебіг. Після усунення травмуючих факторів і проведення протизапальної терапії ясна набула звичайного забарвлення; пародонтальні кишень глибиною 4-5 мм без виділень. Якому методу усунення пародонтальних кишень треба надати перевагу в даному випадку?
Правильна відповідь	А. Кюретаж
В	В. Поверхнева склерозуюча терапія
С	С. Глибока склерозуюча терапія
D	D. Гінгівектомія
Е	Е. Клаптева операція
№	24. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворому 43-х років, встановлено діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня. При мікроскопічному дослідженні вмісту пародонтальних кишень виявлено значну кокову мікрофлору, трихомонади. Що з перерахованого слід застосовувати для інстиляцій?
Правильна відповідь	А. Метронідазол
В	В. Лінкоміцин
С	С. Димексид
D	D. Месулід
Е	Е. Діоксин
№	25. крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Пацієнт 43-х років після перенесеного гострого респіраторного захворювання скаржиться на загальну слабкість, інтенсивний біль у яснах, їх кровоточивість, неприємний запах з рота. Об'єктивно: збільшення і болючість підщелепних лімфовузлів; ясна гіперемовані, набряклі, спостерігаються численні виразкові вогнища, покриті сірим фібринозним нальотом. Що в першу чергу буде виявлено при мікроскопічному дослідженні матеріалу зішкрібу з уражених ділянок ясен?
Правильна відповідь	А. Змішана флора із значною кількістю фузобактерій і спірохет
В	В. Нейтрофіли в стадії розпаду, епітеліальні клітини, стафілококи

C	C. Стрептококи, стафілококи, лактобацили, епітеліальні клітини
D	D. Нейсерії, вейлонели, колібактерії, епітеліальні клітини
E	E. Значна кількість еритроцитів, актиноміцети
№	26. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 18-ти років з'явилася на прийом до лікаря через рік після лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту. Об'єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, міцно охоплюють шийки зубів. До якої диспансерної групи слід віднести цю пацієнтку?
Правильна відповідь	A. Д2
B	B. Д1
C	C. 1 підгрупа Д3
D	D. 2 підгрупа Д3
E	E. Диспансеризації не підлягає
№	27. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 68-ми років скаржиться на безболісне збільшення ясен. В анамнезі: епілепсія, тривалий прийом гідантоїну. Об'єктивно: ясна на всьому протязі обох щелеп гіпертрофована, щільна, болісна при пальпації, вкриває коронки зубів до половини їх висоти. Виявлені ясенні кишени глибиною 5 мм. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
B	B. Вірусні бородавки
C	C. Фіброматоз ясен
D	D. Гіперпластичний синдром при лейкозі
E	E. Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма
№	28. . крок 2013
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Жінка 40-ка років скаржиться на незначну болісність ясен, підвищену чутливість зубів до температурних подразників. Об'єктивно: ясна бліда, щільна, у ділянці нижніх фронтальних зубів спостерігається ретракція ясни з оголенням коренів зубів. На Ro-грамі: резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 довжини коренів. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	A. Пародонтит I ступеня
B	B. Пародонтит II ступеня
C	C. Пародонтит початкового ступеня

D	D. Катаральний гінгівіт
E	E. Локалізований пародонтит
№	29. крок 2012, 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Жінка 48-ми років скаржиться на свербіж в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників. Об'єктивно: шийки зубів оголені. Ясна щільні, бліді, над'ясеневі зубні відкладення в невеликій кількості. У ділянці 13, 14, 24, 25 клиноподібні дефекти. Їх зондування болісне. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз
B	B. Генералізований пародонтит
C	C. Атрофічний гінгівіт
D	D. Локалізований пародонтит
E	E. Десмодонтоз
№	30. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 42-х років впродовж трьох років скаржиться на кровоточивість ясен і рухомість зубів. Лікувалась домашніми засобами. Об'єктивно: регіонарні лімфовузли не збільшені, безболісні, ясна обох щелеп на всьому протязі набряклі, ціанотичні, в пародонтальних кишнях глибиною 5-6 мм міститься серозний ексудат, рухомість зубів II-III ступеню. Фронтальні зуби обох щелеп зміщені, є діастеми. На Ro-грамі: резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг
B	B. Генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг
C	C. Генералізований пародонтит III ступеня, загострений перебіг
D	D. Генералізований пародонтит III ступеня, хронічний перебіг
E	E. Хронічний катаральний гінгівіт
№	31. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 52-х років, працівник друкарні, скаржиться на головний біль, дратівливість, біль у животі, слабкість, неприємні відчуття, солодкуватий запах з рота. Об'єктивно: блідість, слизова оболонка ясен набрякла, гіперемована, по краю ясен спостерігається синьо-чорна облямівка. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Свинцевий гінгівіт
B	B. Ртутний гінгівіт

C	C. Вісмутовий гінгівіт
D	D. Хронічний катаральний гінгівіт
E	E. Виразково-некротичний гінгівіт
№	32. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 35-ти років скаржиться на підвищену чутливість зубів до термічних подразників та періодичне відчуття ломоти в яснах. Об'єктивно регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Слизова оболонка ясен бліда, щільна, не болюча. Ясна не кровлять при зондуванні, пародонтальні кишені відсутні. Корені зубів оголені. В ділянці шийок 15, 14, 13, 23, 24, 25 клиноподібні дефекти. Віялоподібне розходження зубів фронтальної групи. Травматична оклюзія. На ортопантограмі - резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 (горизонтальний тип). Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз II ступеня
B	B. Пародонтоз I ступеня
C	C. Хронічний генералізований пародонтит II ст.
D	D. Хронічний генералізований пародонтит I ст.
E	E. Хронічний генералізований пародонтит III ст.
№	33. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 29-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів, неприємний запах з рота. Об'єктивно: ясна гіперемовані, з ціанотичним відтінком, кровоточать при дотику, пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з серозним ексудатом. Наявні над- і підясеневі зубні відкладення. На ортопантограмі - остеопороз альвеолярного відростка, резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
B	B. Генералізований пародонтит початкового ступеня, хронічний перебіг
C	C. Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг
D	D. Генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг
E	E. Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг
№	34. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	Чоловік 20-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен і болісність їх під час прийому їжі. Об'єктивно: ясна у ділянці фронтальної групи зубів нижньої щелепи валикоподібно потовщена, набрякла, гіперемована, зуби скупчені. У ділянці 42, 41, 31, 32 визначаються пародонтальні кишені глибиною до 4 мм з серозно-гнійним ексудатом. Прикус прямий. На рентгенограмі: резорбція міжальвеолярних перегородок у ділянці 42, 41, 31, 32 до 1/3 довжини коренів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Локалізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг
B	B. Генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг
C	C. Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
D	D. Локалізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг
E	E. Загострення хронічного катарального гінгівіту
№	35. крок 2012
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий після гострого респіраторного захворювання скаржиться на загальну слабкість, інтенсивний біль у яснах, кровоточивість, неприємний запах з рота. Об'єктивно: лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації, ясна гіперемована, набрякла, множинні виразки, вкриті фібринозним нальотом. Яке дослідження обов'язково має провести лікар?
Правильна відповідь	A. Загальний аналіз крові
B	B. Алергологічні проби
C	C. Капіляроскопія
D	D. Цитологічне дослідження
E	E. Імунограма
№	36. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Чоловік 28-ми років скаржиться на болісність і кровоточивість ясен, які з'явилися 4 дні тому після перенесеного застудного захворювання. Останні два роки ясна періодично кровоточать під час чищення зубів. Об'єктивно: ясна набряклі, яскраво-червоного кольору, легко кровлять, болісні під час пальпації. Незначне відкладення зубного каменя. Пародонтальні кишені не визначаються. На Ro-грамі: визначається розширення періодонтальної щілини у маргінальній частині, остеопороз верхівок міжзубних перегородок, відсутність компактної пластинки на їх вершинах. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
B	B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг

C	C. Загострений катаральний гінгівіт
D	D. Хронічний катаральний гінгівіт
E	E. Гострий катаральний гінгівіт
№	37. . крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 37-ми років скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, рухомість зубів, утруднене пережовування їжі. Об'єктивно: ясна синюшно-червоного кольору, пародонтальні кишені 6 мм з серозним вмістом, рухомість зубів II ст., на зубах помірне відкладення над- і під'ясенного зубного каменя, гігієнічний індекс - 3 бали, травматична оклюзія визначається по всій протяжності зубних дуг. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
B	B. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
C	C. Гіпертрофічний гінгівіт
D	D. Гістіоцитоз-Х
E	E. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг
№	38. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 24-х років скаржиться на різкий біль в яснах, неможливість приймати їжу, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38° C , загальну слабкість. Об'єктивно: хворий блідий, збільшені лімфовузли. Ясеневі сосочки набряклі, гіперемовані, вкриті некротичним нальотом. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Виразковий гінгівіт
B	B. Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма
C	C. Гострий катаральний гінгівіт
D	D. Хронічний катаральний гінгівіт
E	E. Свинцевий гінгівіт
№	39. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Лікар-стоматолог для безболісного проведення закритого кюретажу замість аплікації 10% розчину лідокаїну помилково використав 10% розчин азотнокислого срібла. Ясна відразу стали білого кольору, набряклі, болючі. Який з перерахованих засобів повинен використати лікар для надання невідкладної допомоги?
Правильна відповідь	A. 3% розчин йодиду калію
B	B. 0,5% розчин оцтової кислоти

C	C. 0,1% розчин нашатирного спирту
D	D. 2% розчин лимонної кислоти
E	E. 50% етиловий спирт
№	40. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Пацієнту 54-х років проведений розтин пародонтального абсцесу у ділянці 34, 35, промивання порожнини абсцесу антисептиком. В анамнезі: генералізований пародонтит II ступеня, (страждає впродовж 10-ти років), періодично захворювання загострюється з утворенням абсцесу. З супутніх захворювань: хронічний гепатохолецистит, дискоїдний червоний вовчак. Що з фізіотерапевтичних процедур можна призначити цьому хворому для усунення загострення, що виникло, після розтину абсцесу?
Правильна відповідь	A. УВЧ-терапія
B	B. Лазерна терапія
C	C. Інфрачервоне випромінювання (лампа "Солюкс")
D	D. УФ-опромінення (тубус-кварц)
E	E. Електрофорез з гепарином
№	41. крок 2011
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 25-ти років впродовж року скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота вранці. Об'єктивно: зуби стійкі, пародонтальні кишені відсутні, міжзубні сосочки і край ясен - з синюшним відтінком. На Ro-грамі - цілісність компактної пластинки порушена, періодонтальна щілина розширена навколо верхівок міжальвеолярних перегородок, остеопороз і резорбція - незначні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
B	B. Хронічний катаральний гінгівіт
C	C. Хронічний виразково-некротичний гінгівіт
D	D. Гіповітаміноз С
E	E. Гострий катаральний гінгівіт
№	42. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	Жінка 37-ми років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 37, 2°C. Об'єктивно: ясна яскраво гіперемовані, набряклі, легко кровоточать, пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм із гнійним ексудатом. На ортопантограмі: дифузний остеопороз альвеолярних відростків, резорбція міжзубних перегородок до 1/3 їхньої висоти. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит I ступеня, загострений перебіг
B	B. Загострення хронічного катарального гінгівіту
C	C. Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
D	D. Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг
E	E. Генералізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг
№	43. крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 27-ми років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно: ясеневий край гіперемований, набряклий, болісний при доторкуванні, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі резорбція кортикальної пластинки, остеопороз міжзубних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Початковий ступінь генералізованого пародонтиту
B	B. Загострення хронічного катарального гінгівіту
C	C. Генералізований пародонтит I ступінь
D	D. Хронічний катаральний гінгівіт
E	E. Пародонтоз
№	44. . крок 2010
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 57-ми років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних подразників, свербіж ясен. Об'єктивно: корені зубів оголені до 1/3 довжини, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. У ділянці 14, 13, 24, 25, 26, 34 клиноподібні дефекти в межах дентину. Зондування оголених шийок зубів та клиноподібних дефектів болісне. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз I ступеня
B	B. Генералізований пародонтит
C	C. Пародонтоз II ступеня
D	D. Атрофічний гінгівіт
E	E. Локалізований пародонтит
№	45. крок 2010, 2009, 2008, 2007

Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	У хворого 50-ти років скарги на утруднене жування їжі, рухомість зубів, неприємний запах з рота, кровоточивість ясен. Об'єктивно: ясна гіперемовані з ціанотичним відтінком, наявність зубного каменю. Пародонтальні кишені в межах молярів верхньої щелепи 8 мм, у решти зубів - 6 мм. На рентгенограмі - резорбція кісткової тканини на 2/3-1/2 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит III ст, хронічний перебіг
B	B. Генералізований пародонтит II ст, хронічний перебіг
C	C. Генералізований пародонтит I ст, хронічний перебіг
D	D. Генералізований пародонтит III ст, загострений перебіг
E	E. Генералізований пародонтит II ст, загострений перебіг
№	46. . крок 2010, 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 42-х років скаржиться на біль у яснах, посилення їх кровоточивості, збільшення рухомості зубів, неприємний запах із рота. Об'єктивно: ясна яскраво гіперемовані, різко набряклі, легко кровлять під час пальпації. Корені зубів оголені, пародонтальні кишені глибиною 4-6 мм із гнійним ексудатом, над'ясенний і під'ясенний зубний камінь. Рухомість зубів II-III ст. На ортопантомограмі - резорбція міжзубних перегородок до 1/2 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення генералізованого пародонтиту II ст
B	B. Загострення генералізованого пародонтиту I ст
C	C. Загострення генералізованого пародонтиту III ст
D	D. Генералізований пародонтит II ст, хронічний перебіг
E	E. Генералізований пародонтит III ст, хронічний перебіг
№	47. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Чоловік 48-ми років скаржиться на відчуття свербіжу в яснах. Об'єктивно: ясна щільні, звичайного кольору, короткочасний біль у зубах від холодної води. На рентгенограмі визначається остеосклероз міжальвеолярних перегородок - дрібнокомірковий малюнок кістки, висота міжальвеолярних перегородок і цілісність компактної пластинки на їх верхівках збережена. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз початкового ступеня
B	B. Атрофічний гінгівіт
C	C. Пародонтит початкового ступеня

D	D. Пародонтит I ст
E	E. Пародонтоз I ст
№	48. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів, зміщення зубів, свербіж в яснах, біль в ділянці 43, 42, 41, 31, 32, 33 при дії хімічних та температурних подразників. Об'єктивно: ясна щільні, анемічні. На рентгенограмі: атрофія альвеолярної кістки, що досягає 2/3 висоти міжальвеолярних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз III ступеня
B	B. Пародонтоз II ступеня
C	C. Хронічний генералізований пародонтит III ступеня
D	D. Хронічний генералізований пародонтит II ступеня
E	E. Атрофічний гінгівіт
№	49. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 33-х років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 37, 8° C. Об'єктивно: ясна яскраво гіперемовані, набряклі, легко кровоточать, пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм із гнійним ексудатом. На ортопантограмі дифузний остеопороз альвеолярного відростка, резорбція міжзубних перегородок до 1/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Загострення хронічного генералізованого пародонтиту I ст
B	B. Хронічний генералізований періодонтит I ст
C	C. Загострення хронічного генералізованого пародонтиту II ст
D	D. Хронічний генералізований пародонтит II ст
E	E. Загострення хронічного катарального гінгівіту
№	50. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Чоловік 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і прийомі твердої їжі. Об'єктивно: ясна у фронтальній ділянці нижньої щелепи гіперемована, набрякла, кровоточить під час пальпації. Слизова оболонка порожнини рота і ясна в інших ділянках без змін. Прикус глибокий. Зуби стійкі за винятком 41 та 31 (I ступінь рухомості). На рентгенограмі: резорбція міжальвеолярних перегородок у ділянці 42, 41, 32, 31 до 1/3 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	A. Локалізований пародонтит
B	B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь
C	C. Генералізований пародонтит, I ступінь
D	D. Катаральний гінгівіт
E	E. Пародонтоз I ступінь
№	51. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 18-ти років скаржиться на розростання ясен, біль та кровоточивість при прийомі твердої їжі. Об'єктивно: гіперемія, набряк ясен, гіпертрофія ясеневого краю біля 12, 13, 14 до 1/2 висоти коронок. Формалінова проба безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гіпертрофічний гінгівіт
B	B. Генералізований пародонтит II ступеню, хронічний перебіг
C	C. Катаральний гінгівіт
D	D. Виразково-некротичний гінгівіт
E	E. Генералізований пародонтит I ступеню, загострений перебіг
№	52. . крок 2009, 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Молодий чоловік 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів, рясне утворення зубного нальоту, незважаючи на ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота. Об'єктивно: ясеневі сосочки помірно набряклі, застійно гіперемовані, кровоточать під час дотику. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5. Яку пасту Ви запропонуєте цьому хворому для чищення зубів, проводячи комплексну терапію захворювання?
Правильна відповідь	A. Паста, що містить сольові добавки
B	B. Паста, що містить мінералізуючі компоненти
C	C. Фторвмісна паста
D	D. Гелева зубна паста, що містить мікроелементи
E	E. Паста, що містить протигрибкові препарати
№	53. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	Жінка 40-ка років скаржиться на незначну болючість ясен, підвищену чутливість зубів до температурних подразників. Об'єктивно: ясна бліді та щільні, в ділянці фронтальних нижніх зубів спостерігається ретракція з оголенням їх шийок. На рентгенограмі спостерігається рівномірне зниження висоти міжзубних перетинок до 1/3 довжини коренів. Якому захворюванню відповідають ці дані?
Правильна відповідь	A. Пародонтоз
B	B. Генералізований пародонтит
C	C. Гінгівіт
D	D. Локалізований пародонтит
E	E. Папіліт
№	54. . крок 2008, 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 38-ми років, водій, скаржиться на гострий біль у роті, горлі, що утруднює приймання їжі, нездужання, підвищення температури до 38, 6 ⁰ С, що виникли після переохолодження. Хворіє протягом доби, ввечері має заступити на зміну. Об'єктивно: ясна в ділянці нижніх фронтальних зубів та слизова оболонка зіву гіперемовані, набряклі; некроз ясенного краю та збільшення мигдаликів. Бактеріоскопія: фузоспірилярний симбіоз. У крові: ер.-4, 5 · 10 ¹² / ; лейкоц.- 7, 2 · 10 ⁹ / ; ШЗЕ- 18 мм/год. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога?
Правильна відповідь	A. Призначити лікування та видати лікарняний лист
B	B. Призначити лікування та дозволити вийти на зміну
C	C. Направити на госпіталізацію до щелепно-лицьового стаціонару
D	D. Направити на консультацію до лікаря-інфекціоніста
E	E. Направити на консультацію до ЛОР-спеціаліста
№	55. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на відчуття свербіжу в яснах, кровоточивість ясен під час чищення зубів та прийомі їжі, незвичний вигляд ясен. Дані явища спостерігає протягом останніх 1,5 років. З анамнезу життя відомо, що пацієнт 2 роки приймає протисудомні препарати на основі дифеніламіну. При об'єктивному обстеженні виявлено що ясна гіперемовані, набряклі. У фронтальній ділянці вкривають вестибулярну поверхню зубів на 1/2 їх висоти. По вільному краю ясен спостерігається розростання грануляційної тканини, ясна при зондуванні кровоточать. Рентгенологічних змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
B	B. Хронічний виразковий гінгівіт

C	C. Хронічний катаральний гінгівіт
D	D. Локалізований пародонтит
E	E. Генералізований пародонтит
№	56. крок 2008, 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 18-ти років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38, 6 ⁰ C, загальну слабкість, відсутність апетиту. Об'єктивно: слизова порожнини рота гіперемована, суха, язик вкритий білим нашаруванням, ясеневі сосочки набряклі, верхівки їх з ділянками некротичного нашарування, що легко знімається і залишає кровоточиву поверхню. Підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. Визначте збудника захворювання:
Правильна відповідь	A. Фузоспірилярний симбіоз
B	B. Стрепто-стафілококи
C	C. Бліда трепонема
D	D. Вірус простого герпеса
E	E. Гриби роду C andida
№	57. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 42-х років скаржиться на рухомість зубів, зміну їх положення, неприємний присмак у роті, біль під час пережовування їжі. Об'єктивно: зуби верхньої та нижньої щелеп 2-3 ст. рухомості, наявні діастеми і тріми. Корені зубів оголені на 1/2. З пародонтальних кишень - серозно-гнійні виділення. На ортопантограмі - деструкція кісткової тканини до 2/3 довжини кореня. Наявні кісткові кишень. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит III ступеню, хронічний перебіг
B	B. Синдром Папійона-Лефевра
C	C. Хронічний катаральний гінгівіт
D	D. Атрофічний гінгівіт
E	E. Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг
№	58. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 18-ти років скаржиться на розростання ясен, кровотечу і біль під час вживання їжі. Об'єктивно: набряк ясен, гіперемія; розростання досягає 1/3 довжини коронки зуба. Під час пальпації посилення кровотечі та біль. Який найбільш вірогідний діагноз?

Правильна відповідь	A. Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма
B	B. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
C	C. Гострий катаральний гінгівіт
D	D. Хронічний катаральний гінгівіт
E	E. Генералізований пародонтит початкового ступеня, загострений перебіг
№	59. . крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 20-ти років скаржиться на біль та кровоточивість ясен протягом тижня. Біль посилюється під час вживання їжі, кровоточивість з'являється від механічних подразників. Об'єктивно: в ділянці нижніх фронтальних зубів виражена гіперемія, набряк ясен. Верхівки ясеневих сосочків куполоподібні, збільшені в розмірі. Ясна при пальпації болючі, легко кровоточать. Рентгенологічних змін альвеолярного паростка не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Катаральний гінгівіт
B	B. Гіпертрофічний гінгівіт
C	C. Локалізований пародонтит
D	D. Виразковий гінгівіт
E	E. Атрофічний гінгівіт
№	60. крок 2008
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Молодий чоловік 19-ти років звернувся зі скаргами на кровоточивість і болісність ясен. Об'єктивно: у фронтальній ділянці верхньої і нижньої щелеп визначається скупченість зубів, гіперемія, ціаноз і розростання ясеневих сосочків до 1/3 висоти коронок, рясне відкладення м'якого зубного нальоту. Яку з нижчеперахованих процедур доцільно включити до плану лікування цього хворого?
Правильна відповідь	A. Струми Д'Арсонваля
B	B. Діатермія
C	C. Мікрохвильова терапія
D	D. УВЧ-терапія
E	E. Флюктуруючі струми
№	61. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	Жінка 24-х років скаржиться на кровоточивість та болісність ясен, що з'явилися 3 дні тому після фіксації пластмасових коронок на 12, 11, 21, 22. Об'єктивно: ясна у ділянці 12, 11, 21, 22 яскраво-червоного кольору, набряклі, кровоточать, болісні під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Гострий катаральний гінгівіт
B	B. Генералізований пародонтит
C	C. Хронічний катаральний гінгівіт
D	D. Гіпертрофічний гінгівіт
E	E. Атрофічний гінгівіт
№	62. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Чоловік 23-х років скаржиться на біль у роті, неприємний запах з рота, підвищення температури до 38 ⁰ С. Об'єктивно: блідий, адинамічний, регіонарні лімфовузли збільшені та болісні. Ясна набряклі, гіперемовані, з виразками, які вкриті некротичним нальотом. На зубах відкладення зубного каменю. Яке допоміжне дослідження потрібно провести для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	A. Гемограма
B	B. Цитологічне
C	C. Бактеріоскопічне
D	D. Гістологічне
E	E. Люмінесцентне
№	63. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Жінці 38-ми років встановлено діагноз: генералізований пародонтит середнього ступеня важкості, абсцедуючий перебіг. Загальні симптоми: температура 37, 3 ⁰ С, слабкість, сухість слизової порожнини рота, спрага. Яке додаткове дослідження необхідно провести в першу чергу?
Правильна відповідь	A. Визначення вмісту цукру в крові та сечі
B	B. Загальний розгорнутий аналіз крові
C	C. Визначення стійкості капілярів ясни за Кулаженко
D	D. Визначення тканинної насиченості аскорбіновою кислотою
E	E. Реопародонтографія
№	64. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	Жінка 45-ти років скаржиться на кровоточивість ясен протягом півроку, що поступово посилюється. Відзначає легку слабкість, нездужання, головний біль надвечір. Об'єктивно: ясеневий край злегка набряклий, пухкий, пастозний, кровоточить під час легкого доторкування. У молярів та різців - зубо-ясеневі кишени 3-3,5 мм зі незначними виділеннями. На шийках зубів - відкладення пухкого зубного каменю. Яке дослідження найбільш інформативне для визначення ступеня важкості патології пародонта в даній хворобі?
Правильна відповідь	A. Рентгенографія щелеп
B	B. Визначення пародонтального індексу
C	C. Визначення стійкості капілярів
D	D. Проба Шиллера-Пісарєва
E	E. Оцінка ступеня рухливості зубів
№	65. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хвора 23-х років скаржиться на кровотечу з ясен під час чищення зубів та вживання твердої їжі. Об'єктивно: маргінальна частина ясен, в основному з орального боку, набрякла, гіперемована; відмічаються надясеневі зубні відкладення. На рентгенограмі: деструкція кортикальної пластинки міжальвеолярних перегородок, явища остеопорозу. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь
B	B. Генералізований пародонтит, I ступінь
C	C. Генералізований катаральний гінгівіт
D	D. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт
E	E. Генералізований пародонтит, II ступінь
№	66. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Чоловік 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання твердої їжі. Об'єктивно: ясна в фронтальній ділянці нижньої щелепи гіперемовані, набряклі, кровоточать під час пальпації. Слизова оболонка порожнини рота та ясна в інших ділянках без змін. Прикус глибокий. Зуби стійкі, за винятком 41 та 31 (I ступінь рухомості). На рентгенограмі: резорбція міжкоміркових перетинок у ділянці 42, 41, 32, 31 до 1/3 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	A. Локалізований пародонтит
B	B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь
C	C. Генералізований пародонтит, I ступінь

D	D. Катаральний гінгівіт
E	E. Пародонтоз, I ступінь
№	67. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Вагітній 26 років (II-III місяць вагітності) встановлений діагноз: гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма II ступеня. Проведене усунення місцевих подразнюючих факторів, місцева протизапальна терапія. Визначте подальшу тактику по відношенню до цієї хвороби:
Правильна відповідь	A. Навчання раціональній гігієні порожнини рота
B	B. Гінгівектомія
C	C. Глибока склерозуюча терапія
D	D. Діатермокоагуляція сосочків, що розрослися
E	E. Кріодеструкція сосочків, що розрослися
№	68. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Під час проведення комплексного лікування хворого 36-ти років з діагнозом - хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості, було прийняте рішення провести шинування фронтальної групи зубів нижньої щелепи з використанням системи Ribbond. Який матеріал переважніше використати для фіксації полімерної стрічки цієї системи?
Правильна відповідь	A. Текучий фотополімерний композит
B	B. Хімічний мікрофільний композит
C	C. Хімічний мікрогібридний композит
D	D. Хімічний макрофільний композит
E	E. Склоіономірний цемент
№	69. крок 2007
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	У пацієнта 30-ти років прогресуюча рухомість зубів, оголення коренів, значні зубні нашарування, набряк та кровоточивість ясен. Вміст глюкози у крові - 6,55 ммоль/л. Рентгенологічно: остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок без зменшення їх висоти. Яка першочергова тактика лікаря?
Правильна відповідь	A. Консультація лікаря-ендокринолога
B	B. Призначення протизапальної терапії
C	C. Дослідження ясеневі рідини
D	D. Тимчасове шинування

Е	Е. Постійне шинкування
№	70. крок 2009
Тема	ТЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів, зміщення зубів, свербіж в яснах, біль в ділянці 43, 42, 41, 31, 32, 33 при дії хімічних та температурних подразників. Об'єктивно: ясна щільні, анемічні. На рентгенограмі: атрофія альвеолярної кістки, що досягає 2/3 висоти міжальвеолярних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	А. Пародонтоз III ступеня
В	В. Пародонтоз II ступеня
С	С. Хронічний генералізований пародонтит III ступеня
D	D. Хронічний генералізований пародонтит II ступеня
Е	Е. Атрофічний гінгівіт