

№	крок 2007
Тема	Клінічні форми туберкульозу: вогнищевий туберкульоз
Текст завдання	Під час флюорографічного обстеження в 45-ти річного чоловіка вперше на верхівці правої легені виявлені нечисленні вогнища малої інтенсивності з нечіткими контурами. Самопочуття хворого не порушене. Палить багато років. Об'єктивно: над легенями перкуторно - легеневиий звук, дихання везикулярне, хрипи не прослуховуються. Аналіз крові без змін. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Вогнищевий туберкульоз легень
B	Периферичний рак легені
C	Еозинофільна пневмонія
D	Бронхопневмонія
E	Дисемінований туберкульоз легень
№	крок 2008, 2009
Тема	Клінічні форми туберкульозу: дисемінований туберкульоз
Текст завдання	Хворий 40-ка років захворів місяць тому з підвищення температури, появи явищ інтоксикації, до яких потім приєдналися задишка, кашель з відходженням харкотиння. При рентгенологічному обстеженні в верхніх відділах легень виявлені вогнища різноманітної величини, що місцями зливаються. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Дисемінований туберкульоз легенів
B	Двобічна вогнищева пневмонія
C	Карциноматоз легенів
D	Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт
E	Застійна легеня
№	крок 2009
Тема	Клінічні форми туберкульозу: туберкульозний плеврит
Текст завдання	У чоловіка 22-х років з поліартралгією та високою лихоманкою виявлений правобічний ексудативний плеврит. Рентгенологічно з правого боку від IV ребра донизу - гомогенне затемнення. Зліва у II сегменті - поодинокі щільні вогнищеві тіні. Проба Манту с 2ТЕ - 16 мм папула. У плевральній рідині підвищений вміст білка, позитивна реакція Рівальта, збільшений вміст лейкоцитів з переважанням лімфоцитів. Визначте найбільш вірогідну етіологію плевриту:
Правильна відповідь	Туберкульозна
B	Ракова
C	Стафілококова
D	Вірусна
E	Аутоімунна
№	крок 2011

Тема	Організація боротьби з туберкульозом в Україні
Текст завдання	Вчителю загальноосвітньої школи після обстеження встановлено діагноз: туберкульоз легень. На який максимальний термін йому може бути видано листок непрацездатності?
Правильна відповідь	На 10 місяців
B	5 місяців
C	4 місяці
D	2 місяці
E	1 місяць
№	крок 2011
Тема	Ускладнення туберкульозу легень
Текст завдання	До стаціонару доставлено хворого 52-х років, який страждає на дисемінований туберкульоз легень, зі скаргами на різкий біль у правій половині грудної клітки, який з'явився при підйомі на 3 поверх, кашель, задишку в спокої, виражений ціаноз. Про яке ускладнення слід подумати насамперед?
Правильна відповідь	Спонтанний пневмоторакс
B	Серцева недостатність
C	Легенева недостатність
D	Плеврит
E	Гострий інфаркт міокарда
№	крок 2012, 2013, 2015
Тема	Клінічні форми туберкульозу: туберкульозний менінгіт
Текст завдання	Хворий 20-ти років скаржиться на сильний головний біль, двоїння в очах, загальну слабкість, підвищення температури тіла, дратівливість. Об'єктивно: температура тіла 38, 1°С, в контакт вступає неохоче, болісно реагує на подразники. Птоз лівої повіки, розбіжна косоокість, анізокорія S>D. Виражений менінгеальний синдром. При люмбальній пункції ліквор витікає під тиском 300 мм вод.ст., прозорий, з легкою опалесценцією, через добу випала фібриозна плівка. Білок - 1,4 г/л, лімфоцити - 600/3 в мм <sup>3</sup> , цукор - 0,3 ммоль/л. Який попередній діагноз слід поставити хворому?
Правильна відповідь	Туберкульозний менінгіт
B	Менінгококовий менінгіт
C	Лімфоцитарний менінгіт Армстронга
D	Сифілітичний менінгіт
E	Паротитний менінгіт
№	крок 2012, 2013
Тема	Клінічні форми туберкульозу: Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень

Текст завдання	На рентгенограмі легень визначається ущільнення і різке зменшення верхньої частки правої легені. Середня і нижня частки правої легені різко пневмотизовані. Корінь правої легені підтягнутий до ущільненої частки. У верхньому і середньому відділах лівого легеневого поля множинні вогнищеві тіні. В прикореневій ділянці лівого легеневого поля чітко контуруються 2 поряд розміщені кільцеподібні тіні з досить товстими і нерівними стінками. Якому захворюванню відповідає вказана рентгенологічна картина?
Правильна відповідь	Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень
B	Ателектаз верхньої частки правої легені
C	Пневмонія з абсцедуванням
D	Периферичний рак
E	Рак Пенкоста
№	крок 2012, 2016
Тема	Позалегеневий туберкульоз
Текст завдання	Хвора 35-ти років протягом року відзначає слабкість, пітливість, субфебрильну температуру, біль та обмеження рухів у лівому колінному суглобі. 2 роки тому лікувалась з приводу дисемінованого туберкульозу легень. Об'єктивно: положення лівої кінцівки вимушене, колінний суглоб збільшений, болючий при пальпації, рух в ньому обмежений. Проба Манту з 2 ТО - папула 23 мм. В легенях вогнищеві тіні посиленої інтенсивності. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Туберкульозний гоніт
B	Посттравматичний артрит
C	Хронічний остеомієліт
D	Пухлина колінного суглоба
E	Ревматоїдний артрит
№	крок 2015
Тема	Позалегеневий туберкульоз
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржиться на болі у лівому кульшовому суглобі, що посилюються під час ходи, підвищення температури до 37, 7° C впродовж 2-х місяців. В анамнезі: вогнищевий туберкульоз легень. На рентгенограмі лівого кульшового суглоба визначається деструкція суміжних поверхонь головки стегнової кістки і даху вертлюгової западини, звуження суглобової щілини. Проба Манту з 2 ТО - папула 14 мм. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Туберкульозний коксит зліва
B	Саркома лівого кульшового суглоба
C	Артрозо-артрит лівого кульшового суглоба
D	Ревматоїдний артрит
E	Ревматичний артрит

№	крок 2015
Тема	Клінічні форми туберкульозу: дисемінований туберкульоз
Текст завдання	У 12-ти річної дитини протягом 6-ти місяців періодично з'являється лихоманка до 38, 5° С , кашель, задишка, одноразово кровохаркання. БЦЖ - рубець відсутній. Дідусь хворіє на туберкульоз. В легенях розсіяні сухі і різнокаліберні вологі хрипи. Рентгенологічно: однотипна рівномірна дрібно-вогнищева інфільтрація легень, у верхніх частках тонкостінна каверна із слабковираженою перифокальною інфільтрацією. Яке захворювання імовірне?
Правильна відповідь	Туберкульоз легень
B	Вогнищева пневмонія
C	Хронічний бронхіт
D	Бронхіальна астма
E	Синдром Хамана-Річа
№	крок 2015
Тема	Ускладнення туберкульозу легень
Текст завдання	У чоловіка 47-ми років після підняття вантажу з'явилася різка біль у правій половині грудної клітини, почала наростати задуха, ціаноз шкірі та слизистої. Хворий 7 років тому хворів на інфільтративний туберкульоз правої легені. Останні три роки не обстежувався. При об'єктивному обстеженні перкуторно справа тимпаніт, при аускультатії дихання різко послаблене. Яке ускладнення розвинулося у хворого?
Правильна відповідь	Спонтанний пневмоторакс
B	Тромбоемболія легеневої артерії
C	Ексудативний плеврит
D	Ателектаз правої легені
E	Госпітальна пневмонія
№	крок 2013, 2014, 2015
Тема	Клінічна класифікація туберкульозу
Текст завдання	Хворий 30-х років поступив до протитуберкульозного диспансеру у зв'язку з виявленими на флюорографії змінами: у S1 правої легені відмічається тінь діаметром до 1 см, слабкої інтенсивності з нечіткими контурами. На томограмі у центрі тіні визначається деструкція. У харкотинні виявлено МБТ. Хворому встановлено діагноз вогнищового туберкульозу. Яким фазам туберкульозного процесу відповідають виявлені зміни?
Правильна відповідь	Інфільтрації та розпаду
B	Інфільтрації та обсіменіння
C	Розсмоктування і рубцювання
D	Розпаду і обсіменіння
E	Ущільнення і розсмоктування

№	крок 2013
Тема	Позалегеневий туберкульоз
Текст завдання	Хворий страждає на дисемінований туберкульоз легень 5 років. Останнім часом з'явилися біль у поперековій ділянці, часті сечовипускання. У сечі: кисла реакція, протеїнурія; при бактеріоскопії мазка сечі - кислотостійкі бактерії. Яке ураження нирок у цього хворого?
Правильна відповідь	Туберкульоз нирок
B	Амілоїдоз
C	Гломерулонефрит
D	Пієлонефрит
E	Гідронефроз
№	крок 2013
Тема	Позалегеневий туберкульоз
Текст завдання	Хворий 18-ти років скаржиться на припухлість правого гомілковоступневого суглоба, обмеження рухливості, болі, що посилюються під час ходи. В анамнезі "віраж" туберкулінових проб у 7-річному віці. Лікування не приймав через відмову батьків. Рентгенологічно: дистальне епіметафізне вогнище з деструкцією епіфізу великогомілкової кістки, суглобова щілина різко звужена. Реакція Манту з 2 ТО- 18 мм. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Туберкульозний остит правого гомілковоступневого суглоба
B	Епіфізарний остеомієліт
C	Саркома правого гомілковоступневого суглоба
D	Сифіліс правого гомілковоступневого суглоба
E	Травматичний артрит
№	крок 2013
Тема	Лікування туберкульозу
Текст завдання	Хворий 67-ми років перебуває на стаціонарному лікуванні у протитуберкульозному диспансері впродовж двох місяців з приводу рецидиву туберкульозу (24.02.2005) S6 лівої легені (інфільтративний). Хворому призначено наступне лікування: ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол. У хворого з'явилися скарги на диплопію, обмеження поля зору. Який з вищезазначених препаратів викликав таку побічну дію?
Правильна відповідь	Етамбутол
B	Ізоніазид
C	Піразинамід
D	Стрептоміцин
E	Рифампіцин
№	Крок 2019

Текст завдання	Чоловіка 45-ти років доставлено до лікаря після повідомлення про випадок активного туберкульозу у його колеги з яким він працює в одному офісному приміщенні. Скарг не має. Після проведення туберкулінової проби розмір папули становить 14 мм. Даних про результат попередньої проби немає. Який з наступних кроків лікаря є найбільш доречним?
Правильна відповідь	Рентгенографія органів грудної клітки
B	Призначення ізоніазиду, рифампіцину та етамбутолу
C	Повторна туберкулінова проба через 3 місяці
D	Карантин на 3 місяці
E	Забір мокротиння для виявлення мікоба-ктерій туберкульозу
№	Крок 2020
Тема	Позалегеновий туберкульоз. Туберкульоз кісток і суглобів.
Текст завдання	У хворого 33-х років біль у грудному відділі хребта з корінцевим синдромом, підвищення температури тіла до 38-39°C упродовж 2-х місяців. Об'єктивно: біль при пальпації у проекції остистих відростків Th9-10. Комп'ютерна томографія грудного відділу: у ТЬ9-10 множинні деструкції, які містять кісткові секвестри, навколо хребців візуалізується паравертебральний натічний абсцес. Проба Манту з 2 ТО - папула 19 мм. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Туберкульозний спондиліт
B	Анкілозуючий спондилоартрит
C	Неспецифічний остеомиєліт хребта
D	Травматичний спондиліт
E	Метастатичне ураження хребта
№	Крок 2020
Тема	Профілактика туберкульозу
Текст завдання	На прийом до педіатра звернулась ма-ти із 4-и місячною дитиною зі скаргами на підвищення температури до 37,5oC. Дитина народжена доношеною, 8-9 балів за шкалою Апгар. При аналізі медичної документації виявлено, що у дитини немає щеплення проти туберкульозу. В які часові терміни повинно було проведене щеплення проти туберкульозу?
Правильна відповідь	Доношена дитина, 3-5 доба життя
B	Доношена дитина, не пізніше 48 годин від народження
C	Протягом першого тижня життя
D	Протягом перших 24 годин життя
E	Протягом перебування в пологовому будинку після попередньої проби Манту
№	Крок 2020

Тема	Загальні принципи лікування. Антимікобактеріальні препарати. Стандартні режими лікування хворих на туберкульоз.
Текст завдання	Хвора 25-ти років вагітність 12 тижнів, госпіталізована у протитуберкульозну лікарню із вперше виявленим інфільтративним туберкульозом верхньої частки лівої легені. Бактеріовиділювач. Відмовилась від абразіо. Який із перерахованих протитуберкульозних препаратів не можна призначати цій хворій?
Правильна відповідь	Стрептоміцин
B	Ізоніазид
C	Рифампіцин
D	Піразинамід
E	Етамбутол