

№	крок 2023
Тема	профілактика
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулися батьки восьмирічної дівчинки для профілактичного огляду дитини. Після огляду лікар встановив, що індекс кп+КПУ=12. Яку концентрацію іонів фтору у зубній пасті доцільно рекомендувати для індивідуального гігієнічного догляду за зубами дитині з високим рівнем інтенсивності карієсу?
Текст завдання	A. 1500 ppm
B	A. 1100 ppm
C	A. 1000 ppm
D	A. 900 ppm
E	A. 500 ppm
№	крок 2023
Тема	захворювання слизової оболонки
Текст завдання	У дворічної дівчинки третій день спостерігається підвищення температури тіла до 38°C. Вона неспокійна, відмовляється від їжі. Під час огляду на яскраво гіперемованій слизовій оболонці губ, щік та м'якого піднебіння виявлено чисельні дрібні ерозії, вкриті фібринозним нальотом. Підщелепні лімфатичні вузли болісні, дещо збільшені. Визначається гострий катаральний гінгівіт. Який лікарський засіб доцільно призначити для етіотропного лікування у цьому разі?
Текст завдання	Ацикловір
B	Солкоссрил
C	Гідрокортизон
D	Метрогіл
E	Клотримазол
№	крок 2023
Тема	карієс

Текст завдання	У трирічної дитини на жувальній по-верхні 74 зуба лікарем-стоматологом виявлено каріозну порожнину, що розташована у межах плащового дентину. Під-риті краї емалі мають матово-білий колір. Дентин каріозної порожнини світлий, м'який, знімається пластами. Зондування смалево-дентинної межі чутливе. Реакція на холодний подразник болісна, але швидко проходить після його усунення. Який матеріал доцільно використати для пломбування каріозної порожнини в цьо-му разі?
Текст завдання	Склоіономерний цемент
B	Цинкфосфатний цемент
C	ICON
D	Амальгаму
E	Композитний пломбувальний матеріал
№	крок 2023
Тема	захворювання пародонту
Текст завдання	Батьки одинадцятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровоточивість ясен під час їжі у дитини, неприємний запах із рота, підвищення температури тіла до 37,4°C. З анамнезу відомо: нещодавно хлопчик перехворів ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен яскраво гіпсерована, легко кровоточить під час доторкання, верхівки ясенних сосочків укріті сіруватим некротичним нальотом, після видалення якого оголюється виразкова поверхня. Велика кількість зубного нальоту. Який збудник цього захворювання?
Текст завдання	Анаеробна мікрофлора
B	Дріжджеподібні гриби
C	Стафілококи
D	Стрептококи
E	(R Вірус герпесу

№	крок 2023
Тема	захворювання пародонту
Текст завдання	Дівчинка віком 13 років скаржиться на припухлість та кровоточивість ясен під час чищення зубів протягом останніх півроку. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен у ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи набрякла, має ціанотичне забарвлення. Ясенні сосочки округлої форми, пастозні, збільшені у розмірах і перекривають коронкові частини зубів на 1/3 висоти. Відзначається вестибулярне положення 13 і 23 зубів. Який попередній діагноз?
Текст завдання	Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
В	Хронічний катаральний гінгівіт
С	Гострий катаральний гінгівіт
D	Локалізований пародонтит Г ступеня
Е	Генералізований пародонтит Г ступеня
№	крок 2023
Тема	карієс
Текст завдання	У дівчини віком 16 років лікар-стоматолог виявив ділянки емалі білого кольору, що втратили природний блиск у пришийкових ділянках 11 і 21 зубів. Поверхня емалі під час зондування гладенька, щільна. Термодіагностика негативна. Пошкоджені ділянки забарвлюються 2%-м водним розчином метиленового синього. Для лікування початкового карієсу застосовується метод інфільтрації. Виберіть матеріал для виконання цієї методики.
Текст завдання	ICON
В	Склоіономерний цемент
С	Компомер
D	Гідроксидкальційвмісна паста
Е	Розчин нітрату срібла
№	крок 2023

Тема	пульпіт
Текст завдання	Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на періодичну кровотечу у ділянці зуба нижньої щелепи справа. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні 46 зуба каріозна порожнина заповнена м'якою тканиною червоного кольору. Поверхнєве зондування злегка болюче, більш глибоке — провокує біль та кровотечу. На температурні подразники зуб майже не реагує. Перкусія 46 зуба безболісна. Під час рентгенологічного дослідження патологічних змін у ділянці періодонта зуба не виявлено. Який імовірний діагноз?
Текст завдання	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
В	Хронічний фіброзний пульпіт
С	Хронічний локалізований гіпертрофічний гінгівіт
D	Хронічний гранулюючий періодонтит
Е	Хронічний гангренозний пульпіт
№	крок 2023
Тема	пульпіт
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулися батьки восьмирічного хлопчика зі скаргами на відлам коронки переднього зуба у дитини, що виник 2 години тому після травмування під час спортивних змагань. Об'єктивно спостерігається: коронка 11 зуба відсутня на одну третину, пульпа точково оголена, яскраво-червоного кольору, різко болісна під час зондування. Перкусія зуба чутлива. Виберіть доцільний метод лікування 11 зуба
Текст завдання	Консервативний
В	Вітальна екстирпація
С	Девітальна екстирпація
D	Видалення зуба
Е	Вітальна ампутація

№	крок 2023
Тема	карієс
Текст завдання	У хлопчика віком 13 років під час лікування гострого глибокого карієсу 25 зуба на етапі препарування лікар-стоматолог випадково перфорував иульпову камеру у проекції рогу пульпи. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога?
Текст завдання	Застосувати матеріал групи МТА
В	Застосувати девіталізуючу пасту
С	Запломбувати каріозну порожнину склоіономерним цементом
Д	Провести вітальну екстирпацію пульпи
Е	Провести діатермокоагуляцію пульпи
№	крок 2023
Тема	пульпіт
Текст завдання	Шестирічній дитині проводиться лікування гострого дифузного пульпіту 85 зуба методом вітальної екстирпації пульпи. Матеріал якої групи найдоцільніше використати у цьому разі для постійної obturaції корневих каналів?
Текст завдання	Цинк-евгенольні насти
В	Склоіономерні цементи
С	Пасти на основі епоксидної смоли з гутаперчевими штифтами
Д	Цинк-фосфатні цементи
Е	Пасти на основі гідроксиду кальцію
№	крок 2023
Тема	карієс

Текст завдання	Під час огляду дванадцятирічної дівчинки лікарем-стоматологом на медіально-контактній поверхні 46 зуба виявлено каріозну порожнину у межах плащового дентину, стінки і дно якої пігментовані, щільні. Реакція на температурні подразники відсутня. Препарування 46 зуба у ділянці емалево-денгінного з'єднання болісне. КПВ+кн = 2. Виберіть оптимальний пломбувальний матеріал у цьому разі
Текст завдання	Фотополімерний композит
В	Амальгама
С	Силікофосфатний цемент
D	Склоіономерний цемент
Е	Цинк-фосфатний цемент
№	крок 2023
Тема	періодонтит
Текст завдання	Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на різкий, пульсуючий біль у зубі нижньої щелепи, що посилюється під час накушування. Діагностовано гострий гнійний періодонтит 75 зуба. Яку тактику лікування треба застосувати у цьому разі?
Текст завдання	Екстракцію зуба
В	Ендодонтичне лікування з постійною обтурацією корневих каналів
С	Розкриття зуба, призначення полоскання
D	Ендодонтичне лікування з накладанням тимчасової лікувальної пов'язки
Е	Накладання девіталізуючої пасти
№	крок 2023
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	Лікар-стоматолог проводить профілактичний огляд дівчини віком 12 років. Об'єктивно спостерігається: шкіра обличчя бліда, червона облямівка губ суха та вкрита лусочками, у кутах рота тріщини. Слизова оболонка порожнини рота бліда, набрякла, язик яскраво-червоний, гладкий, ниткоподібні сосочки атрофовані. Яке загальносоматичне захворювання супроводжується такими симптомами?
Текст завдання	Залізодсфіцитна анемія
В	Гострий лейкоз
С	Гемофілія
Д	Хвороба Верльгофа
Е	Хвороба Вілнербранда
№	крок 2023
Тема	захворювання слизової оболонки
Текст завдання	Дев'ятирічна дитина скаржиться на появу болісних висипань на губах. Об'єктивно спостерігається: червона облямівка губ набрякла, гіперемована, вкрита тріщинками та численними кров'янистими кірками. На шкірі навколо губ наявні дрібні пухирці з серозним умістом, що в окремих ділянках зливаються між собою. Спостерігається мацерація та мокнуття шкіри, особливо у кутах рота. Який тип хейліту розвинувся у пацієнтки?
Текст завдання	Екзематозний
В	Метеорологічний
С	Актинічний
Д	Атопічний
Е	Ексфоліативний
№	крок 2023
Тема	карієс

Текст завдання	Під час профілактичного огляду семирічної дівчинки лікарем-стоматологом виявлено крейдоподібні плями у пришийковій ділянці вестибулярної поверхні 11, 21 зубів. Плями мають матову поверхню, гладенькі під час зондування, зафарбовуються метиленовим синім. Виберіть доцільний метод лікування у цьому разі.
Текст завдання	Глибоке фторування
В	Імірегнаційна терапія
С	Пломбування дефектів
Д	Зашліфовування дефектів
Е	Диспансерне спостереження
№	крок 2017
Тема	Захворювання тканин пародонту у дітей
Текст завдання	Батьки дівчинки 3-х років скаржаться на рухомість зубів. Об'єктивно: зуби рухомі, ясенні сосочки набряклі, синюшні, спостерігаються патологічні кишени з гнійним ви-діленням. Відмічається підвищене орого-віння шкіри, особливо долоней і підшов. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Хвороба Папійона-Лефевра
В	Хвороба Такахара
С	Хвороба Гоше
Д	Хвороба Німмона-Піка
Е	Хвороба Таратинова
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей

Текст завдання	Хлопчик 9-ти років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури. Об'єктив-но: катаральний гінгівіт, нальот на язиці, гіперемія піднебінних дужок, гіпертрофія мигдаликів, неприємний запах із роту, лім-фаденіт. За даними педіатра - збільшення печінки, селезінки, виразний моноцитоз. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Інфекційний мононуклеоз
В	Гострий герпетичний стоматит
С	Багатоформна ексудативна ерітема
Д	Герпетичена ангіна
Е	Синдром Стівенса-Джонсона
№	крок 2017
Тема	Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	Хлопчик 8-ми років скаржиться на біль в зубі під час їжі. Об'єктивно: в 55 на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, відмічається кровоточивість, перкусія безболісна. Яку пасту необхідно накласти в перше відвідування?
Правильна відповідь	Параформальдегідна
В	Миш'яковиста
С	Резорцин-формалінова
Д	Тимолова
Е	Кальційвмісна
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей
Текст завдання	Дівчинка 8-ми років скаржиться на біль у роті під час їжі. Об'єктивно: на перехідній складці у фронтальному відділі нижньої щелепи ерозія овальної форми, вкрита жовтуватим нальотом, ерозія з облямів-кою червоного кольору, розміром - 5x7 мм. Така ерозія була рік тому. Визначте діа-гноз:

Правильна відповідь	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
B	Гострий герпетичний стоматит
C	Синдром Бехчета
D	Афта Сетона
E	-
№	крок 2017
Тема	Карієс тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	Під час профілактичного огляду у 4,5-річної дитини виявлені приховані каріозні порожнини на контактних поверхнях 54 і зубів. Після видалення навислих країв емалі розм'якшений дентин був легко видалений екскаватором у межах плащово-го дентину. Оберіть оптимальний матеріал для постійної пломби:
Правильна відповідь	Компомерний матеріал
B	Композитний матеріал
C	Силікатний цемент
D	Силікофосфатний цемент
E	Полікарбоксилатний цемент
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей
Текст завдання	Мати дитини 1,5 років звернулася зі скаргами на наявність виразок на слизовій оболонці порожнини рота, слинотечу, в'ялість дитини, блювання, підвищення температури тіла до 39°С . Дитина хворіє другий день, захворіла раптово. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі. На слизовій оболонці язика, щік, губ знаходяться ерозії овальної форми, діаметром 2-3 мм, вкритих білуватим нальотом, болісні під час пальпації. На шкірі обличчя навколо губ 4 міхурці, наповнені напівпрозорим вмістом. Підщелепові лімфовузли збільшені. Який попередній діагноз?

Правильна відповідь	Гострий герпетичний стоматит
B	Гострий грибковий стоматит
C	Багатоформна ексудативна еритема
D	Медикаментозний стоматит
E	Рецидивуючий герпетичний стоматит
№	крок 2017
Тема	Профілактика карієсу зубів у дітей
Текст завдання	У жіночій консультації було проведено бесіди з вагітними жінками про значення характеру харчування для закладки та розвитку зубів майбутньої дитини. На якому тижні внутрішньоутробного розвитку починається закладка фолікулів тимчасових зубів у плода?
Правильна відповідь	7-ий
B	15-ий
C	18-ий
D	4-ий
E	12-ий
№	крок 2017
Тема	Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	У дитини 9-ти років при санації поро-жнини рота в 85 зубі на жувальній поверхні виявлена каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. При зондуванні ви-никає різкий біль, помірна кровоточивість. Від холодної води повільно проходить біль. Перкусія зуба безболісна. Виберіть опти-мальний метод лікування:
Правильна відповідь	Девітальна ампутація
B	Вітальна екстирпація
C	Девітальна екстирпація
D	Вітальна ампутація
E	Біологічний метод

№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей
Текст завдання	У хлопчика 7-ми років діагностовано хронічний періодонтит 64 та 85 зубів. Дитина страждає на гемофілію А. Визначте лікувальну тактику:
Правильна відповідь	Видалення можливе в гематологічному відділенні, після проведення відповідної підготовки
В	Видалення можливе як в щелепно-лицевому стаціонарі, так і в амбулаторії після відповідної підготовки
С	Видалення зубів можливе в амбулаторних умовах; після видалення слід тампону-вати альвеоли гемостатичною губкою
Д	Видалення зубів можливе в щелепно-лицевому відділенні
Е	Видалення зубів протипоказане через високу імовірність кровотечі
№	крок 2017
Тема	Некаріозні ураження твердих тканин зубів у дітей
Текст завдання	Оглядаючи дитину 5-ти років, лікар знайшов множинні крейдоподібні цятки, яскраво-жовтого кольору, що уражають емаль більшості зубів верхньої і нижньої щелеп. При висушуванні плями здобувають матовий відтінок і глянцеvu поверхню. При фарбуванні 2% розчином метилено-вого синього, забарвлення не відбувається. Дитина мешкає в місцевості з вмістом фто-ру у воді 2,0 мг/л. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Флюороз зубів
В	Системна гіпоплазія емалі
С	Мармурова хвороба
Д	Недосконалий амелогенез
Е	Недосконалий дентиногенез
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей

Текст завдання	Мати дівчинки 4-х років скаржитися на підвищення температури тіла у дитини до 39 ^o С , кашель, нежить. Регіональні лімфатичні вузли збільшені. При огляді ротової порожнини на гіперемованій слизовій оболонці щік у ділянці кутніх зубів виявлені точкові плями розміром за шпилькову голівку, що нагадують бризки вапна. Під час пальпації уражених ділянок відчувається нерівність слизової оболонки. Вкажіть імо-вірний діагноз:
Правильна відповідь	Стоматит при корі
В	Стоматит при вітряній віспі
С	Стоматит при краснусі
Д	Багатоформна ексудативна еритема
Е	Гострий герпетичний стоматит
№	крок 2017
Тема	Профілактика карієсу зубів у дітей
Текст завдання	У дівчинки 6-ти років індекс КПУ+кп дорівнює 3,0. ГІ за Федоровим-Володкіною - 3. У перших постійних молярах визначаються глибокі слабомінералізовані фісури. Який метод є оптимальним для профіла-ктики карієсу у цих зубах?
Правильна відповідь	Герметизація фісур
В	Імпрегнація азотнокислим сріблом
С	Аплікації 3% розчину ремодента
Д	Аплікація 0,2% розчину фурациліну
Е	Покриття зубів фтористим лаком
№	крок 2017
Тема	Захворювання тканин пародонту у дітей

Текст завдання	Пацієнт 12-ти років тиждень тому переніс ГРВІ. Скарги на біль і свербіж у яснах, кровоточивість під час прийому їжі. На верхній і нижній щелепах ясна гіперемовані, набряклі, кровлять під час дотику інструментом, індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5 бали, індекс КПУ- 6, проба Шилера-Пісарева позитивна. Який най-більш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного катарального гінгівіту
В	Хронічний катаральний гінгівіт
С	Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
Д	Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма
Е	Пародонтит, стадія загострення
№	крок 2017
Тема	Захворювання тканин пародонту у дітей
Текст завдання	У юнака 17-ти років скарги на нездужання, лихоманку, болі у ясні. Захворів 2 дні тому, температура тіла - 38,5°С. Регіональні лімфовузли збільшені, болісні, рухливі. Ясна на нижній щелепі гіперемована, набрякла, ясенні сосочки кровлять, по краю сірувато-білий наліт, сосочки у ділянці 41, 42, 43 відсутні. Яка мікрофлора най-більш імовірно буде виявлена при мікробіологічному дослідженні?
Правильна відповідь	Фузо-спірилярний симбіоз
В	Стрептококи
С	Дифтерійна паличка
Д	Дріжджеподібні гриби
Е	Стафілококи
№	крок 2017
Тема	Періодонтит тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	У дівчинки 5-ти років діагностовано загострення хронічного періодонтиту 75 зуба. Дитина страждає на хронічний гломерулонефрит. Визначте лікувальну тактику:

Правильна відповідь	Видалення 75 зуба
B	Ендодонтичне лікування 75 зуба
C	Ендодонтичне лікування 75 зуба та пері-остотомія
D	Ендодонтичне лікування 75 зуба та при-значення протизапальної терапії
E	Видалення 75 зуба та періостотомія
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей
Текст завдання	Хлопчик 10-ти років скаржиться на на-явність болючої виразки в роті, яка збіль-шується і не гоїться вже 1,5 місяці, Об'є-ктивно: на слизовій щоки неглибока вираз-ка діаметром 2 см з нерівними підритими краями, м'якої консистенції. Дно виразки горбисте, вкрите жовто-сірим нальотом. Навколо виразки багато дрібних горбиків жовтуватого кольору. Регіонарні лімфати-чні вузли еластичні, болісні, спаяні в паке-ти. Проявом якого захворювання можуть бути дані симптоми?
Правильна відповідь	Туберкульоз
B	Червоний плескатий лишай
C	Виразково-некротичний стоматит
D	Рак
E	Сифіліс
№	крок 2017
Тема	Періодонтит тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	У 6-річної дитини біль у зубі і припухлість обличчя зліва. Об'єктивно: стан задовільний, температура тіла - $37,5^{\circ}C$. Обличчя асиметричне через колатераль-ний набряк м'яких тканин щічної і підще-лепної ділянок зліва. У 74 зубі пломба, пер-кусія болісна, рухливість I ступеня. Пере-хідна складка у 74, 75 згладжена, слизова гіперемована. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний періостит

В	Гострий гнійний періостит
С	Одонтогенний остеомієліт
Д	Гострий гнійний пульпіт 74 зуба
Е	-
№	крок 2017
Тема	Захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей
Текст завдання	Батьки дитини 3-х років скаржаться на появу у неї болісних висипань і відмову від їжі. Під час огляду: на шкірі навколоротової ділянки - 10 пухирців з геморагічним вмістом. На слизовій оболонці губ - декілька афт округлої форми, діаметром 1-3 мм. Визначаються гострий катаральний гінгівіт і підщелепний лімфаденіт. Оберіть за-соби для етіотропного лікування:
Правильна відповідь	Противірусні
В	Протизапальні
С	Протигрибкові
Д	Гіпосенсибілізуючі
Е	Антибіотики
№	крок 2017
Тема	Карієс тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	Батьки 3-річної дитини скаржаться на руйнування зубів верхньої щелепи. Об'єктивно: на жувальних поверхнях 54, 55 зубів виявлені каріозні порожнини у межах емалево-дентинного сполучення. Емаль в ділянці ураження розм'якшена, легко видаляється екскаватором. Дитина відмовля-ється від препарування, її психоемоційний стан нестабільний. Який метод лікування слід запропонувати у даному випадку?
Правильна відповідь	ART-методика
В	Ремінералізуюча терапія
С	Покриття фтор-лаком

D	Інвазивна герметизація
E	Неінвазивна герметизація
	крок 2017
№	Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей
Тема	До лікаря-стоматолога звернулася 12-річна дівчинка зі скаргами на самовільний, нападоподібний біль із короткочасними безбольовими проміжками, тривалістю 10-
Текст завдання	хв., у ділянці 16 зуба, який посилюється вночі при горизонтальному положенні ті-ла, що виник 2 доби тому. При об'єктив-ному обстеженні 16 зуба виявлено глибоку каріозну порожнину, заповнену розм'якше-ним дентином. Зондування болісне по всьо-му дну, вертикальна перкусія злегка боли-сна, біль посилюється від температурних подразників, електрозбудливість пульпи - 15-20 мкА. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий дифузний пульпіт
B	Хронічний конкрементозний пульпіт
C	Гострий обмежений пульпіт
D	Частковий дифузний пульпіт
E	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2017
Тема	Захворювання тканин пародонту у дітей
Текст завдання	Хвора 12-ти років скаржиться на кровоточивість, виражений біль в яснах и рухливість нижніх фронтальних зубів. Страждає цукровим діабетом з 5 років. Об'є-ктивно: ясна гіперемовані, міжзубні сосо-чки набряклі, розпушені, зуби рухливі, па-родонтальні кишені до 5 мм з гнійним вмі-стом. На рентгенограмі альвеолярного па-ростку у ділянці нижніх фронтальних зубів визначається деструкція компактної пла-стинки та губчастої речовини міжзубних перегородок до 1/3 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Генералізований пародонтит, загострення

B	Локалізований пародонтит, хронічний перебіг
C	Локалізований пародонтит у стадії заго-стрення
D	Генералізований пародонтит, хронічний перебіг
E	Катаральний гінгівіт, хронічний перебіг
№	крок 2017
Тема	Періодонтит тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	Хлопчик 10-ти років скаржиться на біль у верхньому зубі справа, який посилюється при накушуванні на 65 зуб. Біль з'явився 2 дні тому. Раніше зуб був лікований. Об'єктивно: коронка 65 зуба змінена в кольорі, зруйнована на 2/3, перкусія різко болюча. Слизова оболонка в ділянці проєкції верхівок кореня 65 зуба гіперемована, пальпація болісна. Який з наступних діагнозів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Загострення хронічного періодонтиту
B	Гострий гнійний періостит верхньої щелепи
C	Гострий одонтогенний остеомієліт
D	Гострий серозний періодонтит
E	Гострий гнійний періодонтит
№	крок 2017
Тема	Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	Дитина 7-ми років скаржиться на біль під час їжі у верхньому правому кутньому зубі. На жувальній поверхні 55 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину, яка сполучається з порожниною зуба. При зондуванні сполучення виникає різкий біль, помірна кровоточивість. Перкусія зуба безболісна. Рентгенологічно змін у періодонті 55 зуба немає. Виберіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний пульпіт
B	Хронічний гангренозний пульпіт
C	Загострення хронічного фіброзного пульпіту

D	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
E	Загострення хронічного гангренозного пульпіту
№	крок 2017
Тема	Карієс тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	Батьки 4-річної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи дитини. Об'єктивно: в пришийко-вій ділянці вестибулярної поверхні різців верхньої щелепи виявлені дефекти, які не перетинають емалево-дентинного сполучення і мають вигляд ділянок крейдоподібно зміненої емалі з видимим руйнуванням її структури. При зондуванні визначається шорстка, розм'якшена поверхня. Реакція на холодові подразники відсутня. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий поверхневий карієс
B	Гострий середній карієс
C	Гострий початковий карієс
D	Хронічний початковий карієс
E	Хронічний поверхневий карієс
№	крок 2017
Тема	Періодонтит тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	Хлопчик 12-ти років скаржиться на постійний інтенсивний пульсуючий біль у зубі. Об'єктивно: підщелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації, у 26 - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на термічні подразники, зондування дна безболісна, перкусія різко болюча, зуб рухомий, слизо-ва оболонка в ділянці 26 гіперемована, на-брякла. Під час некретомії розкрита порожнина зуба, отримана крапля ексудату. На рентгенограмі 26 змін немає. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий гнійний періодонтит
B	Загострення хронічного періодонтиту
C	Гострий одонтогенний періостит

D	Гострий гнійний пульпіт
E	Гострий серозний періодонтит
№	крок 2017
Тема	Захворювання тканин пародонту у дітей
Текст завдання	У дитини 6-ти місяців на слизовій обо-лонці гребеня альвеолярного відростка верхньої щелепи визначається утворення кулястої форми, м'яко-еластичної конси-стенції діаметром 6 мм з вмістом блакитно-го відтінку, що просвічується. Який най-більш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гематома прорізування
B	Фіброма
C	Фолікулярна кіста
D	Радикулярна кіста
E	Папілома
№	крок 2017
Тема	Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей
Текст завдання	У хлопчика 12-ти років в ділянці 46 зуба виникає тривалий біль від прийому гарячої їжі. Об'єктивно: коронка 46 зуба брудно-сірого кольору, глибока каріозна порожнина виповнена розм'якшеним ден-тином. Є сполучення з пульповою каме-рою, глибоке зондування болюче. Тепло-вий подразник викликає біль, який повіль-но вщухає. Перкусія 46 безболісна. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Хронічний гангренозний пульпіт
B	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
C	Хронічний глибокий карієс
D	Хронічний фіброзний пульпіт
E	Хронічний гранулюючий періодонтит
№	крок 2016
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	При обстеженні дитини 5ти років був встановлений діагноз: гострий загальний пульпіт 74 зуба. Який метод лікування найбільш раціональний у даному випадку?
Правильна відповідь	Екстирпація пульпи
B	Вітальна ампутація
C	Девітальна ампутація
D	Біологічний метод
E	Видалення зуба
№	крок 2016
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	У дівчинки 9ти років при визначенні гігієнічного індексу за ФедоровимВолодкіною зафарбувалось 3/4 поверхні кожного зуба. Який стан гігієни порожнини рота у даної дитини буде визначений при обчисленні індексу?
Правильна відповідь	Дуже поганий
B	Хороший
C	Задовільний
D	Незадовільний
E	Поганий
№	крок 2016
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	Під час профогляду у 11річної дівчинки встановлена відсутність емалі на горбиках молярів та однакові за розміром білі плями з чіткими контурами на однойменних зубах. Жувальна поверхня молярів шорстка, тверда, зондування безболісне, поверхня плям блискуча, не фарбується 1% розчином метиленового синього. Який з зазначених діагнозів вірний?
Правильна відповідь	Системна гіпоплазія
B	Місцева гіпоплазія
C	Множинний карієс

D	Підвищене стирання зубів
E	Флюороз
№	крок 2016, 2013
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчинка 12ти років скаржиться на біль у порожнині рота під час прийому їжі, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Біль з'явився три дні тому. Об'єктивно: температура 38, 2° С . У порожнині рота ясенний край на верхній та нижній щелепах вкритий сіруватим нальотом, легко кровить. Ясенні сосочки у 42, 41, 31, 32 відсутні, звиразкування по краю ясни. З якої групи лікарських препаратів необхідно почати місцеве лікування у даному випадку?
Правильна відповідь	Знеболюючі
B	Ферменти
C	Протизапальні
D	Кератопластики
E	Антисептики
№	крок 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Батьки відмічають у дитини 3х років постійний біль у передніх зубах верхньої щелепи. Об'єктивно: коронкова частина б1 зуба має сірий колір, зруйнована. Зондування устя кореневого каналу болісне, супроводжується кровоточивістю. Перкусія зуба різко болісна. На гіперемованій, набряклій, болісній під час пальпації слизовій оболонці в ділянці б1, б2 зубів визначається нориця. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного періодонтиту
B	Гострий гнійний періодонтит
C	Гострий дифузний пульпіт

D	Хронічний гранулюючий періодонтит
E	Загострення хронічного пульпіту
№	крок 2016, 2015
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Хвора скаржиться на біль від кислого і солодкого в 11 зубі. На вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 11 зуба на фоні крейдоподібно зміненої емалі наявний дефект у межах емалево-дентинної границі зі світлим дном. Зондування болісне, перкусія і холодова проба безболісні. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Гострий поверхневий карієс
B	Гострий початковий карієс
C	Гострий середній карієс
D	Гіоплазія емалі
E	Флюороз
№	крок 2016, 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Підліток 14-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно: слизова ясен гіперемована, пастозна, відзначається кровоточивість. Проба Шилера-Пісарєва позитивна. Індекс РМА 70%. ГІ 3,0. На Рограмі фронтальної ділянки змін немає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний катаральний гінгівіт
B	Хронічний пародонтит
C	Гострий катаральний гінгівіт
D	Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
E	Загострення хронічного пародонтиту
№	крок 2016, 2007
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	У пацієнта 46ти років при об'єктивному обстеженні на жувальній поверхні 46 зуба виявили каріозну порожнину в межах плащового дентину. Каріозна порожнина заповнена залишками їжі, стінки та дно заповнені пігментованим дентином, зондування дна та стінок не викликає больових відчуттів, термопроба не болюча, ЕОД 4 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
В	Гострий середній карієс
С	Хронічний глибокий карієс
Д	Гострий початковий карієс
Е	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2016
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Дитина 13ти років скаржиться на випадіння пломби у 22 зубі. Об'єктивно: у 22 зубі каріозна порожнина, частково заповнена пломбувальним матеріалом. Зуб змінений у кольорі. Зондування, термометрія безболісні. Перкусія викликає незначний біль. На рентгенограмі: у верхівки кореня визначається вогнище деструкції кісткової тканини округлої форми з чіткими контурами до 3 мм у діаметрі. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гранулематозний періодонтит
В	Хронічний простий пульпіт
С	Хронічний фіброзний періодонтит
Д	Хронічний гранулюючий періодонтит
Е	Хронічний гангренозний пульпіт
№	крок 2016, 2013
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Текст завдання	У дитини 9ти років під час профілактичного огляду виявлені крейдоподібні плями у пришийковій ділянці 12, 11, 21, 22 зубів. Поверхня плям шорсткувата, тьмяна, зафарбовується метиленовим синім. Холодова проба безболісна. Який метод лікування?
Правильна відповідь	Ремінералізуюча терапія
B	Пломбування
C	Зішліфовування пошкоджених ділянок
D	Імпрегнація нітратом срібла
E	Покриття зубів фторлаком
№	крок 2016
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дівчинка 14ти років скаржиться на сухість губ. Об'єктивно: червона облямівка губ гіперемована, у зоні ураження видно напівпрозорі лусочки сірого кольору, що прикріплені своїм центром до червоної облямівки і дещо відстають по краям. Губи сухі, лущаться. Лусочки легко знімаються, під ними оголюється застійночервона поверхня. У дівчинки звичка постійно скушувати лусочки. Встановіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Ексфоліативний хейліт
B	Гландулярний хейліт
C	Метеорологічний хейліт
D	Актинічний хейліт
E	Екзематозний хейліт
№	крок 2016, 2011
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	У дитини 8-ми років у 75 на дистальноапроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна, від холодної води повільно минаючий біль. Зуб зруйнований кілька місяців тому, не лікувався. Який метод лікування доцільний у даному випадку?
Правильна відповідь	Девітальна ампутація
В	Біологічний метод
С	Вітальна екстирпація
Д	Вітальна ампутація
Е	Девітальна екстирпація
№	крок 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Дитина 5-ти років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа, що посилюється вночі та під час вживання холодного. Об'єктивно: у 65 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води виникає біль, що повільно минає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного пульпіту
В	Гострий періодонтит
С	Загострення хронічного періодонтиту
Д	Гострий серозний пульпіт
Е	Гострий гнійний пульпіт
№	крок 2016, 2015
Тема	ПЕРІОДОНТИТ

Текст завдання	Дитина 4х років скаржиться на гострий біль у зубі на нижній щелепі, що з'явився добу тому. Об'єктивно: на жувальній поверхні 74 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, зондування і перкусія різко болісні, термометрія тривала. Ясна у ділянці 74 зуба гіперемована, набрякла. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий пульпіт, ускладнений періодонтитом
В	Гострий серозний періодонтит
С	Гострий гнійний пульпіт
Д	Загострення хронічного періодонтиту
Е	Гострий серозний пульпіт
№	крок 2016
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	У 12-річної дитини на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 визначаються крейдоподібні плями, емаль без блиску, під час зондування дещо піддатлива. В анамнезі короткочасний біль від хімічних подразників. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс
В	Гострий поверхневий карієс
С	Флюороз зубів
Д	Хронічний початковий карієс
Е	Системна гіоплазія емалі
№	крок 2016
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	У дитини 5ти років кровоточивість ясен впродовж місяця, неприємний запах з рота. В анамнезі часті кровотечі з носа, втомлюваність. Об'єктивно: шкіра обличчя і слизова оболонка порожнини рота бліда, наявні дрібні крововиливи. Ясна яскраво гіперемовані, набряклі, кровлять. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, рухливі, безболісні. Консультація якого спеціаліста необхідна у першу чергу?
Правильна відповідь	Гематолог
B	Нервопатолог
C	Ендокринолог
D	Інфекціоніст
E	Гастроентеролог
№	крок 2016, 2015, 2013, 2012
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчинка 13-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання твердої їжі. Об'єктивно: слизова оболонка ясен верхньої та нижньої щелеп дещо набрякла, гіперемована. Стан гігієни порожнини рота незадовільний. На рентгенограмі змін не виявлено. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний катаральний гінгівіт
B	Гострий катаральний гінгівіт
C	Гіпертрофічний гінгівіт
D	Десквамативний гінгівіт
E	Хронічний атрофічний гінгівіт
№	крок 2016, 2017
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Хвора 17ти років скаржиться на біль в зубі, який виник вперше. Тривалість болю до 2 хвилин. Об'єктивно: в 15 зубі глибока каріозна порожнина. Зондування дна чутливе. Перкусія безболісна. ЕОД 12 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гіперемія пульпи

В	Гострий обмежений пульпіт
С	Гострий дифузний пульпіт
Д	Гострий періодонтит
Е	Загострення хронічного пульпіту
№	крок 2016
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	На консультацію до лікарястоматолога звернулися батьки дівчинки бти років. Дитина захворіла день тому, температура 38, 2° С , нежить, кашель. У порожнині рота на набряклій гіперемійованій слизовій оболонці в проекції молярів визначаються плями білуватожовтого кольору з яскравочервоною облямівкою, розміром з булавочну головку, що виступають над рівнем слизової оболонки. На слизовій м'якого піднебіння яскравочервоні плями неправильної форми. Це є зміни слизової оболонки порожнини рота при:
Правильна відповідь	Кору
В	Дифтерії
С	Скарлатині
Д	Інфекційному мононуклеозі
Е	Вітряній віспі
№	крок 2016
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хлопчик 12ти років скаржиться на появу болісної "виразки" на язиці. З анамнезу: подібні висипання з'являються кожні 3 місяці; хворіє на холецистит. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Шкірні покриви бліді. На слизовій оболонці язика визначається ерозія діаметром 0,8 см з фібринозним нальотом, розташована на інфільтрованій основі. Слизова навколо ерозії гіперемована у вигляді вінчика. Який попередній діагноз?

Правильна відповідь	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
B	Сифілітична ерозія
C	Травматична ерозія
D	Багатоформна ексудативна еритема
E	Хронічний рецидивуючий герпетичний стоматит
№	крок 2016
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	У хлопчика 8ми років на вестибулярних поверхнях різців, іклів, перших молярів крейдоподібні плями і поодинокі дефекти емалі діаметром до 1 мм. Плями мають нечіткі й нерівні контури. Дитина проживає у регіоні з вмістом фтору у питній воді 1,5 мг/л. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Флюороз зубів
B	Системний карієс
C	Системна гіоплазія емалі
D	Синдром СтейтонаКапдепона
E	Недосконалий амелогенез
№	крок 2016
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Батьки 4-річної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи дитини. Об'єктивно: в пришийковій ділянці вестибулярної поверхні різців верхньої щелепи виявлені дефекти, які не перетинають емалеводентинного сполучення і мають вигляд ділянок крейдоподібно зміненої емалі з видимим руйнуванням її структури. При зондуванні визначається шорстка, розм'якшена поверхня. Реакція на холодові подразники відсутня. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий поверхневий карієс
B	Гострий середній карієс
C	Гострий початковий карієс

D	Хронічний початковий карієс
E	Хронічний поверхневий карієс
№	крок 2016,
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Хлопчик 12-ти років скаржиться на короткочасний біль від холодного в зубі нижньої щелепи. Об'єктивно: на апроксимальній поверхні 46 зуба каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину з навислими краями емалі. Дентин дна і стінок жовтого кольору, м'який, зондування дна дещо болісне, перкусія 46 безболісна, холодна вода викликає біль, який швидко минає після усунення подразника. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс
B	Хронічний глибокий карієс
C	Хронічний фіброзний пульпіт
D	Гострий серозний пульпіт
E	Гострий середній карієс
№	крок 2016
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Пацієнту проводять ендодонтичне лікування 11 зуба. Лікар провів інструментальну обробку кореневого каналу. Для пломбування каналу обрав методику гарячої вертикальної конденсації гутаперчі. Оберіть інструмент для конденсації філера:
Правильна відповідь	Плагер
B	Кфайл
C	Гутаконденсор
D	Інжектор
E	Коренева голка
№	крок 2016
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	У хлопчика 11ти років в 34 зубі виникає біль при прийомі солодкої і холодної їжі. Об'єктивно: на жувальній поверхні 34 каріозна порожнина у межах плащового дентину, виповнена світлим, розм'якшеним дентином. Зондування емалеводентинного сполучення болісне, від холодового подразника короточасний біль. Перкусія 34 безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий середній карієс
В	Хронічний глибокий карієс
С	Хронічний поверхневий карієс
Д	Гострий поверхневий карієс
Е	Гострий глибокий карієс
№	крок 2016
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Дитина 7ми років скаржиться на руйнування 85 зуба. Об'єктивно: в 85 зубі на жувальній поверхні виявлена каріозна порожнина в межах щільного плащового дентину. Зондування стінок та дна каріозної порожнини безболісне, реакція на холодові подразники відсутня. Слизова оболонка альвеолярного паростка в ділянці кореня 85 зуба в кольорі не змінена. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
В	Хронічний глибокий карієс
С	Хронічний поверхневий карієс
Д	Гострий поверхневий карієс
Е	Гострий глибокий карієс
№	крок 2015
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	При обстеженні дитини 5-ти років був встановлений діагноз: гострий загальний пульпіт 74 зубу. Який метод лікування найбільш раціональний у даному випадку?
Правильна відповідь	Екстирпація пульпи

В	Вітальна ампутація
С	Девітальна ампутація
Д	Біологічний метод
Е	Видалення зуба
№	крок 2015
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	У хлопчика 12-ти років в 24 зубі виникає біль при прийомі солодкої і холодної їжі. Об'єктивно: на жувальній поверхні 24 каріозна порожнина у межах плащового дентину, виповнена світлим, розм'якшеним дентином. Зондування емалево-дентинного сполучення болісне, від холодного подразника - короткочасний біль. Перкусія 24 - безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий середній карієс
В	Хронічний глибокий карієс
С	Хронічний фіброзний пульпіт
Д	Гострий глибокий карієс
Е	Хронічний середній карієс
№	крок 2015
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	У дівчинки 9-ти років при визначенні гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною зафарбувалось 3/4 поверхні кожного зуба. Який стан гігієни порожнини рота у даної дитини буде визначений при обчисленні індексу?
Правильна відповідь	Дуже поганий
В	Хороший
С	Задовільний
Д	Незадовільний
Е	Поганий
№	крок 2015, 2014, 2013

Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Дитині 5-ти років було встановлено діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит 85 зуба та проведено лікування. Який матеріал для кореневої пломби доцільно обрати?
Правильна відповідь	Цинк-евгенольний цемент
B	Цинк-фосфатний цемент
C	Склоіономерний цемент
D	Кальційвмісна паста
E	Резорцинформалінова паста
№	крок 2015, 2013
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Під час профілактичного огляду у 4,5-річної дитини виявлені приховані каріозні порожнини на контактних поверхнях 54 і 55 зубів. Після видалення навислих країв емалі розм'якшений дентин був легко видалений екскаватором у межах плащового дентину. Оберіть оптимальний матеріал для постійної пломби:
Правильна відповідь	Компомерний матеріал
B	Композитний матеріал
C	Силікатний цемент
D	Силікофосфатний цемент
E	Полікарбоксилатний цемент
№	крок 2015
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дитина 11-ти місяців знаходиться на лікуванні у педіатра з приводу пневмонії. Два дні тому з'явилися неспокій, відмова від їжі. Об'єктивно: слизова порожнини рота яскраво гіперемована, набрякла, вкрита сірувато-білим сирнистим нальотом, який легко знімається. Підщелепні лімфовузли не пальпуються. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	Гострий кандидозний стоматит
B	Багатоформна ексудативна еритема
C	Алергічний стоматит
D	Гострий герпетичний стоматит
E	Хронічний кандидозний стоматит
№	крок 2015
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	<p>Дитина 11-ти років скаржиться на біль і кровоточивість ясен під час їжі, неприємний запах з рота, слабкість і головний біль протягом двох днів. Об'єктивно: слизова оболонка ясен в ділянці нижніх фронтальних зубів набрякла, яскраво гіперемована, легко кровоточить при дотику. Ясенні сосочки вкриті нальотом брудно-сірого кольору, після видалення якого залишається кровоточива болюча поверхня. Прикус глибокий. Відзначаються значні нашарування м'якого зубного нальоту. Регіонарні лімфатичні вузли дещо збільшені, болісні під час пальпації. Температура тіла - 37, 6° .</p> <p>Визначте попередній діагноз:</p>
Правильна відповідь	Гострий виразковий гінгівіт
B	Гострий катаральний гінгівіт
C	Хронічний катаральний гінгівіт
D	Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
E	Генералізований пародонтит
№	крок 2015
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дитина 8-ми років скаржиться на біль і відчуття свербіння на нижній губі, незначну слабкість, головний біль. Протягом останнього тижня хворіла на ГРВІ. Об'єктивно: на межі червоної облямівки та шкіри нижньої губи на тлі гіперемії та набряку виявляються дрібні згруповані пухирці з серозним вмістом. Визначте збудника даного захворювання:
Правильна відповідь	Вірус герпесу
В	Вірус Коксакі
С	Дріжджеподібні гриби
Д	Кокова флора
Е	Змішана флора
№	крок 2015, 2011, 2010, 2017
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	Дитина 14-ти років скаржиться на косметичний дефект у ділянці передніх зубів. Об'єктивно: емаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 у ділянці ріжучого краю витончена, паралельно ріжучому краю визначається борозенчасте заглиблення емалі шириною 1,5 мм, що оперізує зуби. Горби 16, 26, 36, 46 недорозвинені, конічної форми. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Системна гіпоплазія
В	Недосконалий дентиногенез
С	Недосконалий амелогенез
Д	Місцева гіпоплазія
Е	Дисплазія Стентона-Капдепона
№	крок 2015
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	Дитина 9-ти років скаржиться на біль від холодного у нижньому правому кутньому зубі протягом декількох місяців. На медіальній контактній і жувальній поверхнях 46 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна дещо болісне, від холодного виникає короткочасний біль, перкусія зуба безболісна. Яку лікувальну прокладку необхідно використати?
Правильна відповідь	Гідроокискальційвмісна
B	Йодоформна
C	Тимолова
D	Формапрезолова
E	Резорцин-формалінова
№	крок 2015, 2013, 2012, 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У дитини 5-ти років, зі слів матері, скарги на біль під час ковтання, слабкість, підвищення температури тіла до 39, 5° C , припухлість лімфовузлів. Об'єктивно: стан дитини важкий, температура 38, 8° C . Слизова порожнини рота різко гіперемована, набрякла, з крововиливами, виразкуваннями. Зів різко гіперемований, лакуни розширені з ділянками некрозу. Підщелепні, шийні, потиличні лімфовузли збільшені, щільні та болісні. Який діагноз можна припустити?
Правильна відповідь	Інфекційний мононуклеоз
B	Гострий герпетичний стоматит
C	Виразково-некротичний гінгівостоматит
D	Герпетична ангіна
E	Лакунарна ангіна
№	крок 2015, 2012, 2011, 2017

Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Батьки 12-річної дитини скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, які з'явилися півроку тому. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 виявлені крейдоподібні плями. Емаль над ними втратила блиск, при зондуванні - піддатлива, шорстка. В анамнезі - короткочасний біль від хімічних подразників. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс
В	Хронічний початковий карієс
С	Гострий поверхневий карієс
D	Системна гіоплазія емалі
Е	Флюороз зубів
№	крок 2015, 2014, 2013
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Під час санації порожнини рота у дитини 10-ти років у 36 зубі виявлена глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, зондування, перкусія, реакція на температурні подразники безболісна. Був діагностований хронічний періодонтит. Під час лікування відбулася перфорація дна порожнини зуба. Що необхідно зробити у даному випадку?
Правильна відповідь	Закрити перфорацію склоіономером
В	Провести електрофорез йодиду калію
С	Накласти цинк-евгенолову пасту
D	Закрити перфорацію гідроокисом кальцію
Е	Провести операцію видалення зуба
№	крок 2015, 2014
Тема	ПЕРІОДОНТИТ

Текст завдання	Дівчинка 7-ми років скаржиться на біль у 54 зубі, який виник 3 дні тому і посилюється при накушуванні. Раніше зуб лікували. Об'єктивно: у 54 зубі велика пломба, на слизовій оболонці коміркового відростка у ділянці 54 зуба нориця з мізерним виділенням, зуб має рухливість II ступеня. Виберіть тактику лікування 54 зуба:
Правильна відповідь	Видалення
B	Ендодонтичне лікування
C	Ендодонтичне лікування та періостотомія
D	Видалення та періостотомія
E	Видалення та протизапальне лікування
№	крок 2015, 2012, 2010
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Дитина 9-ти років скаржиться на біль від солодкого, кислого на зубі у верхній щелепі зліва. Об'єктивно: на жувальній поверхні 26 - каріозна порожнина у межах емалі. Який оптимальний матеріал необхідний для пломбування 26?
Правильна відповідь	Композит
B	Склоіономер
C	Силіко-фосфатний цемент
D	Силікатний цемент
E	Цинк-фосфатний цемент
№	крок 2015
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дівчинка 14-ти років скаржиться на сухість губ. Об'єктивно: червона облямівка губ гіперемована, у зоні ураження видно напівпрозорі лусочки сірого кольору, що прикріплені своїм центром до червоної облямівки і дещо відстають по краям. Губи сухі, лущаться. Лусочки легко знімаються, під ними оголюється застійно-червона поверхня. У дівчинки звичка постійно скушувати лусочки. Встановіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Ексфоліативний хейліт
B	Гландулярний хейліт
C	Метеорологічний хейліт
D	Актинічний хейліт
E	Екзематозний хейліт
№	крок 2015, 2012, 2010, 2008, 2007
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	У дитини 8-ми років у 75 на дистально-апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна, від холодної води - повільно минаючий біль. Зуб зруйнований кілька місяців тому, не лікувався. Який метод лікування доцільний у даному випадку?
Правильна відповідь	Девітальна ампутація
B	Біологічний метод
C	Вітальна екстирпація
D	Вітальна ампутація
E	Девітальна екстирпація
№	крок 2015
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Текст завдання	Дитина 7,5 років з'явилася до шкільного лікаря-стоматолога для профілактичного огляду. Об'єктивно: на жувальних поверхнях 16, 26, 36 46 зубів глибокі вузькі фісури. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною 1,5, РМА - 0%. Який метод профілактики рекомендований?
Правильна відповідь	Герметизація фісур
B	Обробка фторлаком
C	Електрофорез фториду натрію
D	Імпрегнація азотнокислим сріблом
E	Аплікація ремодентом
№	крок 2015
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Дитина 7-ми років скаржиться на біль під час прийому їжі на верхній щелепі зліва. Об'єктивно: на жувальній поверхні 65 зуба каріозна порожнина у межах біляпульпарного дентину, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна, реакція на холод тривала. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний пульпіт
B	Хронічний періодонтит
C	Хронічний глибокий карієс
D	Хронічний гангренозний пульпіт
E	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
№	крок 2015
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У дитини 10-ти років скарги на біль у кутах рота, особливо під час прийому їжі. Об'єктивно: у кутах рота, а також на гіперемованій набряклій червоній облямівці і шкірі губ визначаються множинні кірочки жовто-медового кольору. Після їх зняття залишаються ерозії, що мокнуть. Визначається мацерація шкіри на уражених ділянках. Встановіть попередній діагноз:

Правильна відповідь	Мікробний хейліт
B	Метеорологічний хейліт
C	Рецидивуючий герпес
D	Ексфоліативний хейліт
E	Екзематозний хейліт
№	крок 2015, 2014, 2013, 2017
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчинка 13-ти років скаржиться на болісність, кровоточивість ясен і запах з рота, які з'явилися близько півроку тому. Об'єктивно: у ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи ясенні сосочки і ясенний край гіпертрофовані, набряклі, ціанотичні. У пришийковій ділянці зубів наявний м'який наліт. ГІ=3. Лікар провів місцеву протизапальну терапію. Яке місцеве лікування слід провести у подальшому?
Правильна відповідь	Склерозуюча терапія
B	Кюретаж кишень
C	Гінгівотомія
D	Фізіотерапія
E	Вестибулопластика
№	крок 2015
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Батьки дитини 4-х років скаржаться на наявність висипань у порожнині рота дитини. Останнім часом дитина млява, відмовляється від їжі. Об'єктивно: на слизовій оболонці порожнини рота округлі ерозії невеликих розмірів з чіткими контурами. На обличчі та волосистій частині голови пухирці з мутним вмістом. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Вітряна віспа
B	Кір

С	ГГС
D	Інфекційний мононуклеоз
E	Скарлатина
№	крок 2014
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	При обстеженні дитини 5-ти років був встановлений діагноз: гострий загальний пульпіт 74 зуба. Який метод лікування найбільш раціональний у даному випадку?
Правильна відповідь	Екстирпація пульпи
B	Вітальна ампутація
С	Девітальна ампутація
D	Біологічний метод
E	Видалення зуба
№	крок 2014
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Батьки дитини 5-ти місяців скаржаться на появу у дитини білого нальоту у роті і відмову від годування. Об'єктивно: загальний стан задовільний, t° – 37, 1 $^{\circ}$ C . Визначаються білі сирністі нашарування на слизовій щік, губ, твердому піднебінні. Нашарування легко знімається, слизова під ним гіперемована. Який додатковий метод обстеження підтвердить діагноз?
Правильна відповідь	Мікробіологічний
B	Імунофлюоресцентний
С	Цитологічний
D	Імунологічний
E	Вірусологічний
№	крок 2014
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	У дитини 2,5 років вчора ввечері з'явився біль у порожнині рота під час прийому їжі та підвищилася температура до 38, 3 ^o C , Об'єктивно: на гіперемованій слизовій оболонці спинки язика декілька ерозій округлої форми 1-3 мм у діаметрі, вкритих сіруватобілим нальотом. Ясна на обох щелепах гіперемовані, набряклі. Підщелепний лімфаденіт. Які препарати слід призначити у першу чергу?
Правильна відповідь	Противірусні
B	Протизапальні
C	Противірусні
D	Кератопластики
E	Антисептичні
№	крок 2014
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хлопчик 8-ми років скаржиться на наявність болісних виразок у порожнині рота. Подібна симптоматика відзначалась минулого року. Об'єктивно: на бічній поверхні язика виявлено 2 ерозії овальної форми, розміром до 0,5 см, вкриті фібринозним нальотом, болісні під час пальпації. Ерозії оточені гіперемованою облямівкою, їх краї дещо піднімаються над оточуючою слизовою оболонкою. В анамнезі у дитини - хронічний гастро-дуоденіт. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
B	Багатоформна ексудативна еритема
C	Синдром Бехчета
D	Синдром Стівенса-Джонсона
E	Гострий герпетичний стоматит
№	крок 2014
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дівчина 16-ти років звернулася зі скаргами на різкі болі у порожнині рота, підвищення температури до 38, 3° С . Після обстеження був встановлений попередній діагноз: гострий герпетичний стоматит. Що буде виявлено при цитологічному дослідженні матеріалу з поверхні ерозій?
Правильна відповідь	Гігантські багатоядерні клітини
B	Акантолітичні клітини
C	Атипові клітини
D	Клітини Пирогова-Ланханса
E	Елементи ретикулоендотеліальної системи
№	крок 2014
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	У 7-річного хлопчика через три тижні після лікування 65 зуба випала пломба. На медіальній контактній поверхні 65 зуба виявлена каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, частково виведена на жувальну поверхню. Дно і стінки каріозної порожнини щільні, зондування дна чутливе, перкусія зуба безболісна. Від холодного виникає біль, який швидко минає після усунення подразника. Виберіть оптимальний матеріал для постійної пломби:
Правильна відповідь	Склоіономерний цемент
B	Силікатний цемент
C	Силікофосфатний цемент
D	Цинкфосфатний цемент
E	Цинкоксидевгенольний цемент
№	крок 2014
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	Школярка 12-ти років скаржиться на наявність порожнин в передніх зубах верхньої щелепи. Об'єктивно: на медіальних контактних поверхнях 11 і 21 зубів виявлені каріозні порожнини в межах плащового дентину, виповнені щільним пігментованим дентином. Зондування дна каріозних порожнин безболісне, перкусія зубів безболісна, реакція на термічні подразники відсутня. Виберіть оптимальний пломбувальний матеріал для постійних пломб:
Правильна відповідь	Композитний матеріал
B	Силікатний цемент
C	Силікофосфатний цемент
D	Цинкфосфатний цемент
E	Склоіономерний цемент
№	крок 2014
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Батьки з дівчинкою 1,5 років звернулись до лікаря-стоматолога зі скаргами на підвищення температури тіла до 38°C , погіршення загального стану, наявність висипань в порожнині рота. Хворіє 3-й день, висипання з'явилися день тому. Об'єктивно: загальний стан середнього ступеня важкості, t°- 37, 8°C . На шкірі обличчя три пухиря. Слизова оболонка порожнини рота гіперемована. На язиці, що ках, піднебінні ерозії (15-20). Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий герпетичний стоматит
B	Хронічний рецидивуючий стоматит
C	Багатоформна ексудативна еритема
D	Виразково-некротичний стоматит
E	Гострий кандидозний стоматит
№	крок 2014

Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Хлопчик 9-ти років скаржиться на болі під час вживання їжі у ділянці 36 зуба. Об'єктивно: в 36 зубі глибока каріозна порожнина, порожнина зуба закрита, зондування дна різко болісне. Болі від температурних подразників швидко минають, перкусія негативна. Виберіть пасту для лікування даного зуба:
Правильна відповідь	На основі гідроокису кальцію
В	Параформальдегідна паста
С	Резорцин-формалінова паста
D	З додаванням кортикостероїдів
Е	Тимолова паста
№	крок 2014
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дівчинка 6-ти років захворіла гостро 3 дні тому. Температура 40, 3° С . На шкірі обличчя, шиї, грудей, спини, передпліч, гомілкях червоно-багряна папульозна висипка і поодинокі міхури діаметром до 4-5 см, наповнені серозним вмістом. У порожнині рота: на слизовій оболонці, на язиці наявні великі ерозії, вкриті білуватим нальотом, різко болісні під час дотику. Губи набряклі, гіперемовані, вкриті кров'янистими кірками. Кон'юнктивіт. На шкірі повік - кров'янисті кірочки і міхурці. Периферичні лімфовузли збільшені незначно. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Синдром Стівенса-Джонсона
В	Коровий стоматит
С	Багатоформна ексудативна еритема
D	Гострий герпетичний стоматит
Е	Синдром Лайєлла
№	крок 2014

Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчинка 12-ти років з'явилась до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Об'єктивно: зуби інтактні, прикус відкритий, слизова оболонка в ділянці папілярної та маргінальної частин гіперемована, з ціанотичним відтінком; відмічається збільшення ясенних сосочків, які закривають 1/3 висоти коронки фронтальних зубів верхньої щелепи, форма ясенних сосочків округла. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гіпертрофічний гінгівіт
В	Хронічний катаральний гінгівіт
С	Гострий катаральний гінгівіт
Д	Фіброматоз ясен
Е	-
№	крок 2014
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	У дівчинки 5-ти років на апроксимальній поверхні 54 зуба каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зуб змінив свій колір, відмічається неприємний запах з рота. Поверхнєве зондування каріозної порожнини безболісне, глибоке - болісне. Перкусія безболісна. З анамнезу відомо, що болі виникають від гарячого. Оберіть найбільш раціональний метод лікування:
Правильна відповідь	Девітальна екстирпація
В	Девітальна ампутація
С	Вітальна ампутація
Д	Вітальна екстирпація
Е	Видалення 54 зуба
№	крок 2014
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	Дівчинка 12-ти років скаржиться на больові напади в 36, які провокуються гарячою їжею. З анамнезу: рік тому 36 турбував інтенсивними нічними больовими нападами. Раніше нелікований. Об'єктивно: на жувальній поверхні 36 глибока каріозна порожнина, сполучена з пульповою камерою. При глибокому зондуванні - різкий біль, гнилісний запах. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гангренозний пульпіт
В	Хронічний фіброзний пульпіт
С	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
Д	Пульпіт, ускладнений періодонтитом
Е	Загострення хронічного пульпіту
№	
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Школяр 13-ти років скаржиться на біль у зубі, що посилюється принакушуванні на нього. Об'єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, реакція на термічні подразники, зондування безболісне, перкусія різко болюча, зуб рухомий, слизова гіперемована, набрякла. Після екскавації дентину - відкрита порожнина зуба, отримана крапля ексудату. На рентгенограмі змін немає. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий гнійний періодонтит
В	Загострення хронічного періодонтиту
С	Гострий серозний періодонтит
Д	Гострий гнійний пульпіт
Е	Гострий серозний пульпіт
№	крок 2014
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	Під час планового обстеження у дівчинки 11-ти років у ділянці шийок 12, 11, 21, 22 масивне відкладання зубного нальоту, після видалення якого були виявлені крейдоподібні ділянки емалі. При вітальному фарбуванні 2% розчином метиленового синього відбулося їх зафарбовування в блакитний колір. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс
B	Флюороз зубів
C	Гіоплазія емалі
D	Гострий поверхневий карієс
E	Гострий середній карієс
№	крок 2014
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Хлопчик 13-ти років звернувся зі скаргами на косметичний дефект. Страждає на гастродуоденіт. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні центральних різців, іклів верхньої і нижньої щелеп крейдоподібні плями, шорсткуваті під час зондування. Дитина розподілена до 3 групи диспансерного нагляду. Скільки разів на рік вона має відвідати стоматолога?
Правильна відповідь	3-4
B	1-2
C	1
D	2-3
E	2
№	крок 2014
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	Батьки 7ми річної дівчинки скаржаться на наявність крейдоподібних плям на передніх зубах верхньої щелепи, які нещодавно прорізались. При об'єктивному обстеженні на вестибулярній поверхні 11 і 21 зубів у пришийковій ділянці визначаються білі плями. Транспарентність емалі в цих ділянках порушена. Яке додаткове обстеження можна застосувати?
Правильна відповідь	Фарбування метиленовим синім
В	Рентгенографія
С	Фарбування йодовмісними розчинами
Д	Електроодонтодіагностика
Е	Радіовізіографія
№	крок 2014, 2009
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	При стоматологічному обстеженні дитини виявлено аномальну форму центральних різців: бочкоподібна форма, півмісяцева виїмка по ріжучому краю. З анамнезу встановлено, що під час вагітності мати хворіла на сифіліс. У дитини окрім аномалії зубів виявлені глухота і паренхіматозний кератит. Як називається ця аномалія розвитку зубів?
Правильна відповідь	Зуби Гетчінсона
В	Зуби Пфлюгера
С	Клиноподібний дефект
Д	Флюороз (деструктивна форма)
Е	Ерозія твердих тканин
№	крок 2014
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дівчинка 14ти років скаржиться на почервоніння, сухість і відчуття печіння губ, утворення на них кірочок. В анамнезі шкідлива звичка облизувати і прикушувати нижню губу. Подібний стан спостерігається у дитини протягом 2х років у зимовий період. Об'єктивно: на гіперерованій і сухій червоній облямівці губ прозорі кірочки сіруватого кольору. Шкіра і слизова оболонка губ не змінена. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Метеорологічний хейліт
B	Гландулярний хейліт
C	Контактний алергічний хейліт
D	Ексфоліативний хейліт
E	Мікробний хейліт
№	крок 2014
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчина 16ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість і розростання ясен. Об'єктивно: ясна у ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи пухкі, гіпереровані, перекривають коронки зубів на 1/3 висоти, кровлять під час дотику. Визначаються пародонтальні кишень до 3,5 мм. Зубна дуга нижньої щелепи звужена, скупченість зубів у фронтальній ділянці. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною 3,5 бали. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Локалізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг
B	Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
C	Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма I ступеня
D	Десквамативний гінгівіт, еритематозна форма
E	Загострення хронічного катарального гінгівіту
№	крок 2013
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дитина 13-ти років скаржиться на періодичну (1 раз на 3 місяці) появу болісних утворень у роті. Об'єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи визначаються 2 ерозії розміром 0,8x1 см на інфільтрованій основі з припіднятими щільнуватими краями, вкриті білувато-сірим нашаруванням. В анамнезі - ексудативний діатез, хронічний холецистит. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
В	Рецидивуючий герпетичний стоматит
С	Стоматит Венсана
Д	Багатоформна ексудативна еритема
Е	Стоматит Сеттона
№	крок 2013
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Дівчинка 9-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі, біль у зубі, який швидко минає після усунення подразника. Об'єктивно: в 36 каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, з вузьким вхідним отвором, дентин розм'якшений, реакція на холодний подразник болісна, швидко минає, зондування дна болісне, перкусія безболісна. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс
В	Гострий середній карієс
С	Хронічний середній карієс
Д	Хронічний глибокий карієс
Е	Хронічний простий пульпіт
№	крок 2013
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Лікар-педіатр направив на консультацію до стоматолога дівчинку 6-ти років. Захворіла добу тому, температура 38, 2° С , нежить, кашель. В порожнині рота на слизовій оболонці щік плями білувато-жовтого кольору на рівні молярів, розміром з голівку шпильки. Плями виступають над рівнем слизової оболонки. На слизовій м'якого піднебіння яскраво-червоні плями неправильної форми. Якому захворюванню відповідає зазначена симптоматика та зміни слизової оболонки порожнини рота?
Правильна відповідь	Кір
В	Мононуклеоз
С	Дифтерія
Д	Вітряна віспа
Е	Скарлатина
№	крок 2013
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Дитина 4-х років скаржитья на біль зубі на верхній щелепі під час їди. Об'єктивно: у 65 - каріозна порожнина на дистально-апроксимальній поверхні межах плащового дентину з пігментованим розм'якшеним дентином на дні і стінках. Зондування стінок болісне, перкусія безболісна, реакція на холод короткочасна. Порожнина зуба закрыта. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий середній карієс
В	Хронічний періодонтит
С	Гострий глибокий карієс
Д	Хронічний середній карієс
Е	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2013
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Текст завдання	Дитина 6-ти років звернулась до стоматолога-педіатра з метою профілактичного обстеження. Об'єктивно: порожнина рота санована; 16, 26, 36, 46 зуби інтактні, прорізались 3 місяці тому. Який з відомих методів попередження карієсу доцільно використати?
Правильна відповідь	Герметизація фісур зубів
B	Аплікації 10% розчином глюконату кальцію
C	Іонофорез 1% розчином <i>N aF</i>
D	Покриття фтористим лаком
E	Приймання лікарського засобу "Ві-тафтор"
№	крок 2013
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	У дитини 4-х років під час планової санації виявлено глибоку каріозну порожнину в 74 зубі, що сполучається з порожниною зуба. При зондуванні сполучення – біль, незначна кровоточивість. Перкусія безболісна. Реакція на температурні подразники чутлива. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний пульпіт
B	Загострення хронічного пульпіту
C	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
D	Гострий серозний пульпіт
E	Хронічний гангренозний пульпіт
№	крок 2013
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	У дитини 3-х років вчора у порожнині рота з'явилися висипання та болісність під час прийому їжі. Об'єктивно: загальний стан задовільний, температура тіла 37, 5° С , підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. На слизовій оболонці губ, язика, декілька ерозій округлої форми, діаметром 1-3 мм, з вінчиком гіперемії, вкриті білуватим нальотом. Ясна гіперемована, набрякла. Які препарати необхідно призначити у першу чергу?
Правильна відповідь	Противірусні
В	Протизапальні
С	Протигрибкові
Д	Кератопластики
Е	Антисептики
№	крок 2013
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Батьки 7,5-річної дитини звернулись до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. Об'єктивно: КПВ+кп = 4, індекс Гріна-Вермільйона = 2,5. Фісури перших постійних молярів відкриті, інтактні, не пігментовані. Який метод первинної профілактики карієсу доцільно застосувати у даному випадку?
Правильна відповідь	Неінвазивна герметизація
В	Інвазивна герметизація
С	Аплікація фторвмісними лаками
Д	Аплікація антибактеріальними лаками
Е	Аплікація кальційвмісними гелями
№	крок 2013
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	Хлопчик 10-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на гострий самовільний, нападаподібний біль у зубах нижньої щелепи зліва. Зі слів батьків, зуб болів впродовж ночі. Біль іррадіює у вухо, потилицю. Об'єктивно: у 36 зубі на апроксимально-медіальній поверхні глибока каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину. Зондування болісне по всьому дну і спричиняє напад болю. Реакція на холод позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий дифузний пульпіт
B	Гострий гнійний пульпіт
C	Гострий глибокий карієс
D	Загострення хронічного пульпіту
E	Гострий апікальний періодонтит
№	крок 2013
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	У дівчинки 8,5 років під час огляду виявлена глибока каріозна порожнина у 85 зубі, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, від холодної води - повільно минаючий біль. Перкусія безболісна. Проводиться метод девітальної ампутації. Яку лікувальну пасту доцільно використати у даному випадку?
Правильна відповідь	Муміфікуюча
B	Антисептична
C	Ферментативна
D	Одонотропна
E	Протизапальна
№	крок 2013
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	У 12-річної дитини на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 визначаються крейдоподібні плями, емаль без блиску, під час зондування - дещо піддатлива. В анамнезі - короткочасний біль від хімічних подразників. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс
В	Гострий поверхневий карієс
С	Флюороз зубів
Д	Хронічний початковий карієс
Е	Системна гіоплазія емалі
№	крок 2013
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Дівчинка 15-ти років при звертанні до клініки висловлює скарги на гострий самочинний пульсуючий біль у ділянці нижньої щелепи справа, що іррадіює у вухо і потилицю. Полоскання холодною водою вгамовує біль. Об'єктивно: на дистально-жувальній поверхні 46 - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія слабкоболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний пульпіт
В	Загострення хронічного пульпіту
С	Гострий загальний пульпіт
Д	Загострення хронічного періодонтиту
Е	Гострий гнійний періодонтит
№	крок 2013
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Текст завдання	Підліток 15-ти років скаржиться на виразний біль і кровоточивість ясен при чищенні зубів впродовж тижня. Об'єктивно: слизова оболонка маргінального краю набрякла, яскраво гіперемована, легко кровить при дотику. У фронтальній ділянці нижньої і верхньої щелеп виявлено пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм із серозним вмістом. В анамнезі: інсулінозалежний цукровий діабет. Для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота у даному випадку доцільно рекомендувати пасти, що містять:
Правильна відповідь	Антисептики
B	Сполуки кальцію
C	Сполуки фтору
D	Пірофосфати
E	Сполуки цинку
№	крок 2013
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	В клініку звернулися батьки хлопчика 10-ти років із скаргами на косметичний дефект верхнього переднього зуба дитини. При огляді виявлено: коронка 11 правильної форми, нормального розміру, на вестибулярній поверхні – плями коричневого кольору. Симетричний зуб без відхилення від норми. Із анамнезу: 51 був видалений в результаті травматичного вивиху. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Місцева гіпоплазія
B	Системна гіпоплазія
C	Вогнищева гіпоплазія
D	"Тетрацикліновий"зуб
E	Флюороз
№	крок 2013
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дитина 12-ти років скаржиться на печіння губ, біль при відкриванні рота, наявність на червоній облямівці губ жовтуватих кірочок. Об'єктивно: на червоній облямівці губ від кута рота до кута рота, починаючи від зони Клейна до середини червоної облямівки - кірочки жовтуватого кольору. Після зняття кірочок оголюється гладка яскраво-червона волога поверхня. Який найбільш ймовірний діагноз?
Правильна відповідь	Ексфоліативний хейліт
В	Атопічний хейліт
С	Метеорологічний хейліт
Д	Екзематозний хейліт
Е	Гландулярний хейліт
№	крок 2012
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	При профілактичному огляді хлопчика 8-ми років виявлено крейдоподібну пляму з матовою поверхнею на вестибулярній поверхні 21 зуба, яка локалізована в пришийковій ділянці. Суб'єктивні скарги відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Карієс в стадії плями
В	Плямиста форма флюорозу
С	Гіпоплазія емалі
Д	Поверхневий карієс
Е	Дисплазія Капдепона
№	крок 2012
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	У хлопчика 9-ти років у 46 зубі в межах "сліпої" ямки виявлено каріозну порожнину в межах плащового пігментованого дентину. Зондування дна безболісне, під час препарування емалеводентинного з'єднання виникає біль. Перкусія 46 безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
B	Гострий середній карієс
C	Хронічний фіброзний пульпіт
D	Хронічний періодонтит
E	Місцева гіпоплазія
№	крок 2012
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Хворому 10-ти років встановлено діагноз: гострий гнійний пульпіт 36 зуба, ускладнений гострим фокальним періодонтитом. Який метод лікування повинен обрати лікар-стоматолог?
Правильна відповідь	Вітальна екстирпація
B	Девітальна ампутація
C	Девітальна екстирпація
D	Біологічний метод
E	Вітальна ампутація
№	крок 2012
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дитина 12-ти років впродовж року скаржиться на періодичну кровоточивість ясен при чищенні зубів. Об'єктивно: ясна в ділянці фронтальних зубів обох щелеп застійно гіперемовані, набряклі. Ясенні сосочки мають куполоподібну форму. ГІ за Федоровим-Володкіною - 3,1. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний катаральний гінгівіт
B	Гострий катаральний гінгівіт

C	Гіпертрофічний гінгівіт
D	Атрофічний гінгівіт
E	Виразково-некротичний гінгівіт
№	крок 2012
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Хворий 14-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на відчуття оскоми. У 24, 14 зубах у пришийковій ділянці на щічній поверхні було виявлено крейдоподібні плями з нерівними, але чіткими контурами. Поверхня плям гладенька, фарбується розчином метиленового синього. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Початковий карієс
B	Плямиста форма флюорозу
C	Поверхневий карієс
D	Місцева гіпоплазія
E	Системна гіпоплазія
№	крок 2012
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Під час профілактичного огляду у хлопчика 8-ми років було виявлено: ділянки гіперкератозу сірувато-білого кольору по лінії змикання зубів, які не знімаються. Був поставлений діагноз - м'яка лейкоплакія. Хлопчик постійно закушує щоки. З чого потрібно почати лікування?
Правильна відповідь	Усунення шкідливої звички
B	Призначення седативних препаратів
C	Призначення полівітамінів
D	Призначення кератопластичних препаратів
E	-
№	крок 2012
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулась пацієнтка 14-ти років зі скаргами на сухість, печіння та біль ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 38, 8° С, головний біль, різку слабкість. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі, на них наявна плівка брудно-сірого кольору, при знятті якої з'являється болюча виразкова поверхня. Підщелепові лімфовузли збільшені та болісні при пальпації. На зубах відзначаються значні нашарування м'якого зубного нальоту. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Виразково-некротичний гінгівіт
В	Гіпертрофічний гінгівіт
С	Катаральний гінгівіт
Д	Генералізований пародонтит
Е	Локалізований пародонтит
№	крок 2012
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хлопчик 13-ти років скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, яка турбує його впродовж декількох місяців. Об'єктивно: міжзубні сосочки набряклі, ціанотичного відтінку. Відмічається велика кількість зубного нальоту. Гігієна порожнини рота незадовільна. Проба Шиллера-Пісарєва позитивна. На рентгенограмі відсутні ознаки остеопорозу міжзубних перегородок. Яка тактика лікаря в перше відвідування?
Правильна відповідь	Професійна гігієна порожнини рота
В	Протизапальна терапія
С	Фізіотерапія
Д	Склерозуюча терапія
Е	Гінгівектомія
№	крок 2012

Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	Хлопчик 9-ти років звернувся з метою санації. При об'єктивному обстеженні на вестибулярній поверхні 22, 21, 11, 12 і на горбиках 16, 26, 36, 46 зубів виявлені крейдоподібні плями, поверхня блискуча. Реакція на термічні та хімічні подразники відсутня. З анамнезу: хворів на рахіт. Проживає в місцевості, де вміст фтору у питній воді становить 0,5 мг/л. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Системна гіпоплазія емалі
В	Флюороз
С	Дисплазія Стейнтона-Капдепона
D	Місцева гіпоплазія емалі
Е	Недосконалий амелогенез
№	крок 2012
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У дівчинки 2,5 років діагностовано важку форму гострого герпетичного стоматиту, період згасання хвороби. Якими лікарськими препаратами необхідно доповнити лікування гострого герпетичного стоматиту в цей період?
Правильна відповідь	Кератопластичні
В	Протеолітичні
С	Противірусні
D	Протигрибкові
Е	Знеболюючі
№	крок 2012
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Батьки скаржаться на порушення стану дитини 3-х років, підвищення температури тіла до 38, 0° С, кашель, нежить. При огляді порожнини рота: на м'якому піднебінні виявлена енантема, на слизовій оболонці щік у ділянці кутніх зубів - плями, що нагадують бризки вапна, які трохи підвищуються над гіперемованою слизовою оболонкою. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Кір
В	ГРВІ
С	Інфекційний мононуклеоз
Д	Вітряна віспа
Е	Скарлатина
№	крок 2012, 2008
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дитина 2-х років на прийомі у стоматолога з приводу висипань на слизовій оболонці порожнини рота та болісності під час прийому їжі, які з'явилися вчора. Об'єктивно: температура тіла 37, 5° С шкірні покриви чисті. Підщелепні лімфовузли болісні. У порожнині рота: на слизовій оболонці губ, язика ерозії округлої форми діаметром 1-3 мм, болісні, вкриті білуватим нальотом. Ясна на верхній і нижній щелепах гіперемована, набрякла, кровить під час дотику. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий герпетичний стоматит
В	Синдром Стівенса-Джонсона
С	Рецидивуючий афтозний стоматит
Д	Багатоформна ексудативна еритема
Е	Рецидивуючий герпетичний стоматит
№	крок 2012
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	У дитини 6-ти років підвищилась температура тіла, з'явився біль під час ковтання. Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, температура тіла 38, 5° С. На гіперемованій слизовій оболонці м'якого піднебіння, піднебінних дужок, мигдаликах визначаються міхурці, ерозії 1-3 мм в діаметрі. Задня стінка ротоглотки гіперемована, набрякла. Слизова оболонка порожнини рота без змін. Підщелепні лімфовузли збільшені, трохи болісні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Герпетична ангіна
В	Гострий герпетичний стоматит
С	Стоматит при вітряній віспі
Д	Дифтерія
Е	Інфекційний моноклеоз
№	крок 2012
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Дівчинка 10-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 26 зубі. Об'єктивно: в 26 зубі каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину, дентин щільний, пігментований. Реакція на холодний подразник чутлива. Зондування і перкусія безболісні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний глибокий карієс
В	Хронічний середній карієс
С	Гострий середній карієс
Д	Гострий глибокий карієс
Е	Хронічний фіброзний пульпіт
№	Крок 2012, 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	У хлопчика 6-ти років виявлено збільшені лімфовузли у обох підщелепних та шийних ділянках. Об'єктивно: 75, 84, 85 зруйновані, є прояви кандидозного хейліту. Зі слів матері, в останні 2-3 місяці хлопчик швидко втомлюється, пітніє при найменшому фізичному зусиллі, скаржиться на слабкість, покинув заняття у спортивній секції. Визначте план дообстеження дитини:
Правильна відповідь	Розгорнутий аналіз крові, консультація гематолога
В	Біохімічний аналіз крові, консультація ендокринолога
С	Пункційна біопсія, консультація онколога
Д	МРТ, консультація імунолога
Е	Рентгенографія легенів, консультація пульмонолога
№	крок 2012
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дитина 14-ти років впродовж останнього тижня скаржиться на біль і кровоточивість ясен при чищенні зубів і вживанні їжі. Об'єктивно: слизова оболонка ясен у фронтальній ділянці щелеп набрякла, інтенсивно гіперемована, легко кровить при інструментальному дослідженні. КПВ=6. Стан гігієни ротової порожнини незадовільний. Зубну щітку якої жорсткості слід рекомендувати для індивідуальної гігієни порожнини рота в даний період захворювання?
Правильна відповідь	М'яка
В	Середня
С	Жорстка
Д	Дуже м'яка
Е	Дуже жорстка
№	крок 2012
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Текст завдання	Батьки 7-річної дитини скаржаться на наявність у неї в зубах каріозних порожнин. Об'єктивно: інтенсивність карієсу становить $KПВ+кп=0+8=8$, значення індексу Green-Vermillion дорівнює 2,0. Слизова оболонка ясен без патологічних змін. Для індивідуальної гігієни порожнини рота у даному випадку доцільно рекомендувати зубні пасти, що містять:
Правильна відповідь	Сполуки фтору
B	Антисептики
C	Рослинні добавки
D	Сольові добавки
E	Ферменти
№	крок 2012, 2011
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Під час профілактичного огляду у дівчинки 15-ти років виявлені крейдоподібні плями на вестибулярних поверхнях центральних різців та іклів верхньої і нижньої щелеп, які забарвлюються розчином метиленового синього. ГІ за Федоровим-Володкіною - 3,8 бала. Скільки разів на рік дівчинка повинна відвідувати стоматолога, якщо середній показник інтенсивності карієсу в регіоні у даній віковій групі складає 5?
Правильна відповідь	03.Кві
B	02.Бер
C	2
D	01.Лют
E	1
№	крок 2012
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	Хворий 15-ти років скаржиться на гострий, самовільний, нічний біль у зубі верхньої щелепи справа. Біль практично не зникає, триває 3 доби, має пульсуючий характер, іррадіює в вухо. Об'єктивно: в 25 зубі - глибока каріозна порожнина, що розташована в межах навколопульпарного дентину, з розм'якшеним дном. Зондування дна болюче, вертикальна перкусія 25 зуба позитивна. Холодовий подразник дещо зменшує інтенсивність болю. ЕОД- 50 мкА. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний пульпіт
В	Гострий серозний обмежений пульпіт
С	Гострий серозний дифузний пульпіт
Д	Гострий гнійний періодонтит
Е	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Батьки 5-річної дитини виявили неї рухливість зубів і кровоточивість ясен. Об'єктивно: слизова оболонка набрякла, гіперемована, легко кровоточить, рухливість зубів I-II ступеня. При огляді виявлено також гіперкератоз долоней. Яке додаткове обстеження органів ротової порожнини необхідно провести?
Правильна відповідь	Рентгенологічне
В	Електроодонтометричне
С	Біопотенціалометрія
Д	Бактеріологічне
Е	Вітальне забарвлення
№	крок 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Хлопчик 12-ти років скаржиться на біль у порожнині рота протягом 2-х діб, головний біль, підвищення температури тіла до 39° С . В анамнезі ексудативний діатез. Об'єктивно: на шкірі обличчя та рук еритематозні плями, папули з двоконтурним забарвленням. Катаральний кон'юнктивіт та риніт. Червона облямівка губ набрякла, з кров'яними кірками; на слизовій оболонці порожнини рота - болісні ерозії з сіруватим нальотом, по їх краях є уривки оболонок пухирів. Слизова оболонка ясен гіперемована. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Синдром Стивенса-Джонсона
В	Гострий герпетичний стоматит
С	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
Д	Багатоформна ексудативна еритема
Е	Синдром Лайела
№	крок 2011, 2010
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	8-річному хлопчикові встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 21. Лікування проведено екстирпаційним методом. Оберіть матеріал для кореневої пломби:
Правильна відповідь	Кальцієвмісний матеріал
В	Склоіономірний цемент
С	Цинк-евгенолова паста
Д	Резорцин-формалінова паста
Е	Фосфат-цемент
№	крок 2011
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	Дівчинка 10-ти років скаржиться на незначний біль у зубі на нижній щелепі під час прийому холодної їжі. Об'єктивно: на жувальній поверхні 36 каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, в межах плащового дентину. Зондування чутливе по емалево-дентинній межі. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий середній карієс
В	Гострий глибокий карієс
С	Хронічний глибокий карієс
D	Поверхневий карієс
Е	Хронічний середній карієс
№	крок 2011, 2017
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хвора 16-ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. З анамнезу: часті носові кровотечі, загальна слабкість. Об'єктивно: блідість шкірних покривів і слизової оболонки рота, на слизовій щік, язика та м'якого піднебіння - множинні петехії. В крові: ер.- $3 \cdot 10^{12}$ /л., Нв- 94 г/л, КП- 0,9,9 /л, тромб.- $80 \cdot 10^9$ /л, час лейкоц.- $2,9 \cdot 10$ зсідання крові - 9 хв, ШОЕ - 18 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хвороба Верльгофа
В	Хвороба Вакеза
С	Хвороба Аддісона-Бірмера
D	Залізодефіцитна анемія
Е	Хронічний лімфолейкоз
№	крок 2011
Тема	ПУЛЬПТ

Текст завдання	Хворого 16-ти років турбує кровоточивість з порожнини зуба при прийомі їжі. Об'єктивно: в 16 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, заповнена розростаннями м'якої тканини багряно-червоного кольору, що легко кровить при доторкуванні. Зондування новоутворення слабкоболісне. Реакція на холодний подразник майже не виражена. На Ро-грамі патологічних змін твердих тканин зуба та періапикальних тканин не виявляється. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
B	Хронічний гранулюючий періодонтит
C	Хронічний гангренозний пульпіт
D	Гіпертрофічний папіліт
E	Хронічний гранулематозний періодонтит
№	крок 2011
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Дитина 11-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини у лівому верхньому кутньому зубі, яка з'явилась півроку тому. Об'єктивно: на медіальній контактній поверхні 26 зуба - каріозна порожнина, розташована у межах плащового дентину. Дно і стінки каріозної порожнини щільні, пігментовані, під час зондування - безболісні. Реакція на термічні подразники відсутня. Перкусія зуба безболісна. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
B	Хронічний глибокий карієс
C	Гострий середній карієс
D	Гострий глибокий карієс
E	Хронічний періодонтит
№	крок 2011
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	У дитини 5-ти років на апроксимальній поверхні 54 зуба каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Відмічається неприємний запах з рота. Поверхнєве зондування каріозної порожнини безболісне, глибоке - болісне. Перкусія безболісна. При опитуванні з'ясовано, що від гарячого виникає біль. Оберіть раціональний лікарський засіб для антисептичної обробки корневих каналів:
Правильна відповідь	Гіпохлорит натрію
B	Розчин етонію
C	Розчин фурациліну
D	Спирт
E	Розчин формаліну
№	крок 2011
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	У хлопчика 14-ти років під час лікування гострого глибокого карієсу в 25 зубі лікар випадково відкрив порожнину зуба в проекції рогу пульпи. Яка подальша тактика лікаря?
Правильна відповідь	Застосувати пасту, що містить гідроксид кальцію
B	Застосувати девіталізуючу пасту
C	Застосувати муміфікуючу пасту
D	Провести знеболення, видалити пульпу
E	Провести ампутацію пульпи
№	крок 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Мати дівчинки 4-х років звернулась до стоматолога зі скаргами на появу в роті дитини виразок. Хвороба почалася 3 дні тому лихоманкою. Об'єктивно: на слизовій оболонці порожнини рота спостерігаються ерозії до 0,5 см в діаметрі, які вкриті фібринозним нальотом. Ясна гіперемовані. Температура тіла 38, 9° С . Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий герпетичний стоматит
B	Багатоформна ексудативна еритема
C	Кандидомікоз
D	Герпангіна
E	Хронічний рецидивуючий герпетичний стоматит
№	крок 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Хлопчик 15-ти років звернувся зі скаргами на біль, сухість губ. Хворіє 3 місяці. Об'єктивно: нижня губа набрякла, вкрита лусочками, наявні тріщини, ерозії, відзначається "симптом роси". Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гландулярний хейліт
B	Екзематозний хейліт
C	Мікробний хейліт
D	Ексфоліативний хейліт
E	Алергічний хейліт
№	крок 2011
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Мати 3-річної дитини скаржиться на появу білих плям на передніх зубах верхньої щелепи. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 51 та 61 дефект в межах емалі. Зондування безболісне. Який оптимальний метод лікування?
Правильна відповідь	Імпрегнація розчином нітрату срібла

B	Покриття фторлаком
C	Аплікація ремодентом
D	Препарування і пломбування
E	Електрофорез розчину фтористого натрію
№	крок 2011
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	Дівчина 16-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на косметичний дефект передніх зубів - наявність темних плям та дефектів твердих тканин. Плями були помічені при прорізуванні, дефекти з'явилися згодом. Було встановлено діагноз: ерозивна форма флюорозу 16, 11, 12, 22, 26, 31, 32, 36, 41, 42, 46. Виберіть метод лікування:
Правильна відповідь	Реставраційне лікування
B	Ремінералізуюче лікування
C	Протезування
D	Хірургічне лікування
E	Диспансерне спостереження
№	крок 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У дитини 3-х років біль у горлі, температура тіла 38° С . На гіперемованій, набряклій слизовій оболонці мигдаликів та ретромоллярного трикутника визначаються нашарування білувато-сірого кольору у вигляді павутиння, що тісно спаяні з прилеглими тканинами. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Дифтерія
B	ГГС
C	Кір
D	Вітряна віспа

Е	Інфекційний мононуклеоз
№	крок 2011, 2009
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Група спеціалістів проводить епідеміологічне обстеження певних вікових груп по вивченню поширеності ознак ураження пародонта і потреб у лікуванні. За допомогою якого індексу вивчаються ці показники?
Правильна відповідь	СРІТН (ВООЗ)
В	ОНІ-S (Гріна-Вермільона)
С	РDJ (Рамф'єрда)
D	РJ (Рассела)
Е	РМА (Парма)
№	крок 2011, 2010, 2009
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Хлопчик 14-ти років скаржиться на гострий самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа. Біль триває три доби, посилюється вночі, носить пульсуючий характер, віддає у скроню. Об'єктивно: у 15 каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину. Дентин розм'якшений, брудно-сірого кольору. Зондування болісне по всьому дну порожнини, перкусія 15 болісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний пульпіт
В	Гострий дифузний пульпіт
С	Гострий вогнищевий пульпіт
D	Гострий періодонтит
Е	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2011
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН

Текст завдання	Дівчинці 13 років. Проживає у місцевості з вмістом фтору у питній воді 1,6 мг/л. Під час огляду на вестибулярних поверхнях усіх зубів виявлені крейдоподібні плями. Інтенсивність білого забарвлення знижується від центру до периферії. У ділянці центральних різців по ріжучому краю визначається світло-коричнева пігментація. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Флюороз зубів
В	Гострий початковий карієс
С	Системна гіоплазія емалі
D	Синдром Стейнтон-Капдепона
Е	Недосконалий амелогенез
№	крок 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	У дівчинки 13-ти років спостерігається кровоточивість ясен і рухливість передніх зубів протягом останнього місяця. Об'єктивно: слизова оболонка ясен у ділянці нижніх різців та іклів набрякла, гіперемована, кровить під час дотику. Рухливість цих зубів І ступеня, пародонтальні кишені - 3 мм. На ортопантограмі - зменшення кісткової тканини міжальвеолярних перегородок на 1/3 їх висоти. Визначається скупченість фронтальних зубів нижньої щелепи. ПІ - 4,2. Які місцеві лікувальні заходи необхідно провести у першу чергу?
Правильна відповідь	Професійна гігієна
В	Протизапальна терапія
С	Ортодонтичне лікування
D	Фізіотерапевтичне лікування
Е	Антибактеріальна терапія
№	крок 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	У хлопчика 10-ти років кровоточивість ясен і рухливість зубів протягом останнього року, сухість у роті. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота суха, блискуча, незначно гіперемована. Слизова оболонка ясен набрякла, яскраво гіперемована, кровить під час дотику. Рухливість усіх зубів I-II ступеня, пародонтальні кишені - 3 мм. На ортопантограмі - збуток кісткової тканини міжальвеолярних перегородок на 1/3 висоти. ПІ - 4,2. Консультація якого спеціаліста необхідна у першу чергу?
Правильна відповідь	Ендокринолог
В	Невропатолог
С	Гематолог
Д	Інфекціоніст
Е	Гастроентеролог
№	крок 2011
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У дитини 6-ти місяців в місці переходу м'якого піднебіння в тверде виникла овальна виразка з чіткими краями. Ерозивна поверхня вкрита жовтуватим нальотом з вираженим запальним валиком навколо. Виразка різко болісна. Дитина знаходиться на штучному вигодовуванні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Афта Беднара
В	Гострий герпетичний стоматит
С	Туберкульозна виразка
Д	Виразково-некротичний стоматит
Е	Хронічний кандидоз
№	крок 2011
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	Дитина 12-ти років скаржиться на кровоточивість і біль у 46 при вживанні їжі. В анамнезі - сильний біль у зубі в минулому. Об'єктивно: в 46 - глибока каріозна порожнина II класу за Блеком, що сполучається з порожниною зуба і частково виповнена тканиною червоного кольору. Доторкання - болісне, супроводжується кровоточивістю. На 46, 45, 44 значні відкладення м'якого зубного нальоту. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
В	Хронічний папіліт
С	Хронічний фіброзний пульпіт
Д	Хронічний гранулюючий періодонтит
Е	Хронічний гангренозний пульпіт
№	крок 2011
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Батьки з дитиною 6-ти років звернулися з метою санації. З анамнезу: на нижній щелепі справа на ясні періодично з'являвся "гнійничок". Об'єктивно: в 85 зубі наявна велика каріозна порожнина, зондування і перкусія безболісні, реакція на термічні подразники відсутня. Після розкриття порожнини зуба зондування устів кореневих каналів безболісне. На Ro-грамі: у ділянці коренів 85 вогнище розрідження з нечіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гранулюючий періодонтит
В	Хронічний гранулематозний періодонтит
С	Хронічний гранулюючий остит
Д	Хронічний фіброзний періодонтит
Е	Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту
№	крок 2010
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Текст завдання	Мама дитини 6,5 років звернулася з метою контролю результатів герметизації фісур 16, 26, 36, 46, яка була проведена 6 місяців тому. Герметик зберігся у 36, 46, а в 16 і 26 не зберігся. Яка подальша тактика лікаря?
Правильна відповідь	Повторити герметизацію фісур
В	Профілактичне пломбування
С	Аплікації розчином ремоденту
Д	Покриття зубів фторлаком
Е	Електрофорез 1% р-ном фтористого натрію
№	крок 2010, 2007
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Хлопчик 12-ти років скаржиться на короткочасний біль від холодного у зубі на нижній щелепі справа. Об'єктивно: у 46 на медіальній поверхні каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину, що не сполучається з порожниною зуба, зі світлим розм'якшеним дентином на дні та стінках. Реакція на холод болісна, швидкоминуча. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс
В	Гострий середній карієс
С	Гострий обмежений пульпіт
Д	Гострий дифузний пульпіт
Е	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Влітку дитина 12-ти років скаржиться на біль у горлі, головний біль та підвищення температури тіла до 38, 5°С, нежить, кашель. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемована, набрякла, на піднебінні та піднебінних дужках виявлено 10-15 ерозій розміром до 0,5 мм, які не вкриті нальотом і мають червоне дно. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Герпетична ангіна
В	Гострий герпетичний стоматит
С	Багатоформна ексудативна еритема
Д	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
Е	Інфекційний мононуклеоз
№	крок 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчина 17-ти років висловлює скарги на болісність і кровоточивість ясен під час чищення зубів і прийому їжі. Хворіє впродовж 1,5 років. Зверталася за допомогою до стоматолога. Проведене лікування істотного ефекту не дало. Об'єктивно: ясеневі сосочки у ділянці фронтальних зубів верхньої і нижньої щелеп пухкі, ціанотичні, перекривають коронки зубів на 1/3-1/2 їх висоти, кровлять під час дотику. Електрофорез якого з перелічених засобів дозволить отримати терапевтичний ефект у даної хворої?
Правильна відповідь	Гепарин
В	Алое
С	Вітамін В ₁
Д	Трипсин
Е	Фторид натрію
№	крок 2010

Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Під час профілактичного огляду у 6-річної дитини на спинці язика поряд із зонами підвищеного зроговіння ниткоподібних сосочків виявлені ділянки десквамації епітелію, що мають вигляд овальних червоних плям. Грибоподібні сосочки гіпертрофовані. Скарги відсутні. В анамнезі у дитини - дисбактеріоз кишечника. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Десквамативний глосит
В	Кандидозний глосит
С	Гострий катаральний глосит
D	Ромбоподібний глосит
Е	Герпетичне ураження язика
№	крок 2010, 2009, 2008, 2007
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	При профілактичному огляді хлопчика 8-ми років виявлено матові крейдоподібні плями на вестибулярній поверхні 11 та 21 зубів, які локалізовані у пришийковій ділянці. Суб'єктивні скарги у дитини відсутні. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс
В	Плямиста форма флюорозу
С	Місцева гіпоплазія емалі
D	Гострий поверхневий карієс
Е	Хронічний початковий карієс
№	крок 2010
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	Батьки 6-річної дитини звернулись до стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об'єктивно: на дистальній контактній поверхні 85 виявлена каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дно і стінки щільні, пігментовані, під час зондування безболісні, на холодне зуб не реагує, перкусія зуба безболісна. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
В	Гострий середній карієс
С	Хронічний глибокий карієс
Д	Хронічний періодонтит
Е	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дитина 3-х місяців хворіє протягом двох днів, неспокійна, відмовляється від їжі, температура тіла нормальна. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемована, набрякла. На спинці язика і слизовій оболонці щік визначається сироподібний плівчастий наліт білого кольору. Після його видалення залишається яскраво гіперемована поверхня з точковими крововиливами. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий кандидозний стоматит
В	М'яка форма лейкоплакії
С	Гострий герпетичний стоматит
Д	Герпетична ангіна
Е	Червоний плоский лишай
№	крок 2010
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	Під час профілактичного огляду у дитини 4-х років на жувальній поверхні 54 виявлена глибока каріозна порожнина, виповнена щільним дентином, що не сполучається з порожниною зуба. Зондування, перкусія і термометрія 54 - безболісні. Індекс КП=1, індекс гігієни - 1,9. Який пломбувальний матеріал найбільш підходить для постійної пломби у 54?
Правильна відповідь	Склоіономірний цемент
B	Силікатний цемент
C	Силікофосфатний цемент
D	Хімічний композит
E	Фотополімерний композит
№	крок 2010
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Дитині 10-ти років після профілактичного обстеження стоматолог-педіатр встановив діагноз: вогнищева демінералізація 13, 12, 11, 21, 22, 23. Призначено електрофорез ремінералізуючими розчинами. Які засоби доцільно використовувати в даному випадку?
Правильна відповідь	Препарати кальцію і фосфору з наступним використанням препаратів фтору
B	Препарати фтору з наступним використанням препаратів кальцію і фосфору
C	Тільки препарати кальцію
D	Тільки препарати фосфору
E	Тільки препарати фтору
№	крок 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Батьки скаржаться на наявність у ротовій порожнині 8-річної дитини болісного утворення, що перешкоджає прийому їжі. Подібні скарги відзначаються двічі на рік. Об'єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи виявлено ерозію округлої форми розміром до 0,7 см, яка вкрита нальотом сірувато-жовтого кольору. Ерозія має гіперемовану облямівку, болісна під час пальпації. В анамнезі у дитини - хронічний холецистохолангіт. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
В	Багатоформна ексудативна еритема
С	Синдром Бехчета
Д	Синдром Стівенса-Джонсона
Е	Травматична ерозія
№	крок 2010
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Дитина 12-ти років скаржиться на кровотечу із 46 та біль при вживанні їжі. В анамнезі - сильний біль в минулому. Об'єктивно: II клас за Блеком, каріозна порожнина глибока та сполучена з порожниною зуба, частково виповнена розростанням пульпи, доторкання до тканини пульпи болісне, супроводжується кровотечею. На 46, 45, 44 значне відкладення м'якого білого нальоту. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
В	Хронічний папіліт
С	Хронічний простий пульпіт
Д	Хронічний гангренозний пульпіт
Е	Хронічний гранулюючий періодонтит
№	крок 2010, 2009, 2008
Тема	ПЕРІОДОНТИТ

Текст завдання	У 6-ти річної дівчинки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину в 85 зубі. Перкусія і зондування безболісні. Після видалення розм'якшеного дентину виникло сполучення з порожниною зуба. Глибоке зондування безболісне. На рентгенограмі 85 зуба вогнище деструкції кісткової тканини в ділянці біфуркації, кортикальна пластинка 35 без патологічних змін. Для кореневої пломби в наведеній ситуації найбільш доцільно використати такий матеріал:
Правильна відповідь	Цинк-евгенолова паста
B	Резорцин-формалінова паста
C	Склоіономірний цемент
D	Фосфат-цемент
E	Кальцієвмісна паста
№	крок 2010, 2009
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Пацієнт 13-ти років скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно: ясна у ділянці усіх зубів гіперемовані, набряклі, РМА=46%, гігієнічний індекс за Гринном-Вермільйоном 2,5 бали. Попередній діагноз: загострення хронічного генералізованого катарального гінгівіту. З яким активним компонентом слід рекомендувати пасту даному пацієнту?
Правильна відповідь	Хлоргексидин
B	Гліцерофосфат кальцію
C	Монофторфосфат
D	Вітаміни А, D, Е
E	Комплекс мікроелементів
№	крок 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	Хворий 16-ти років скаржиться на розростання, кровоточивість ясен та біль у них впродовж року. Об'єктивно: в ділянці 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів ясеневі сосочки збільшені та перекривають коронки зуба на 1/2 їх висоти. Ясна у вигляді яскраво-червоних грануляцій, болісні під час пальпації. На зубах значні відкладення зубного каменя. Рентгенологічних змін альвеолярного відростка не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гіпертрофічний гінгівіт
B	Локалізований пародонтит
C	Виразковий гінгівіт
D	Генералізований пародонтит
E	Катаральний гінгівіт
№	крок 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дитина 10,5 років скаржиться на появу болісних висипань на губах. Об'єктивно: червона облямівка губ набрякла, гіперемована, вкрита тріщинками і численними кров'янистими кірками. На шкірі верхньої губи визначаються дрібні пухирці з серозним вмістом, що зливаються між собою в окремих ділянках. Спостерігаються також мацерація та мокнуття шкіри, особливо у кутах рота. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Екзематозний хейліт
B	Метеорологічний хейліт
C	Атопічний хейліт
D	Актинічний хейліт
E	Ексфоліативний хейліт
№	крок 2010
Тема	ПЕРІОДОНТИТ

Текст завдання	Дитина 9-ти років скаржиться на ниючий біль у зубі, що посилюється при натисканні на нього. Місяць тому зуб лікувався з приводу пульпіту. Об'єктивно: у 36 пломба, перкусія різко болісна, слизова оболонка гіперемована, набрякла. На рентгенограмі змін немає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний періодонтит
В	Загострення хронічного пульпіту
С	Гострий дифузний пульпіт
D	Гострий гнійний пульпіт
Е	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2010
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Хлопчик 13-ти років скаржиться на біль у зубі на верхній щелепі від теплового, гарячого, неприємний запах з рота під час відсмоктування з зуба. Об'єктивно: 24 зуб змінений у кольорі, визначається глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, глибоке зондування болісне. Перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гангренозний пульпіт
В	Хронічний періодонтит
С	Хронічний фіброзний пульпіт
D	Загострення хронічного пульпіту
Е	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	У дівчинки 13-ти років спостерігається кровоточивість ясен і рухливість передніх зубів протягом останнього місяця. Об'єктивно: слизова оболонка ясен у ділянці нижніх різців та іклів набрякла, гіперемована, кровить під час доторкання. Рухливість цих зубів I ступеня, пародонтальні кишені - 3 мм. На ортопантограмі - зменшення кісткової тканини міжальвеолярних перегородок на 1/3 їх висоти. Визначається скупченість фронтальних зубів нижньої щелепи. ПІ - 4,2. Які місцеві лікувальні заходи необхідно провести у першу чергу?
Правильна відповідь	Професійна гігієна
B	Протизапальна терапія
C	Ортодонтичне лікування
D	Фізіотерапевтичне лікування
E	Антибактеріальна терапія
№	крок 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Підліток 16-ти років скаржиться на неприємний запах з рота, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37, 6°C впродовж 2-х днів. Нещодавно перехворів на ангіну. Об'єктивно: стан гігієни порожнини рота незадовільний, зуби вкриті шаром м'якого зубного нальоту. Ясна гіперемовані, ясеневі сосочки вкриті брудно-сірим нальотом. Визначте збудників даного захворювання:
Правильна відповідь	Фузобактерії, спірохети
B	Стрептококи
C	Віруси герпесу
D	Стафілококи
E	Дріжджоподібні гриби
№	крок 2010
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дівчинка 11,5 років на плановій санації порожнини рота поскаржилася на біль у губах під час вживання їжі, що періодично з'являється і раптово вщухає. Об'єктивно: слизова оболонка губ у зоні Клейна гіперемована, набрякла, суха, під час розмови відзначається виділення дрібних краплинок слизового секрету. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Простий glandулярний хейліт
В	Мікробний хейліт
С	Екзематозний хейліт
Д	Контактний алергічний хейліт
Е	Ексфоліативний хейліт
№	крок 2010
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	Дівчинка 14-ти років скаржиться на наявність естетичного дефекту у вигляді білих плям на зубах. За місцем проживання вміст фтору в питній воді складає 2 мг/л. Об'єктивно: вестибулярні поверхні всіх зубів на верхній і нижній щелепі вкриті плямами білого кольору з нечіткими контурами. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Флюороз
В	Місцева гіпоплазія
С	Системна гіпоплазія
Д	Множинний карієс
Е	Недосконалий амелогенез
№	
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Під час профілактичного огляду школярів молодших класів у хлопчика 7-ми років на слизовій оболонці щоки по лінії змикання зубів виявлені нашарування сіро-білого кольору, які не знімаються. Слизова злегка гіперемована, безболісна під час пальпації. Хлопчик емоційно неврівноважений, закушує щоки. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	М'яка форма лейкоплакії
В	Хронічний рецидивний афтозний стоматит
С	Хронічний кандидозний стоматит
Д	Червоний плоский лишай
Е	Багатоформна ексудативна еритема
№	крок 2009
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 12-ти років скаржиться на кровоточивість ясен, рухливість зубів. Хворіє з 4-х років. Об'єктивно: ясна у ділянці усіх зубів гіперемовані, набряклі, кровлять під час інструментального обстеження. Корені зубів оголені на 1/3, вкриті білуватим нальотом. Рухливість зубів 2-го ступеня. Зубоясеневі кишені глибиною 4-5 мм. Під час зовнішнього огляду виявлені сухість і потовщення поверхневого шару шкірних покривів у ділянці долонь та підшов; мають місце тріщини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Синдром Папійона-Лефевра
В	Хвороба Хенда-Шулера-Крістчена
С	Генералізований пародонтит
Д	Хвороба Леттерера-Зіве
Е	Локалізований пародонтит
№	крок 2009, 2008, 2007
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	У хлопчика 5-ти років підвищення температури тіла до 39, 2° С, біль у горлі, головний біль, нудота. Об'єктивно: слизова оболонка м'якого піднебіння та піднебінних дужок яскраво гіперемована, чітко відмежована від оточуючих тканин. Язик сухий, набряклий, його бічні поверхні вільні від нальоту, червоного кольору, грибоподібні сосочки помітно збільшені у розмірах. Шкіра обличчя, окрім блілого носогубного трикутника, гіперемована, вкрита дрібною плямистою висипкою. Підщелепні лімфатичні вузли болісні під час пальпації. Визначте збудника даного захворювання:
Правильна відповідь	Гемолітичний стрептокок
В	Вірус Коксакі
С	Вірус герпесу
Д	Паличка Борде-Жанду
Е	Паличка Леффлера
№	крок 2009, 2008, 2007
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	Пацієнт 16-ти років скаржиться на косметичний дефект у ділянці верхніх фронтальних зубів у вигляді білих плям, які виявлені давно і з часом не змінюються. Об'єктивно: білі плями на вестибулярних поверхнях 11, 12, 21, 22 у ріжучого краю та на вестибулярних поверхнях 16, 26, 36, 46 ближче до жувальної поверхні. Під час зондування поверхня плям гладенька, безболісна; реакція на холодний подразник безболісна. Плями не забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Системна гіперплазія емалі
В	Місцева гіпоплазія емалі
С	Гострий початковий карієс
Д	Флюороз, плямиста форма

Е	Ерозія твердих тканин зубів
№	крок 2009
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Дитина 10-ти років скаржиться на гострий, самочинний, нападаподібний біль у зубі на верхній щелепі зліва. Об'єктивно: на дистальній контактній поверхні 26 виявлена каріозна порожнина, заповнена світлим розм'якшеним дентином, локалізована в межах навколопульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини різко болісне, перкусія зуба безболісна. Від холодного виникає тривалий напад болю. В анамнезі у дитини алергія на лідокаїн. Виберіть оптимальну пасту для використання в перше відвідування:
Правильна відповідь	Параформальдегідна
В	Йодоформна
С	Тимолова
Д	Формапрезолова
Е	Цинк-евгенолова
№	крок 2009, 2008
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Дитина 3-х років скаржиться на наявність порожнини в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно: у 84 на жувальній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дентин розм'якшений, зондування стінок порожнини болісне, перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий середній карієс
В	Хронічний поверхневий карієс
С	Хронічний фіброзний пульпіт
Д	Гострий глибокий карієс
Е	Хронічний глибокий карієс
№	крок 2009, 2008, 2007

Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Дитина 7-ми років скаржиться на самочинний біль у верхніх правих кутніх зубах. На медіальній контактній і жувальній поверхнях 55 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним світлим дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна різко болісне, перкусія зуба дещо болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка у проекції коренів 55 зуба не ушкоджена, рентгенологічних змін у цій ділянці не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий дифузний пульпіт
B	Хронічний фіброзний пульпіт
C	Хронічний гангренозний пульпіт
D	Загострення хронічного періодонтиту
E	Гострий глибокий карієс
№	крок 2009
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Хлопчик 8-ми років скаржиться на гострий короткочасний біль у 11 від холодного і солодкого. Об'єктивно: в 11 каріозна порожнина на медіоконтактній поверхні в межах емалево-дентинного сполучення, виповнена розм'якшеним вологим дентином, який легко знімається пластинами. Краї емалі білого кольору, подриті, крихкі. Поверхнєве зондування безболісне, термометрія позитивна, перкусія негативна. Виберіть пломбувальний матеріал:
Правильна відповідь	Склоіономірний цемент
B	Силікофосфатний цемент
C	Композитний матеріал
D	Срібна амальгама
E	Силікатний цемент
№	крок 2009, 2007

Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	У дівчинки 13-ти років скарги на часте випадання пломби в 21. З анамнезу: 2 роки тому лікувалася з приводу травми зуба. Об'єктивно: у 21 дефект 1/3 коронки в поперековому напрямку. Перкусія безболісна. Зуб у кольорі не змінений. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований на 1 мм від верхівки, пломбувальний матеріал щільно прилягає до стінок кореневого каналу. Яка тактика лікаря?
Правильна відповідь	Відновити дефект фотополімером
B	Перепломбувати кореневий канал
C	Провести резекцію верхівки кореня
D	Провести операцію видалення зуба
E	Вкрити зуб штучною коронкою
№	крок 2009
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Батьки 2-х річної дитини скаржаться на наявність нориць з гнійними виділеннями у ділянці передніх зубів верхньої щелепи. Об'єктивно: коронкові частини 51, 52, 61 і 62 зубів значно зруйновані, зондування вустів корневих каналів слабо болісне, супроводжується значною кровоточивістю. Перкусія зубів безболісна. На тлі пастозної ціанотичної слизової оболонки альвеолярного паростка у цій ділянці визначаються рубці та нориці. Визначте найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний гранулюючий періодонтит
B	Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту
C	Загострення хронічного фіброзного періодонтиту
D	Хронічний гранулематозний періодонтит
E	-
№	крок 2009, 2008
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Батьки дитини 1,5 років звернулися до клініки зі скаргами на збільшення язика, порушення прийому їжі. Страждає з народження. Об'єктивно: загальний стан без особливостей. Язик збільшений в розмірі (макроглосія). Слизова оболонка його має зернисті міхуроподібні вирости. Язик щільний, безболісний під час пальпації. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Лімфангіома язика
В	Гемангіома язика
С	Фіброма язика
Д	Кіста язика
Е	Рак язика
№	крок 2009
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Дівчинці 1 рік 6 місяців. На вестибулярній поверхні 52, 51, 61, 62 розлогі каріозні порожнини в межах емалі. Зондування трохи болісне, перкусія 52, 51, 61, 62 безболісна. Яка тактика лікування найбільш доцільна?
Правильна відповідь	Імпрегнація сріблом
В	Пломбування амальгамою
С	Ремінералізуюча терапія
Д	Покриття фтор-лаком
Е	Пломбування фосфат-цементом
№	крок 2009
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Батьки дитини 6-ти років звернулися до дитячого стоматолога з метою профілактичного обстеження дитини. Порожнина рота санована. Нещодавно, зі слів батьків, у дитини прорізалась 36 та 46. Який з методів профілактики карієсу найбільш доцільно використати в перші 1,5-2 роки після прорізування вказаних зубів?

Правильна відповідь	Герметизація фісур
B	Сріблення фісур
C	Покриття зубів фторлаком
D	Аплікації розчином ремоденту
E	Полоскання фторидом натрію
№	крок 2009
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Дитина 12-ти років скаржиться на кровоточивість із зуба під час прийому їжі та чищенні зубів. Зуб раніше болів. Об'єктивно: у 36 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба, виповнена розростаннями червоного кольору. Під час зондування визначається болісність і легка кровоточивість, перкусія безболісна, незначний біль від температурних подразників. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
B	Хронічний гранулюючий періодонтит
C	Хронічний папіліт
D	Ясеневий поліп
E	Хронічний простий пульпіт
№	крок 2009
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Під час санації порожнини рота у дитини 10-ти років на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці 21, 12 виявлені крейдянні плями. Поверхня емалі матова, гладенька, больова реакція на температурні подразники відсутня. Який додатковий метод обстеження підтвердить діагноз?
Правильна відповідь	Вітальне зафарбовування
B	Ортопантомографія
C	Внутрішньоротова рентгенографія

D	ЕОД
Е	Стоматоскопія в ультрафіолетовому світлі
№	крок 2009
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дитина 2-х місяців неспокійна, погано спить, відмовляється від їжі, температура тіла - субфебрильна. Об'єктивно: на гіперерованій слизовій оболонці язика, губ, щік, піднебіння спостерігається сироподібний наліт, який легко знімається тампоном. Регіональні лімфатичні вузли дещо збільшені і болісні під час пальпації. Якому захворюванню відповідає зазначена симптоматика?
Правильна відповідь	Гострий псевдомембранозний кандидозний стоматит
B	Хронічний атрофічний кандидозний стоматит
C	Гострий герпетичний стоматит
D	Дифтерія
Е	Стоматит під час кору
№	крок 2009
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Підліток 16-ти років скаржиться на неприємний запах з рота, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37, 6° C . Симптоми з'явилися два дні тому, нещодавно перехворів на ангіну. Об'єктивно: стан гігієни порожнини рота незадовільний, зуби вкриті шаром м'якого зубного нальоту. Ясна гіпереровані, ясеневі сосочки вкриті брудно-сірим нальотом. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Виразково-некротичний гінгівіт
B	Гострий катаральний гінгівіт
C	Гіпертрофічний гінгівіт
D	Хронічний катаральний гінгівіт
Е	Десквамативний гінгівіт

№	крок 2009
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У хлопчика 6-ти років виявлено збільшені лімфовузли у обох підщелепних та шийних ділянках. Об'єктивно: 75, 84, 85 зруйновані, є прояви кандидозного хейліту. Зі слів матері, в останні 2-3 місяці хлопчик швидко втомлюється, пітніє при найменшому фізичному зусиллі, скаржиться на слабкість, покинув заняття у спортивній секції. Визначте план дообстеження дитини:
Правильна відповідь	Розгорнутий аналіз крові, консультація гематолога
B	Біохімічний аналіз крові, консультація ендокринолога
C	Пункційна біопсія, консультація онколога
D	МРТ, консультація імунолога
E	Рентгенографія легенів, консультація пульмонолога
№	крок 2009
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дівчинка 12-ти років скаржиться на набряклість, почервоніння губ, відчуття свербіж. Хворіє на бронхіальну астму. Подібний стан спостерігається у дитини впродовж 3-х років у зимовий період. Об'єктивно: на червоній облямівці губ і прилеглій шкірі еритема з чіткими межами і набряклість, дрібні тріщинки; мають місце ознаки ліхенізації губ. Спостерігаються сліди розчухувань на шкірі губ, щік і лоба у вигляді подряпин і кірочок. Слизова порожнини рота без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Атопічний хейліт
B	Контактний алергічний хейліт
C	Метеорологічний хейліт
D	Ексфолювативний хейліт
E	Мікробний хейліт
№	крок 2009

Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Батьки 5-річної дитини звернули увагу на нерівномірну забарвленість спинки язика і звернулися до дитячого стоматолога. Об'єктивно: порожнина рота санована, КП=4, на спинці та бокових поверхнях язика - ділянки десквамації епітелію, що межують із зонами гіпертрофії та підвищеного ороговіння ниткоподібних сосочків. В анамнезі - алергія на деякі харчові продукти. Який клінічний діагноз?
Правильна відповідь	Десквамативний глосит
В	Туберкульозний глосит
С	Кандидозний глосит
Д	Герпетичне ураження язика
Е	Гострий катаральний глосит
№	крок 2009
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Хлопчик 12-ти років скаржиться на постійний, інтенсивний пульсуючий біль у зубі, що посилюється при накушуванні. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок колатерального набряку м'яких тканин, підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. В 26 - глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Реакції на термічні подразники та зондування безболісні, перкусія різко болісна, зуб рухомий. На рентгенограмі 26: змін у періодонті немає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний періодонтит
В	Гострий серозний періодонтит
С	Загострення хронічного періодонтиту
Д	Гострий гнійний пульпіт
Е	Пульпіт, ускладнений періодонтитом
№	крок 2009

Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Дівчинка 6-ти років з'явилася до лікаря-стоматолога з метою завершення лікування 75 з приводу загострення хронічного гранулюючого періодонтиту. Скарги відсутні. Об'єктивно: герметична пов'язка в 75 збережена, перкусія зуба безболісна, слизова оболонка в ділянці 75 без патологічних змін, безболісна під час пальпації. Який матеріал доцільно використати для пломбування корневих каналів у даному випадку?
Правильна відповідь	Цинк-євгенолова паста
B	Сілер із гутаперчевим штифтом
C	Кальційвмісна паста
D	Склоіономірний цемент
E	Йодоформна паста
№	крок 2009
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дитина 4-х років захворіла гостро: $t^{\circ} 39^{\circ} C$, головний біль, нудота, біль під час ковтання. Об'єктивно: слизова оболонка м'якого піднебіння і мигдалики різко гіперемовані. Язик у перший день захворювання був обкладений сіруватим нальотом, на другу добу відбулося самоочищення язика. На третю добу язик має гладеньку поверхню, малинове забарвлення, грибоподібні сосочки гіперемовані. Який можливий діагноз?
Правильна відповідь	Скарлатина
B	Вітряна віспа
C	Кір
D	Дифтерія
E	Герпетична ангіна
№	крок 2008

Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчинка 11-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживанні їжі, що турбує її протягом року. Об'єктивно: ясна на верхній і нижній щелепі набряклі, застійно гіперемовані. Гігієнічний стан порожнини рота незадовільний. Прикус ортогнатичний. При рентгенологічному дослідженні пародонту патологічних змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний катаральний гінгівіт
B	Гострий катаральний гінгівіт
C	Генералізований пародонтит
D	Локалізований пародонтит
E	Гіпертрофічний гінгівіт
№	крок 2008
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Дитина 13-ти років звернулася зі скаргами на болісність нижньої губи, яка непокоїть протягом 2-х місяців. Об'єктивно: слизова оболонка нижньої губи гіперемована, вивідні протоки малих слинних залоз розширені, визначається симптом роси. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гландулярний хейліт
B	Метеорологічний хейліт
C	Мікробний хейліт
D	Ексфоліативний хейліт
E	Контактно-алергічний хейліт
№	крок 2008
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	У дитини 8-ми років каріозна порожнина на жувальній поверхні 16 зуба в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини болісне, дентин розм'якшений, слабкопігментований. Від холодого подразника виникає біль, що швидко минає. Оберіть лікувальну пасту в даному випадку:
Правильна відповідь	Гідроксикальцій-вмісна
В	Резорцин-формалінова
С	Параформальдегідна
D	Миш'яковиста
Е	Тимолова
№	крок 2008
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	7-ми місячна дівчинка направлена на консультацію до стоматолога у зв'язку з наявністю виразки порожнини рота. Народилася передчасно. Вигодовування - сумішами з пляшечки з гумовою соскою. Об'єктивно: на межі твердого і м'якого піднебіння виявлена виразка розмірами 0,8x1,0 см, овальної форми, вкрита жовто-сірим нальотом, оточена валикоподібним інфільтратом. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Афта Беднара
В	Афта Сеттона
С	Туберкульозна виразка
D	Гострий герпетичний стоматит
Е	Гострий кандидозний стоматит
№	крок 2008
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН

Текст завдання	До клініки на консультацію звернулася дівчина 17-ти років зі скаргами на наявність дефектів твердих тканин на передніх і бічних зубах, які суб'єктивно їй не турбують. Дефекти коронок існують вже давно. Народилася і проживає у місцевості з вмістом фтору в питній воді 1,2 мг/л. Об'єктивно: на вестибулярних поверхнях різців верхньої і нижньої щелеп у ділянці екватора визначаються дефекти твердих тканин у межах глибоких шарів емалі, розташовані паралельно ріжучому краю. Аналогічні дефекти виявлені у ділянці горбів перших молярів, дно і стінки дефектів гладенькі. Колір емалі на дні - світло-коричневий. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Системна гіпоплазія
В	Місцева гіпоплазія
С	Вогнищева одонтодисплазія
Д	Ендемічний флюороз
Е	Ерозія твердих тканин зуба
№	крок 2008
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Дівчинці 1 рік та 2 місяці. На вестибулярній поверхні 52, 51, 61, 62 великі каріозні порожнини в межах емалі. Зондування трохи болісне, перкусія 52, 51, 61, 62 безболісна. Яка тактика лікування доцільна в даному випадку?
Правильна відповідь	Імпрегнація сріблом
В	Пломбування фосфат-цементом
С	Ремінералізуюча терапія
Д	Покриття фтор-лаком
Е	Пломбування амальгамою
№	крок 2008
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	Дитина 13-ти років скаржиться на біль від холодного у нижньому лівому кутньому зубі протягом декількох місяців. Об'єктивно: на жувальній поверхні 37 зуба виявлена каріозна порожнина з навислими краями емалі, розташована в межах навколопульпарного дентину, заповнена світлим розм'якшеним дентином. Зондування дна дещо болісне. Від холодного виникає короткочасний біль. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс
B	Хронічний фіброзний пульпіт
C	Гострий середній карієс
D	Хронічний гангренозний пульпіт
E	Хронічний глибокий карієс
№	крок 2008
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 11-ти років скаржиться на рухливість зубів, кровоточивість ясен. Хворіє з 3-х років. Об'єктивно: ясна в ділянці всіх зубів гіперемовані, набряклі, кровоточать при інструментальному обстеженні. Корені зубів оголені на 1/3, вкриті білим нальотом. Рухливість зубів 2 ступеня. Зубоясеневі кишені глибиною 4-5 мм. При зовнішньому огляді спостерігається сухість і потовщення шкірних покривів у ділянці долонь, передньої третини передпліч, підошовних поверхонь; наявні тріщини. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Синдром Папійона-Лефевра
B	Хвороба Гоше
C	Хвороба Леттерера-Сиве
D	Хвороба Хенда-Шюллера-Крисчена
E	Хвороба Німана-Піка
№	крок 2008
Тема	ПЕРІОДОНТИТ

Текст завдання	Дитина 8-ми років скаржиться на постійний ниючий біль у 46 зубі, що посилюється при накушуванні, який з'явився вчора. Раніше був біль від холодного. Об'єктивно: у 46 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, порожнина зуба закрита, зондування і реакція на температурні подразники безболісні. Перкусія болісна, відзначається незначна рухливість. Ясна в ділянці 46 гіперемована, набрякла, пальпація її болісна. На Ro-грамі біля верхівки несформованих коренів змін немає. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний періодонтит
B	Гострий гнійний пульпіт
C	Гострий загальний серозний пульпіт
D	Гострий гнійний періодонтит
E	Загострення хронічного періодонтиту
№	крок 2008, 2007
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчинці 13,5 років. Скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання їжі, неприємний запах з рота. Протягом останнього тижня хворіла на ангіну. Об'єктивно: слизова оболонка ясен у ділянці передніх зубів верхньої та нижньої щелеп набрякла, гіперемована. Верхівки ясенних сосочків некротизовані, легко кровоточать при дотику. Відзначаються значні нашарування м'якого зубного нальоту. Визначте збудника захворювання:
Правильна відповідь	Анаеробна мікрофлора
B	Вірус герпеса
C	Стрептококи
D	Стафілококи
E	Дріжджеподібні гриби
№	крок 2008
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Хлопчику 1,8 років. Перебував на лікуванні в інфекційному відділенні, отримував ампіцилін. На 6-й день лікування у дитини, під час огляду, в порожнині рота були виявлені білі нальоти у вигляді сирнистих плівок на гіперерованій слизовій оболонці в ділянці ясеневих валиків, щік і на язиці. Плівки знімаються, оголюючи гіпереровану поверхню. Загальний стан задовільний, температура тіла 36, 7 ⁰ С. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий кандидозний стоматит
В	Медикаментозний стоматит
С	Хронічний кандидозний стоматит
Д	Гострий герпетичний стоматит
Е	М'яка форма лейкоплакії
№	крок 2008
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	У хворого 9-ти років біля ріжучого краю на вестибулярній поверхні І1 виявлена пляма молочного кольору, безболісна при зондуванні та дії температурних подразників. Встановлено діагноз: місцева гіпоплазія емалі І1. Яке лікування даного захворювання?
Правильна відповідь	Курс ремінералізуючої терапії
В	Профілактична гігієна порожнини рота
С	Зішліфовування плями
Д	Герметизація ураженої ділянки
Е	Косметичне пломбування
№	крок 2008, 2007
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Текст завдання	У дитини 7-ми років при зовнішньому огляді виявлено: потовщення перенісся, напіввідкритий рот, сухі губи. Кути рота лущаться. З анамнезу: дитина спить з відкритим ротом. У порожнині рота змін не виявлено. До якої диспансерної групи слід віднести цю дитину?
Правильна відповідь	Друга
B	Перша
C	Третя
D	Четверта
E	-
№	крок 2008
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	У хлопчика 13-ти років скарги на біль від холодного у 46 зубі. Об'єктивно: на жувальній поверхні 46 зуба глибока каріозна порожнина у межах світлого розм'якшеного навколопульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини болісне по всій поверхні, реакція на холододовий подразник різко болісна, швидко минає після припинення його дії. Оберіть оптимальну лікувальну пасту:
Правильна відповідь	Гідроксикальцій-вмісна
B	Тимолова
C	Йодоформна
D	Резорцин-формалінова
E	Цинк-евгенолова
№	крок 2008
Тема	ПЕРІОДОНТИТ

Текст завдання	Дитина 8-ми років скаржиться на біль, що посилюється при накушуванні у 21 зубі. Місяць тому відбувся відлам частини коронки зуба у результаті падіння. До лікаря не звертався. Об'єктивно: у 21 зубі в ділянці медіального кута має місце дефект коронки на 1/3 її висоти. Порожнина зуба відкрита, зондування і реакція на термічний подразник безболісні. Перкусія різко болісна. Ясна в ділянці 21 набрякла, гіперемована. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного періодонтиту
В	Загострення хронічного пульпіту
С	Гострий серозний періодонтит
D	Гострий гнійний періодонтит
Е	Пульпіт, ускладнений періодонтитом
№	крок 2008
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	До клініки звернулася дитина 7-ми років з метою санації порожнини рота. Народилася і проживала у місцевості, де вміст фтору у воді становить 2,5 мг/л. При огляді на вестибулярних поверхнях 11, 21, 31, 41 і на горбах 16, 26, 36, 46 виявлені симетрично розташовані темні плями. З анамнезу з'ясовано, що зуби прорізалися ураженими. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Флюороз зубів
В	Недосконалий одонтогенез
С	Недосконалий амелогенез
D	Системна гіпоплазія емалі
Е	Місцева гіпоплазія емалі
№	крок 2008
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дівчинка 12-ти років скаржиться на печіння і болючість язика, особливо при вживанні гострої їжі. Об'єктивно: на кінчику та спинці язика спостерігаються овальні червоні плями. У ділянках ураження відсутні ниткоподібні сосочки. Дівчинка відзначає, що плями періодично збільшуються і мають мігруючий характер. Вкажіть імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Десквамативний глосит
В	Ромбоподібний глосит
С	Складчастий язик
Д	Волохатий язик
Е	Малиновий язик
№	крок 2008
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	У дівчинки 11-ти років скарги на кровоточивість у зубі на нижній щелепі під час прийому їжі і чищення зубів. Раніше зуб болів, до лікаря не зверталася. Об'єктивно: у 46 зубі глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба, яка заповнена розростаннями червоного кольору. Під час зондування визначається легка кровоточивість і болісність, перкусія болісна, від холодного виникає незначний біль. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
В	Хронічний гранулюючий періодонтит
С	Хронічний папіліт
Д	Ясеневий поліп
Е	Хронічний простий пульпіт
№	крок 2008, 2007
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	Дитина 13-ти років скаржиться на виниклий вчора гострий самочинний короткотривалий біль нападоподібного характеру в ділянці 36, який посилюється під час прийому їжі. Об'єктивно: у 36 глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Порожнина зуба закрита, зондування дна болісне в одній точці. Від холодного подразника виникає нетривалий біль. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий обмежений пульпіт
В	Гострий глибокий карієс
С	Гострий дифузний пульпіт
Д	Хронічний фіброзний пульпіт
Е	Загострення хронічного пульпіту
№	крок 2008
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	На профілактичному огляді у стоматолога дівчинка 11-ти років. Об'єктивно: інтенсивність карієсу КПВз=3, ГІ за Гріном-Вермілліоном - 1,6, РМА=20%. З анамнезу: 1-2 рази за рік хворіє на простудні захворювання. Скільки разів на рік дівчинка повинна відвідувати стоматолога, якщо середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в даній віковій групі складає 4?
Правильна відповідь	3-4
В	1
С	2-3
Д	2
Е	1-2
№	крок 2007
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ

Текст завдання	У хлопчика 10-ти років у порожнині рота виявлено виразковий гінгівіт, пародонтальні кишені, патологічну рухливість всіх зубів, оголення коренів зубів. При рентгенологічному обстеженні виявлено деструкцію альвеолярного паростка лакунарного типу. Клінічно проявляється нецукровий діабет, гепатоспленомегалія, екзофтальм, рентгенологічно - осередкова деструкція плоских кісток. Визначте найбільш вірогідний діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний гістіоцитоз
B	Синдром Папійона-Лефевра
C	Циклічна нейтропенія
D	Гіпоімунглобулінемія
E	Постійна нейтропенія
№	крок 2007
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	У хлопчика 11-ти років у ділянці 24 виникає біль при вживанні солодкої та холодної їжі. Вперше біль виник три тижні тому. Об'єктивно: на жувальній поверхні 24 каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим, розм'якшеним дентином. Зондування емалево-дентинного сполучення болісне, від холодого подразника - короткочасний біль. Перкусія 24 - безболісна. Який пломбувальний цемент найбільш доцільний для постійної пломби?
Правильна відповідь	Склоіономірний
B	Силікофосфатний
C	Фенолятний
D	Силікатний
E	Полікарбоксилатний
№	крок 2007
Тема	ПУЛЬПТ

Текст завдання	Дитина 12-ти років скаржиться на біль у зубі на нижній щелепі з правого боку від холодного і при потраплянні їжі. Об'єктивно: у 46 на медіальній поверхні каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, не сполучається з порожниною зуба, зі світлим розм'якшеним дентином на дні та стінках. Зондування дна болісне в одній точці, перкусія безболісна. Реакція на холод болісна, швидкоминаюча. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий глибокий карієс
B	Гострий середній карієс
C	Гострий обмежений пульпіт
D	Гострий дифузний пульпіт
E	Хронічний простий пульпіт
№	крок 2007
Тема	ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Текст завдання	Дитина 8-ми років звернулася до лікаря-стоматолога з метою санації. При обстеженні було виявлено високу інтенсивність каріозного процесу (кп+КПВ=7), індекс Федорова-Володкіної становив 3,0 бали. Якій оцінці відповідає гігієнічний стан порожнини рота дитини?
Правильна відповідь	Поганий стан
B	Добрий стан
C	Задовільний стан
D	Незадовільний стан
E	Дуже поганий стан
№	крок 2007
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дівчинка 2-х років хворіє 4-й день. Підвищена температура тіла до 38 ⁰ С, вередує, відмовляється від їжі; на 3-й день з'явилися висипання в порожнині рота. Об'єктивно: підщелепні лімфовузли болісні, дещо збільшені. У порожнині рота на слизовій оболонці губ, щік, м'якого піднебіння - численні ерозії, вкриті білуватим нашаруванням, катаральний гінгівіт. Яку мазь слід використати для етіотропного місцевого лікування?
Правильна відповідь	Ацикловір
В	Флуцинар
С	Гідрокортизонова
Д	Клотримазол
Е	Солкосерил
№	крок 2007
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчина 16-ти років скаржиться на розростання ясен, їх кровоточивість, біль під час вживання їжі. Зазначені симптоми виникли рік тому. Об'єктивно: скупченість зубів. На нижній щелепі збільшені в розмірах ясеневі сосочки яскраво-червоного кольору, які вкривають коронки зубів на 1/2 і кровоточать при дотику. На рентгенограмі змін немає. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гіпертрофічний гінгівіт
В	Фіброматоз ясен
С	Генералізований пародонтит
Д	Локалізований пародонтит
Е	Катаральний гінгівіт
№	крок 2007
Тема	КАРІЄС

Текст завдання	На прийом до лікаря звернулася мати з дитиною 8-ми років з скаргами на зміну кольору передніх зубів у пришийковій ділянці. Гігієнічний індекс дорівнює 2,8, слина в'язка, КПВ+кп = 10, на вестибулярній поверхні 21 та 12 у пришийковій ділянці крейдоподібні плями, забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Вогнищева демінералізація
В	Гострий поверхневий карієс
С	Ерозія емалі
Д	Флюороз емалі
Е	Гіпоплазія емалі
№	крок 2007
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Дівчині 13-ти років після обстеження було встановлено діагноз хронічного гіпертрофічного гінгівіту, фіброзна форма. Які лікарські препарати необхідно призначити в першу чергу?
Правильна відповідь	Склерозуючі
В	Протизапальні
С	Протеолітичні ферменти
Д	Кортикостероїди
Е	Протигрибкові
№	крок 2007
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Дитина 9-ти років скаржиться на короткочасний біль від солодкого у 22. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 22 дефект у межах емалі. Зондування безболісне. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий поверхневий карієс
В	Флюороз емалі

С	Гіпоплазія емалі
D	Гострий початковий карієс
E	Гострий середній карієс
№	крок 2007
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	У дівчинки 6-ти років скарги на гострий самочинний біль у зубі на верхній щелепі з правого боку, що підсилюється при вживанні гарячої їжі. Біль з'явився день тому. Об'єктивно: у 55 глибока каріозна порожнина виповнена розм'якшеним дентином, після його видалення легко відкривається порожнина зуба, глибоке зондування якої болісне. Перкусія позитивна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний пульпіт
B	Загострення хронічного пульпіту
С	Гострий гнійний періодонтит
D	Гострий серозний пульпіт
E	Пульпіт, ускладнений періодонтитом
№	крок 2007
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	У дитини 10-ти років у 36 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина зі світлим, розм'якшеним дентином. Зондування дна дещо болісне, на холодну воду біль швидкоминаючий. Було діагностовано гострий глибокий карієс. При лікуванні випадково було розтинено ріг пульпи. Ваша тактика в даній ситуації:
Правильна відповідь	Накладення гідроксикальційвмісної пасти
B	Вітальна ампутація пульпи
С	Вітальна екстирпація пульпи
D	Девітальна ампутація
E	Девітальна екстирпація
№	крок 2007

Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ ПАРОДОНТУ
Текст завдання	Хворий 14-ти років звернувся зі скаргами на біль та кровоточивість ясен. Захворів 3 дні тому. Об'єктивно: загальний стан задовільний, відзначається блідість шкірних покривів, температура 38 ⁰ С, підщелепні лімфовузли болісні під час пальпації, злегка збільшені, не спаяні з підлеглими тканинами. У ділянці 44, 45, 46, 47 відзначається наявність брудно-сірого нальоту, порушення цілісності ясеневих сосочків та крайової ясни, рясне відкладення зубного нальоту. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Виразково-некротичний гінгівіт
В	Гострий герпетичний гінгівіт
С	Гострий катаральний гінгівіт
D	Хронічний катаральний гінгівіт
Е	Гіпертрофічний гінгівіт
№	крок 2007
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Хворий 14-ти років звернувся зі скаргами на слабо виражений ниючий біль у нижній щелепі з лівого боку в ділянці 37, без іррадіації. Об'єктивно: на жувальній поверхні 37 - глибока каріозна порожнина, з'єднана з порожниною зуба, зондування безболісне, реакція на термічні подразники відсутня, вертикальна перкусія позитивна; на рентгенограмі в ділянці 37 змін немає. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий серозний періодонтит
В	Гострий гнійний пульпіт
С	Гострий гнійний періодонтит
D	Гострий серозний періостит
Е	Загострення хронічного періодонтиту

№	крок 2007
Тема	ПЕРІОДОНТИТ
Текст завдання	Хлопчик 8-ми років скаржиться на біль у 54, який виник 3 дні тому і посилюється при накушуванні. Раніше зуб лікували. Об'єктивно: у 54 велика пломба, на слизовій оболонці коміркового відростка в ділянці 54 нориця з мізерним виділенням, зуб має рухливість II ступеня. Оберіть тактику лікування:
Правильна відповідь	Видалення 54 зуба
В	Ендодонтичне лікування 54 зуба
С	Ендодонтичне лікування 54 зуба та періостотомія
Д	Видалення 54 зуба та періостотомія
Е	Видалення 54 зуба та протизапальне лікування
№	крок 2007
Тема	НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН
Текст завдання	У дитини 10-ти років під час профілактичного огляду на вестибулярній поверхні І1 виявлений дефект твердих тканин зуба у вигляді чашоподібного заглиблення. Емаль у ділянці дефекту гладенька, блискуча, барвниками не забарвлюється. В анамнезі у віці 3х років вбитий вивих 51 зуба. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:
Правильна відповідь	Місцева гіпоплазія
В	Гострий початковий карієс
С	Вогнищева гіпоплазія емалі
Д	Гострий поверхневий карієс
Е	Флюороз зубів
№	крок 2007
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	У дитини 7-ми років на апроксимальній поверхні 55 глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. З анамнезу відомо, що 3-4 місяці тому неодноразово був нічний самочинний біль. При зондуванні дна каріозної порожнини виявляється біль та кровоточивість. Термометрія позитивна. Перкусія 55 зуба безболісна. Оберіть найбільш раціональний метод лікування:
Правильна відповідь	Девітальна ампутація
В	Девітальна екстирпація
С	Біологічний метод
Д	Вітальна ампутація
Е	Вітальна екстирпація
№	крок 2007
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Дитина 5-ти років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі з правого боку, що посилюється вночі та під час вживання холодного. Подібний біль у зубі був півроку тому. Об'єктивно: у 65 зубі глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води біль, що повільно минає. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного пульпіту
В	Гострий серозний періодонтит
С	Загострення хронічного періодонтиту
Д	Гострий дифузний пульпіт
Е	Гострий гнійний пульпіт
№	крок 2007
Тема	ПУЛЬПІТ

Текст завдання	Дитині 9,5 років. Скаржиться на біль під час їжі в правому кутньому нижньому зубі. На жувальній поверхні 46 зуба визначена глибока каріозна порожнина, яка заповнена розм'якшеним дентином світло-коричневого кольору, що сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, супроводжується помірною кровоточивістю. Перкусія зуба безболісна. Визначте найбільш вірогідний діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний пульпіт
B	Хронічний гангренозний пульпіт
C	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
D	Гострий серозний пульпіт
E	Гострий гнійний пульпіт
№	крок 2007
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Під час проведення профілактичного огляду в дитячому садку у дитини 3,5 років виявлена каріозна порожнина на апроксимальній поверхні 54. Об'єктивно: каріозна порожнина з широким входом, дентин щільний, пігментований. Зондування дна і стінок порожнини безболісне. Перкусія зуба безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
B	Гострий середній карієс
C	Хронічний глибокий карієс
D	Гострий глибокий карієс
E	Хронічний поверхневий карієс
№	крок 2007
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дитина 14-ти років звернулася на прийом зі скаргами на незвичайний вигляд язика. Об'єктивно: на поверхні язика глибокі борозни, які розташовуються симетрично у поздовжньому та поперечному напрямках. Дно і бокові поверхні складок вкриті гіпертрофованими сосочками. Язик збільшений у розмірах. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Складчастий язик
В	Чорний волохатий язик
С	Гострий катаральний глосит
D	Десквамативний глосит
Е	Ромбоподібний глосит
№	крок 2007
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	Пацієнт 5-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на болючість та набряк губ. В анамнезі - дискінезія жовчних шляхів та поствакцинальна алергія. Хворіє біля 1 року; в літку спостерігалось покращення. Об'єктивно: червона облямівка губ інфільтрована, вкрита дрібними лусочками, в кутах рота - тріщини. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Алергічний хейліт
В	Ексфоліативний хейліт
С	Мікробний хейліт
D	Метеорологічний хейліт
Е	Травматичний хейліт
№	крок 2007
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Дитина 15-ти років скаржиться на стовщення нижньої губи. Об'єктивно: нижня губа майже вдвічі збільшена в об'ємі. Її червона облямівка суха, вкрита лусочками. Шкіра в ураженій ділянці бліда. Пальпаторно визначається м'який набряк. Визначте найбільш вірогідний діагноз:
Правильна відповідь	Макрохейліт
В	Алергічний хейліт
С	Метеорологічний хейліт
Д	Актинічний хейліт
Е	Атопічний хейліт
№	крок 2009
Тема	КАРІЄС
Текст завдання	Дитина 10-ти років скаржиться на гострий, самочинний, нападоподібний біль у зубі на верхній щелепі зліва. Об'єктивно: на дистальній контактній поверхні 26 виявлена каріозна порожнина, заповнена світлим розм'якшеним дентином, локалізована в межах навколопульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини різко болісне, перкусія зуба безболісна. Від холодного виникає тривалий напад болю. В анамнезі у дитини алергія на лідокаїн. Виберіть оптимальну пасту для використання в перше відвідування:
Правильна відповідь	Параформальдегідна
В	Йодоформна
С	Тимолова
Д	Формапрезолова
Е	Цинк-евгенолова
№	крок 2016
Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

Текст завдання	Хвора 16-ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. З анамнезу: часті носові кровотечі, загальна слабкість. Об'єктивно: блідість шкірних покривів і слизової оболонки рота, на слизовій щік, язика та м'якого піднебіння множинні петехії. В крові: ер. 3, $1 \cdot 10^{12}$ /л, Нв 94 г/л, КП 0,9, лейкоц. $9 \cdot 10^9$ /л, тромб. $80 \cdot 10^9$ /л, час зсідання крові 9 хв., ШОЕ 18 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хвороба Верльгофа
В	Хвороба Вакеза
С	Хвороба АддісонаБірмера
Д	Залізодефіцитна анемія
Е	Хронічний лімфолейкоз
№	крок 2016
Тема	ПУЛЬПІТ
Текст завдання	Дитина 6-ти років скаржить на неприємні відчуття і біль в 65 зубі, що посилюються під час прийому гарячої їжі. Батьки дитини помітили появу неприємного запаху з рота. З анамнезу: нещодавно 65 зуб непокоїв інтенсивним нічним болем. Об'єктивно: в 65 зубі глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, зондування коронкової пульпи безболісне, під час глибокого зондування кореневих каналів виникає біль. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний гангренозний пульпіт
В	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
С	Хронічний фіброзний пульпіт
Д	Хронічний гранулюючий періодонтит
Е	Хронічний глибокий карієс
№	крок 2016

Тема	ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
Текст завдання	У дівчинки 2-х років третій день підвищена температура тіла до $38^{\circ}C$. Вона вередлива, відмовляється від їжі. На яскраво гіперемованій слизовій оболонці губ, щік, м'якого піднебіння чисельні дрібні ерозії, вкриті фібринозним нальотом, які зливаються. Підщелепні лімфовузли болісні, дещо збільшені. Визначається гострий катаральний гінгівіт. Який препарат доцільно використати для етіотропного місцевого лікування?
Правильна відповідь	Ацикловір
B	Гідрокортизон
C	Метрогіл
D	Клотримазол
E	Солкосерил
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Батьки дитини 5-ти місяців скаржаться на появу у неї білого нальоту у роті і відмову від годування. Об'єктивно: загальний стан задовільний, $t^{\circ} 37, 1^{\circ}C$. Визначаються білі сирністі нашарування на слизовій щік, губ, твердому піднебінні. Нашарування легко знімається, слизова під ним гіперемована. Який додатковий метод обстеження підтвердить діагноз?
Правильна відповідь	Мікробіологічний
B	Імунофлюоресцентний
C	Цитологічний
D	Імунологічний
E	Вірусологічний
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Юнак 12-ти років звернувся зі скаргами на біль, кровоточивість ясен. Захворів 4 дні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, температура тіла 38,5° С . Підщелепні лімфовузли зліва збільшені і болісні, не спаяні з підлеглими тканинами. Ясенні сосочки і крайова частина ясни у ділянці 33, 34, 35, 36, 37 зубів гіперемовані, виразковані, вкриті некротичним нальотом. На зубах відкладання м'якого зубного нальоту. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Виразково-некротичний гінгівіт
B	Гострий катаральний гінгівіт
C	Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
D	Хронічний катаральний гінгівіт
E	-
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Батьки дівчинки 3-х років скаржаться на рухомість зубів. Об'єктивно: зуби рухомі, ясенні сосочки набряклі, синюшні, спостерігаються патологічні кишени з гнійним виділенням. Відмічається підвищене ороговіння шкіри, особливо долоней і підшов. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Хвороба Папійона-Лефевра
B	Хвороба Такахара
C	Хвороба Гоше
D	Хвороба Німмона-Піка
E	Хвороба Таратинова
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Хлопчик 9-ти років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури. Об'єктивно: катаральний гінгівіт, нальот на язиці, гіперемія піднебінних дужок, гіпертрофія мигдаликів, неприємний запах із роту, лімфаденіт. За даними педіатра - збільшення печінки, селезінки, виразний моноцитоз. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Інфекційний моноклеоз
В	Гострий герпетичний стоматит
С	Багатоформна ексудативна ерітема
Д	Герпетичена ангіна
Е	Синдром Стівенса-Джонсона
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Хлопчик 8-ми років скаржиться на біль в зубі під час їжі. Об'єктивно: в 55 на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, відмічається кровоточивість, перкусія безболісна. Яку пасту необхідно накласти в перше відвідування?
Правильна відповідь	Параформальдегідна
В	Миш'яковиста
С	Резорцин-формалінова
Д	Тимолова
Е	Кальційвмісна
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Дівчинка 8-ми років скаржиться на біль у роті під час їжі. Об'єктивно: на перехідній складці у фронтальному відділі нижньої щелепи ерозія овальної форми, вкрита жовтуватим нальотом, ерозія з обляміркою червоного кольору, розміром - 5x7 мм. Така ерозія була рік тому. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
B	Гострий герпетичний стоматит
C	Синдром Бехчета
D	Афта Сетона
E	-
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Батьки дитини 6-ти місяців скаржаться на наявність нальоту в порожнині рота у дитини. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемована, вкрита білим нальотом, що нагадує зсіле молоко, наліт легко знімається. Що являється збудником даного захворювання?
Правильна відповідь	Гриби роду <i>Candida</i>
B	Вірус простого герпеса
C	Паличка Лефлера
D	Вірус Коксакі
E	Вірус Епштейна-Барра
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Під час профогляду у 11-річної дівчинки встановлена відсутність емалі на горбиках молярів та однакові за розміром білі плями з чіткими контурами на однойменних зубах. Жувальна поверхня молярів шорстка, тверда, зондування безболісне, поверхня плям блискуча, не фарбується 1% розчином метиленового синього. Який з зазначених діагнозів вірний?

Правильна відповідь	Системна гіпоплазія
B	Місцева гіпоплазія
C	Множинний карієс
D	Підвищене стирання зубів
E	Флюороз
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Під час профілактичного огляду у 4,5-річної дитини виявлені приховані каріозні порожнини на контактних поверхнях 54 і 55 зубів. Після видалення навислих країв емалі розм'якшений дентин був легко видалений екскаватором у межах плащового дентину. Оберіть оптимальний матеріал для постійної пломби:
Правильна відповідь	Компомерний матеріал
B	Композитний матеріал
C	Силікатний цемент
D	Силікофосфатний цемент
E	Полікарбоксилатний цемент
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Дитина 1,5 років хворіє протягом двох днів, відмовляється від їжі, неспокійна. Батьки відзначають підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}C$, появу болісних виразок у ротовій порожнині. Об'єктивно: на слизовій оболонці м'якого і твердого піднебіння визначається 5-7 дрібних ерозій овальної форми з тонкою червоною облямівкою, вкритих фібринозним нальотом. Регіонарні лімфатичні вузли дещо збільшені, болісні під час пальпації. Відзначається набряк, гіперемія і кровоточивість ясен. Визначте найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Гострий герпетичний стоматит

В	Герпетична ангіна
С	Інфекційний мононуклеоз
Д	Багатоформна ексудативна еритема
Е	Гострий кандидозний стоматит
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Дитина 14-ти років скаржиться на косметичний дефект у ділянці передніх зубів. Об'єктивно: емаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 у ділянці ріжучого краю витончена, паралельно ріжучому краю визначається борозенчасте заглиблення емалі шириною 1,5 мм, що оперізує зуби. Горби 16, 26, 36, 46 недорозвинені, конічної форми. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Системна гіоплазія
В	Недосконалий дентиногенез
С	Недосконалий амелогенез
Д	Місцева гіоплазія
Е	Дисплазія Стентона-Капдепона
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Дівчинка 9-ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. Хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: ясенні сосочки у ділянці зубів верхньої і нижньої щелеп гіперемовані, набряклі, вкривають коронку на 1/3. Який метод дослідження необхідний з метою диференційної діагностики?
Правильна відповідь	Рентгенографія
В	Реопародонтографія
С	Вакуумна проба
Д	Проба Кулаженко
Е	Проба Пісарєва-Шилєра

№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Мати дитини 1,5 років звернулася зі скаргами на наявність виразок на слизовій оболонці порожни рота, слинотечу, в'ялість дитини, блювання, підвищення температури тіла до 39° С . Дитина хворіє другий день, захворіла раптово. Об'єктивно: ясна гіперемовані, набряклі. На слизовій оболонці язика, щік, губ знаходяться ерозії овальної форми, діаметром 2-3 мм, вкритих білуватим нальотом, болісні під час пальпації. На шкірі обличчя навколо губ 4 міхурці, наповнені напівпрозорим вмістом. Підщелепові лімфовузли збільшені. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий герпетичний стоматит
В	Гострий грибковий стоматит
С	Багатоформна ексудативна еритема
Д	Медикаментозний стоматит
Е	Рецидивуючий герпетичний стоматит
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	ТЕМА
Правильна відповідь	7-ий
В	15-ий
С	18-ий
Д	4-ий
Е	12-ий
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Батьки 12-річної дитини скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, які з'явилися півроку тому. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 виявлені крейдоподібні плями. Емаль над ними втратила блиск, при зондуванні - піддатлива, шорстка. В анамнезі - короткочасний біль від хімічних подразників. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий початковий карієс
В	Хронічний початковий карієс
С	Гострий поверхневий карієс
D	Системна гіоплазія емалі
Е	Флюороз зубів
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	У дитини 6,5 років під час профілактичного огляду виявлено каріозну порожнину на дистально-апроксимальній поверхні 65 в межах плащового дентину. Дно та стінки пігментовані, щільні, при зондуванні безболісні, на холодне зуб не реагує, перкусія безболісна. Під час препарування відзначається болісність на рівні емалево-дентинного сполучення. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
В	Гострий середній карієс
С	Хронічний глибокий карієс
D	Хронічний фіброзний пульпіт
Е	Хронічний гранулюючий періодонтит
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Дитина 4-х років, практично здорова, оглянута з метою санації. Об'єктивно: на жувальній поверхні 75 каріозна порожнина у межах плащового дентину, виповнена розм'якшеним дентином. Емалево-дентинне покриття болісне при зондуванні. Який оптимальний матеріал для постійної пломби?
Правильна відповідь	Склоіономерний цемент
В	Фосфатний цемент
С	Силікофосфатний цемент
D	Композитний матеріал
Е	Силікатний цемент
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Дитина 7,5 років, практично здорова, скаржиться на перелом коронкової частини і біль у передньому правому верхньому зубі. Об'єктивно: коронкова частина 11 зуба відсутня на 2/3, пульпа оголена, має червоний колір, при зондуванні - різко болісна і кровоточить, перкусія зуба болісна. З моменту травми пройшло 2 години. Виберіть оптимальний метод лікування:
Правильна відповідь	Вітальна ампутація
В	Девітальна ампутація
С	Вітальна екстирпація
D	Девітальна екстирпація
Е	Біологічний метод
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Батьки 2,5-річної дитини скаржаться на руйнування передніх зубів верхньої щелепи протягом декількох місяців. Об'єктивно: на контактних і вестибулярних поверхнях 52, 51, 61, 62 зубів виявлені каріозні порожнини в межах плащового дентину, заповнені розм'якшеним пігментованим дентином, який легко знімається екскаватором. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий середній карієс
В	Хронічний глибокий карієс
С	Гострий глибокий карієс
Д	Хронічний середній карієс
Е	Хронічний поверхневий карієс
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Хлопчику 7 років було проведено герметизацію фісур 36 та 46 зубів. Коли найбільш ефективно проведення герметизації фісур?
Правильна відповідь	Одразу ж після прорізування постійного зуба
В	Після формування постійного прикусу
С	Після виявлення карієсу постійних зубів
Д	Через 1-2 роки після прорізування
Е	Через 3-4 роки після прорізування
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Дівчинка 6-ти років захворіла два дні тому, після прийому парацетамолу з приводу ГРВІ. Захворювання розпочалося гостро з підвищення температури тіла до 39,8° С . Об'єктивно: на шкірі обличчя виявлені плямисто-папульозні висипання у вигляді "кокард". Червона облямівка губ набрякла, гіперемована, вкрита масивними коричневими нашаруваннями і тріщинами, що кровоточать. Кон'юнктивіт. На набряклій і гіперемованій слизовій оболонці порожнини рота численні ерозії, покриті фібринозним нальотом, різко болісні під час пальпації. Визначте найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Синдром Стівенса-Джонсона
В	Багатоформна ексудативна еритема
С	Гострий герпетичний стоматит
Д	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
Е	Пухирчатка
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	У дитини 9-ти років при санації порожнини рота в 85 зубі на жувальній поверхні виявлена каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. При зондуванні виникає різкий біль, помірна кровоточивість. Від холодної води повільно минутий біль. Перкусія зуба безболісна. Виберіть оптимальний метод лікування:
Правильна відповідь	Девітальна ампутація
В	Вітальна екстирпація
С	Девітальна екстирпація
Д	Вітальна ампутація
Е	Біологічний метод
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Дитина 14-ти років скаржиться на сухість і лущення губ, особливо в осінньо-зимовий період. Об'єктивно: червона облямівка губ суха, інфільтрована, вкрита численними лусочками. Шкіра губ ущільнена, пігментована, визначається посилення її малюнка, лущення, а також радіальні тріщини. Водночас, відзначається сухість, ліхенізація і екскоріація шкіри обличчя. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Атопічний хейліт
B	Ексфоліативний хейліт
C	Актинічний хейліт
D	Метеорологічний хейліт
E	Контактний алергічний хейліт
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Оглядаючи дитину 5-ти років, лікар знайшов множинні крейдоподібні цятки, яскраво-жовтого кольору, що уражають емаль більшості зубів верхньої і нижньої щелеп. При висушуванні плями здобувають матовий відтінок і глянцеvu поверхню. При фарбуванні 2% розчином метиленового синього, забарвлення не відбувається. Дитина мешкає в місцевості з вмістом фтору у воді 2,0 мг/л. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Флюороз зубів
B	Системна гіпоплазія емалі
C	Мармурова хвороба
D	Недосконалий амелогенез
E	Недосконалий дентиногенез
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Мати дівчинки 4-х років скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 38° С , кашель, нежить. Регіональні лімфатичні вузли збільшені. При огляді ротової порожнини на гіперерованій слизовій оболонці щік у ділянці кутніх зубів виявлені точкові плями розміром за шпилькову голівку, що нагадують бризки вапна. Під час пальпації уражених ділянок відчувається нерівність слизової оболонки. Вкажіть імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Стоматит при корі
B	Стоматит при вітряній віспі
C	Стоматит при краснусі
D	Багатоформна ексудативна еритема
E	Гострий герпетичний стоматит
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Дитина 13-ти років скаржиться на періодичну кровоточивість ясен під час чищення зубів протягом півроку. Об'єктивно: слизова оболонка ясен в ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи застійно гіперерована, набрякла. Значення індексу КПВ дорівнює 4. Рівень гігієнічного догляду за ротовою порожниною незадовільний. У даному випадку необхідно рекомендувати зубні пасти, що містять:
Правильна відповідь	Екстракти трав
B	Цитрат цинку
C	Гліцерофосфат кальцію
D	Амінофториди
E	Сольові добавки
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Дівчинка 12-ти років скаржиться на біль у роті, особливо під час вживання їжі. Із анамнезу: вказані симптоми спостерігаються 1-2 рази за рік. Об'єктивно: на перехідній складці слизової оболонки виявлені 3 афти розміром 5-7 мм, вкриті жовтуватим нальотом, оточені запаленою облямівкою червоного кольору, при доторканні різко болючі. Вкажіть імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
В	Гострий герпетичний стоматит
С	Хронічний рецидивуючий герметичний стоматит
Д	Багатоформна ексудативна еритема
Е	Токсично-алергічний медикаментозний стоматит
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	У дівчинки 6-ти років індекс КПУ+кп дорівнює 3,0. ПІ за Федоровим-Володкіною - 3. У перших постійних молярах визначаються глибокі слабомінералізовані фісури. Який метод є оптимальним для профілактики карієсу у цих зубах?
Правильна відповідь	Герметизація фісур
В	Імпрегнація азотнокислим сріблом
С	Аплікації 3% розчину ремодента
Д	Аплікація 0,2% розчину фурациліну
Е	Покриття зубів фтористим лаком
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Дівчинка 8-ми років скаржиться на зміну кольору 21 зуба, болі від теплого. Декілька місяців тому 21 зуб лікували з приводу гострого дифузного пульпіту методом вітальної ампутації. Об'єктивно: у 21 пломба, перкусія безболісна. На рентгенограмі: корінь сформований на 2/3, кортикальна пластинка комірки зуба у ділянці верхівки кореня не порушена. Який матеріал слід використати для пломбування каналу у даному випадку?
Правильна відповідь	Кальційгидроксидна паста
B	Цинк-фосфатний цемент
C	Резорцин-формалінова паста
D	Склоіономерний цемент
E	–
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Дитина 4-х років скаржиться на гострий біль у зубі на нижній щелепі, що з'явився добу тому. Об'єктивно: на жувальній поверхні 74 каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, зондування і перкусія різко болісні, відповідь на термічні подразники позитивна. Ясна у ділянці 74 зуба гіперемована, набрякла. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий пульпіт, ускладнений періодонтитом
B	Гострий серозний періодонтит
C	Гострий гнійний пульпіт
D	Загострення хронічного періодонтиту
E	Гострий серозний пульпіт
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Пацієнт 12-ти років тижень тому переніс ГРВІ. Скарги на біль і свербіж у яснах, кровоточивість під час прийому їжі. На верхній і нижній щелепах ясна гіперемовані, набряклі, кровлять під час дотику інструментом, індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5 бали, індекс КПУ-6, проба Шилера-Пісарева позитивна. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного катарального гінгівіту
B	Хронічний катаральний гінгівіт
C	Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
D	Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма
E	Пародонтит, стадія загострення
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Дитина 10-ти років скаржиться на постійний біль у 36 зубі пульсуючого характеру, що з'явився день тому, від гарячого біль посилюється, від холодного - дещо послаблюється. Об'єктивно: у 36 зубі на жувальній і медіальній поверхнях - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба, зондування дна порожнини, перкусія болісні. На R-грамі патологічних змін у періодонті немає. Який метод лікування слід використати?
Правильна відповідь	Вітальної екстирпації
B	Девітальної екстирпації
C	Вітальної ампутації
D	Девітальної ампутації
E	Консервативний
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	У 7-річної практично здорової дитини під час препарування каріозної порожнини у 46 зубі з приводу гострого середнього карієсу був випадково розкритий медіально-щічний ріг пульпи. Оберіть оптимальний метод лікування у даному випадку:
Правильна відповідь	Біологічний метод
B	Девітальна ампутація
C	Девітальна екстирпація
D	Вітальна ампутація
E	Вітальна екстирпація
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	У юнака 17-ти років скарги на нездужання, лихоманку, болі у ясні. Захворів 2 дні тому, температура тіла - $38,5^{\circ}C$. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні, рухливі. Ясна на нижній щелепі гіперемована, набрякла, ясенні сосочки кровлять, по краю сірувато-білий наліт, сосочки у ділянці 41, 42, 43 відсутні. Яка мікрофлора найбільш імовірно буде виявлена при мікробіологічному дослідженні?
Правильна відповідь	Фузо-спірилярний симбіоз
B	Стрептококи
C	Дифтерійна паличка
D	Дріжджеподібні гриби
E	Стафілококи
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Дівчинка 13-ти років скаржиться на болісність, кровоточивість ясен і запах з рота, які з'явилися близько півроку тому. Об'єктивно: у ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи ясенні сосочки і ясенний край гіпертрофовані, набряклі, ціанотичні. У пришийковій ділянці зубів наявний м'який наліт. ПІ=3. Лікар провів місцеву протизапальну терапію. Яке місцеве лікування слід провести у подальшому?
Правильна відповідь	Повна професійна гігієна порожнини рота
В	Кюретаж кишень
С	Гінгівотомія
Д	Фізіотерапія
Е	Вестибулопластика
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Дівчинка 9-ти років скаржиться на постійний біль в 11 зубі, який місяць тому був травмований з відколом коронки. Зуб не ліку-вався. Об'єктивно: коронка 11 зуба відсутня на 1/4 висоти, сіруватого кольору, порожни-на зуба закрита. Перкусія болісна. Перехідна складка набрякла, різко болісна під час паль-пації. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий травматичний періодонтит
В	Гострий гнійний дифузний пульпіт
С	Гострий гнійний періодонтит
Д	Загострення хронічного періодонтиту
Е	Хронічний гранулюючий періодонтит
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Хлопчик 10-ти років скаржиться на наявність болючої виразки в роті, яка збільшується і не гоїться вже 1,5 місяці, Об'єктивно: на слизовій щоки неглибока виразка діаметром 2 см з нерівними підритими краями, м'якої консистенції. Дно виразки горбисте, вкрите жовто-сірим нальотом. Навколо виразки багато дрібних горбиків жовтуватого кольору. Регіонарні лімфатичні вузли еластичні, болісні, спаяні в пакети. Проявом якого захворювання можуть бути дані симптоми?
Правильна відповідь	Туберкульоз
В	Червоний плескатий лишай
С	Виразково-некротичний стоматит
Д	Рак
Е	Сифіліс
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Батьки дитини 3-х років скаржаться на появу у неї болісних висипань і відмову від їжі. Під час огляду: на шкірі навколоротової ділянки - 10 пухирців з геморагічним вмістом. На слизовій оболонці губ - декілька афт округлої форми, діаметром 1-3 мм. Визначаються гострий катаральний гінгівіт і підщелепний лімфаденіт. Оберіть засоби для етіотропного лікування:
Правильна відповідь	Противірусні
В	Протизапальні
С	Протигрибкові
Д	Гіпосенсибілізуючі
Е	Антибіотики
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Пацієнту 10 років. Скарги на загальне нездужання, підвищення температури тіла до 38° С , біль під час ковтання. Об'єктивно: запалення слизової оболонки у ділянці зіву, піднебінних дужок і язичка, набряк мигдаликів. На мигдаликах визначається масивний фібринозний плівковий наліт, щільно спаяний з підлеглими тканинами, що поширюється на м'яке і тверде піднебіння. Плівки розташовані також на яснах і язиці. Визначаються підщелепний і шийний лімфаденіти. Який збудник захворювання?
Правильна відповідь	Паличка Лефлера
B	Вірус Коксакі
C	Вірус герпесу
D	Гемолітичний стрептокок
E	Паличка Борде-Жангу
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Батьки 3-річної дитини скаржаться на руйнування зубів верхньої щелепи. Об'єктивно: на жувальних поверхнях 54, 55 зубів виявлені каріозні порожнини у межах емалево-дентинного сполучення. Емаль в ділянці ураження розм'якшена, легко видаляється екскаватором. Дитина відмовляється від препарування, її психоемоційний стан нестабільний. Який метод лікування слід запропонувати у даному випадку?
Правильна відповідь	ART-методика
B	Ремінералізуюча терапія
C	Покриття фтор-лаком
D	Інвазивна герметизація
E	Неінвазивна герметизація
№	крок 2017-2018

Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулася 12-річна дівчинка зі скаргами на самовільний, нападоподібний біль із короткочасними безбольовими проміжками, тривалістю 10-20 хв., у ділянці 16 зуба, який посилюється вночі при горизонтальному положенні тіла, що виник 2 доби тому. При об'єктивному обстеженні 16 зуба виявлено глибоку каріозну порожнину, заповнену розм'якшеним дентином. Зондування болісне по всьому дну, вертикальна перкусія злегка болісна, біль посилюється від температурних подразників, електрозбудливість пульпи - 15-20 мкА. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий дифузний пульпіт
В	Хронічний конкрементозний пульпіт
С	Гострий обмежений пульпіт
Д	Частковий дифузний пульпіт
Е	Хронічний фіброзний пульпіт
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	При об'єктивному огляді дитини 10-ти років було виявлено незначну гіперемію, інфільтрацію, сухість всієї поверхні червоної облямівки губ. Архітектоніка губ порушена. Відмічається сухість та стягнутість губ, особливо в холодну пору року. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Метеорологічний хейліт
В	Атопічний хейліт
С	Алергічний хейліт
Д	Ексфоліативний хейліт
Е	Мікробний хейліт
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Дитина 7-ми років скаржиться на біль під час їжі у верхньому правому кутньому зубі. На жувальній поверхні 55 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину, яка сполучається з порожниною зуба. При зондуванні сполучення виникає різкий біль, помірна кровоточивість. Перкусія зуба безболісна. Рентгенологічно змін у періодонті 55 зуба немає. Виберіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний пульпіт
B	Хронічний гангренозний пульпіт
C	Загострення хронічного фіброзного пульпіту
D	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
E	Загострення хронічного гангренозного пульпіту
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Батьки 4-річної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи дитини. Об'єктивно: в пришийковій ділянці вестибулярної поверхні різців верхньої щелепи виявлені дефекти, які не перетинають емалево-дентинного сполучення і мають вигляд ділянок крейдоподібно зміненої емалі з видимим руйнуванням її структури. При зондуванні визначається шорстка, розм'якшена поверхня. Реакція на холодові подразники відсутня. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий поверхневий карієс
B	Гострий середній карієс
C	Гострий початковий карієс
D	Хронічний початковий карієс
E	Хронічний поверхневий карієс
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	Дівчинка 14-ти років звернулася із скаргами на затримку їжі в зубі на нижній щелепі зліва. Об'єктивно: в 36 зубі на жувальній поверхні - каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину з широким входним отвором. Дентин щільний, пігментований. Зондування дна та стінок безболісне. Перкусія зуба безболісна. Термодіагностика чутлива, біль швидко минає після усунення подразника. Дитина за станом здоров'я належить до I групи. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний глибокий карієс
B	Гострий глибокий карієс
C	Хронічний середній карієс
D	Хронічний простий пульпіт
E	Хронічний гангренозний пульпіт
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Хлопчик 12-ти років скаржиться на постійний інтенсивний пульсуючий біль у зубі. Об'єктивно: підщелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації, у 26 - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на термічні подразники, зондування дна безболісна, перкусія різко болюча, зуб рухомий, слизова оболонка в ділянці 26 гіперемована, набрякла. Під час некректомії розкрита порожнина зуба, отримана крапля ексудату. На рентгенограмі 26 змін немає. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий гнійний періодонтит
B	Загострення хронічного періодонтиту
C	Гострий одонтогенний періостит
D	Гострий гнійний пульпіт
E	Гострий серозний періодонтит
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>

Текст завдання	У хлопчика 12-ти років в ділянці 46 зуба виникає тривалий біль від прийому гарячої їжі. Об'єктивно: коронка 46 зуба брудно-сірого кольору, глибока каріозна порожнина виповнена розм'якшеним дентином. Є сполучення з пульповою камерою, глибоке зондування болюче. Тепловий подразник викликає біль, який повільно вщухає. Перкусія 46 безболісна. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Хронічний гангренозний пульпіт
B	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
C	Хронічний глибокий карієс
D	Хронічний фіброзний пульпіт
E	Хронічний гранулюючий періодонтит
№	крок 2017-2018
Тема	<i>Дитяча терапевтична стоматологія</i>
Текст завдання	Батьки 6-річної дитини скаржаться на наявність болю в ділянці молярів на верхній щелепі зліва. Об'єктивно: на дистально-контактній поверхні 54 зуба - каріозна порожнина в межах розм'якшеного біляпульпарного дентину, яка не сполучається з порожниною зуба. Зондування дна безболісне, реакція на температурні подразники відсутня. Перкусія різко болюча. На набряклій, гіперемованій слизовій оболонці проекції коренів 54 зуба визначається нориця. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного періодонтиту
B	Гострий серозний періодонтит
C	Гострий гнійний пульпіт
D	Гострий гнійний періодонтит
E	Пульпіт, ускладнений періодонтитом
№	крок 2019
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	У дитини 6-ти років третій день підвищена температура тіла до 38-39°C, болісність при ковтанні. Об'єктивно: на слизовій оболонці піднебінних дужок, мигдаликах, частково на м'якому піднебінні відзначаються декілька ерозій до 2 мм в діаметрі, які розташовані на гіперемованій слизовій оболонці та вкри-ті білуватим нальотом. Підщелепні лімфо-вузли збільшені, безболісні при пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Герпетична ангіна
В	Гострий герпетичний стоматит
С	Багатоформна ексудативна еритема
Д	Дифтерія
Е	Інфекційний моноклеоз
№	крок 2019
Тема	профілактика
Текст завдання	У жіночій консультації було проведено бесіди з вагітними жінками про значення характеру харчування для закладки та роз-витку зубів майбутньої дитини. На якому тижні внутрішньоутробного розвитку по-чинається закладка фолікулів тимчасових зубів у плода?
Правильна відповідь	7-ий
В	4-ий
С	15-ий
Д	12-ий
Е	18-ий
№	крок 2019
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	Дитині 10 років. Скарги на сухість, біль, збільшення в об'ємі і лущення губ. Під час огляду виявлено, що слизова оболонка губ гіперемована, губи збільшені в об'ємі, при натягуванні губи відзначається виділення секрету з дрібних слинних залоз у вигляді «крапель роси». Вкажіть найбільш імовірний попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гландулярний хейліт
В	Актинічний хейліт
С	Метерологічний хейліт
Д	Ексфоліативний хейліт
Е	Контактний алергічний хейліт
№	крок 2019
Тема	періодонтит
Текст завдання	Дівчина 16-ти років скаржиться на постійний ниючий біль у зубі нижньої щелепи, який посилюється при накушуванні. Об'єктивно: в 46 зубі - каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Порівняльна перкусія різко болюча. Реакція на термічні подразники, зондування безболісні. Слизова оболонка ясен у ділянці 46 зу-ба яскраво гіперемована, набрякла, болюча при пальпації. На рентгенограмі: вогнище деструкції кісткової тканини неправильної форми, з нечіткими обрисами. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту
В	Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту
С	Гострий серозний періодонтит
Д	Гострий гнійний періодонтит
Е	Загострення хронічного фіброзного періодонтиту
№	крок 2019
Тема	пульпіт

Текст завдання	Дівчинка 12-ти років скаржиться на спонтанний біль в 16 зубі з короткими періодами ремісій (10-20 хвилин), який з'явився 4 дні тому. Вночі біль посилюється, іррадіює на праву частину верхньої щелепи. При огляді виявлено глибоку каріозну порожнину у 16 зубі, дентин м'який, зондування болісне по всьому дну вертикальна перкусія трохи болісна, біль підсилюється під дією термічних подразників. ЕОД- 25 мкА. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий дифузний пульпіт
В	Хронічний фіброзний пульпіт
С	Гострий обмежений пульпіт
Д	Гострий апікальний періодонтит
Е	Хронічний конкрементозний пульпіт
№	крок 2019
Тема	пульпіт
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулася мама з 11-річним хлопчиком зі скаргами у нього на виражений самовільний біль у 46 зубі, який хвилеподібно наростає та віддає у верхню та нижню щелепу. Больовий напад поступово посилюється, стає пульсуючим і стихає на декілька хвилин від холодної води. Об'єктивно: у 46 зубі виявлено глибоку каріозну порожнину з розм'якшеним пігментованим дентином, пульпова камера легко перфорується зондом, зондування болісне по всьому дну, перкусія болісна. Електро-збудливість - 40-50 мкА. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий гнійний пульпіт
В	Гострий дифузний пульпіт
С	Загострення хронічного гангренозного пульпіту
Д	Травматичний пульпіт
Е	Гострий обмежений пульпіт
№	крок 2019
Тема	пульпіт

Текст завдання	В клініку звернулися батьки хлопчика 8-ми років із скаргами на ниючий біль в зубі у дитині на нижній щелепі праворуч, що виникає від дії термічних подразників і по-вільно минає після їх усунення. Об'єктивно: на апроксимальній поверхні 46 зуба - глибока каріозна порожнина. Під час некректомії екскаватором виявлене сполучення з порожниною зуба, зондування якого супроводжується різким болем і кровоточивістю. Який метод лікування пульпіту показаний у даному випадку?
Правильна відповідь	Вітальна ампутація
B	Девітальна ампутація
C	Біологічний
D	Девітальна екстирпація
E	Вітальна екстирпація
№	крок 2019
Тема	періодонтит
Текст завдання	Хлопчик 12-ти років скаржить на постійний біль у зубі верхньої щелепи, який посилюється при накушуванні. Об'єктивно: у 26 зубі - глибока каріозна порожнина, що не сполучається з порожниною зуба. Реакція на термічні подразники відсутня, зондування дна безболісне, перкусія різко болюча. слизова оболонка в ділянці 26 зуба має незначні ознаки запалення. На рентгенограмі 26 зуба змін немає. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Гострий серозний періодонтит
B	Хронічний гранулюючий періодонтит
C	Загострення хронічного періодонтиту
D	Гострий гнійний пульпіт
E	Гострий гнійний періодонтит
№	крок 2019
Тема	карієс

Текст завдання	Батьки дівчинки 5-ти років звернулись до стоматолога-педіатра з метою санації по-рожнини рота у дитини. Після клінічного обстеження був поставлений діагноз: хро-нічний глибокий карієс 54 зуба. Виберіть доцільний пломбувальний матеріал для лі-кування 54 зуба:
Правильна відповідь	Склоіономерний цемент
B	Композитний матеріал
C	Силікофосфатний цемент
D	Силікатний цемент
E	Цинк-фосфатний цемент
№	крок 2019
Тема	захворювання пародонту
Текст завдання	Дівчинка 13,5 років скаржиться на при-пухлість і кровоточивість ясен при чищенні зубів впродовж півроку. Об'єктивно: сли-зова оболонка ясен в ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи набрякла, має ціано-тичне забарвлення. Ясенні сосочки округлої форми, ущільнені, збільшені у розмірах і пе-рекривають коронкові частини зубів на 1/3 висоти. Відзначається вестибулярне поло-ження 13 і 23 зубів. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
B	Гострий катаральний гінгівіт
C	Хронічний катаральний гінгівіт
D	Генералізований пародонтит Г ступеня
E	Локалізований пародонтит Г ступеня
№	крок 2019
Тема	профілактика
Текст завдання	Група спеціалістів проводить епідеміо-логічне обстеження певних вікових груп по вивченню поширеності ознак ураження пародонта і потреб у лікуванні. За допомогою якого індексу вивчаються ці показники?

Правильна відповідь	СПІТН (ВООЗ)
В	РНІ-S (Гріна-Вермільйона)
С	РІ (Рассела)
D	РDІ (Рамф'єрда)
Е	РМА (Парма)
№	крок 2019
Тема	некаріозні ураження
Текст завдання	У дитини 6-ти місяців діагностовано дво-бічну бронхопневмонію. Призначено анти-біотики широкого спектру дії. Знаходиться на штучному вигодовуванні, наявні розлади травлення (диспепсія). Які можливі патоло-гічні зміни твердих тканин зубів?
Правильна відповідь	Системна гіпоплазія емалі
В	Зуби Фурньє
С	Місцева гіпоплазія
D	Синдром Стейнтон-Капдепона
Е	Зуби Іетчінсона
№	крок 2019
Тема	захворювання слизової оболонки
Текст завдання	Дитина 14-ти років скаржиться на сухість і лущення губ, особливо в осінньо-зимовий період. Об'єктивно: червона облямівка губ суха, інфільтрована, вкрита численними лу-сочками. Шкіра губ ущільнена, пігментована, визначається посилення її малюнка, лущення, а також радіальні тріщини. Во-дночас, відзначається сухість, ліхенізація і екскоріація шкіри обличчя. Визначте попе-редній діагноз:
Правильна відповідь	Атопічний хейліт
В	Актинічний хейліт
С	Ексфоліативний хейліт

D	Контактний алергічний хейліт
E	Метеорологічний хейліт
№	крок 2019
Тема	пульпіт
Текст завдання	У дитини 3-х років під час планової са-нації в 54 зубі виявлено глибоку каріозну порожнину, заповнену рештками їжі та роз-м'якшеним дентином. Після препарування 54 зуба пульпа кровоточить, зондування різ-ко болісне. Для проведення лікування пуль-піту методом де вітальної ампутації під час першого відвідування необхідно застосува-ти:
Правильна відповідь	Параформальдегідну пасту
B	Дентин-пасту
C	Цинк-евгенолову пасту
D	Йодоформну пасту
E	Кальційвмісну пасту
№	крок 2019
Тема	захворювання пародонту
Текст завдання	Пацієнт 12-ти років тиждень тому пе-реніс ГРВІ. Скарги на біль і свербіння у яснах, кровоточивість під час прийому їжі. На верхній і нижній щелепах ясна гіперемовані, набряклі, кровоточать під час до-тику інструментом, індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5 бали, індекс КПУ- 6,про-ба Шилера-Пісарева позитивна. Який най-більш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Загострення хронічного катарального гінгівіту
B	Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма
C	Хронічний катаральний гінгівіт
D	Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма
E	Пародонтит, стадія загострення
№	крок 2019

Тема	захворювання слизової оболонки
Текст завдання	Дитина 1,5 років хворіє протягом двох днів, відмовляється від їжі, неспокійна. Ба-тьки відзначають підвищення температури тіла до 38,5°C, появу болісних виразок у ро-товій порожнині. Об'єктивно: на слизовій оболонці м'якого і твердого піднебіння ви-значається 5-7 дрібних ерозій овальної фор-ми з тонкою червоною облямівкою, вкри-тих фібринозним нальотом. Регіонарні лім-фатичні вузли дещо збільшені, болісні під час пальпації. Відзначається набряк, гіпе-ремія і кровоточивість ясен. Визначте най-більш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Гострий герпетичний стоматит
В	Інфекційний мононуклеоз
С	Герпетична ангіна
D	Гострий кандидозний стоматит
Е	Багатоформна ексудативна еритема
№	крок 2019
Тема	некаріозні ураження
Текст завдання	Батьки 7,5-річної дитини скаржаться на косметичний недолік переднього зуба верх-ньої щелепи. На вестибулярній поверхні 11 зуба поблизу ріжучого краю виявлена блискуча пляма жовтого кольору з чіткими обрисами. Емаль при зондуванні гладка. В анамнезі - вивих 51 зуба. Визначте попере-дній діагноз:
Правильна відповідь	Місцева гіпоплазія емалі
В	Флюороз зубів
С	Гострий поверхневий карієс
D	Гострий початковий карієс
Е	Системна гіпоплазія емалі
№	крок 2019
Тема	пульпіт

Текст завдання	Дитині 8 років. Під час огляду порожнини рота в 46 зубі, який має сіро-коричневий колір, виявлено глибоку каріозну порожнину, що сполучається з порожниною зуба; зондування коронкової пульпи безболісне, зондування вустів корневих каналів болюче. Перкусія злегка відчутна. На рентгенограмі - корені зуба сформовані на 3/4 довжини. Що з переліченого найбільш ефективно для медикаментозної обробки корневих каналів при лікуванні 46 зуба?
Правильна відповідь	1 % розчин гіпохлориту натрію
В	3% розчин перекису водню
С	40% розчин формаліну
Д	0,9% розчин натрію хлориду
Е	1:5000 розчин фурациліну
№	крок 2019
Тема	карієс
Текст завдання	Батьки 5-річної дитини звернулись до лікаря-стоматолога з метою санації її ротової порожнини. Об'єктивно: на жувальних поверхнях 54, 64, 74, 75 і 85 зубів виявлено каріозні порожнини в межах розм'якшеного плащового дентину. Дитина нервово збуджена, поводить себе неадекватно. Виберіть найбільш доцільну лікувальну тактику у даному випадку:
Правильна відповідь	ART-методика
В	Інвазивна герметизація
С	Профілактичне пломбування
Д	Імпрегнаційна терапія
Е	Глибоке фторування
№	крок 2019
Тема	захворювання пародонту

Текст завдання	Дівчинка 8-ми років скаржиться на кро-воточивість ясен. Дитина хворіє на цукро-вий діабет. Об'єктивно: ясенні сосочки у ді-лянці зубів верхньої і нижньої щелеп гіперемовані, набряклі, вкривають коронки на 1/3. Рухливість зубів I ступеня. Який метод дослідження необхідно провести для вста-новлення діагнозу?
Правильна відповідь	Рентгенографія
B	Вакуумна проба
C	Стоматоскопія
D	Реопародонтографія
E	Індекс ПМА
№	крок 2019
Тема	пульпіт
Текст завдання	При обстеженні дитини 5-ти років був встановлений діагноз: гострий дифузний пульпіт 74 зуба. Який метод лікування най-більш раціональний у даному випадку?
Правильна відповідь	Екстирпація пульпи
B	Видалення зуба
C	Вітальна ампутація
D	Девітальна ампутація
E	Біологічний метод
№	крок 2019
Тема	профілактика
Текст завдання	Дитина 12,5 років звернулася до лікаря - стоматолога з метою санації ротової поро-жнини. Об'єктивно: інтенсивність карієсу відповідає високому рівню - КПВ=2+4+0=6. Індекс Green-Vermillionдорівнює 1,7. Слизо-ва оболонка ясен блідо-рожевого кольору. У даному випадку для індивідуальної гігіє-ни ротової порожнини доцільно призначити зубні пасту, що містять:
Правильна відповідь	Амінофториди
B	Сольові добавки

С	Екстракти трав
D	Ферменти
Е	Антисептики
№	крок 2019
Тема	некаріозні ураження
Текст завдання	До клініки звернулася батьки дитини 7- ми років з метою санації порожнини рота. Хлопчик народився і проживав у місцевості, де вміст фтору у воді 2,5 мг/л. Під час огляду було виявлено, що на вестибулярній поверх-ні 11, 21, 31, 41, 16, 26, 36, 46 наявні темні плями. З анамнезу відомо, що зуби проріза-лися ураженими. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Флюороз
B	Гіперплазія емалі
С	Ерозія зубів
D	Гіпоплазія емалі
Е	Недосконалий амелогенез
№	крок 2019
Тема	карієс
Текст завдання	Батьки 4-річної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої ще-лепи дитини. Об'єктивно: в пришийковій ділянці вестибулярної поверхні різців верх-ньої щелепи виявлені дефекти, які не пере-тинають емалево-дентинного сполучення і мають вигляд ділянок крейдоподібно зміне-ної емалі з видимим руйнуванням її структу-ри. При зондуванні визначається шорстка, розм'якшена поверхня. Реакція на холодові подразники відсутня. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Іострий поверхневий карієс
B	Хронічний поверхневий карієс
С	Іострий середній карієс
D	Іострий початковий карієс

Е	Хронічний початковий карієс
№	крок 2019
Тема	захворювання пародонту
Текст завдання	Хлопчика 7-ми років привели на кон-сультацію до лікаря-стоматолога. Об'єктивно: ясна гіпереровані, відзначається кровоточивість, рухомість зубів, корені ого-лені, вкриті нальотом, наявність патологі-чних зубо-ясенних кишень, заповнених гра-нуляціями. Дитина знаходиться на обліку у педіатра. Зі слів мами останнім часом стан дитини погіршився, відзначається нецукро-вий діабет, екзофтальм. Який діагноз можна запідозрити у дитини?
Правильна відповідь	Хвороба Хенда-Шюллера-Крістчена
В	Хвороба Леттера-Сіве
С	Хвороба Іоше
Д	Хвороба Таратинова
Е	Синдром Папійона-Лефевра
№	крок 2020
Тема	некаріозні ураження
Текст завдання	У дитини 6-ти місяців діагностовано двобічну бронхопневмонію. Призначено антибіотики широкого спектру дії. Дитина перебуває на штучному вигодовуванні, наявні розлади травлення (диспепсія). Які можливі патологічні зміни твердих тканин зубів?
Правильна відповідь	Системна гіпоплазія емалі
В	Місцева гіпоплазія емалі
С	Зуби Фурньє
Д	Синдром Стейнтон-Капдепона
Е	Зуби Гетчінсона
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	Дівчина 18-ти років після повернення з літньої відпустки скаржиться на незначну болючість, сухість та лущення губ. Об'єктивно: нижня губа яскраво-червоного кольору, червона облямівка губи суха та вкрита дрібними сріблясто-білими лусо-чками. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Актинічний хейліт
B	Хронічний екзематозний хейліт
C	Ексфоліативний хейліт
D	Гландулярний хейліт
E	Метеорологічний хейліт
№	крок 2020
Тема	карієс
Текст завдання	Батьки дитини 6-ти років звернули-ся до дитячого стоматолога зі скаргами на затримку залишків їжі та короткочасний біль при дії холодого подразника в зубі нижньої щелепи справа, що зникає одразу після його усунення. Об'єктивно: у 85 зубі наявна каріозна порожнина на жувальній поверхні в межах плащового дентину з вузьким входним отвором. Дентин, який заповнює каріозну порожнину, світлий та розм'якшений. Зондування дна каріозної порожнини неболюче. Дитина відчуває страх та відмовляється від препарування. Який метод лікування ви можете запропонувати?
Правильна відповідь	АРТ-методика
B	Інвазивна герметизація
C	Імпрегнація сріблом
D	Покриття фторлаком
E	Глибоке фторування
№	крок 2020
Тема	профілактика

Текст завдання	Під час профілактичного огляду 6,5-річної дитини у дистолінгвальній ямці жувальної поверхні 46 зуба було виявлено каріозну порожнину з вузьким вхідним отвором. Дно порожнини локалізоване в межах розм'якшеного плащового дентину. Інші ділянки фісури не уражені. Лікар-стоматолог обрав методику профілактичного пломбування. Яку тактику доцільно використати щодо інтактних ділянок фісури?
Правильна відповідь	Неінвазивну герметизацію
B	Інвазивну герметизацію
C	Аплікації фторидвмісними лаками
D	Аплікації кальційвмісними гелями
E	Аплікації антисептичними лаками
№	крок 2020
Тема	
Текст завдання	Дитина 9,5 років скаржиться на руйнування бічного зуба верхньої щелепи справа. Об'єктивно: коронкова частина 16 зуба зруйнована, порожнина зуба розкрита. Зондування на рівні вустів кореневих каналів слабо болісне, супроводжується інтенсивною кровоточивістю. Перкусія зуба безболісна. На слизовій оболонці альвеолярного відростка у проекції коренів 16 відзначається нориця. Визначте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний гранулюючий періодонтит
B	Хронічний фіброзний періодонтит
C	Хронічний гангренозний пульпіт
D	Хронічний фіброзний пульпіт
E	Хронічний гранулематозний періодонтит
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	Батьки дитини 7-ми років скаржаться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38,8°C впродовж 2 днів. Об'єктивно: в ділянці ясен, щік, губів, на дні порожнини рота спостерігається катаральний стоматит. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені та болючі. На м'якому піднебінні, мигдаликах, дужках катаральне запалення яскраво-червоного кольору, язик набряклий, червоного кольору, сухий. Шкіра обличчя, за винятком білого носогубного трикутника, гіперемована. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Скарлатина
B	Кір
C	Кашлюк
D	Інфекційний моноклеоз
E	Вітряна віспа
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки
Текст завдання	Дитина 14-ти років скаржиться на сухість і лущення губ, особливо в осінньо-зимовий період. Об'єктивно: червона облямівка губ суха, інфільтрована, вкрита численними лусочками. Шкіра губ ущільнена, пігментована, визначається посилення її малюнка, лущення, а також радіальні тріщини. Водночас відзначається сухість, ліхенізація і екскоріація шкіри обличчя. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Атопічний хейліт
B	Контактний алергічний хейліт
C	Актинічний хейліт
D	Ексфоліативний хейліт
E	Метеорологічний хейліт
№	крок 2020
Тема	пульпіт

Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернулася 12-річна дівчинка зі скаргами на самовільний, нападаподібний, довготривалий біль короткочасними безбольовими проміжками у ділянці 16 зуба, який посилюється вночі при горизонтальному положенні тіла та іррадіює по верхній щелепі, що виник 2 доби тому. При об'єктивному обстеженні 16 зуба виявлено глибоку каріозну порожнину, заповнену розм'якшеним дентином. Зондування болісне по всьому дну, вертикальна перкусія злегка болісна, біль посилюється від температурних подразників, електрозбудливість пульпи -15-20 мкА. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Гострий дифузний пульпіт
В	Хронічний фіброзний пульпіт
С	Гострий гнійний пульпіт
Д	Хронічний конкрементозний пульпіт
Е	Гострий обмежений пульпіт
№	крок 2020
Тема	пульпіт
Текст завдання	Дівчинка 15-ти років скаржитися на наявність каріозної порожнини в зубі, мимовільний біль, який швидко минає. Дитина соматично здорова. Об'єктивно: в 36 зубі каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, реакція на холодний подразник болюча, біль минає через 1-2 хв., зондування дна болюче в одній точці, перкусія неболюча. Визначте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гіперемія пульпи
В	Гострий обмежений пульпіт
С	Хронічний глибокий карієс
Д	Гострий глибокий карієс
Е	Гострий дифузний пульпіт
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	Пацієнт 14-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39-40,1 °С, яке зберігається протягом 5 днів, сильний біль у горлі та появу нальоту на мигдаликах. При обстеженні виявлено ознаки тонзиліту, фарингіту та збільшення лімфатичних вузлів вздовж грудино-ключично-соскоподібного м'яза. Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Інфекційний мононуклеоз
В	Кандидоз
С	Скарлатина
Д	Тонзиліт
Е	Герпетична ангіна
№	крок 2020
Тема	карієс
Текст завдання	Дитина 10-ти років скаржиться на біль у ділянці фронтальних верхніх зубів при вживанні холодної їжі, що з'явився місяць тому після травми. При огляді виявлено: відсутній кут коронки 21, відлом різально-го краю 11 у межах дентину. Зондування 11, 21 безболісне, реакція на холод - болісна, короткочасна. ЕОД- 7 мкА. Який з пломбувальних матеріалів слід використати?
Правильна відповідь	Мікрогібридний композит
В	Компомер
С	Амальгаму
Д	Макронаповнений композит
Е	Склоіономер
№	крок 2020
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	Батьки дитини 6-ти років скаржаться на підвищення у неї температури тіла до 39°C протягом 3 днів, слабкість, погіршення апетиту, біль при ковтанні. Об'єктивно: слизова оболонка мигдаликів, піднебінних дужок, ретромоларного простору, бічної та задньої стінки глотки набрякла, вкрита брудносірим нальотом, який щільно спаяний з підлеглими тканинами, дуже важко знімається, оголюючи поверхню, яка кровоточить. Підщелепні лімфовузли збільшені, болючі. Припустіть найбільш імовірний попередній діагноз:
Правильна відповідь	Дифтерія
В	Кір
С	Гострий псевдомембранозний кандидоз
D	Інфекційний мононуклеоз
Е	Скарлатина
№	крок 2020
Тема	профілактика
Текст завдання	Дитина 12,5 років звернулася до лікаря-стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об'єктивно: інтенсивність карієсу відповідає високому рівню - КПВ=2+4+0=6. Індекс Green-Vermillion дорівнює 1,7. Слизова оболонка ясен блідо-рожевого кольору. У даному випадку для індивідуальної гігієни ротової порожнини доцільно призначити зубні пасти, що містять:
Правильна відповідь	Амінофториди
В	Ферменти
С	Сольові добавки
D	Антисептики
Е	Екстракти трав
№	крок 2020
Тема	захворювання пародонту

Текст завдання	Хворий 15-ти років скаржиться на кровоточивість ясен та біль при прийомі їжі упродовж року. Об'єктивно: в ділянці 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів ясеневі сосочки збільшені та перебивають на 1/2 висоти коронки зуба. Ясна у вигляді яскраво-червоних грануляцій, болісні при пальпації. На зубах наявність мінералізованого зубного нальоту. Рентгенологічних змін альвеолярного паростка не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гіпертрофічний гінгівіт
В	Катаральний гінгівіт
С	Виразковий гінгівіт
Д	Локалізований пародонтит
Е	Генералізований пародонтит
№	крок 2020
Тема	пульпіт
Текст завдання	Дитина 7,5 років, практично здорова, скаржиться на перелом коронкової частини і біль у передньому правому верхньому зубі. Об'єктивно: коронкова частина І1 зуба відсутня на 2/3, пульпа оголена, має червоний колір, при зондуванні - різко болісна і кровоточить, перкусія зуба болісна. З моменту травми пройшло 2 години. Виберіть оптимальний метод лікування:
Правильна відповідь	Вітальна ампутація
В	Девітальна ампутація
С	Девітальна екстирпація
Д	Вітальна екстирпація
Е	Біологічний метод
№	крок 2020
Тема	карієс

Текст завдання	Під час профілактичного огляду хлопчика 8-ти років виявлені крейдоподібні плями на вестибулярній поверхні 11, 21 зубів. Плями мають матову, гладеньку під час зондування поверхню. Больова реакція на температурні подразники відсутня. Виберіть додатковий метод обстеження в даному випадку для підтвердження діагнозу:
Правильна відповідь	Вітальне зафарбовування
B	Стоматоскопія в ультрафіолетовому світлі
C	Ортопантомографія
D	Внутрішньоротова рентгенографія
E	ЕОД
№	крок 2021
Тема	пульпіт
Текст завдання	Практично здорова дитина 7 років скаржиться на злам коронкової частини і біль у правому верхньому передньому зубі. Об'єктивно встановлено: коронкова частина 11-го зуба відсутня на 1/3, пульпа точково оголена, має червоний колір, різко болісна і кровоточить під час зондування. Перкусія зуба дещо болісна. Від моменту травми пройшло 2 години. Оберіть оптимальний у цьому разі метод лікування:
Правильна відповідь	Біологічний метод
B	Вітальна ампутація
C	Вітальна екстирпація
D	Девітальна ампутація
E	Девітальна екстирпація
№	крок 2021
Тема	Карієс

Текст завдання	<p>. Батьки 5-річної дитини звернулись до лікаря-стоматолога з приводу санації її ротової порожнини. Об'єктивно встановлено: на жувальних поверхнях 54-го, 64-го, 74-го, 75-го і 85-го зубів виявлено каріозні порожнини в межах розм'якшеного плащового дентину. Дитина нервово збуджена, поводить неадекватно. Оберіть найдоцільнішу в цьому разі лікувальну тактику:</p>
Правильна відповідь	ART-методика
В	Інвазивна герметизація
С	Імпрегнаційна терапія
D	Профілактичне пломбування
Е	Глибоке фторування
№	крок 2021
Тема	захворювання слизової оболонки
Текст завдання	<p>Дитина 2 років перебуває на лікуванні з приводу гострого герпетичного стоматиту, важкої форми. Період згасання хвороби. Якими лікарськими засобами для місцевого оброблення слизової оболонки порожнини рота слід доповнити арсенал препаратів саме в цей період?</p>
Правильна відповідь	Кератопластичними
В	Знеболювальними
С	Противірусними
D	Протеолітичними ферментами
Е	Антисептиками
№	крок 2021
Тема	захворювання пародонту

Текст завдання	Під час планового огляду у хлопця 15 років виявлене скупченість зубів у фронтальній частині нижньої щелепи. Ясна у цій ділянці дещо набряклі та гіперемовані, із ціанотичним відтінком, ясенний край валикоподібно потовще-ний. На зубах наявний зубний камінь. Проба Шиллера-Писарева позитивна. Рентгенологічно у фронтальній ділянці нижньої щелепи спостерігається нечіткість контурів кортикальної пластинки на верхівках міжзубних перегородок за збереження її цілісності. Поставте діа-гноз:
Правильна відповідь	Хронічний катаральний гінгівіт
В	Десквамативний гінгівіт
С	Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
Д	Гострий катаральний гінгівіт
Е	Гострий виразковий гінгівіт
№	крок 2021
Тема	періодонтит
Текст завдання	Дитина 2 років отримала травму зубів. Об'єктивно встановлено: коронки 51-го і 61-го зубів коротші від сусідніх на 1/3. Слизова оболонка в ділянці 51-го і 61-го зубів гіперемована, набрякла. На рентгенограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів 51-го і 61-го зубів відсутня. Яка лікувальна тактика буде оптимальною?
Правильна відповідь	Диспансерне спостереження
В	Реплантація
С	Репозиція 51-го, 61-го зубів
Д	Лігатурне шинування
Е	Видалення 51-го, 61-го зубів
№	крок 2021
Тема	карієс

Текст завдання	Під час профілактичного огляду дівчинки 7 років виявлені крейдоподібні плями на вестибулярній поверхні 11-го, 21-го зубів. Плями мають матову, гладеньку під час зондування поверхню, зафарбовуються метиленовим синім. Оберіть доцільний в цьому разі метод лікування:
Правильна відповідь	Глибоке фторування 11-го, 21-го зубів
В	Імпрегнаційна терапія 11-го, 21-го зубів
С	Зішліфовування дефектів 11-го, 21-го зубів
Д	Пломбування 11-го, 21-го зубів
Е	Диспансерне спостереження
№	крок 2021
Тема	пульпіт
Текст завдання	Хлопець 18 років скаржиться на наявність порожнини в 37-му зубі, біль під час потрапляння твердої їжі. Зуб болів рік тому, до лікаря не звертався. Об'єктив-но встановлено: на жувальній поверхні 37-го зуба глибока каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою, з якої випинається розростання грануляційної тканини, що охоплює майже всю каріозну порожнину. Зондування грануляції спричиняє кровоточивість та не-значну болючість. Перкусія безболісна. Слизова оболонка в проекції коренів 37-го зуба блідо-рожевого кольору без патологічних змін. ЕОД - 60 мкА. По-ставте імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
В	Хронічний фіброзний пульпіт
С	Гіпертрофічний папіліт
Д	Грануляції з ділянки біфуркації коре-нів
Е	Хронічний гранулюючий періодонтит
№	крок 2021
Тема	пульпіт

Текст завдання	Хлопчик 9 років скаржиться на спон-танний пульсуючий біль у ділянці нижніх зубів справа, що іррадіює, але трохи за-спокоюється від холодного. Об'єктивно встановлено: у 46-му зубі глибока каріоз-на порожнина в межах навколопульпар-ного дентину з розм'якшеним дном. Зон-дування дна різко болісне. Перкусія зу-ба болісна. Поставлено діагноз: гострий гнійний пульпіт 46-го зуба. Оберіть ме-тод лікування:
Правильна відповідь	Вітальна екстирпація пульпи
B	Біологічний метод лікування
C	Девітальна ампутація пульпи
D	Девітальна екстирпація пульпи
E	Вітальна ампутація пульпи
№	крок 2021
Тема	пульпіт
Текст завдання	Дівчинка 15 років скаржиться на на-явність каріозної порожнини в зубі, ми-мовільний біль, який швидко минає. Ди-тина соматично здорова. Об'єктивно встановлено: у 36-му зубі каріозна по-рожнина в межах навколопульпарного дентину, реакція на холодний подразник болюча, біль минає за 1-2 хв., зондування дна болісне в одній точці, перкусія безбо-лісна. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гіперемія пульпи
B	Гострий глибокий карієс
C	Хронічний глибокий карієс
D	Гострий дифузний пульпіт
E	Гострий обмежений пульпіт
№	крок 2021
Тема	пульпіт

Текст завдання	Під час спілкування із батьками ди-тини 5 років встановлено, що останнім часом вона стала жувати на одну сторо-ну та відмовлятися від твердої їжі. Об'є-ктивно встановлено: в 74-му зубі каріо-зна порожнина, наявність зубних наша-рувань на зубах 73-му, 74-му, 75-му. Зон-дування дна каріозної порожнини в 74-му зубі викликає біль із незначною крово-течею в місці сполучення її з пульповою камерою. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний фіброзний пульпіт
В	Хронічний гіпертрофічний пульпіт
С	Хронічний гангренозний пульпіт
Д	Гострий середній карієс
Е	Гострий глибокий карієс
№	крок 2021
Тема	профілактика
Текст завдання	Під час проведення епідеміологічного обстеження певних вікових груп для вивчення поширеності ознак ураження пародонта і потреб у лікуванні використовується індекс:
Правильна відповідь	СРІТN (ВООЗ)
В	РНІ-S (Гріна-Вермільйона)
С	РІ (Рассела)
Д	РDІ (Рамф'єрда)
Е	РМА (Парма)
№	крок 2021
Тема	карієс

Текст завдання	Під час огляду ротової порожнини дитини 12 років у 46-му зубі на медіальній контактній поверхні виявлено каріозну порожнину в межах плащового дентину, стінки і дно якої пігментовані, щільні. Реакція на температурні подразники відсутня. Препарування 46-го зуба в ділянці емалево-дентинного з'єднання бо-лісне. КПВ+кп = 2. Оберіть оптимальний пломбувальний матеріал у цьому разі:
Правильна відповідь	Фотополімерний композит
B	Амальгама
C	Силікофосфатний цемент
D	Склоіономерний цемент
E	Цинк-фосфатний цемент
№	крок 2021
Тема	некаріозні ураження
Текст завдання	У дівчинки 7 років під час профіла-ктичного огляду на вестибулярній по-верхні ближче до ріжучого краю верхніх центральних різців виявлено гладенькі крейдоподібні плями, що не забарвлюю-ться метиленовим синім. З анамнезу ві-домо, що у 4 роки у дитини була травма 51-го, 61-го зубів. Який діагноз найімовір-ніший?
Правильна відповідь	Місцева гіпоплазія
B	Системна гіпоплазія
C	Гіперплазія
D	Карієс в стадії плями
E	Гострий поверхневий карієс
№	крок 2021
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	Батьки дитини 7 років скаржаться на біль у горлі, підвищення у неї температури тіла до 38,8°C упродовж 2 днів. Об'єктивно встановлено: в ділянці ясен, щік, губ і на дні порожнини рота спостерігається катаральний стоматит. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені та болючі. На м'якому піднебінні, мигдаликах, дужках катаральне запалення яскраво-червоного кольору, язик набряклий, червоного кольору, сухий. Шкіра обличчя, за винятком білого носогубного трикутника, гіперемована. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Скарлатина
B	Вітряна віспа
C	Кір
D	Коклюш
E	Інфекційний мононуклеоз
№	крок 2021
Тема	періодонтит
Текст завдання	Дитині 4 років поставлено діагноз: загострення хронічного періодонтиту 85-го зуба. Рентгенологічно виявлено: руйнування замикальної пластинки фолікула 45-го зуба, затемнення в ділянці бі-фуркації 85-го зуба, патологічна резорбція медіального кореня на 2/3. Якою буде тактика лікування?
Правильна відповідь	Виконати екстракцію 85-го зуба
B	Запломбувати кореневі канали в одне відвідування та виконати періостотомію
C	Виконати періостотомію та гемісекцію резорбованого кореня
D	Ендодонтична та медикаментозна обробка кореневих каналів 85-го зуба, герметична пов'язка
E	Зняти больові та запальні явища, виконати імпрегнацію кореневих каналів і зберегти зуб відкритим до його фізіологічної зміни
№	крок 2021
Тема	карієс

Текст завдання	Дитина 6 років звернулася зі скаргами на затримку їжі в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно встановлено: у 75-му зубі на жувальній поверхні наявна каріозна порожнина в межах плащово-го дентину з широким вхідним отвором. Дентин стінок і дна щільний, пігментований. Зондування каріозної порожнини безболісне. Реакція на термічні подразники відсутня, перкусія зуба безболісна. Слизова оболонка в ділянці 75-го зуба без патологічних змін. Дитина за станом здоров'я належить до I групи. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Хронічний середній карієс
B	Хронічний фіброзний пульпіт
C	Хронічний поверхневий карієс
D	Гострий глибокий карієс
E	Хронічний глибокий карієс
№	крок 2021
Тема	періодонтит
Текст завдання	Дівчинка 14 років протягом 3 днів скаржиться на пульсуючий біль у зубах на верхній щелепі зліва, який у разі накушування різко посилюється. Об'єктивно встановлено: у 26-му зубі глибока каріозна порожнина не сполучається з порожниною зуба. Зондування дна безболісне. Вертикальна та горизонтальна перкусія різко болісні. Слизова оболонка в ділянці 26-го зуба гієрерована. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний періодонтит
B	Гострий дифузний пульпіт
C	Пульпіт, ускладнений періодонтитом
D	Гострий гнійний пульпіт
E	Гострий серозний періодонтит
№	крок 2021
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	У пацієнта встановлені клінічні сим-птоми, що нагадують симптоми гострого герпетичного стоматиту. Наявність яких клітин за цитологічного метода дослідження підтвердить цей діагноз?
Правильна відповідь	Наявність гігантських багатоядерних клітин
В	Наявність клітин Німана-Піка
С	Наявність клітин Тцанка
Д	Наявність атипових мононуклеарів
Е	Наявність клітин Гоше
№	крок 2021
Тема	захворювання пародонту
Текст завдання	Дівчинка 14 років звернулася до стоматолога зі скаргами на збільшення розміру ясенних сосочків у ділянці фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп. Під час огляду виявлено, що ясенні сосочки гіперемовані, набряклі, пере-кривають коронки зубів на 1/2 висоти, кровоточать від дотику. Патологія якої системи найчастіше відіграє найбільш важливу роль в етіології цього захворювання?
Правильна відповідь	Ендокринної системи
В	Центральної нервової системи
С	Травної системи
Д	Імунної системи
Е	Серцево-судинної системи
№	крок 2021
Тема	захворювання слизової оболонки

Текст завдання	Дівчинка 8 років скаржиться на бо-лючість, печіння, сухість губ. З анамнезу з'ясовано наявність у пацієнтки харчової алергії. Об'єктивно встановлено: незначний набряк, гіперемія шкіри губ. Червона облямівка губ інфільтрована, наявні тріщини, кірочки, лусочки. Поверхня губ суха. У кутах рота спостерігаються інфільтрація, мацерація, тріщини. По-ставте найімовірніший діагноз:
Правильна відповідь	Екзематозний хейліт
B	Гландулярний хейліт
C	Актинічний хейліт
D	Ексфоліативний хейліт
E	Метеорологічний хейліт
№	крок 2021
Тема	захворювання слизової оболонки
Текст завдання	Дитина 12 років скаржиться на під-вищення температури тіла до 39,7°C, збільшення лімфатичних вузлів, біль у горлі, риніт, кашель. Об'єктивно встановлено: у порожнині рота спостерігається гострий катаральний стоматит, частина піднебінних мигдаликів укріті жовтувато-сірим нальотом, який легко знімається та має кришкуватий характер. Шийні, потиличні та підщелепні лімфовузли збільшені, рухомі, малоболючі. Під час лабораторного дослідження крові виявлено: лейко-, лімфо- та моноцитоз, атипові мононуклеари. Визначте збудника захворювання:
Правильна відповідь	Вірус Епштейна-Барр
B	Вірус простого герпесу
C	Гемолітичний стрептокок
D	Паличка Леффлера
E	Вірус Коксаки
№	крок 2021

Тема	профілактика
Текст завдання	Під час профілактичного огляду у 7-річної дитини в обмеженій ділянці фісури 36-го зуба виявлено каріозну поро-жнину з навислими краями емалі. Зонд затримується в розм'якшеному денти-ні. В інших ділянках емаль на краю фісур блискуча, щільна. Лікар-стоматолог планує пломбування каріозного дефекту 36-го зуба. Яку тактику доцільно вико-ристати щодо інтактних ділянок фісури?
Правильна відповідь	Інвазивна герметизація
В	Аплікації кальційвмісними гелями
С	Оброблення зуба антисептичним роз-чином
D	Неінвазивна герметизація
Е	Аплікації фторвмісними лаками
№	крок 2021
Тема	захворювання слизової оболонки
Текст завдання	Батьки дитини 6 років скаржаться на підвищення у неї температури тіла до 39°C протягом 3 днів, слабкість, по-гіршення апетиту, біль під час ковтан-ня. Об'єктивно встановлено: слизова оболонка мигдаликів, піднебінних ду-жок, ретромоллярного простору, бічної та задньої стінки глотки набрякла, вкри-та брудно-сірим нальотом, який щільно спаяний з підлеглими тканинами і дуже важко знімається, оголюючи поверхню, яка кровоточить. Підщелепні лімфову-зли збільшені, болючі. Поставте найімо-вірніший попередній діагноз:
Правильна відповідь	Дифтерія
В	Гострий псевдомембранозний кандидоз
С	Інфекційний мононуклеоз
D	Кір
Е	Скарлатина