

№	Крок 2023
Тема	Хірургічні інфекції
Текст завдання	У хірургічному відділенні лікується жінка віком 65 років із приводу флегмони сідничної ділянки. Під час мікробіологічного дослідження рани збудником хірургічної інфекції виявлені нсклостридіальні анаероби протей та бактероїди. Яку лікувальну тактику треба застосувати насамперед у лікувати цієї інфекції?
Правильна відповідь	Застосування протигангренозної сировотки
В	Антибіотикотерапію + профілактичне щеплення
С	Антибактеріальну терапію
Д	Промивання гнійної порожнини антисептиками
Е	Радикальне висічення уражених тканин
№	Крок 2023
Тема	Хвороби шлунка
Текст завдання	Чоловік віком 35 років скаржиться на періодичні болі в епігастрії в нічний час. Діагностовано виразку цибулини дванадцятипалої кишки. Який неінвазивний метод діагностики інфекції <i>Helicobacter pylori</i> , що володіє найбільшою чутливістю і специфічністю, необхідно призначити пацієнту насамперед?
Правильна відповідь	13С-сечовинний дихальний тест
В	Визначення фекального антигену
С	Визначення IgA, IgM у слині
Д	Визначення IgG, IgM у сироватці крові
Е	Гастроскопія з біопсією
№	Крок 2023
Тема	Патологія печінки

Текст завдання	Жінка віком 36 років звернулася до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, біль у животі та жовтяничний колір шкіри, що поступово наростали протягом останніх 3-х місяців. Пацієнтка заперечує вживання наркотиків та незахищені статеві стосунки. Під час фізикального обстеження спостерігається: іктеричність склер та жовтяниця, болісність при пальпації правої підреберної ділянки. Під час лабораторного дослідження сироватки крові виявлено: загальний білірубін — 64,5 мкмоль/л, прямий — 22,7 мкмоль/л, АСТ — 822 Од/л, АЛТ — 1237 Од/л, HBsAg — позитивно, HBeAg — позитивно. Яка тактика лікування цієї пацієнтки є найбільш доцільною?
Правильна відповідь	ПЕГ-інтерферон а-2а
В	Вакцина для профілактики гепатиту В та ламівудин
С	Специфічний імуноглобулін проти вірусу гепатиту В
Д	Преднізолон та рибавірин
Е	Імуноглобулін людини нормальний
№	Крок 2023
Тема	Ендокрина хірургія
Текст завдання	На другий день після тиреоїдектомії у пацієнтки з'явилися судоми. Яке лікування вона потребує насамперед?
Правильна відповідь	Магній Вg+ калій внутрішньо
В	Внутрішньовенне введення 40%-го розчину глюкози
С	Кетамін внутрішньовенно
Д	Внутрішньовенне введення 10%-го кальцій хлорида
Е	Внутрішньовенне введення калія хлорида
№	Крок 2023
Тема	Захворювання вен

Текст завдання	Пацієнтка віком 35 років скаржиться на біль у правій гомілці, який посилюється під час ходьби. Об'єктивно спостерігається: на правій гомілці за ходом варикозно розширеної малої підшкірної вени шкіра червона, гаряча на дотик, під час пальпації у верхній третині гомілки визначається довгасте болюче ущільнення розмірами 3x2 см. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?
Правильна відповідь	Тромбофлебіт
В	Фурункул
С	Тромбоз глибоких вен
Д	Лімфаденіт
Е	Лімфангіт
№	Крок 2023
Тема	Цукровий діабет
Текст завдання	Жінка віком 64 роки хворіє на цукровий діабет 2 типу, отримує цукрознижуючу терапію: метформін по 850 мг 3 рази на добу. Глікемія натщесерце — 7,8 ммоль/л, через дві години після їжі — 10,5 ммоль/л, глікозильований гемоглобін — 8,7%. Під час огляду лікарем-офтальмологом було діагностовано діабетичну проліферативну ретинопатію сітківки обох очей. Яка подальша тактика лікування?
Правильна відповідь	Перевести на інсулінотерапію
В	Збільшити дозу метформіну до 3 500 мг на добу
С	До цукрознижуючої терапії додати гліклазид 160 мг в день
Д	До цукрознижуючої терапії додати гліклазид 10 мг в день
Е	Не змінювати терапію
№	Крок 2023
Тема	Політравма

Текст завдання	До лікарні шпиталізовано постраждалого в ДТП чоловіка віком 42 роки з діагнозом: політравма, розрив селезінки, перелом правого стегна. Об'єктивно спостерігається: загальмований, шкіра вкрита липким холодним потом, бліда. Дихання поверхневе, часте. Пульс — 140/хв, слабкого наповнення, АТ — 65/40 мм рт. ст., ЦВТ — 0. Планується операційне втручання під внутрішньовенною анестезією зі штучною вентиляцією легень. Який анестетик необхідно вибрати для проведення загальної анестезії?
Правильна відповідь	Кетамін
В	Пропофол
С	Ізофлюран
Д	Севофлуран
Е	Тіопентал натрію
№	Крок 2023
Тема	Хвороби органів черевної порожнини
Текст завдання	Чоловік віком 38 років скаржиться на переймоподібні болі в животі, нудоту, блювоту, вздуття живота, невідходження газів, відсутність стільця. Із анамнезу відомо, що нещодавно пацієнта проперовано з приводу апендициту. Пальпаторно живіт болісний у всіх відділах, напружений. Визначається шум плескоту, нечіткі симптоми подразнення очеревини, гіперперистальтика. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Злукова кишкова непрохідність
В	Дивертикулярний коліт
С	Виразкова хвороба шлунка
Д	Рак товстого кишечника
Е	Розлитий перитоніт
№	Крок 2023
Тема	Шок у хірургічних хворих

Текст завдання	Жінку віком 24 років шпиталізовано зі скаргами па блювання за типом «кавової гущі», запаморочення, загальну слабкість. Під час об'єктивного обстеження встановлено: пацієнтка у свідомості, шкіра бліда, суха, над легенями аускультативно — жорстке дихання. ЧД — 20/хв, АТ — 100/80 мм рт. ст, пульс — 100/хв. Живіт м'який, безболісний. Перитонеальні симптоми негативні. Стілець рідкий, чорний. Діурез збережений. У клінічному аналізі кроні виявлено: НБ — 95 г/л, еритроцити — 3,1 г/л, лейкоцити — 9,8 г/л. Який показник шокового індекса Альговера у цієї пацієнтки?
Правильна відповідь	1
В	1,5
С	2
D	1,25
Е	0,85
№	Крок 2023
Тема	Ендокрина хірургія
Текст завдання	Жінка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, сонливість, постійне відчуття втоми, зниження працездатності, закрепи, випадіння волосся. З анамнезу відомо, що пацієнтка рік тому перенесла резекцію щитоподібної залози з приводу багатовузлового зобу. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 36°C, шкірні покриви сухі, зморшкуваті, аменорея. Який патологічний стан виник у пацієнтки?
Правильна відповідь	Гіпотиреоз
В	Гіпопаратиреоз
С	Клімактеричний синдром
D	Тиреотоксикоз
Е	Хронічний тиреоїдит
№	Крок 2023

Тема	Хірургічна патологія легень та плеври
Текст завдання	Пацієнт віком 56 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,5°C, кашель із виділенням гнійного мокротиння, незначну задишку. Хворіє протягом трьох днів. З першого дня клінічних проявів приймав амоксицилін-клавуланат, однак стан не покращився. З анамнезу відомо, що пацієнт не палить, протягом останніх шести місяців не приймав антибіотики, п'ять років хворіє на цукровий діабет 2 типу, приймає метформін. Об'єктивно спостерігається: АТ — 130/80 мм рт. ст., пульс — 85/хв. ЧД — 20/хв. Під час перкусії легень виявлено притуплення перкуторного звуку в нижніх відділах правої легені, аускультативно над цією ділянкою вислуховуються ослаблене везикулярне дихання та дрібнопузирчасті вологі хрипи. З боку інших органів та систем патології не виявлено. За результатами загального аналізу крові: нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом формули вліво. Яка подальша тактика сімейного лікаря?
Правильна відповідь	Призначити фторхінолон III—IV покоління
В	Призначити цефалоспорини I покоління
С	Призначити доксициклін
Д	Збільшити дозу амоксицилін-клавуланата та додати муколітичні засоби
Е	Направити на консультацію до ендокринолога
№	Крок 2023
Тема	Хірургічна патологія легень та плеври
Текст завдання	Чоловіка віком 45 років шпиталізовано до лікарні у тяжкому стані. З анамнезу відомо, що до шпиталізації він хворів протягом 3-х тижнів на пневмонію. Об'єктивно встановлено: шкіра та слизові темно-землистого кольору, температура тіла — 38°C, задишка у стані спокою, дихання зліва різко ослаблено. Спостерігається кашель із рясним харкотинням. Рентгенологічно виявлено затемнення лівого геміторака. Який діагноз найімовірніший?
Правильна відповідь	Емпієма плеври

В	Пухлина легені
С	Пневмоторакс
Д	Бронхіт
Е	Пневмонія
№	Крок 2023
Тема	Критичні стани у хірургічних хворих
Текст завдання	Пацієнт віком 40 років був прооперований із приводу флегмони поперекової ділянки. Після операції у нього різко підвищилася температура тіла до 38°C, з'явилися явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів у крові. У післяопераційній рані, на місці некротичної тканини, з'явилися бліді грануляції, заповнені гнійним умістом. Яке ускладнення виникло у пацієнта?
Правильна відповідь	Сепсис
В	Алергічна реакція
С	Повторна флегмона
Д	Бешихове запалення
Е	Гнилісна флегмона
№	Крок 2023
Тема	Ендокрина хірургія
Текст завдання	Жінка віком 35 років скаржиться, що після ГРВІ почалися перебої в роботі серця, зниження ваги, біль передньої поверхні шиї. Об'єктивно спостерігається: пульс — 110/хв, АТ — 130/60 мм рт. ст., щитоподібна залоза незначно збільшена, болюча при пальпації. Лабораторно встановлено: ШОЕ— 40 мм/год, ТТГ - 0,05 мОд/л, Т4 - 34,3 пмоль/л. Який найімовірніший діагноз?
Правильна відповідь	Підгострий тиреоїдит
В	Тиреоїдит Хашимото
С	Дифузний токсичний зоб
Д	Гострий тиреоїдит

Е	Пароксизмальна тахікардія
№	Крок 2023
Тема	Кишкова непрохідність
Текст завдання	Семимісячна дитина шпиталізована до хірургічного відділення за 8 годин після захворювання зі скаргами на напади неспокою, біль у животі, одноразове блювання. Об'єктивно спостерігається: у правій половині живота пальпується пухлиноподібне утворення. Під час ректального дослідження виявлено кров у вигляді «малинового желе». Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Інвагінацію кишечника
В	Ентерокістому
С	Пухлину черевної порожнини
D	Глистну інвазію
Е	Подвоєння кишечника
№	Крок 2023
Тема	Хвороби органів черевної порожнини
Текст завдання	За 2 місяці після операційного втручання з приводу парапроктиту жінка віком 53 роки звернулась до лікаря зі скаргами на перианальний дискомфорт, тенезми слизисто-гнійні виділення. Під час ректального обстеження відмічається зовнішній норицевий отвір, при надавлюванні на який виходить гній, по ходу отвору відмічається шнуроподібне ущільнення в напрямку прямої кишки. Під час анаскопії встановлено: слизова облонка кишківника по типу бруківки. Який імовірний діагноз у пацієнтки?
Правильна відповідь	Хвороба Крона, параректальна нориця
В	Рак прямої кишки
С	Гострий парапроктит
D	Неспецифічний виразковий коліт
Е	Неповна внутрішня параректальна нориця



№	Крок 2023
Тема	Синдром ішемії кінцівок
Текст завдання	Чоловік віком 28 років скаржиться на біль у лівій нижній кінцівці протягом 6 місяців, переміжну кульгавість, що з'являється після проходження 50-100 м, періодично нічні болі в кінцівці. Під час огляду кінцівка бліда, холодна, артеріальна пульсація відсутня на гомілці. Який імовірно діагноз у пацієнта?
Правильна відповідь	Облітеруючий ендартеріт
В	Облітеруючий атеросклероз
С	Емболія стегнової артерії
Д	Хвороба Такаюсу
Е	Синдром Рейно
№	Крок 2023
Тема	Диференційна діагностика жовтяниць
Текст завдання	У пацієнта віком 23 роки об'єктивно спостерігається: шкірні покрови жовтого кольору, склери іктеричні, пульс — 66/хв, АТ — 120/80 мм рт. ст., АЛТ, АСТ, тимолова проба — норма. Загальний білірубін — 34 мкмоль/л за рахунок непрямого. Для якої патології характерні ці симптоми?
Правильна відповідь	Синдрому Жильбера
В	Синдрому холестазу
С	Хронічного вірусного гепатиту С
Д	Хронічного криптогенного гепатиту
Е	Цирозу печінки
№	Крок 2023
Тема	Цукровий діабет

Текст завдання	Чоловік віком 55 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на слабкість, спрагу, сухість у роті, підвищення АТ. Об'єктивно спостерігається: ІМТ — 35,6 кг/м <sup>2</sup> , АТ — 140/90 мм рт. ст., шкіра суха, підшкірно-жирова клітковина розподілена за абдомінальним типом. Глікемія натщесерце — 6,0 ммоль/л, постпрандіальна — 11,4 ммоль/л, НbA1c — 6,8%. Яку тактику лікування потрібно вибрати?
Правильна відповідь	Дієтотерапію та фізичні навантаження
В	Призначити метформін
С	Призначити похідні сульфонілсечовини
Д	Призначити статини
Е	Інсулінотерапію
№	Крок 2023
Тема	Хірургічні захворювання органів черевної порожнини
Текст завдання	Пацієнт віком 27 років упродовж 5 років лікувався з приводу НВК. Чоловік звернувся зі скаргами на виражений біль у животі, що з'явився 3 години тому, гази не відходять. Об'єктивно спостерігається: сухий язик, живіт не бере участі в акті дихання, позитивні симптоми подразнення очеревини. Пульс — 120/хв. Встановіть імовірний діагноз.
Правильна відповідь	Перфорація товстої кишки. Перитоніт
В	Механічна кишкова непрохідність
С	Гостра шлунково-кишкова кровотеча
Д	Гострий апендицит
Е	Інвагінація товстої кишки
№	Крок 2023
Тема	Диференційна діагностика раку легень

Текст завдання	Жінка віком 56 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,5°C, пітливість уночі та збільшення лімфовузлів у лівій пахвовій та лівій надключичній ділянках. Під час фізикального обстеження в цих ділянках пальпуються збільшені, безболісні, щільні лімфовузли. Під час рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини виявлено: розширення тіні середостіння за рахунок збільшених лімфовузлів. Після ексцизійної біопсії лімфовузла надключичної ділянки, виявлені атипівні багатоядерні клітини Рід-Штернберга. З сімейного анамнезу відомо: у бабусі пацієнтки — рак молочної залози. Для якого захворювання характерні ці симптоми?
Правильна відповідь	Лімфоми Ходжкіна
В	Метастаз раку молочної залози
С	Інфекційного мононуклеозу
Д	Бронхогенної карциноми
Е	Туберкульозу
№	Крок 2023
Тема	Хірургічні захворювання стравоходу
Текст завдання	Чоловік віком 52 роки звернувся зі скаргами на періодичні болі за грудиною, порушення проходження твердої їжі, схуднення на 5 кг за 3 тижні. Під час фіброезофагогастроскопії виявлено: вільна прохідність стравоходу до рівня 37,5-38 см від краю верхніх різців, де визначається верхній полюс екзофітного утворення, що звужує просвіт до 1/2 від норми. За результатами біопсії: аденокарцинома. Яке передракове захворювання найімовірніше у пацієнта?
Правильна відповідь	Стравохід Баррета
В	Ліпома стравоходу
С	Дивертикул стравоходу
Д	Стан після опіку стравоходу
Е	Поліп стравоходу

№	Крок 2023
Тема	Диференційна діагностика раку легень
Текст завдання	Жінка віком 67 років звернулася до лікаря зі скаргами на новоутворення у верхньому відділі лівої молочної залози, яке вона виявила випадково. Пацієнтка направлена на маммографію і УЗД молочних залоз. Під час маммографії у верхньо-зовнішньому квадранті залози виявлено утворення високої щільності з тяжистими контурами і поліморфними мікрокальцинатами. Під час УЗД виявлено: гіперехогенне утворення вертикальної орієнтації з нерівними нечіткими контурами і аксиллярний лімфатичний вузол розміром 2,5 см із порушенням структури. Встановіть діагноз.
Правильна відповідь	Злоякісна пухлина з метастатичним лімфовузлом
В	Фібroadенома із запаленням
С	Олеогранульома
Д	Гамартома з ураженням лімфовузла
Е	Доброякісна пухлина з ураженням лімфовузла
№	крок 2017
Тема	Гнійна хірургія. Діагностика гнійних ускладнень при маститі
Текст завдання	У хворої на 4-у добу після оперативного втручання з приводу гнійного маститу загальний стан погіршився, зросла температура до 40°C, частота пульсу - 110/хв., частота дихання - 24/хв. Артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів - $18 \cdot 10^9$ /л, кількість паличкоядерних форм - 19%. Яке ускладнення можна припустити?
Правильна відповідь	Сепсис
В	Нагноєння рани
С	Газова гангрена
Д	Перитоніт
Е	Гостре респіраторне захворювання

№	крок 2017
Тема	Інструментальні методи дослідження при пошкодженнях живота.
Текст завдання	Хворому 25-ти років поставлено діагноз: перелом кісток тазу. Стан тяжкий, пульс - 116/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живіт напружений, болючий, симптоми подразнення очеревини слабо виражені. В крові: еритроцити - $3,2 \cdot 10^{12}/л$ ; Нь- 110 г/л; Нт- 0,37; лейкоцити - $10 \cdot 10^9/л$ ; паличкоядерні - 10%. Який додатковий метод обстеження найбільш інформативний?
Правильна відповідь	Лапароскопія
В	Оглядова рентгенограма черева
С	Ультразвукове дослідження черева
Д	Лапароцентез
Е	Фіброгастродуоденоскопія
№	крок 2017
Тема	Судинна хірургія. Диференційна діагностика ускладнень при варикозному розширенні вен н/кінцівок
Текст завдання	Хвора 35-ти років скаржиться на біль в правій гомілці, який посилюється під час ходьби. Об'єктивно: на
Правильна відповідь	Тромбофлебіт
В	Тромбоз глибоких вен
С	Фурункул
Д	Лімфангіт
Е	Лімфаденіт
№	крок 2017
Тема	Пошкодження груді. Лікувальна тактика.
Текст завдання	Потерпілий 40-ка років зазнав ножового поранення під праву лопатку. Об'єктивно: шкіра звичайного
Правильна відповідь	Первинна хірургічна обробка рани

В	Пункція плевральної порожнини
С	Торакоцентез
Д	Торакоскопія
Е	Торакотомія
№	крок 2017
Тема	Перитоніт. тактика надання невідкладної допомоги.
Текст завдання	Хворий 42-х років зі скаргами на гострий біль в епігастральній ділянці, що почався раптово на тлі повного здоров'я, та підвищення температури тіла до 38,5°C, з позитивним симптомом Щоткіна-Блумберга, потребує хірургічної медичної допомоги. Який вид хірургічної допомоги за часом може бути наданий хворому?
Правильна відповідь	Екстрена (невідкладна)
В	Екстрена (невідкладна) або відтермінована
С	Планова
Д	Відтермінована або планова
Е	Екстрена (невідкладна) або планова
№	крок 2017
Тема	Проктологія. Діагностика ускладнень гострого парапроктиту.
Текст завдання	У хворого, оперованого з приводу гострого парапроктиту, протягом 5-ти діб на тлі комплексної терапії, при позитивній динаміці місцевого перебігу захворювання, спостерігаються остуди, гіпертермія, тахікардія, ейфорія. Лікар припустив, що у хворого розвинувся сепсис. Яке дослідження може підтвердити діагноз?
Правильна відповідь	Посів крові на наявність збудника
В	Рентгенографія легень
С	Ультразвукове дослідження печінки

D	Визначення ступеню мікробної контамінації рани
E	E. Визначення рівня молекул середньої маси
№	крок 2017
Тема	Гнійна хірургія. Діагностика гнійних захворювань шкіри.
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність декількох щільних, болючих вузлів у правій пахвовій ділянці, підвищення температури тіла до 38°C, загальну слабкість. Хворіє 3 доби. Локально: в правій пахвовій області є три вузлоподібних утворення, які підвищуються над поверхнею шкіри, розмірами від 0,5 см до 1,5 см в діаметрі, різко болючі при пальпації, з чіткими контурами, шкіра над ними багрово-синюшного відтінку, підняття верхньої кінцівки обмежено через біль. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гнійний гідраденіт
B	Абсцес
C	Карбункул
D	Фурункул
E	Гнійний лімфаденіт
№	крок 2017
Тема	Організація охорони здоров'я.
Текст завдання	Бригада екстреної медичної допомоги доставила пацієнта з гострим інфарктом міокарду до обласного кардіологічного центру, де було виконано кардіохірургічне втручання. В межах якого виду медичної допомоги були надані вказані медичні послуги?
Правильна відповідь	Високоспеціалізована медична допомога
B	Екстрена медична допомога
C	Кваліфікована медична допомога
D	Спеціалізована медична допомога

Е	Паліативна медична допомога
№	крок 2017
Тема	Кардіохірургія. Тактика при гнійних ускладненнях при протезуванні штучного мітрального клапану.
Текст завдання	У хворого 56-ти років в ході ультразвукового обстеження встановлена наявність вегетацій на штучному мітральному клапані, який було імплантовано 3 роки тому, та підклапанних структурах з ознаками деструкції вегетацій та розвитку недостатності штучного клапану. Яке лікування показане хворому?
Правильна відповідь	Оперативне (репротезування)
В	Призначення вазодилататорів
С	Подальше спостереження
Д	Імплантація штучного водія ритму
Е	Обмеження фізичного навантаження
№	крок 2010, 2009
Тема	Судинна хірургія. Ускладнення при проведенні інфузійної терапії.
Текст завдання	Хворому 46-ти років, який готується до операції з приводу раку шлунку, проводиться передопераційна інфузійна терапія. В праву ліктьову вену введено до 3,0 л розчинів. На наступну добу він відчув тягучий біль у ділянці правого плеча. При огляді: на внутрішній поверхні плеча відмічається повздовжня смуга гіперемії, набряклість шкіри, болючий тяж. Яке ускладнення розвинулося у хворого?
Правильна відповідь	Гострий тромбофлебіт
В	Прокол вени та набряк паравенозної клітковини
С	Некроз паравенозної клітковини
Д	Гострий лімфангоїт
Е	Флегмона паравенозної клітковини



№	крок 2010, 2011
Тема	Проктологія. Діагностика гострого парапроктиту.
Текст завдання	У хворого 29-ти років 3 дні тому з'явилися біль пульсуючого характеру в ділянці прямої кишки, підвищення температури тіла, загальна слаб-кість. Об'єктивно: локальна болісність в анальній ділянці на 6 годині. При пальцевому дослідженні прямої кишки болючий інфільтрат, що досягає гребінцевої лінії. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий парапроктит
В	Гостра анальна тріщина
С	Гострий геморой
Д	Пухлина прямої кишки
Е	Гострий простатит
№	крок 2010, 2009
Тема	Судинна хірургія. Інструментальна діагностика тромбоемболії легеневої артерії.
Текст завдання	Чоловік 52-х років скаржить на напади задухи, біль у правому боці під час дихання. Захворів раптово. З анамнезу відомо, що останній місяць він лікувався з приводу тромбофлебіту правої нижньої кінцівки. У приймальному відділенні раптово втратив свідомість, виникла задуха і біль у боці. Об'єктивно: ЧСС- 102/хв., ЧДР- 28/хв., АТ- 90/70 мм рт.ст. Аускультативно: акцент ІІ тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легенями з правого боку під лопаткою дрібнопухирцеві хрипи, шум тертя плеври. Яке дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Ангіографія судин легень
В	Ехокардіоскопія
С	Вивчення функції зовнішнього ди-хання
Д	ЕКГ
Е	Коагулограма
№	крок 2010, 2011

Тема	Судинна хірургія. Механізм дії м'язово-венозної помпи.
Текст завдання	Розвиток хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок залежить від функціонального стану так званої "м'язово-венозної помпи". Відносно якої групи м'язів застосовується цей термін?
Правильна відповідь	Гомілки
В	Черевної стінки
С	Сідничної ділянки
Д	Стегна
Е	Стопи
№	крок 2010
Тема	Медіастиніт. Торакальна хірургія. Тактика лікування при розривах стравоходу.
Текст завдання	У хворої 44-х років після езофагоскопії та біопсії на наступний день з'явилась емфізема обох надключичних ділянок, біль під час ковтання та за грудниною, ціаноз. Температура 39°C. У крові: лейк.- $16 \cdot 10^9$ /л, зсув лейкоцитарної формули вліво. На рентгенограмі визначається обмежене затемнення заднього середостіння на рівні біфуркації трахеї. Поставлено діагноз: розрив стравоходу. Яку тактику лікування найбільш доцільно обрати?
Правильна відповідь	Оперативне: дронування середостіння, накладання гастростоми
В	Спостереження
С	Консервативне антибактеріальне лікування
Д	Оперативне радикальне з зашиванням рани стравоходу
Е	Оперативне: накладання гастростоми
№	крок 2010, 2011
Тема	Гнійна хірургія. Місцеве лікування гнійних захворювань в фазі гідратації.

Текст завдання	Хірургом оглянутий хворий 42-х років. Діагноз: фурункул правого передпліччя, гнійно-некротична стадія. Проведено розтин фурункула. Пов'язку з яким препаратом треба покласти в фазі гідратації?
Правильна відповідь	Гіпертонічний розчин
B	Мазь Вишневського
C	Іхтіолова мазь
D	Хлорамін
E	Димексид
№	крок 2010, 2012
Тема	Внутрішньочеревна кровотеча. Переливання крові. Визначення груп крові.
Текст завдання	Хворий 37-ми років доставлений до відділення у непритомному стані. Отримав закриту травму в ділянку живота. Підозрюється внутрішньочеревна кровотеча, пошкодження внутрішніх органів. Готуються до термінового оперативного втручання. Лікар визначив за допомогою стандартних сироваток групу крові та отримав такий результат: 0(I) - відсутність аглютинації, A(II) - відсутність аглютинації, B(III) - відсутність аглютинації. Яка група крові у постраждалого?
Правильна відповідь	0(I)
B	A(II)
C	B( III )
D	AB(IV )
E	Переливання крові та кровозамінників
№	крок 2010, 2011
Тема	Кардіохірургія. Вибір тактики лікування при аритміях серця.

Текст завдання	Жінка 53-х років скаржиться на біль та перебої в роботі серця. Хворіє з дитинства, батько її страждав на аритмії серця. Об'єктивно: стан важкий, Рс- 220/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст. ЕКГ: ЧСС- 215/хв., розширення і деформація комплексу QRS з наявністю атріовен-трикулярної дисоціації; зубець Р - по-зитивний. В подальшому частота серцевих скорочень знизилася до 45/хв., повне роз'єднання зубця Р і комплексу QRST . Що з перерахованого є най-більш ефективним в лікуванні хворої?
Правильна відповідь	Імплантація штучного водія ритму
В	β-адреноблокатори
С	Холінолітики
Д	Антагоністи кальцію
Е	Серцеві глікозиди
№	крок 2010
Тема	Гнійна хірургія. Діагностика ускладнень гнійних захворювань м'яких тканин.
Текст завдання	Хворий 40-ка років був прооперований з приводу флегмони поперекової ділянки. У нього знову різко підвищилась температура тіла до 38°С, з'явилися явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів у крові. В рані, яка майже очистилася від некротичних тканин і заповнилася грануляціями, з'явилися гнилісні виділення, грануляції стали блідими. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
Правильна відповідь	Сепсис
В	Гнилісна флегмона
С	Бешихове запалення
Д	Алергічна реакція
Е	Ерізіпелюїд
№	крок 2010

Тема	Судинна хірургія. Діагностика ускладнень при тромбофлебіті глибоких вен голені.
Текст завдання	У хворого 65-ти років, який тривалий час хворіє на тромбофлебіт глибоких вен нижніх кінцівок, раптово з'явилися задишка, кашель з виділенням харкотиння і домішками крові, біль за грудниною з іррадіацією в правий бік. Рс- 100/хв, АТ- 90/50 мм рт.ст., ЦВТ- 300 мм вод.ст. Яке ускладнення виникло у хворого?
Правильна відповідь	Тромбоемболія легеневої артерії
В	Гострий перикардит
С	Гостра пневмонія
Д	Інфаркт міокарда
Е	Гостра серцево-судинна недостатність
№	крок 2010, 2009, 2015
Тема	Діагностика ускладнень при переливанні крові.
Текст завдання	У хворого 33-х років гостра крововтрата (ер.- 2, $2 \cdot 10^{12}$ /л, Нв- 55 г/л), група крові А(І І )Rh <sup>+</sup> . Йому помилково проведено трансфузію донорської еритромаси АВ(IV)Rh <sup>+</sup> . Через годину з'явилися відчуття тривоги, біль у попереку, животі. Рс- 134/хв., АТ- 100/65 мм рт.ст., температура тіла - 38, 6°С. При катетеризації сечового міхура отримано 12 мл/год сечі темно-коричневого кольору. Яке ускладнення виникло у хворого?
Правильна відповідь	Гостра ниркова недостатність
В	Кардіальний шок
С	Алергічна реакція на донорську еритромасу
Д	Цитратна інтоксикація
Е	Інфекційно-токсичний шок
№	крок 2007
Тема	Судинна хірургія. Патогенез абдомінального та ішемічного синдрому.

Текст завдання	У чоловіка 75-ти років приблизно через 30 хвилин після вживання їжі виникає гострий біль у навколопупкової ділянці, що супроводжується блюванням і відчуттям здуття живота. За останні декілька місяців він схуд на 10 кг, тому що не їсть, запобігаючи болю. Між больовими нападами змін під час огляду живота немає. Над правою стегною артерією прослуховується шум, периферична пульсація на нижніх кінцівках ослаблена. Рентгенологічне дослідження шлунка і колоноскопія змін не виявили. Що є провідним у патогенезі вказаних змін?
Правильна відповідь	Ішемія
В	Психогенні зміни
С	Неопластичний процес
Д	Запалення
Е	Минуща обструкція
№	крок 2007, 2008
Тема	Судинна хірургія. Патогенез гострого артеріального тромбозу.
Текст завдання	У чоловіка 65-ти років гостро виникли біль, парестезії, блідість лівої нижньої кінцівки. Об'єктивно: пульс на <i>a.dorsalis pedis</i> зліва відсутній. Відзначається похолодання шкіри та блідість, які поступово поширюються вгору по кінцівці. Ці симптоми з найбільшим ступенем вірогідності свідчать про:
Правильна відповідь	Артеріальну оклюзію
В	Тромбофлебіт поверхневих вен
С	Грижа поперекового хребтового диска
Д	Тромбофлебіт глибоких вен
Е	-
№	крок 2007, 2008
Тема	Торакальна хірургія. Діагностика дивертикулу стравоходу.

Текст завдання	Хворий скаржиться на відчуття важкості за грудниною та періодичне відчуття зупинки їжі, дисфагію. Під час рентгенологічного обстеження барієвий контраст виявляє поодинокі мішкоподібне випинання правої передньої стінки стравоходу з рівними контурами та чітко окресленою шийкою. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Дивертикул стравоходу
В	Рак стравоходу
С	Грижа стравохідного отвору діафрагми
Д	Варикозне розширення вен стравоходу
Е	Поліп стравоходу
№	крок 2007
Тема	Проктологія. Діагностика ускладнень геморою.
Текст завдання	Хворий скаржиться на періодичний рясний домішок алої крові в калі після акту дефекації. Хворіє більше 5-ти років. Захворювання пов'язує з важкими фізичними навантаженнями. Кровотеча посилюється після фізичних навантажень або вживання алкогольних напоїв. Випорожнення 1 раз на 2-3 доби, безболісні, кожного разу супроводжуються випадінням гемороїдальних вузлів. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Внутрішній кровоточивий геморої
В	Рак прямої кишки
С	Гострий проктосигмоїдит
Д	Зовнішній кровоточивий геморої
Е	Дивертикульоз тонкої кишки
№	крок 2007
Тема	Холедохолітиаз. Хірургія жовчних протоків.

Текст завдання	Хворому 43-х років 6 років тому проведена холецистектомія з приводу хронічного калькульозного холециститу. Останні півроку став відзначати біль у правому підребер'ї та минуці жовтяниці. Останні 2 тижні жовтяниця не проходить. Під час обстеження виявлено стенозуючий папіліт протяжністю до 0,5 см. Оберіть найкращий варіант лікування хворого:
Правильна відповідь	Провести ендоскопічну папілосфінктеротомію
В	Проводити консервативне лікування: спазмолітики, антибіотики, протизапальні засоби
С	Провести зовнішнє дронування холедоха
Д	Провести трансдуоденальну папілосфінктеротомію
Е	Провести холедоходуоденостомію
№	крок 2007, 2016
Тема	Диференціальна діагностика ущемлення пахвинних гриж.
Текст завдання	Хворий 62-х років скаржиться на наявність випинання в лівій пахвинній ділянці, яке поступово збільшувалось. Об'єктивно: в лівій пахвинній ділянці випинання розміром 5-6 см, щільне, еластичне, болісне, в черевну порожнину не вправляється, шкіра над ним не змінена, зовнішнє пахвинне кільце пропускає кінчик пальця. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Пахвинний лімфаденіт
В	Вправима лівобічна пахвинна грижа
С	Лівобічна защемлена пахвинна грижа
Д	Невправима лівобічна пахвинна грижа
Е	Пухлинний утвір
№	крок 2007
Тема	Торакальна хірургія. Тактика надання невідкладної допомоги при пневмотораксі.



Текст завдання	Хворий 42-х років після підняття важкого предмету відзначив різкий біль у правій половині грудної клітки, різко посилилася задишка. Стан хворого важкий: ціаноз губ та слизових, ЧДР- 28/хв, Рс- 122/хв. Над правою половиною грудної клітки перкуторно - тимпаніт, аускультативно - різко ослаблене дихання; акцент II тону над легеневою артерією. АТ- 80/60 мм рт.ст. Який основний невідкладний захід на догоспітальному етапі?
Правильна відповідь	Аспірація повітря з плевральної порожнини
В	Введення адреналіну
С	Введення еуфіліну
Д	Викликати кардіологічну бригаду
Е	Інгаляція кисню
№	крок 2007
Тема	Судинна хірургія. Діагностика тромбозу мезентеріальних судин.
Текст завдання	Хвора 74-х років скаржиться на біль та здуття живота, нудоту. Страждає на ішемічну хворобу серця, постінфарктний та дифузний кардіосклероз. Об'єктивно: стан важкий, живіт здутий, черевна стінка слабо бере участь в акті дихання. Під час лапароскопії: у черевній порожнині невелика кількість мутного випоту, одна з петель тонкої кишки темно-синюшнього кольору. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Тромбоз мезентеріальних судин
В	Заворот кишечнику
С	Гостра кишкова непрохідність
Д	Ішемічний абдомінальний синдром
Е	Бешихове запалення
№	крок 2007, 2008
Тема	Гнійна хірургія. Діагностика гнійних захворювань м'яких тканин.

Текст завдання	У хворої 60-ти років, на 4-ту добу після ін'єкції, в лівій сідниці з'явилися біль та ущільнення тканин. Об'єктивно: в верхньо-зовнішньому квадранті лівої сідниці шкіра червоного кольору, гаряча на дотик, під час пальпації визначається інфільтрат 6х6 см, болісний, у центрі розм'якшення. Температура тіла - 37, 9 <sup>0</sup> . Що слід зробити для визначення наявності абсцесу?
Правильна відповідь	Пункція
В	Біопсія
С	Ультразвукове дослідження
Д	Рентгенографія
Е	Загальний аналіз крові
№	крок 2007, 2008
Тема	Судинна хірургія. Діагностика ускладнень гострого тромбофлебиту.
Текст завдання	У хворої варикозне розширення вен нижньої кінцівки ускладнилося гострим тромбофлебітом. Інфільтрат збільшився в об'ємі, набув різкої болючості, шкіра гіперемована. Температура гектичного характеру. В лікарні за місцем проживання лікувалась за звичайною схемою. За 2 доби до госпіталізації утворився другий інфільтрат під пупартовою зв'язкою. З'явився озноб. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Висхідний тромбофлебіт поверхневих вен
В	Гострий тромбоз глибоких вен
С	Бешихове запалення
Д	Хвороба Бюргера
Е	Післятромбофлебітичний синдром
№	крок 2007
Тема	Гнійна хірургія. Вибір методу лікування панарицію.

Текст завдання	Хворий 28-ми років, що 2 дні тому поранив дистальну фалангу вказівного пальця правої руки голкою, скаржиться на різкий біль пульсуючого характеру та набряк у ділянці цієї фаланги, виражене порушення рухомості пальця. Через біль, останньої ночі заснути не зміг. Об'єктивно: вказівний палець дещо зігнутий, дистальна фаланга його гіперемована, значно збільшена в об'ємі. Зондом чітко визначається точка максимальної болючості. Температура тіла 36, 9 <sup>0</sup> . Яким повинно бути місцеве лікування?
Правильна відповідь	Розтин та дренивання гнійного процесу пальця
В	Розтин та дренивання гнійника після місцевої інфільтративної анестезії
С	Обколювання ураженої ділянки антибіотиками з новокаїном
Д	Застосування напівспиртових компресів
Е	Резекція дистальної фаланги пальця
№	крок 2007, 2014
Тема	Ускладнення переливання крові. Вибір трансфузійних сред при анафілактичній реакції.
Текст завдання	До стаціонару надійшов хворий 33-х років із зупиненою повторною виразковою кровотечею. Під час огляду виснажений, блідий. У крові: Hb- 77 г/л, Ht- 0,25. У зв'язку з наявністю анемії двічі була спроба переливання однокрупної ( )Rh <sup>+</sup> крові. Обидва рази переливання було зупинено у зв'язку з розвитком анафілактичної реакції. Переливання якого трансфузійного середовища бажано в даному випадку?
Правильна відповідь	Відмиті еритроцити
В	Свіжоцитратна кров
С	Еритроцитарна маса (нативна)
Д	Еритроцитарна завись
Е	Еритроцитарна маса, яка бідна на лейкоцити та тромбоцити
№	крок 2007

Тема	Організація охорони здоров'я. Визначення груп крові
Текст завдання	До хірургічного стаціонару надійшов хлопець 19-ти років, який отримав закриту травму живота. Під час операції виявлені численні розриви селезінки та тонкої кишки. Артеріальний тиск прогресивно знижується. Виникла необхідність у гемотрансфузії. Хто може виконати визначення групи крові та резус-належності у потерпілого?
Правильна відповідь	Лікар будь-якої спеціальності
В	Лікар-лаборант
С	Хірург
Д	Лікар-травматолог
Е	Лікар-анестезіолог
№	крок 2007, 2008
Тема	Торакальна хірургія. Тактика лікування згорнутого гемотораксу.
Текст завдання	Хворий 35-ти років надійшов до районної лікарні через тиждень після ДТП з клінікою згорненого гемотораксу. Яка доцільна лікувальна тактика в плані профілактики розвитку гострої емпієми плеври в хворого?
Правильна відповідь	Хірургічне усунення згорненого гемотораксу
В	Лікування плевральними пункціями
С	Комплексна консервативна терапія
Д	Дренування плевральної порожнини пасивним дренажем
Е	Дренування плевральної порожнини активним дренажем
№	крок 2008, 2009
Тема	Судинна хірургія. Діагностика судинних ускладнень при протезуванні стегнового суглоба.

Текст завдання	Через 5 днів після трансплантації кульшового суглоба у жінки 72-х років раптово розвинувся напад ядухи, гіпотензія, пітливість. Відзначається підвищене наповнення і пульсація вен шиї. Під час аускультативної і перкусійної легень змін не виявлено. Тони серця нормальні. На ЕКГ: синусова тахікардія, блокада правої ніжки пучка Гіса, що вперше виникла, неспецифічні зміни інтервалу $S - T$ та зубця $T$ . Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Тромбоемболія легеневої артерії
В	Гострий інфаркт міокарда
С	Розшаровуюча аневризма аорти
Д	Перикардит
Е	Аспірація
№	крок 2008
Тема	Тактика лікування гострого панкреатиту.
Текст завдання	Чоловік 40-ка років зловживає алкоголем. Висловлює скарги на постійний біль у епігастральній ділянці. У процесі обстеження виявлені зміни протоки підшлункової залози - множинні ділянки звуження з послідовним розширенням. Яка з перерахованих операцій найбільш показана пацієнту?
Правильна відповідь	Латеральна панкреатоєюностомія
В	Дистальна панкреатоєюностомія
С	Сфінктеротомія
Д	Дистальна панкреатектомія
Е	Тотальна панкреатектомія
№	крок 2008
Тема	Тактика лікування хворого з травмою живота.
Текст завдання	Лікуванням вибору при дуоденальній обструкції, зумовленій вторинною дуоденальною гематомою, яка розвинулася через кілька днів після тупої травми живота, є:

Правильна відповідь	Назогастральна декомпресія і парентеральне харчування
В	Ретрокишкова гастроєюностомія
С	Дуоденоеюностомія
Д	Негайна ревізія
Е	Формування дуоденостоми
№	крок 2008
Тема	Діагностика пневмотораксу. Торакальна хірургія.
Текст завдання	У чоловіка 25-ти років раптово виник гострий біль у правій половині грудної клітки і задишка. Об'єктивно: трахея відхилена вліво. Усе перераховане може мати місце, КРІМ:
Правильна відповідь	Шум тертя плеври зліва
В	Відсутність сухих хрипів
С	Відсутність вологих хрипів
Д	Підвищене голосове тремтіння з правого боку
Е	Дистанційні сухі хрипи
№	крок 2008
Тема	Торакальна хірургія. Диференційна діагностика при гострій патології органів грудної клітки.
Текст завдання	Хворий скаржиться на різку задишку, яка посилюється при фізичному навантаженні. Скарги виникли раптово 2 години тому на роботі: різкий біль зліва у грудній клітці, кашель. З часом біль зменшувався, але зростала задишка, запаморочення, блідість, холодний піт, ціаноз. Відсутнє везикулярне дихання. Рентгенологічно - затемнення з лівого боку. Яку патологію можна запідозрити?
Правильна відповідь	Спонтанний лівобічний пневмоторакс
В	Інфаркт легені
С	Плеврит

D	Лівобічна пневмонія
E	Абсцес легені
№	крок 2008
Тема	Судинна хірургія. Диференційна діагностика гострих захворювань судин н/кінцівок.
Текст завдання	Хворий 43-х років переніс 3 роки тому тромбоз глибоких вен здухвинно-стегнового сегменту з правого боку. На сьогоднішній день турбують важкість, набряк правої нижньої кінцівки. Об'єктивно: помірний набряк гомілки, бура індурація шкіри у нижній третині гомілки, варикозно розширені поверхневі вени гомілки. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Післятромбофлебітичний синдром, варикозна форма
B	Гострий тромбоз вен з правого боку
C	Лімфедема правої нижньої кінцівки
D	Синдром Паркс-Вебера
E	Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
№	крок 2008
Тема	Гнійна хірургія. Диференційна діагностика гнійних захворювань шкіри та м'яких тканин.
Текст завдання	Хвора 23-х років захворіла 3 тижні тому, коли з'явилося затвердіння у пахвовій впадині, дуже болюче. Через 4-5 днів воно вскрилось з виділенням великої кількості гною. Потім навколо з'явилися нові інфільтрати. До цього випадку шкірними хворобами не хворіла. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гідраденіт
B	Фурункул
C	Мікоз
D	Оперізуючий герпес
E	Стрептодермія
№	крок 2008

Тема	Тактика лікування діафрагмальних гриж.
Текст завдання	Хворий скаржиться на печію та постійний біль за грудниною. Після вживання їжі, при нахилі тулуба, виникає зригування. При рентгенологічному дослідженні виявлено: ковзька кардіофункціональна кила стравохідного отвору діафрагми, з розміщенням кардії на дні шлунка на 8 см вище діафрагми. При езофагоскопії є ознаки рефлюкsezофагиту. Яка тактика лікування цього хворого?
Правильна відповідь	Операція в хірургічному стаціонарі
В	Консервативне лікування в поліклініці
С	Консервативне лікування в терапевтичному стаціонарі
Д	Консервативне лікування в хірургічному стаціонарі
Е	Санаторно-курортне лікування
№	крок 2008
Тема	Хірургія органів черевної порожнини. Диференційна діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини.
Текст завдання	Жінка 40-ка років протягом 3-х діб відзначає поступово наростаючий біль у правій здухвинній ділянці, що починався з епігастральної ділянки. Температура до 37, 5 – 37, 8 <sup>0</sup> С. Під час огляду: язик вологий, Рs- 80/хв, живіт при пальпації м'який, помірно болючий в правій здухвинній ділянці, де нечітко пальпується невеликий утвір. У крові: лейк.-12 · 10 <sup>9</sup> /л. Про яку патологію слід думати?
Правильна відповідь	Апендикулярний інфільтрат
В	Пухлина сліпої кишки
С	Перекручена кіста яєчника
Д	Позаматкова вагітність
Е	Апендикулярний абсцес



№	крок 2008, 2009, 2015
Тема	Гнійні захворювання легень. Диференційна діагностика захворювань органів грудної клітки.
Текст завдання	Хвора 52-х років скаржиться на біль у правій половині грудної клітини, задишку, кашель з великою кількістю пінистого харкотиння у вигляді "м'ясних помиїв", з неприємним запахом. Об'єктивно: стан тяжкий, ціаноз, ЧДР-31/хв, при перкусії вкорочений перкуторний звук над правою легенею, аускультативно - різнокаліберні вологі хрипи. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гангрена легені
В	Абсцес легені
С	Емпієма плеври
Д	Бронхоектатична хвороба
Е	Хронічна пневмонія
№	крок 2008, 2011, 2015, 2016
Тема	Гнійна хірургія. Диференційна діагностика гнійних захворювань н/кінцівок.
Текст завдання	На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38 <sup>0</sup> С, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?
Правильна відповідь	Лімфаденіт
В	Лімфангоїт
С	Флегмона
Д	Правець
Е	Бешиха
№	крок 2008, 2009
Тема	Судинна хірургія. Диференційна діагностика оклюзій н/х уражень судин верхньої кінцівки.

Текст завдання	Хворий 52-х років скаржиться на головний біль, слабкість лівої верхньої кінцівки. При фізичному навантаженні лівої кінцівки збільшуються неврологічні симптоми. Пульсація на артеріях лівої кінцівки різко ослаблена, на сонних артеріях - збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Оклюзія лівої підключичної артерії, синдром "обкрадання"
B	Синдром торакального виходу
C	Синдром Рейно
D	Хвороба Такаясу
E	Оклюзія брахіоцефального стовбура
№	крок 2008
Тема	Діагностика хірургічних ускладнень цукрового діабету.
Текст завдання	Хворий 68-ми років скаржиться на різкий біль у правій стопі, набряк пальців та потемніння шкіри IV пальця. На цукровий діабет хворіє 15 років, лікується нерегулярно. Яке ускладнення цукрового діабету виникло в хворого?
Правильна відповідь	Гангрена IV пальця правої стопи
B	Панарицій
C	Гематома
D	Бешиха
E	Перелом IV пальця правої стопи
№	крок 2008
Тема	Гнійна хірургія. Діагностика гнійних захворювань кисті.
Текст завдання	У хворого 19-ти років, після поверхневого ушкодження шкіри на долонній поверхні нігтьової фаланги II пальця, з'явився незначний біль та пухир, заповнений гноем. На тильній поверхні кисті ознаки лімфангіту. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Шкірний панарицій

В	Бешиха
С	Лімфангіт
Д	Фурункул
Е	Кістковий панарицій
№	крок 2008
Тема	Тактика лікування пошкоджень стравоходу.
Текст завдання	У хворої 72-х років з важкою супутньою патологією, під час ургентної фіброезофагогастроскопії, було пошкоджено стінку стравоходу. Почали прогресивно наростати явища гострої дихальної недостатності та виник колапс лівої легені. Яку допомогу необхідно надати хворій?
Правильна відповідь	Дренування плевральної порожнини за Бюллау, дренування середостіння, антибактеріальна терапія
В	Дренування плевральної порожнини за Бюллау, антибактеріальна терапія
С	Лівобічна торакотомія, ушивання рани середостіння і стравоходу
Д	Лівобічна торакотомія з ушиванням рани стравоходу
Е	Ендоскопічне ушивання рани стравоходу, дренування
№	крок 2009
Тема	Діагностика ускладнень захворювань стравоходу.
Текст завдання	Пацієнт 48-ми років при бужуванні стравоходу з причини рубцевої стриктури відчув різкий біль у животі. Раніше хворів на виразкову хворобу 12-ти палої кишки. При огляді: живіт різко напружений, болючий; Рс 110/хв. Бо-люче ковтання слини. Блідість шкірних покривів. Який найбільш вірогідний ді-агноз?
Правильна відповідь	Перфорація абдомінального відділу стравоходу
В	Гострий інфаркт міокарда
С	Защемлення діафрагмальної грижі
Д	Перфорація виразки 12-ти палої кишки
Е	Тромбоз мезентеріальних судин

№	крок 2009
Тема	Діагностика захворювань органів грудної клітки.
Текст завдання	У дитини 2-х років, яка знаходиться на лікуванні в дитячому відділенні з приводу гострої пневмонії, різко погіршився загальний стан: дитина неспокійна, виявляється задишка, ЧДР- 50/хв., Рс- 130/хв. При перкусії: зміщення межистіння вліво, праворуч - притуплення перкуторного звуку до 5 ребра, вище - з коробковим відтінком; при аускультатції - дихання праворуч різко послаблене. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Напружений правобічний піопневмоторакс
В	Ателектаз лівої легені
С	Гостра емфізема межистіння
Д	Правобічна пневмонія
Е	Гострий перикардит
№	крок 2009
Тема	Діагностика захворювань органів черевної порожнини.
Текст завдання	У хворої 49-ти років 4 доби тому з'явився біль у правій половині черева, який спочатку наростав і до кінця другої доби став поступово вщухати, підсилюючись лише при різких рухах та кашлі. Температура тіла спочатку була 38°С і поступово знизилася до 37, 5°С. Стан задовільний, Рс- 84/хв. Язик вологий. В правій здухвинній ділянці відмічається слабо виражена напруга м'язів, через яку пальпується щільне болюче пухлиноподібне утворення з нерівним контуром і обмеженою рухливістю. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Апендикулярний інфільтрат
В	Апендикулярний абсцес
С	Пухлина сліпої кишки
Д	Пілефлебіт

Е	Правобічний аднексит
№	крок 2009
Тема	Діагностика гострого панкреатиту.
Текст завдання	Хвора скаржиться на біль у епігастральній ділянці оперізуючого характеру, нудоту, багаторазове блювання, здуття черева, наростаючу слабкість. Стан тяжкий, виражена блідість шкірних покривів, Рс-100/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений. Живіт здутий, але м'який при пальпації. Симптомів подразнення очеревини немає. У крові: лейкоц.- $26 \cdot 10^9/\text{л}$ , амілаза - 44 г(год·л). Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий панкреатит
В	Пенетрація та кровотеча з виразки 12-ти палої кишки
С	Гострий холецистит
Д	Гострий тромбоз мезентеріальних судин
Е	Гострий апендицит
№	крок 2009
Тема	Діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини.
Текст завдання	У хворого 54-х років раптово з'явився сильний біль у надчеревній ділянці. Об'єктивно: вимушене положення тіла. Біль при пальпації живота по всій поверхні, напруженість м'язів черевної стінки. Печінкова тупість відсутня. Який із методів діагностики слід застосувати для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
В	Пневмоперитонеографія
С	Фіброгастродуоденоскопія
Д	Іригоскопія
Е	Контрастна рентгенографія шлунку та 12-ти палої кишки

№	крок 2009
Тема	Хірургічна тактика при гнійних захворюваннях м'яких тканин.
Текст завдання	Хвора 35-ти років 3 дні тому отримала рвану рану стегна внаслідок побутової травми. Звернулася по допомогу. Їй проведено додатковий розтин шкіри, висічення змертвілих тканин, розкриття гнійних заплівів, дронування рани. Яку операцію виконано хворій?
Правильна відповідь	Вторинна хірургічна обробка рани
В	Рання первинна хірургічна обробка рани
С	Відстрочена хірургічна обробка рани
Д	Пізня первинна хірургічна обробка рани
Е	Повторна хірургічна обробка рани
№	крок 2009
Тема	Проктологія. Діагностика.
Текст завдання	Пацієнт скаржиться на наявність випинань у ділянці ануса, які з'являються під час дефекації та потребують вправлення. При огляді аноскопом вище гребінцевої лінії визначаються випинання слизової розміром 1x1 см. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Внутрішній геморої
В	Гострий парапроктит
С	Зовнішній геморої
Д	Анальна тріщина
Е	-
№	крок 2009
Тема	Діагностика гнійних захворювань кисті та пальців.

Текст завдання	До хірурга поліклініки звернувся хворий 40-ка років зі скаргами на пульсуючий біль та набряк I пальця правої кисті. Під час огляду виявлено: рівномірний набряк пальця, згладжені міжфалангові борозни. Дослідження гудзиковим зондом різко болуче по ходу сухожилків згиначів. Уражений палець знаходиться в стані згинання. Який діагноз у хворого?
Правильна відповідь	Сухожильний панарицій
B	Підшкірний панарицій
C	Пандактиліт
D	Суглобний панарицій
E	Кістковий панарицій
№	крок 2009
Тема	Діагностика захворювань жочовивідних шляхів.
Текст завдання	У хворої 35-ти років з жовчнокам'яною хворобою після порушення дієти виник гострий напад болю в правому підребер'ї, який припинився на 3-ю добу, але з'явилася жовтяниця, яка з кожним днем наростає. Який неінвазивний метод діагностики хвороби слід застосувати у хворої?
Правильна відповідь	Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
B	Інфузійна холецистохолангіографія
C	Визначення рівня білірубіну в крові
D	Дуоденальне зондування
E	Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
№	крок 2008
Тема	Диференційна діагностика гострих захворювань черевної порожнини.
Текст завдання	У хворого 54-х років, який протягом 10-ти років хворіє на виразкову хворобу 12-ти палої кишки, після прийому їжі, виник гострий "кинджальний" біль в епігастрії. Об'єктивно: блідий, брадикардія, "доскоподібний живіт", різко позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Яку патологію запідозрить лікар швидкої допомоги?

Правильна відповідь	Проривна виразка 12-ти палої кишки
B	Тромбоз кишечника
C	Гостра кишкова непрохідність
D	Защемлена кила
E	Гострий панкреатит
№	крок 2011
Тема	Тактика лікування при нирково-кам'яній хворобі.
Текст завдання	Хвора 44-х років надійшла зі скаргами на тупий, ниючий біль у лівій поперековій ділянці, домішок гною в сечі. При обстеженні діагностований зліва коралоподібний камінь II ст. Який метод лікування показаний?
Правильна відповідь	Оперативне лікування
B	Контактна літотрісія
C	Дистанційна літотрісія
D	Консервативна терапія
E	Висхідний літоліз
№	крок 2011
Тема	Тактика надання першої допомоги при травмах судин.
Текст завдання	Хворий 48-ми років під час роботи на будівництві поранив варикозно змінену підшкірну вену на гомілці, що супроводжувалось інтенсивною венозною кровотечею. Вкажіть оптимальний варіант першої долікарської допомоги:
Правильна відповідь	Стискаюча пов'язка та еластичне бинтування кінцівки
B	Накладання джгута Есмарха вище місця травми
C	Накладання джгута Есмарха нижче місця травми
D	Притиснення стегнової артерії в типовому місці



Е	Максимальне згинання кінцівки в колінному суглобі
№	крок 2011
Тема	Діагностика розриву аневризми аорти черевної порожнини.
Текст завдання	Хворий 62-х років доставлений до хірургічного відділення зі скаргами на раптове виникнення болю у пупковій ділянці, яка супроводжувалась непритомністю, іррадіює у спину, пахвинну ділянку. Об'єктивно: стан важкий, болісність під час пальпації у пупковій ділянці, кишкові шуми послаблені. Відзначається зниження артеріального тиску. На УЗД: вільна рідина у черевній порожнині, потовщення стінки черевної аорти. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Розрив аневризми черевної аорти
В	Перфорація виразки шлунка
С	Гострий панкреатит
Д	Перитоніт
Е	Гострий апендицит
№	крок 2011
Тема	Діагностика гнійних захворювань шкіри та м'яких тканин.
Текст завдання	Хворий скаржить на болісну припухлість у ділянці підборіддя, загальне нездужання, головний біль. У цій ділянці виявлений гостро запальний конусо-подібної форми щільний вузол. Шкіра над ним напружена, червона. У центрі вузла наявна виразка з прямовисними краями і некротичним стрижнем брудно-зеленого кольору. Піднижньо-щелепні лімфатичні вузли справа збільшені і болісні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Фурункул
В	Туберкульоз
С	Карбункул
Д	Третинний сифіліс (гумозний)
Е	Глибока трихофітія

№	крок 2011
Тема	Диференційна діагностика анаеробної клостридіальної інфекції.
Текст завдання	Хворий на 5-ту добу після операції з приводу пошкодження товстої кишки скаржить на розпираючий біль у післяопераційній рані, слабкість, сонливість, головний біль, підвищення температури до 40° Навколо рани припухлість, крепітація газу. Виділення із рани мізерні темносірого кольору з гнилісним запахом. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Анаеробна клостридіальна ранова інфекція
В	Абсцес
С	Нагноєння післяопераційної рани
Д	Бешиха
Е	Флегмона
№	крок 2011, 2012, 2013
Тема	Тактика лікування при трамі живота.
Текст завдання	У хворого 38-ми років внаслідок отриманого удару тупим предметом по лівій половині грудної клітки виявлено перелом Х ребра зліва зі зміщенням відламків, пристінковий пневмоторакс. Відзначає болі в лівому підребер'ї. Об'єктивно: блідий, АТ- 80/40 мм рт.ст. Рс- 138/хв., слабких наповнення і напруження. На УЗД виявлено рідину в лівій половині живота. Виявлено розрив селезінки. Яку лікувальну тактику слід обрати?
Правильна відповідь	Дренувати ліву плевральну порожнину і зробити лапаротомію
В	Негайно виконати верхньо-серединну лапаротомію і потім дренувати ліву плевральну порожнину
С	Зробити негайно лапаротомію і спирт-новокаїнову блокаду Х ребра
Д	Провести протишокові заходи і після підвищення артеріального тиску зробити лапаротомію
Е	Зробити лівобічну торакотомію, а потім одразу ж лапаротомію
№	крок 2011

Тема	Патогенез гнійних захворювань легень та плеври.
Текст завдання	Хворому на двосторонній гідроторакс неодноразово проводили плевральні пункції з обох боків. Після чергової пункції виникло погіршення стану - лихоманка, біль у грудях. Наступного дня лікуючим терапевтом під час плевральної пункції справа одержано гній. Який механізм виникнення правосторонньої гострої емпієми?
Правильна відповідь	Контактно-аспіраційний
В	Лімфогенний
С	Гематогенний
D	Імплантаційний
Е	Повітряний
№	крок 2011
Тема	Зупинка зовнішньої кровотечі.
Текст завдання	У хворого 37-ми років після автомобільної катастрофи наявний різкий біль та кровотеча в середній третині правого стегна. Об'єктивно: рана на передній поверхні правого стегна з масивною кровотечею, патологічна рухомість на рівні середньої третини стегна. З чого слід почати надання допомоги?
Правильна відповідь	Виконати пальцеве притиснення стегнової артерії
В	Ввести знеболюючі засоби
С	Накласти джгут
D	Іммобілізувати кінцівку транспортною шиною
Е	Виконати венепункцію і почати внутрішньовенну інфузію поліглюкіну
№	крок 2011
Тема	Діагностика гнійних ускладнень гострих захворювань органів черевної порожнини.

Текст завдання	Хвора 49-ти років 14 днів тому була оперована з приводу перфоративного апендициту, поширеного фібринозно-гнійного перитоніту. Післяопераційний період протікав без ускладнень. На 9-ту добу у хворой з'явилася субфебрильна температура, болі у животі, часті рідкі випорожнення. При УЗД черевної порожнини в лівій мезогастральній ділянці визначається рідинне утворення 9x10 см. У крові: лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Міжпетельний абсцес
В	Пухлина черевної порожнини
С	Абсцес печінки
Д	Кіста лівої нирки
Е	Абсцес селезінки
№	крок 2011
Тема	Тактика надання допомоги при гострих захворюваннях органів черевної порожнини на догоспітальному етапі.
Текст завдання	Хвора 65-ти років 3 години тому відчула різкий біль у животі з іррадіацією в праву лопатку; було одноразове блювання. Лікується з приводу ревматоїдного артриту. Об'єктивно: блідість шкіри, АТ-100/60 мм рт.ст., Рс- 60/хв. Живіт значно болючий та напружений в епігастрії та правому підребер'ї, позитивні симптоми подразнення парієтальної очеревини, над правою реберною дугою - тимпаніт. Яка тактика лікаря швидкої допомоги?
Правильна відповідь	Доставити хвору в хірургічний стаціонар
В	Ввести знеболюючі препарати, динамічний нагляд
С	Промити шлунок
Д	Ввести спазмолітичні препарати
Е	Доставити хвору в ревматологічне відділення
№	крок 2011

Тема	Діагностика гострої кишкової непрохідності.
Текст завдання	Під час оперативного втручання у хворого 30-ти років виявлено тонко-тонкокишковий конгломерат темного кольору, кишка в якому визнана нежиттєздатною. Привідна кишка розширена до 7-8 см, роздута, переповнена кишковим вмістом та газом. Яка патологія призвела до оперативного втручання?
Правильна відповідь	Інвагінаційна (змішана) непрохідність
В	Странгуляційна непрохідність
С	Обтураційна непрохідність
Д	Паралітична непрохідність
Е	Спастична непрохідність
№	крок 2011, 2016
Тема	Ускладнення парапроктиту.
Текст завдання	Хворий 43-х років надійшов з клінікою ішіоректального парапроктиту. На 12-ту добу лікування стан хворого різко погіршився: почав зростати рівень інтоксикації та печінкової недостатності, температура тіла гектична, АТ- 100/60 мм рт.ст. На УЗД в печінці визначається гідрофільне утворення. У крові: лейкоц.- $19,6 \cdot 10^9$ /л, ер.- $3,0 \cdot 10^{12}$ /л, Нь- 98 г/л. Чим ускладнився перебіг захворювання?
Правильна відповідь	Абсцес печінки
В	Пілефлебіт
С	Кіста печінки
Д	Некроз печінки
Е	Синдром Бадда-Кіарі
№	крок 2012
Тема	Диференційна діагностика при гострих захворюваннях судин нижніх кінцівок.

Текст завдання	Хвора 50-ти років скаржиться на розпираючий біль у лівій нижній кінцівці, який посилюється при фізичному навантаженні, припухлість в ділянці гомілки та ступні. Об'єктивно: ліва гомілка та ступня пастозні, шкіра в нижній частині гомілки індурована, бронзового відтінку, розширені підшкірні вени, наявна виразка з некротичними масами. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Посттромбофлебітичний синдром
В	Хронічна артеріальна недостатність
С	Гострий артеріальний тромбоз
Д	Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок
Е	Гангрена нижньої кінцівки
№	крок 2012, 2013
Тема	Ускладнення анестезіологічного забезпечення операції.
Текст завдання	Хворому було виконано резекцію шлунка. Під час операції ліва верхня кінцівка хворого була відведена і зафіксована до операційного столу для виконання анестезіологічного забезпечення. В післяопераційному періоді у хворого з'явилися порушення функції верхньої кінцівки у вигляді "звисаючої кисті". Пошкодження якого нерва привело до виникнення цього симптому?
Правильна відповідь	Променевий нерв
В	Пахвовий нерв
С	Ліктьовий нерв
Д	Серединний нерв
Е	М'язово-шкірний нерв
№	крок 2012
Тема	Диференційна діагностика шлунково-кишкових кровотеч.

Текст завдання	У хворого 42-х років діагностована шлунково-кишкова кровотеча, що підтвердилось реакцією Грегерсена та зниженням рівня гемоглобіну до 90 г/л та кількості еритроцитів до $2,7 \cdot 10^{12}$ /л. Загальний стан хворого задовільний. Які додаткові методи обстеження треба виконати?
Правильна відповідь	Фіброгастродуоденоскопія
В	Лапароскопія
С	Визначення кислотності шлункового соку
Д	Проба Холландера
Е	Рентгеноскопія шлунка
№	крок 2012
Тема	Діагностика ускладнень атеросклеротичного пошкодження судин н/ кінцівок.
Текст завдання	Хворий 73-х років страждає на атеросклероз аорти та великих артерій. Скаржиться на біль у правій гомілці. Поступово пальці правої ступні почорніли, ступня холодна. Шкіра на пальцях та в дистальному відділі ступні суха, зморщена, темного кольору. Пульсація на підколінній артерії різко ослаблена, а на задній великогомілковій та тильній артерії ступні відсутня. Яке ускладнення атеросклерозу виникло у хворого?
Правильна відповідь	Облітерація артерій гомілки та суха гангрена ступні
В	Тромбоз глибоких вен правої гомілки
С	Волога гангрена правої ступні
Д	Емболія правої підколінної артерії
Е	Некротична бешиха правої ступні
№	крок 2012, 2013
Тема	Помилки та ускладнення при переливанні крові.

Текст завдання	При визначенні груп крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації із стандартними сироватками А(II) і В(III) груп і негативною - із 0(I) і АВ(IV) груп. Про що свідчить даний результат?
Правильна відповідь	Непридатність стандартних сироваток
В	Перша група крові
С	Друга група крові
Д	Третя група крові
Е	Четверта група крові
№	крок 2012
Тема	Тактика лікування хворих облітеруючим ендартеріїтом.
Текст завдання	Хворий 27-ми років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу облітеруючого ендартеріїту. Хворіє впродовж 2-х років. Ефекту від консервативного лікування не відмічає. Яке оперативне втручання може бути найбільш ефективним?
Правильна відповідь	Поперекова симпатектомія
В	Періартеріальна симпатектомія
С	Видалення II-III грудних симпатичних вузлів
Д	Резекція наднирника
Е	Видалення IV-V поперекових симпатичних вузлів
№	крок 2012, 2013
Тема	Тактика лікування хворого з карбункулом верхньої губи.
Текст завдання	В поліклініку звернувся хворий з карбункулом верхньої губи. Температура тіла 39° С . Виражений набряк верхньої губи, повік. Як повинен вчинити хірург з цим хворим?
Правильна відповідь	Госпіталізувати до хірургічного відділення



В	Амбулаторно призначити курс антибіотикотерапії
С	Розкрити карбункул, лікувати амбулаторно
Д	Призначити фізіотерапевтичні процедури і зігріваючі компреси
Е	Розкрити карбункул і призначити антибіотики
№	крок 2012
Тема	Вибір тактики лікування у хворих з гнійними захворюваннями м'яких тканин.
Текст завдання	Хворому із поширеним післяін'єкційним абсцесом правої сідниці лікар-хірург провів спочатку пункцію, а потім оперативне розкриття абсцесу з випорожненням гнійного вмісту та налагодженням постійного промивання порожнини розчинами антисептиків, введенням протеолітичних ферментів. Призначив антибіотики широкого спектру дії та імунокорегуючу терапію. Яка із виконаних та призначених дій хірурга є провідним компонентом профілактики сепсису?
Правильна відповідь	Хірургічне розкриття абсцесу
В	Пункція абсцесу
С	Місцеве застосування протеолітичних ферментів
Д	Призначення антибіотикотерапії
Е	Призначення медикаментозної імунокорекції
№	крок 2012
Тема	Ускладнення при переливанні крові.
Текст завдання	Хворому 54-х років з виразковою кровотечею, група крові 0(I), Rh-негативний, перелито 200 мл еритроцитарної маси. Через кілька годин після трансфузії у хворого виникли такі симптоми: послаблення пульсу, зниження артеріального тиску до 80/50 мм рт.ст., блідість шкіри обличчя, запаморочення, головний біль, болі в усьому тілі, особливо в поперековій ділянці. Рік тому хворому вже проводилася гемотрансфузія із приводу кровотечі. Про яке ускладнення йдеться?
Правильна відповідь	Несумісність крові по Rh-фактору

B	Несумісність крові за груповими факторами
C	едоброякісність донорської крові
D	Анафілактичний шок
E	Цитратна інтоксикація
№	крок 2012
Тема	Діагностика кишкової непрохідності.
Текст завдання	Хворий 50-ти років скаржиться на гострий біль у епігастральній ділянці, часте блювання, різку загальну слабкість. Хворіє впродовж 2-х діб. Об'єктивно: різка блідість шкірних покривів, язик сухий. Ps- 100/хв., слабого наповнення, АТ- 110/70 мм рт.ст. Живіт при пальпації м'який, помірно болючий в епігастрії та мезогастрії, симптомів подразнення очеревини немає. Перистальтика значно посилена у мезогастрії зліва. При оглядовій рентгенографії є чаші Клойбера зліва. Про яку патологію слід думати?
Правильна відповідь	Кишкова непрохідність
B	Гострий панкреатит
C	Проривна виразка 12-палої кишки
D	Гострий холецистит
E	Харчове отруєння
№	крок 2012
Тема	Діагностика травматичного пошкодження органів грудної клітки.
Текст завдання	Чоловік 40-ка років доставлений швидкою допомогою після дорожньо-транспортної пригоди зі скаргами на виражену задишку, біль в правій половині грудної клітки та груднини, кашель з невеликою кількістю яскравої пінистої крові. Об'єктивно: стан хворого вкрай важкий, ціаноз обличчя, виражена підшкірна емфізема грудної стінки, шиї та обличчя, пульс ритмічний, 110/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. При аускультії легень - справа дихання різко ослаблене на всьому протязі, зліва - задовільне. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	Розрив правого головного бронха
B	Травматичний пульмоніт
C	Правобічний пневмоторакс
D	Правобічний тотальний гемоторакс
E	Розрив діафрагми
№	крок 2013
Тема	Діагностика ускладнень виразкової хвороби 12-палої кишки.
Текст завдання	Хвора 32-х років скаржиться на біль у епігастрії, що виникає вночі і зранку натще та через 2 години після прийому їжі, блювання "кавовою гущею", печію, періодичні запаморочення, загальну слабкість. Об'єктивно: болючість в гастродуоденальній зоні, позитивний симптом Менделя. У крові: Нв- 90 г/л; лейк.- $8,0 \cdot 10^9$ /л; ШЗЕ- 20 мм/год. Чим ускладнився перебіг захворювання?
Правильна відповідь	Шлунково-кишкова кровотеча
B	Пенетрація
C	Перфорація
D	Стеноз
E	Малігнізація
№	крок 2013
Тема	Діагностика ускладнень травматичного пошкодження при повішанні.
Текст завдання	Хворому 51-го року проведена успішна серцево-легенева реанімація після суїцидальної спроби шляхом повішання. Через 1,5 години: непритомний, АТ-130/90 мм рт.ст., Рс- 130/хв. Наростає дихальна недостатність: ЧД- 28/хв., задишка інспіраторного характеру, втягіння надключичних ямок на вдосі, у диханні беруть участь крила носа. Аускультативно: над трахеєю глибокий свист, над легеньми - жорстке дихання. Яка основна причина дихальної недостатності у хворого?

Правильна відповідь	Ушкодження хрящової гортані
B	Аспіраційний синдром
C	Нейрогенний набряк легень
D	Бронхообтураційний синдром
E	Пригнічення дихального центру
№	крок 2013
Тема	Діагностика захворювань судин н/кінцівок
Текст завдання	Хвора 50-ти років скаржиться на розпираючий біль у лівій нижній кінцівці, який посилюється при фізичному навантаженні, припухлість в ділянці гомілки та ступні. Об'єктивно: ліва гомілка та ступня пастозні, шкіра в нижній частині гомілки індурована, бронзового відтінку, розширені підшкірні вени, наявна виразка з некротичними масами. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Посттромбофлебітичний синдром
B	Хронічна артеріальна недостатність
C	Гострий артеріальний тромбоз
D	Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок
E	Гангрена нижньої кінцівки
№	крок 2013, 2016
Тема	Діагностика гнійних ускладнень ран.
Текст завдання	Хворому 29-ти років проведена первинна хірургічна обробка розчавленої рани верхньої третини лівого стегна. Через 2 дні стан хворого погіршився: при огляді рана з незначними виділеннями, м'язи сіруватого кольору, кінцівка набрякла, шкіра холодна, вкрита синюшними плямами, при пальпації визначається крепітація. Свідомість запаморочена. Температура тіла 40, 3° C. Яке ускладнення виникло у хворого?

Правильна відповідь	Анаеробна газова гангрена
B	Флегмона стегна
C	Правець
D	Бешиха
E	Артеріальний тромбоз
№	крок 2013
Тема	Диференційна діагностика стегнової грижі.
Текст завдання	Хвора віком 50-ти років скаржиться на біль у правій пахвинній ділянці. При дослідженні у положенні стоячи виявлено, що нижче правої шкірної пахвинної складки наявне випинання розмірами 3х3 см, яке в положенні лежачи вправляється під пахвинну зв'язку, по зовнішньому краю визначається пульсація стегнової артерії. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Стегнова грижа
B	Метастаз злоякісної пухлини
C	Пахвинний лімфаденіт
D	Пахвинна грижа
E	Доброякісна пухлина
№	крок 2013
Тема	Визначення сумісності при переливанні крові.
Текст завдання	При проведенні комплексу реакцій, необхідних для гемотрансфузії, хворому з виразковою хворобою шлунка з групою крові A(II) Rh+ встановлено: кров в ампулі групи A(II) Rh+ (при повторній перевірці). При реакції на індивідуальну сумісність за резусфактором - аглютинація є. Яка подальша тактика?
Правильна відповідь	Індивідуальний підбір крові на станції переливання крові
B	Повністю відмовитися від проведення гемотрансфузії

С	Повторно провести індивідуальну пробу на резуссумісність
D	Перелити хворому кров А(II) Rh+
E	Перелити хворому вказану кров з профілактикою гемотрансфузійного шоку
№	крок 2013, 2015, 2016
Тема	Діагностика гнійних захворювань кисті.
Текст завдання	Хворий 50-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла до 39° С, пульсуючий біль та припухлість правої кисті. Напередодні уколів кисть риб'ячою кісткою. При огляді відмічається набряк і різкий біль у долоні та в ділянці підвищення I пальця кисті. Окрім цього відзначається набряк м'яких тканин тилу кисті, почервоніння шкіри та різкий біль при рухах пальців. Яке захворювання у пацієнта?
Правильна відповідь	Флегмона правої кисті
B	Карбункул кисті
С	Бешиха кисті
D	Сухожилковий панарицій I пальця кисті
E	Стороннє тіло кисті
№	крок 2013
Тема	Диференційна діагностика механічної жовтяниці.
Текст завдання	Хвора 49-ти років госпіталізована зі скаргами на слабкість, жовтяницю, свербіж шкіри. Захворіла 2,5 місяці тому. При госпіталізації – значна жовтяниця. Печінка не пальпується. Жовчний міхур збільшений, безболісний. Білірубін крові - 190 мкмоль/л, за рахунок прямого. Кал ахолічний. Яка найбільш імовірна причина жовтяниці?
Правильна відповідь	Механічна жовтяниця
B	Гемолітична жовтяниця
С	Хвороба Жильбера

D	Паренхіматозна жовтяниця
E	Синдром Каролі
№	крок 2013
Тема	Інструментальна діагностика кишкової непрохідності.
Текст завдання	Хворого госпіталізовано з підозрою на гостру кишкову непрохідність. Який з методів дослідження буде найбільш інформативним для підтвердження діагнозу?
Правильна відповідь	Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
B	Лапароцентез
C	Лапароскопія
D	УЗД
E	ФГДС
№	крок 2013, 2015, 2016
Тема	Діагностика захворювань молочної залози.
Текст завдання	Хвора 23-х років скаржиться на наявність пухлини у нижньому зовнішньому квадранті лівої молочної залози протягом 1-го року, що перед менструацією стає болісним і збільшується в розмірах. При пальпації: рухоме утворення, наповнене рідиною, до 3 см, із чіткими контурами, периферичні лімфатичні вузли не змінені. При ультразвуковому дослідженні молочних залоз: у нижньому зовнішньому квадранті лівої молочної залози об'ємне утворення зниженої ехогенності, розміром 31x29 мм. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Кіста молочної залози
B	Фібroadенома
C	Фіброзна мастопатія
D	Рак молочної залози
E	Масталгія
№	крок 2014

Тема	Хірургічна тактика при перитоніті.
Текст завдання	До лікарні ургентно потрапила хвора 24-х років з проявами перитоніту. 16 годин тому перенесла кримінальний аборт. Об'єктивно: бліда, язик сухий. Черевна стінка у диханні участі не бере, під час пальпації вона напружена, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний у всіх відділах. У крові: лейкоц.- $15 \cdot 10^9$ /л, паличкоядерних 20%. Яка лікувальна тактика?
Правильна відповідь	Термінова лапаротомія
В	Консервативне лікування, спостереження
С	Діагностичний лапароцентез
Д	Діагностична лапароскопія
Е	Проведення плазмаферезу
№	крок 2014
Тема	Діагностика гнійних захворювань шкіри та м'яких тканин.
Текст завдання	До лікаря звернувся хворий 33-х років зі скаргами на біль у ділянці шиї. Хворіє 2 тижні. Має місто загальне нездужання. Об'єктивно: на задній поверхні шиї спостерігається щільний запальний вузол розміром з волоський горіх, з набряком прилеглих тканин, на поверхні вузла, у центрі наявні 5 некротичних стрижнів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Карбункул
В	Фурункул
С	Коліквативний туберкульоз
Д	Вульгарна ектима
Е	Лейшманіоз
№	крок 2014
Тема	Диференційна діагностика пневмотораксу.



Текст завдання	Хворий 62-х років звернувся зі скаргами на задишку, біль у правому боці, серцебиття, що поступово нарастають впродовж доби. Об'єктивно визначаються ціаноз шкіри обличчя та кистей, тахікардія, тимпаніт та послаблення дихання над правою легенею. На рентгенограмі: просвітлення правого легеневого поля зі зміщенням середостіння вліво. Яка патологія найбільш імовірна у даного хворого?
Правильна відповідь	Спонтанний пневмоторакс
В	Спонтанний гідропневмоторакс
С	Зовнішній клапанний пневмоторакс
Д	Тромбоемболія правої легеної артерії
Е	Обтурація правого головного бронха
№	крок 2014, 2015
Тема	Диференційна діагностика захворювань кісткової системи.
Текст завдання	Хворий 29-ти років захворів гостро 3 тижні тому. Різко підвищилась температура, з'явилися сильні болі в лівій гомілці. На рентгенограмах цієї ділянки множинні вогнища деструкції неправильної геометричної форми з нерівними контурами. В ділянках деструкції визначаються щільні тіні секвестрів. Навколо уражених відділів кістки визначаються смужки звапнення відшарованого окістя. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гематогенний остеомієліт кісток лівої гомілки
В	Туберкульозне ураження кісток лівої гомілки
С	Саркома лівої великогомілкової кістки
Д	Фіброзна остеодистрофія кісток лівої гомілки
Е	Метастатичне ураження кісток лівої гомілки
№	крок 2014
Тема	Визначення групи крові.

Текст завдання	У хворого 54-х років внутрішня кровотеча. Йде операція. При визначенні групи крові аглютинація наступила в першій та третій краплях двох серій стандартних гемаглютинаційних сироваток. Яка група крові у хворого?
Правильна відповідь	A (II)
B	0 (I)
C	B (III)
D	AB (IV)
E	Визначення слід повторити
№	крок 2014
Тема	Ускладнення при переливанні крові.
Текст завдання	Під час переливання крові при проведенні біологічної проби хворий поскаржився на озноб, вкрився холодним потом, відзначає мерехтіння "метеликів" перед очима, незначний біль у поперековій ділянці. Що у хворого?
Правильна відповідь	Гемотрансфузійна реакція
B	Пірогенна реакція
C	Бактеріально-токсичний шок
D	Цитратний шок
E	Напад ниркової кольки
№	крок 2014
Тема	Диференційна діагностика причин шлунково-кишкових кровотеч.
Текст завдання	Хвора 37-ми років перенесла гепатити А і В. Доставлена у важкому стані. При надходженні блювання рідкою кров'ю і згортками повним ротом. АТ- 80/40 мм рт.ст. Рs-108/хв. Живіт збільшений, безболісний. З рота "печінковий" запах. Визначте найбільш імовірне джерело кровотечі:

Правильна відповідь	Варикозні вени стравоходу і шлунка
B	Гострі виразки 12-палої кишки
C	Розрив слизової кардіального відділу шлунка
D	Хронічна виразка шлунка
E	Легенева кровотеча
№	крок 2014
Тема	Диференційна діагностика розшаровуючої аневризми абдомінального відділу аорти.
Текст завдання	При огляді потерпілого 32-х років внаслідок автокатастрофи черговий хірург виявив: живіт м'який, симптоми подразнення очеревини відсутні, зліва від пупка болюче пульсуюче новоутворення, аускультативно над ним систолічний шум, пульсація на артеріях нижніх кінцівок ослаблена. АТ- 90/60 мм рт.ст., Рs- 90/хв. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Розшаровуюча аневризма аорти
B	Гострий тромбоз біфуркації аорти
C	Травматичне пошкодження лівої нирки
D	Розрив товстого кишечника
E	Травматичний розрив селезінки
№	крок 2014
Тема	Ускладнення гострих абсцесів легень та плеври.
Текст завдання	У хворого 46-ти років з гострим абсцесом лівої легені при кашлі раптово виникли сильний біль у грудній клітці та задуха, посилилась тахікардія. На контрольній Ro-грамі виявлено колабовану ліву легеню, повітря в лівій плевральній порожнині з горизонтальним рівнем рідини. Який механізм виникнення даного ускладнення?
Правильна відповідь	Прорив гнійника в плевральну порожнину
B	Розрив булли лівої легені

С	Перехід запалення на вісцеральну плевру
D	Ателектаз лівої легені
E	Гостра серцево-легенева недостатність
№	крок 2014
Тема	Ускладнення опікової хвороби.
Текст завдання	У потерпілого 40-ка років опікова травма 15% поверхні тіла II-III ст. На 20-ту добу після травми у хворого різке підвищення температури тіла, загальна слабкість, часте везикулярне дихання, загострення рис обличчя, АТ- 90/50 мм рт.ст., Ps- 112/хв. Про яке ускладнення можна думати?
Правильна відповідь	Сепсис
B	Пневмонія
С	Гостра інтоксикація
D	Гнійний бронхіт
E	Анаеробна інфекція
№	крок 2014
Тема	Тактика хірургічного лікування при гострому тромбофлебіті вен н/кінцівок.
Текст завдання	Хвора 47-ми років хворіє на варикозне розширення вен правої нижньої кінцівки. Скарги на біль, гіперемію вздовж підшкірних вен, підвищення температури тіла. При огляді великої підшкірної вени на гомілці і стегні спостерігається гіперемія до середньої третини; під час пальпації болісна, тверда. Яке лікування потрібне хворій?
Правильна відповідь	Операція Троянова
B	Консервативна терапія
С	Склерозуюче лікування
D	Операція Фельдера
E	Операція Пальма
№	крок 2014, 2016

Тема	Профілактика рецидиву тромбоемболії.
Текст завдання	У повної жінки 73-х років на 4 день після пластики пупкової кили виникла клінічна картина субмасивної тромбоемболії легеневих артерій. При дуплексній сонографії вен нижніх кінцівок виявлено флотуючий тромб в стегновій вені. Який оптимальний засіб профілактики рецидиву емболії?
Правильна відповідь	Імплантація кава-фільтра
В	Безперервна довенна інфузія гепарину
С	Низькомолекулярні гепарини
Д	Тромбектомія
Е	Плікація нижньої порожнистої вени
№	крок 2014
Тема	Інструментальна діагностика захворювань підшлункової залози.
Текст завдання	Хворий 37-ми років скаржиться на біль у лівому підребер'ї, який посилюється після приймання їжі, нагинанні тулуба. Два роки тому переніс операцію з приводу деструктивного панкреатиту. Об'єктивно: дефіцит маси тіла 15 кг. Рс- 80/хв. Живіт не здутий. У лівій підреберній ділянці пальпується утворення щільної консистенції, не рухоме, трохи болюче. Розміри 15x20 см, контури чіткі. В крові відхилень від норми немає. Запідозрена кіста підшлункової залози. Назвіть інструментальний метод обстеження, що дозволить встановити діагноз:
Правильна відповідь	Діагностична лапароскопія і біопсія
В	УЗД
С	Оглядова рентгенографія черевної порожнини
Д	Комп'ютерна томографія
Е	Поєднання УЗД та КТГ
№	крок 2014
Тема	Діагностика гнійних захворювань кисті.

Текст завдання	Хвора 41-го року проколола вказівний палець правої кисті рибною кісткою. Протягом 10-ти днів по медичну допомогу не зверталася, лікувалася самостійно. Скарги на пульсуючий біль, почервоніння, набряк ушкодженого пальця, гнійні виділення з рани. Загальний стан задовільний. Рентгенологічно: остеопороз та крайова деструкція нігтьової фаланги вказівного пальця з утворенням кіркових секвестрів. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Кістковий панарицій
В	Сирінгомієлітична остеопатія
С	Остеогенна саркома
Д	Деформуючий артроз
Е	Перелом Буша
№	крок 2014
Тема	Тактика лікування хворих з тампонадою серця.
Текст завдання	У чоловіка 58-ми років на 5-й тиждень після перенесеного інфаркту міокарду виник гострий біль в ділянці серця, виражена задишка. Об'єктивно: стан хворого вкрай важкий, виражений ціаноз обличчя, набухання і пульсація шийних вен, пульс на периферичних артеріях не визначається, на сонній артерії - ритмічний, 130/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст. При аускультатії серця - тони різко ослаблені, при перкусії - розширення меж серця в обидва боки. Яка тактика лікування даного хворого?
Правильна відповідь	Пункція перикарду і негайна торакотомія
В	Інгаляція кисню
С	Пункція плевральної порожнини зліва
Д	Консервативне лікування, інфузія адрено-міметиків
Е	Дренування плевральної порожнини
№	крок 2014
Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'яких тканин. Диференційна діагностика.

Текст завдання	Через 4 доби після вогнепального кульового поранення м'яких тканин стегна стан хворого став прогресивно погіршуватися. Скарги на розпираючий біль у рані середньої третини стегна, біль наростає за останні 12 годин. Набряк шкіри і підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла 38, 2° С. Рс- 102/хв. Краї рани зяють, тьмяного кольору, ще вчора життєздатні м'язи - вибухають у рану, вареного вигляду, тьмяні, з сіро-брудним нальотом, при захопленні пінцетом - розпадаються. Який вид інфекції розвинувся у рані стегна?
Правильна відповідь	Анаеробна клостридіальна інфекція рани
В	Дифтерія рани
С	Аеробна грам-негативна інфекція рани
D	Гнилісна інфекція рани
Е	Аеробна грам-позитивна інфекція
№	крок 2014
Тема	Тактика лікування післяпологових маститів.
Текст завдання	У жінки 28-ми років на 7-му добу після пологів з'явилися скарги на біль у правій молочній залозі, підвищення температури тіла до 39° С, озноб, погіршення загального стану. При огляді визначається інфільтрат у верхньозовнішньому квадранті молочної залози з ділянкою розм'якшення. Яка тактика лікаря?
Правильна відповідь	Хірургічне лікування
В	Антибактеріальна терапія
С	Припинення лактації
Д	Динамічне спостереження
Е	Фізіотерапевтичне лікування
№	крок 2015
Тема	Диференційна діагностика ускладнень виразкової хвороби шлунку та 12-ти палої кишки.

Текст завдання	Хворий 42-х років скаржиться на постійний біль в епігастральній ділянці з іррадіацією в спину, нудоту, блювання, печію. Хворіє на виразкову хворобу <i>duodenum</i> протягом 20-ти років. Об'єктивно: пониженого харчування, язик обкладений, вологий. Живіт напружений, болючий під час пальпації в пілородуоденальній зоні. Позитивний симптом Образцова. Субфебрилітет. У крові: лейк.- $10,0 \cdot 10^9$ / ШЗЕ- 24 мм/год. Рентгенологічно: в цибулині <i>duodenum</i> занурена тришарова ніша 0,7x1,0 см. Реакція Грегерсена негативна. Яке ускладнення має місце в даному випадку?
Правильна відповідь	Пенетрація
В	Перфорація
С	Кровотеча
Д	Малігнізація
Е	Стеноз воротаря
№	крок 2015
Тема	Патогенез розриву стравоходу.
Текст завдання	У хворого 48-ми років після вживання 700 мл горілки та великої кількості їжі з'явилися нестримне блювання, інтенсивний біль за грудниною та в епігастральній ділянці з іррадіацією у хребет, задишка. Втратив свідомість. Об'єктивно: ЧД- 28/хв. Рс- 54/хв. АТ- 80/50 мм рт.ст. Підшкірна крепітація в ділянці шиї, ціаноз обличчя. Тони серця послаблені. Дихання везикулярне з обох боків. Напруження м'язів у епігастральній ділянці. Чим може бути обумовлений стан хворого?
Правильна відповідь	Розрив стравоходу
В	Гострий інфаркт міокарда
С	Пневмоторакс
Д	Розшаровуюча аневризма аорти
Е	Тромбоемболія легеневої артерії
№	крок 2015



Тема	Патогенез спонтанного пневмотораксу.
Текст завдання	У хворого 30-ти років, курця, під час нападу кашлю з'явився різкий біль у правій половині грудної клітки, задишка у спокої, різка загальна слабкість. Запідозрено пневмоторакс. Над правою половиною грудної клітки тимпаніт, дихання відсутнє. ЧД-36/хв., Рс- 120/хв., ритмічний, АТ- 90/60 мм рт.ст. У патогенезі даного стану провідна роль належить такому чиннику:
Правильна відповідь	Різке підвищення внутрішньоплеврального тиску
В	Підвищення тиску в малому колі кровообігу
С	Зниження скоротливої здатності лівого шлуночка
Д	Механічна закупорка гілок легеневої артерії
Е	Тромбоз дрібних коронарних артерій
№	крок 2015
Тема	Тактика надання першої допомоги хворому з відмороженнями.
Текст завдання	З відмороженнями обох ступней хворий доставлений до приймального відділення. Що необхідно зробити потерпілому?
Правильна відповідь	Накласти пов'язку, ввести судиннорозширюючі препарати
В	Призначити серцеві препарати
С	Помістити ноги в гарячу воду
Д	Розтерти снігом ступні
Е	Накласти спиртовий компрес
№	крок 2015
Тема	Ускладнення защемленої стегнової грижі
Текст завдання	Хвора 73-х років надійшла в клініку в екстреному порядку із защемленою стегновою килою. Крім того у хворої наявна варикозна хвороба лівої нижньої кінцівки, ожиріння ІV ст. Яке найбільш імовірно ускладнення може виникнути у післяопераційному періоді?

Правильна відповідь	Тромбоемболія легеневої артерії
B	Сепсис
C	Гостра дихальна недостатність
D	Інфаркт міокарда
E	Гостра пневмонія
№	крок 2015
Тема	Диференційна діагностика ускладнень карбункулу.
Текст завдання	Хворий 53-х років поступив у клініку з районної лікарні, де 5 днів тому лінійним розрізом був розкритий карбункул спини. В післяопераційному періоді стан залишався важким. Констатовано тахіпноє, тахікардія, лейкоцитоз, гіпертермія. При бактеріологічному обстеженні крові виділений гемолітичний стрептокок. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Сепсис
B	Карбункул спини в стадії абцедування
C	Токсикорезорбтивна гарячка
D	Синдром системної запальної відповіді
E	Септичний шок
№	крок 2016
Тема	Диференціальна діагностика ускладнень виразкової хвороби 12-ти палої кишки.
Текст завдання	У хворого з виразковою хворобою 12-палої кишки змінилася клінічна картина: біль постійний з іррадіацією у спину, що посилюється після їжі, погано зупиняється атропіном. Втрата ваги за півроку до 6 кг. Ендоскопічно виявлена виразка цибулини 12-палої кишки з щільними краями, деформація цибулини. Чим можна пояснити зміни клінічної картини?
Правильна відповідь	Пенетрація
B	Перфорація

С	Дуоденоспазм
D	Малігнізація
E	Стеноз воротаря
№	крок 2016, 2013
Тема	Тактика хірурга при відмові хворого від операції при перитоніті.
Текст завдання	Хворого 43-х років госпіталізовано з приводу перфоративної виразки шлунку через 5 годин з моменту захворювання. Діагноз підтверджений наявністю ознак пневмоперитонеуму на оглядовій рентгенограмі черевної порожнини. Клінічно в хворого нарастають ознаки розлитого перитоніту. Супутнє захворювання - шизофренія. Близьких, родичів не має. Від оперативного втручання категорично відмовився. Які найдоцільніші дії хірурга-куратора?
Правильна відповідь	Скликати консиліум з участю адміністрації лікарні та за його рішенням негайно оперувати хворого
B	Відмовитися від оперативного втручання і проводити комплексне консервативне лікування
С	Продовжувати вмовляти хворого, доки не отримає його згоди на операцію
D	Проводити консервативне лікування за методикою Тейлора
E	Повідомити начмеда лікарні та проводити консервативне лікування до згоди хворого на операцію
№	крок 2016
Тема	Диференційна діагностика гнійних захворювань шкіри та м'яких тканин.
Текст завдання	До лікаря звернувся хворий 35-ти років зі скаргами на болюче утворення в ділянці задньої поверхні шиї, яке з'явилося 1,5 тижня тому та супроводжується болючістю та головним болем. Об'єктивно: на вказаній ділянці різко болючий інфільтрат яскраво-червоного кольору з набряком навколо. З отвору на поверхні інфільтрату виділяється гній. Під час пальпації спостерігається виразна болючість. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Фурункул
B	Нейродерміт
С	Екзема

D	Короста
E	Токсидермія
№	крок 2008, 2010
Тема	ТЕМА Лікування спонтанного пневмотораксу
Текст завдання	На 4-ту добу після ушивання перфоративної виразки шлунка в хворого, який страждає на емфізему легень, розвинувся спонтанний пневмоторакс. Найбільш вигідним місцем дренивання плевральної порожнини для усунення пневмотораксу є:
Правильна відповідь	A. Друге міжребер'я по середньоключичній лінії
B	B. Восьме міжребер'я по задній аксилярній лінії
C	C. Сьоме міжребер'я по передній аксилярній лінії
D	D. Шосте міжребер'я по передній пахвовій лінії
E	E. П'яте міжребер'я по середньоключичній лінії
№	крок 2010, 2009, 2015
Тема	ТЕМА Профілактика газової інфекції
Текст завдання	До хірургічного відділення через 4 години після травми надійшов потерпілий 37-ми років з великою розчавленою раною лівого стегна. Яка головна умова успішної профілактики газової гангрен у потерпілого?
Правильна відповідь	A. Видалення нежиттєздатних тканин та своєчасна хірургічна обробка рани
B	B. Введення специфічної сироватки 3000 ОД
C	C. Введення специфічної сироватки 30000 ОД
D	D. Інфільтрація м'яких тканин навкруги рани розчином антибіотиків
E	E. Промивання рани розчином перекису водню 6%
№	крок 2016
Тема	ТЕМА Лікування кишкової непрохідності

Текст завдання	В інфекційне відділення госпіталізовано хворого з імовірною дизентерією (часті випорожнення з домішками крові, схожі на желе з червоної смородини). Через добу встановлено остаточний діагноз - інвагінація. Хворого переведено до спеціалізованого відділення. Які методи лікування можна використати?
Правильна відповідь	Оперативна дезінвагінація
В	Консервативна дезінвагінація
С	Інфузійна терапія зі спазмолітиками
Д	Мануальна дезінвагінація
Е	Паранефральна блокада
№	крок 2009, 2016
Тема	<b><i>Тактика лікування хворих з покусаними ранами</i></b>
Текст завдання	Хворого 40-ка років годину тому покусав бездомний собака. На лівій гомілці слід укусу - рана розмірами 4x2x0,5 см. Яка хірургічна допомога найбільш доцільна в цьому випадку?
Правильна відповідь	Туалет рани мильною водою, провізорні шви на рану
В	Асептична пов'язка
С	Мазева пов'язка
Д	Глухий шов
Е	Провізорні шви на рану
№	крок 2018
Тема	Захворювання жовчовивідних шляхів
Текст завдання	Дівчинка 13-ти років протягом 5-ти років скаржиться на біль у правому підребер'ї, що віддає у праву лопатку, напади болю пов'язані з порушенням дієти, вони нетривалі, легко знімаються спазмолітичними засобами. Під час нападу болю пальпація живота болюча, максимально в точці проєкції жовчного міхура. З найбільшою імовірністю у хворого має місце:

Правильна відповідь	Дискінезія жовчовивідних шляхів
В	Хронічний холецистит
С	Хронічний гастродуоденіт
Д	Хронічний панкреатит
Е	Виразкова хвороба 12-палої кишки
№	крок 2018
Тема	Новоутворення товстої кишки
Текст завдання	Хворий 58-ми років скаржиться на здут-тя кишечника, закрепи, різку слабкість, схуднення. Впродовж останнього місяця випоро-жнення лише після прийому проносних. Під час пальпації живота спостерігається щіль-не утворення у лівій здухвинній ділянці. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Рак сигмоподібної кишки
В	Рак сліпої кишки
С	Пухлина брижі товстої кишки
Д	Пухлина заочеревинного простору зліва
Е	Рак лівого сечоводу
№	крок 2018
Тема	Ускладнення варикозного розширення вен нижніх кінцівок
Текст завдання	Вам довелося прийти на допомогу жінці 58-ми років, у якої виникла рясна кровотеча з розірваного варикозно розширеного вено-зного вузла на лівій гомілці. У чому полягає перша допомога?
Правильна відповідь	Підвищене положення кінцівки. Стискаль-на стерильна пов'язка
В	Накладання джгута дистально до джерела кровотечі
С	Накладання джгута проксимально до дже-рела кровотечі

D	Операція Троянова-Тренделенбурга
E	Z-подібний шов на розірваний варикозний вузол
№	крок 2018
Тема	Нагнійні захворювання легень та плеври
Текст завдання	Чоловік 38-ми років захворів 2 тижні то-му, з'явився кашель, слабкість, підвищилася температура до $38,0^{\circ}C$ . Стан різко погіршив-ся до кінця 1-го тижня, коли з'явилися остуда, проливний піт, надвечір температура підви-щилася до $39,0^{\circ}C$ . За 2 дні до госпіталізації у хворого під час кашлю виділилася велика кількість смердючого харкотиння з кров'ю, після чого стан хворого покращився. Пульс - 80/хв., частота дихання - 20/хв., температура тіла - $37,6^{\circ}C$ . Які зміни можливі на рентгено-грамі грудної порожнини?
Правильна відповідь	Наявність порожнини з горизонтальним рівнем рідини
B	Однорідна округла тінь в легеневому полі
C	Зміщення середостіння в сторону гомоген-ної тіні
D	Тінь в нижньому відділі з косою верхньою межею
E	Затемнення частки легені
№	крок 2018
Тема	Нагнійні захворювання легень та плеври
Текст завдання	Хвора 36-ти років скаржиться на зади-шку, відчуття стискання в правій половині грудної клітки, підвищення температури до $38,7^{\circ}C$ , кашель з виділенням невеликої кіль-кості слизово-гнійного харкотиння. Хворіє понад тиждень. Скарги пов'язує з переохо-лодженням. Об'єктивно: легкий акроціаноз губ, пульс ритмічний, 90/хв., артеріальний тиск - 140/85 мм рт.ст. Права половина гру-дної клітки відстає в акті дихання. Перкусія - справа нижче кута лопатки прослуховує-ться тупість з межею до верху. В цій ділянці дихання відсутнє. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Ексудативний плеврит

B	Позагоспітальна пневмонія
C	Ателектаз легені
D	ТЕЛА
E	Абсцес легені
№	крок 2018
Тема	Панкреатит
Текст завдання	Хвора 37-ми років скаржиться на постійний тупий біль в підребер'ях з іррадіацією в спину, який посилюється після їжі. Турбує здуття живота, часті випорожнення з домішками неперетравленої їжі. Хворіє понад 5 років, схудла на 15 кг. Об'єктивно: помірно здуття живота, болючість в зоні Шоффа-ра, точках Дежардена, Мейо-Робсона. Який з методів дослідження буде найбільш інформативним для підтвердження зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози?
Правильна відповідь	Копрограма
B	Пероральна холецистографія
C	Ретроградна панкреатографія
D	ЕФГДС
E	Ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини
№	крок 2018
Тема	Жовчокам'яна хвороба
Текст завдання	Хвора 50-ти років скаржиться на напад болю у правому підребер'ї, блювання з домішками жовчі, впродовж 5-ти років турбував біль у епігастрії, нудота, порушення випорожнення. Об'єктивно: частота серцевих скорочень - 92/хв. Підвищеної повноти, язик обкладений, іктеричні склери. Живіт м'який, болючий у проекції жовчного міхура, локальне м'язове напруження у правому підребер'ї, позитивний симптом Мерфі. В загальному аналізі крові: лейкоцити - $9,6 \cdot 10^9$ /л, швидкість осідання еритроцитів - 14 мм/год. Яке дослідження доцільно призначити для підтвердження діагнозу в даному випадку?



Правильна відповідь	Ультразвукове дослідження жовчного міхура
B	Сцинтиграфію печінки
C	Бактеріологічне дослідження жовчі
D	Холецистографію
E	Ретроградну холангіопанкреатографію
№	крок 2018
Тема	Ускладнення струмектомії
Текст завдання	Хвора 63-х років оперована з приводу ба-гатовузлового еутиреоїдного зобу великих розмірів. З технічними труднощами вимушено виконана субтотальна резекція обох часток щитоподібної залози. На 4-й день після операції з'явилися судоми м'язів обличчя і верхніх кінцівок, біль в животі. Позитивні симптоми Хвостека і Труссо. Чим найімовірніше зумовлений такий стан хворої?
Правильна відповідь	Недостатність паращитоподібних залоз
B	Післяопераційний гіпотиреоз
C	Тиреотоксичний криз
D	Пошкодження зворотнього нерву
E	Трахеомалія
№	крок 2018
Тема	Закрита травма живота
Текст завдання	Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий отримав множинні переломи кінцівок та кісток тазу. В анамнезі: гемофілія А. Під час обстеження формуються гематоми на ушкоджених ділянках. Стан погіршується. Артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Вкажіть найбільш доцільну комбінацію інфузійних засобів для лікування пацієнта після застосування поліглюкіну та сольових розчинів:

Правильна відповідь	Кріопреципітат, еритроцитарна маса
B	Свіжозаморожена плазма, альбумін
C	Еритроцитарна маса, альбумін
D	Кріопреципітат, глюкоза
E	Еритроцитарна маса
№	крок 2018
Тема	Травматичні пошкодження верхніх кінцівок
Текст завдання	Спортсмен 26-ти років впав з упором на правий плечовий суглоб. Зазначає різкий біль, обмеження пасивних рухів, активні рухи в плечовому суглобі неможливі. Відведена і зігнута у плечовому суглобі травмовану руку підтримує здоровою. Об'єктивно: в ділянці дельтоподібного м'яза западина, під шкірою різко випинається акроміальний відросток лопатки, голівка плечової кістки пальпується під дзьобоподібним відростком. Який найбільш імовірний клінічний діагноз?
Правильна відповідь	Вивих плеча
B	Перелом анатомічної шийки плеча
C	Перелом хірургічної шийки плеча
D	Перелом голівки плечової кістки
E	Відрив великого пагорбка плечової кістки
№	крок 2018
Тема	Гостра кишкова непрохідність
Текст завдання	Дитина 7-ми місяців доставлена у хірургічне відділення через 8 годин після захворювання зі скаргами на напади неспокою, біль у животі, одноразове блювання. Об'єктивно: у правій половині живота пальпується пухлиноподібне утворення. При ректальному дослідженні - кров у вигляді "малинового желе". Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Інвагінація

В	Подвоєння кишечника
С	Пухлина черевної порожнини
Д	Глистна інвазія
Е	Ентерокістома
№	крок 2018
Тема	Новоутворення легень
Текст завдання	Хворий 67-ми років скаржиться на зади-шку, біль у грудях, загальну слабкість. Хво-ріє 5 місяців. Об'єктивно: температура тіла - $37,3^{\circ}C$ , пульс - 96/хв. Над правою легенею голосове тремтіння не визначається, перку-торний звук тупий, дихання не прослуховує-ться. У харкотинні - домішка крові, дифузно змішаної зі слизом. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Рак легень
В	Великовогнищева пневмонія
С	Бронхоектатична хвороба
Д	Вогнищевий туберкульоз легень
Е	Ексудативний плеврит
№	крок 2018
Тема	Ускладнення виразкової хвороби 12-ти палої кишки
Текст завдання	Хворий 48-ми років госпіталізований з нападами судом. Багато років страждає на виразку 12-ти палої кишки (ДПК). Протя-гом останнього місяця спостерігає щоденне блювання, схуд на 20 кг. Об'єктивно: хворий виснажений. В епігастральній ділянці визна-чається "шум плеску". Нижня межа шлунка на рівні гребінцевої лінії. Лабораторно: за-гальний білок - 47 г/л; $K$ - 2,1 ммоль/л, $Na$ - 118 ммоль/л, $Ca$ - 1,6 ммоль/л, хлориди - 82 ммоль/л, гематокрит - 64%. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Декомпенсований стеноз воротаря

B	Кровоточива виразка 12-ти палої кишки
C	Субкомпенсований стеноз воротаря
D	Малігнізована виразка шлунка
E	Компенсований стеноз воротаря
№	крок 2018
Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'яких тканин
Текст завдання	Хвора 48-ми років надійшла до хірургічного відділення з ранами стегна. При огляді встановлено, що поверхня рани вкрита брудно-сірим нальотом з неприємним солод-куватим запахом. Рановий вміст нагадує ма-линове желе. Шкірні покриви навколо рани напружені, блискучі. Під час пальпації тканин спостерігається помірна крепітація. Яка мікрофлора найбільш імовірно стала причиною запалення?
Правильна відповідь	Анаеробна клостридіальна
B	Анаеробна неклостридіальна
C	Стрептококи
D	Стафілококи
E	Синьогнійна паличка
№	крок 2018
Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'яких тканин
Текст завдання	У юнака 16-ти років на тлі підвищеної сальності шкіри обличчя, верхньої частини спини, передньої поверхні грудей, множинні комедони, періодично з'являються фолікулярні вузлики, пустули. Суб'єктивних відчуттів немає. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Звичайні вугри
B	Вторинний сифіліс
C	Вульгарний сикоз
D	Фурункульоз

Е	Рожеві вугри
№	крок 2018
Тема	Ускладнення раку легені
Текст завдання	Хворому 54 роки. Впродовж року лікує-ться з приводу недиференційованої форми раку легень. Наразі приєдналися відчуття тяжкості та болючість у правому підребер'ї. Який метод діагностики буде найбільш ін-формативним в даному випадку?
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини
В	Радіоізотопна гепатографія
С	Вазографія печінки
Д	Діагностична лапароскопія
Е	Ультразвукова біолокація з прицільною пункційною біопсією
№	крок 2018
Тема	Надання невідкладної допомоги при утопленні
Текст завдання	На березі моря ви побачили молодого хлопця, який лежав на землі. Шкіра гусяча, різко ціанотична, на губах біла піна. Пульс частий аритмічний, в легенях дихання не ви-слуховується. Якими будуть перші дії на до-госпітальному етапі?
Правильна відповідь	Видалити слиз і піну з рота та ротоглотки, провести штучне дихання
В	Залишити в спокої, викликати швидку допомогу
С	Розтерти і зігріти хворого
Д	Надати положення з піднятими ногами
Е	Зробити різкий удар по груднині
№	крок 2018
Тема	Новоутворення кісток

Текст завдання	Хворий 35-ти років скаржиться на біль у верхній третині плеча, який посилюється вночі. При огляді: помірний набряк у верхній третині плеча, шкіра над ним підвищеної температури, болючість при пальпації, обмеження рухів в плечовому суглобі. На рентгенограмах: ділянка деструкції плечової кістки у метадіафізарному відділі з явищами гомілкового періоститу (спікули) і відшаруванням окістя у вигляді "дашка". Встановіть попередній діагноз:
Правильна відповідь	Остеогенна саркома
В	Остеома
С	Гемангіома
Д	Хондробластома
Е	Хондрома
№	крок 2018
Тема	Ускладнення виразкової хвороби 12-типалої кишки
Текст завдання	Пацієнт 60-ти років скаржиться на практично постійне відчуття важкості та переповнення в епігастрії, що посилюється після їжі, відрижку з тухлим запахом, іноді блювання з'їденою 1-2 дні тому їжею, схуднення. 12 років тому вперше виявлена виразка пілоричного каналу. Спостерігав періодичний "голодний" біль, з приводу якого приймав ранітидин. Погіршення протягом 3-х місяців. Об'єктивно: визначається "шум плескоту" в епігастрії. Про яке ускладнення йдеться?
Правильна відповідь	Стеноз пілоруса
В	Пенетрація виразки шлунка
С	Функціональний спазм воротаря
Д	Стороннє тіло шлунка (безоар)
Е	Малігнізація виразки шлунка
№	крок 2018
Тема	Закрита травма живота

Текст завдання	Хворий 25-ти років надійшов через 2 години після дорожньо-транспортної аварії зі скаргами на постійний інтенсивний біль у правій паховій ділянці та у симфізі тазу, неможливість самостійно пересуватися. При огляді: положення хворого вимушене - по-за "жаби" (позитивний симптом Волковича). Садна й синці на шкірі в проекції симфізу та горизонтальної гілки лобкової кістки право-руч, виражений набряк м'яких тканин. Позитивний симптом "прилиплої п'яти" праворуч. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Закритий перелом лобкової кістки право-руч
B	Забій кісток тазу
C	Травматична пахвинна грижа
D	Травматична аневризма стегнової артерії
E	Вивих правого стегна
№	крок 2018
Тема	Новоутворення стравоходу
Текст завдання	До дільничного терапевта звернувся па-цієнт 43-х років зі скаргами на печію, відриж-ку кислим, появу болю під час ковтання їжі, а також неможливістю вживати тверду їжу. Хворий повідомив, що печія та відрижка ки-слим у нього спостерігається впродовж 8-мироків. Погіршення свого стану спостерігає останні 3 місяці. Яке обстеження потрібно пройти пацієнту в першу чергу?
Правильна відповідь	Фіброезофагогастроуденоскопія
B	Тест з інгібітором протонової помпи
C	Добовий езофаго-рН-моніторинг
D	Багатогодинний езофаго-рН-моніторинг
E	Комп'ютерна томографія органів грудної клітки
№	крок 2018
Тема	Зовнішні кровотечі

Текст завдання	Пацієнт 30-ти років після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) непритомний, шкірні покриви бліді, пульс ниткоподібний. В с/3 правого стегна наявна велика рвана рана з рясною тривалою зовнішньою артеріальною кровотечею. Накладено джгут. Кровотеча зупинена. На який максимальний час може бути накладений джгут на кінцівку в літню пору?
Правильна відповідь	Не більше 2 годин
В	Не більше 5 годин
С	Не більше 10 годин
Д	Не більше 2 хвилин
Е	Не більше 10 секунд
№	крок 2018
Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'яких тканин
Текст завдання	У породіллі через 3 тижні після пологів підвищилася температура тіла до $38^{\circ}C$ , з'явилися остуда, слабкість та біль в лівій молочній залозі. Молочна залоза збільшена, на-грубла, болюча при пальпації; розм'якшення та флуктуації в ділянці інфільтрату немає. В крові: помірний лейкоцитоз. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Серозний мастит
В	Лактостаз
С	Абсцедивний мастит
Д	Мастопатія
Е	Гангренозний мастит
№	крок 2018
Тема	Пошкодження органів грудної клітки



Текст завдання	У хворого 19-ти років проникаюче поранення лівої половини грудної порожнини. Стан тяжкий, ціаноз, задишка. Об'єктивно: зліва - дихання різко послаблене. Серце - то-ни глухі, пульс - 102/хв., артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Ехокардіографія - виявлений ехонегативний простір, який оточує камеру лівого шлуночка. Невелика кількість ріди-ни у лівій плевральній порожнині та велика кількість повітря. Якому патологічному ста-ну найбільш імовірно відповідає ця картина?
Правильна відповідь	Лівобічний гідропневмоторакс та гідроперикард
В	Лівобічний пневмоторакс та гемоперикард
С	Правобічний пневмоторакс та гемопери-кард
Д	Лівобічний пневмоторакс та ексудативний перикардит
Е	Дилатаційна кардіоміопатія
№	крок 2018
Тема	Пухлини молочної залози
Текст завдання	Пацієнтка 35-ти років скаржиться на біль і збільшення правої молочної залози. Страждає на безпліддя 15 років. Права мо-лочна залоза збільшена у розмірах, шкіра її пастозна, гіперемована, пальпується інфільтрат тістоподібної консистенції без чітких контурів, симптом "лимонної кірки". Постав-те діагноз:
Правильна відповідь	Рак молочної залози
В	Мастит
С	Вузлова мастопатія
Д	Абсцес молочної залози
Е	Фібroadенома молочної залози
№	крок 2018
Тема	Ускладнення виразкової хвороби 12-типалої кишки

Текст завдання	Хлопчик 15-ти років протягом останніх 5 років хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки. Останнє загострення хвороби було весною. Раптово з'явився "кинджальни-й" біль в епігастрії, який дещо тамувався в колінно-ліктьовому положенні. Стан дитини тяжкий, різка блідість, тахікардія, симптоми подразнення очеревини. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Перфорація 12-палої кишки
В	Гострий апендицит
С	Калькульозний холецистит
Д	Гостра кишкова непрохідність
Е	Гострий панкреатит
№	крок 2018
Тема	Нагнійні захворювання легень та плеври
Текст завдання	Хворому 27-ми років з двостороннім гідротораксом неодноразово проводили плевральні пункції з обох сторін. Після чергової пункції - погіршення стану, лихоманка, біль у грудях. Наступного дня під час плевральної пункції справа одержано гній. Встановлено діагноз: правостороння гостра емпієма плеври. Який механізм виникнення даного ускладнення?
Правильна відповідь	Контактно-аспіраційний
В	Лімфогенний
С	Гематогенний
Д	Імплантаційний
Е	Повітряний
№	крок 2018
Тема	Хвороби щитоподібної залози

Текст завдання	Хвора 23-х років звернулася до клініки зі скаргами на серцебиття, пітливість, слабкість, зниження працездатності, тремтіння пальців рук. За місяць схудла на 10 кг. При огляді: частота серцевих скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 130/70 мм рт.ст. Під час ультразвукового дослідження (УЗД) в щитоподібній залозі виявлено вузол 2х2 см. При скануванні в місці вузла виявлена ділянка підвищеного накопичення радіофармпрепарату. Решта тканин щитоподібної залози РФП не накопичує. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Токсична аденома щитоподібної залози
В	Змішаний токсичний зоб
С	Аутоімунний тиреоїдит
Д	Підгострий тиреоїдит
Е	Тиреотропінома
№	крок 2018
Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'яких тканин
Текст завдання	Породілля 22-х років на 4 добу післяпологового періоду скаржить на головний біль, слабкість, біль в правій молочній залозі, різке підвищення температури тіла до 39° С, лихоманку. В ділянці верхньозовнішнього квадранта правої молочної залози пальпується щільний болісний інфільтрат, шкіра над яким гіперемована. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс - 110/хв. Живіт м'який, безболісний. Який імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Лактаційний мастит, інфільтративна форма
В	Лактостаз
С	Флегмонозний мастит
Д	Гангренозний мастит
Е	Ретромаммарний абсцес
№	крок 2018

Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'яких тканин
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність декількох щільних, болючих вузлів у правій пахвовій ділянці, підвищення температури тіла до 38° С, загальну слабкість. Хворіє 3 доби. Локально: в правій пахвовій ділянці є три вузлоподібних утворення, які підвищуються над поверхнею шкіри, розмірами від 0,5 см до 1,5 см в діаметрі, різко болючі при пальпації, з чіткими контурами, шкіра над ними багрово-синюшного відтінку, підняття верхньої кінцівки обмежене через біль. По-ставте діагноз:
Правильна відповідь	Гнійний гідраденіт
В	Абсцес
С	Карбункул
Д	Фурункул
Е	Гнійний лімфаденіт
№	крок 2018
Тема	Вроджені вади розвитку кишковика
Текст завдання	У дитини 11-ти років спостерігаються періодичні закрепи від народження, здуття живота, зниження апетиту, інколи нудота, гіпотрофія м'язів. На іригограмі спостерігається звуження в ділянці прямої кишки із супра-стенотичним розширенням ободової кишки вище цього місця. При аноманометрії аноректальний рефлекс негативний. Який метод діагностики буде найбільш інформативним для підтвердження діагнозу?
Правильна відповідь	Повношарова біопсія стінки прямої та ободової кишки
В	Ультразвукове дослідження (УЗД)
С	Оглядова рентгенографія черевної порожнини
Д	Біохімічне дослідження крові
Е	Термографія передньої черевної стінки

№	крок 2018
Тема	Післяопераційні тромбози та емболії
Текст завдання	У хворого 67-ми років на 6-й день після планової операції раптово виникла гостра дихальна недостатність. Частота серцевих скорочень - 130/хв. Верхня половина тулу-ба, шия та обличчя ціанотичні, кашель, різ-кий біль за грудниною. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., центральний венозний тиск – 330 мм вод.ст. На ЕКГ інверсія зубця Т. Яке ускладнення розвинулося у хворого?
Правильна відповідь	Тромбоемболія легеневої артерії
В	Повторна кровотеча
С	Гостра недостатність коронарних артерій
Д	Гострий інфаркт міокарда
Е	Гіповолемічний шок
№	крок 2018
Тема	Новоутворення шкіри та м'яких тканин
Текст завдання	Хвора 35-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність новоутвору на шкі-рі правої гомілки. Об'єктивно: невос непра-вильної форми діаметром 1 см, без чітких меж, з сухою поверхнею, темно-коричневого кольору. Встановлено діагноз: імовірна ме-ланома шкіри правої гомілки. Який метод верифікації діагнозу меланоми шкіри?
Правильна відповідь	Ексцизійна біопсія
В	Мазок-відбиток
С	Інцизійна біопсія
Д	Позитронно-емісійна томографія - комп'ютерна томографія (ПЕТ-КТ)
Е	Ультразвукове дослідження (УЗД)
№	крок 2019
Тема	Пошкодження уретри

Текст завдання	Хворий 42-х років доставлений до трав-матологічного відділення 2 години то-му. Рентгенологічно: перелом кісток тазу. Об'єктивно: виведений з шоку. Самостійно не мочиться. Уретрорагія. Пальпується збільшений сечовий міхур. Болісна припу-хлість в ділянці промежини. Який попере-дній діагноз?
Правильна відповідь	Травма уретри
B	Рефлекторна затримка сечовипускання
C	Забій промежини
D	Гостра ниркова недостатність
E	Травма сечового міхура
№	крок 2019
Тема	Захворювання щитоподібної залози
Текст завдання	Чоловік 45-ти років, звернувся до ліка-ря зі скаргами на дратівливість, підвищену втомленість, схуднення, серцебиття, пере-бої в роботі серця. При пальпації лівої долі щитоподібної залози пальпується утворен-ня, щільно-еластичної консистенції, безбо-лісне, яке при ковтанні зміщується разом з щитоподібною залозою. Позитивні очні симптоми, екзофтальм, порушення конвер-генції. Артеріальний тиск -135/80 мм рт.ст., пульс - 110/хв. При ультразвуковому дослі-дженні щитоподібної залози у лівій долі візуалізується гіперехогенне округле утво-рення розмірами 2х3 см, з чіткими конту-рами, однорідної структури. Який висновок лікаря після проведеного обстеження буде найбільш коректним?
Правильна відповідь	Дифузно-токсичний зоб
B	Рак щитоподібної залози
C	Вузол щитоподібної залози
D	Гострий тиреоїдит
E	Кіста щитоподібної залози
№	крок 2019

Тема	Гострий холецистит
Текст завдання	Хвора 50-ти років скаржиться на напад болю у правому підребер'ї. блювання з домішками жовчі, впродовж 5-ти років турбував біль у епігастрії. нудота, порушення випорожнення. Об'єктивно: частота серцевих скорочень - 92/хв. Підвищеної повноти. язик обкладений. іктеричні склери. Живіт м'який, болючий у проекції жовчного міхура, локальне м'язове напруження у правому підребер'ї, позитивний симптом Мерфі. В загальному аналізі крові: лейкоцити - 9, 6 - 109/л, швидкість осідання еритроцитів - 14 мм/год. Яке дослідження доцільно призначити для підтвердження діагнозу в даному випадку?
Правильна відповідь	Ультразвукове дослідження жовчного міхура
В	Ретроградну холангіопанкреатографію
С	Бактеріологічне дослідження жовчі
Д	Холецистографію
Е	Сцинтиграфію печінки
№	крок 2019
Тема	Травми верхніх кінцівок.
Текст завдання	Спортсмен 26-ти років впав з упором на правий плечовий суглоб. Зазначає різкий біль, обмеження пасивних рухів, активні ру-хи в плечовому суглобі неможливі. Відведе-ну і зігнуту у плечовому суглобі травмова-ну руку підтримує здоровою. Об'єктивно: в ділянці дельтоподібного м'яза западан-ня, під шкірою різко випинається акроміальний відросток лопатки, голівка плечової кістки пальпується під дзьобоподібним від-ростком. Який найбільш імовірний кліні-чний діагноз?
Правильна відповідь	Вивих плеча
В	Перелом хірургічної шийки плеча
С	Перелом анатомічної шийки плеча
Д	Перелом голівки плечової кістки
Е	Відрив великого пагорбка плечової кіс-тки

№	крок 2019
Тема	Захворювання щитоподібної залози
Текст завдання	Хвора 63-х років оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зобу великих розмірів. З технічними труднощами вимушено виконана субтотальна резекція обох часток щитоподібної залози. На 4-й день після операції з'явилися судоми м'язів обличчя і верхніх кінцівок, біль в животі. Позитивні симптоми Хвостека і Труссо. Чим найімовірніше зумовлений такий стан хворої?
Правильна відповідь	Недостатність паращитоподібних залоз
В	Трахеомаліяція
С	Пошкодження зворотного нерву
Д	Післяопераційний гіпотиреоз
Е	Тиреотоксичний криз
№	крок 2019
Тема	Новоутворення підшлункової залози
Текст завдання	Чоловік 58-ми років, скаржиться на постійний біль в епігастрії, що іррадіює в спину і посилюється після прийому жирної їжі. Пацієнт відмічає слабкість, за останні 2 місяці втратив у вазі до 9 кг. Місяць тому з'явилась жовтяниця, що поступово зростає. Живіт м'який, печінка не збільшена. При лабораторному дослідженні крові гемоглобін - 68 г/л, лейкоцити - $9,0 \cdot 10^9$ /л, швидкість зсідання еритроцитів - 36 мм/год. На УЗД: жовчний міхур великих розмірів, конкрементів не містить, холедох розширений, в головці підшлункової залози - округле утворення до 4 см в діаметрі з нечіткими контурами. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Рак головки підшлункової залози
В	Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки з пенетрацією в головку підшлункової залози
С	Рак шлунка з метастазами в печінку



D	Хронічний індуративний панкреатит
E	Хронічний холецистопанкреатит
№	крок 2019
Тема	Цироз печінки
Текст завдання	Чоловіка 48-ми років доставлено до лікаря у непритомному стані. В анамнезі зло-вживання алкоголем. При обстеженні шкіра бліда, на тулубі "судинні зірочки", печінковий запах з рота, язик обкладений коричневим нальотом. Підшкірні вени передньої стінки живота розширені у вигляді (caput medusae). При пальпації органів черевної порожнини позитивний симптом флюктуації, гепатомегалія, спленомегалія. Набряки нижніх кінцівок. Який стан у хворого є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Гостра печінкова недостатність
B	Гостра шлунково-кишкова кровотеча
C	Перфоративна виразка шлунка
D	Гіпоглікемічна кома
E	Гіперглікемічна кома
№	крок 2019
Тема	Ускладнення переломів кісток
Текст завдання	Хворий 30-ти років звернувся до сімейного лікаря через 2 місяці після операції з приводу відкритого перелому плечової кістки. При огляді стан хворого задовільний, в ділянці операційної рани є нориця з незначним гнійним виділенням, почервоніння, флюктуація. На рентгенограмі: деструкція плечової кістки з секвестрами. Яке ускладнення виникло у хворого в післяопераційному періоді?
Правильна відповідь	Посттравматичний остеомієліт
B	Гематогенний остеомієліт
C	Нагноєння рани

D	Лігатурна нориця
E	Післятравматична флегмона
№	крок 2019
Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'яких тканин
Текст завдання	У породіллі через 4 тижні після терміно-вих пологів підвищилась температура тіла до 39°C, з'явилися слабкість та біль у пра-вій молочній залозі, озноб. Молочна залоза нагрубла, збільшена, чутлива при пальпа-ції. Флуктуації у ділянці інфільтрату немає. В аналізі крові помірний лейкоцитоз. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Серозний мастит
B	Гангренозний мастит
C	Лактостаз
D	Абсцедуючий мастит
E	Мастопатія
№	крок 2019
Тема	Захворювання стравоходу
Текст завдання	У пацієнта 64-х років протягом останніх 2 місяців з'явилося відчуття утрудненого ковтання твердої їжі з затримкою її посере-дині стравоходу. Втрата ваги - 4 кг. Батько хворого помер від раку шлунка. Запідозре-но рак стравоходу. За допомогою якого до-слідження найбільш імовірно можна верифікувати цю патологію?
Правильна відповідь	ФЕГДС з біопсією
B	Дихальний уреазний тест
C	Внутрішньостравохідна рН-метрія
D	Рентгенконтрастне дослідження страво-ходу і шлунка
E	Комп'ютерна томограма грудної клітки
№	крок 2019

Тема	Черевні грижі
Текст завдання	Хворий 58-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на невелике безболісне випинання в пахвинній ділянці протягом останнього місяця. Випинання не збільшується, з'являється при стоянні та зникає в положенні лежачи на спині. Утрудненого сечо-випускання та закріпів немає. Пальпація черевної стінки безболісна. Ректальне дослідження патологічних змін не виявило. Що із перерахованого є найбільш доцільним наступним кроком лікаря у даній ситуації?
Правильна відповідь	Провести відкрити пластику із застосуванням сітки
В	Накласти бандаж
С	Проінформувати пацієнта про ознаки защемлення і відпустити додому
D	Направити на КТ-дослідження черевної порожнини та малого тазу
Е	Провести тонкоголкову пункційну біопсію
№	крок 2019
Тема	Травматичні пошкодження нижніх кінцівок
Текст завдання	Чоловік 50-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в стегні після падіння на сходах. Піднятися та ходити не може. Права нога коротша за ліву на 5 см, ступня ротована назовні. Пульс на правій тильній артерії стопи задовільний. Стегно збільшене в об'ємі, деформоване, в середній третині болюча пальпація. Виявляється патологічна рухомість, крепітація. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Перелом діафіза стегнової кістки
В	Хибний суглоб
С	Закритий перелом кісток миски
D	Вивих правого стегна
Е	Забій сідничного нерва
№	крок 2019
Тема	Ускладнення виразкової хвороби 12-типалой кишки

Текст завдання	Хворий 43-х років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки протягом 8-ми років. Під час роботи на садовій ділянці відчув різкий біль у епігастральній ділянці, слабкість, запаморочення. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс - 102/хв., слабкий, артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст., живіт не приймає участі у акті дихання, напружений, болісний у епігастрії, печінкова тупість відсутня. Яке захворювання є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Перфорація виразки
B	Шлункова кровотеча
C	Загострення панкреатиту
D	Кишкова непрохідність
E	Інфаркт міокарда
№	крок 2019
Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'язів тканин
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність декількох щільних, болючих вузлів у правій пахвовій ділянці, підвищення температури тіла до 38°C, загальну слабкість. Хворіє 3 доби. Локально: в правій пахвовій області є три вузлоподібних утворення, які підвищуються над поверхнею шкіри, розмірами від 0,5 см до 1,5 см в діаметрі, різко болючі при пальпації, з чіткими контурами, шкіра над ними багрово-синюшного відтінку, підняття верхньої кінцівки обмежено через біль. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гнійний гідраденіт
B	Фурункул
C	Гнійний лімфаденіт
D	Карбункул
E	Абсцес
№	крок 2019
Тема	Новоутворення лімфатичної системи

Текст завдання	Жінка 56-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури до 38,5°C, підвищену пітливість вночі та збільшення лімфовузлів в лівій пахвовій та лівій надключичній ділянках. У сімейному анамнезі рак молочної залози у бабусі. При фізикальному обстеженні в зазначених ділянках пальпуються збільшені, безболісні, щільні лімфовузли. При рентгенологічному дослідженні органів грудної порожнини розширення тіні середостіння за рахунок збільшених лімфовузлів. Після ексцизійної біопсії лімфовузла надключичної ділянки, виявлені атипові багатоядерні клітини Рід-Штернберга. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Лімфома Ходжкіна
B	Інфекційний мононуклеоз
C	Метастази раку молочної залози
D	Бронхогенна карцинома
E	Туберкульоз
№	крок 2019
Тема	Нагнійні захворювання легень та плеври
Текст завдання	Чоловік 38-ми років захворів 2 тижні тому, з'явився кашель, слабкість, підвищилася температура до 38,0°C. Стан різко погіршився до кінця 1-го тижня, коли з'явилися остуда, проливний піт, надвечір температура підвищилася до 39,0°C. За 2 дні до госпіталізації у хворого під час кашлю виділилася велика кількість смердючого харкотиння з кров'ю, після чого стан хворого покращився. Пульс - 80/хв., частота дихання - 20/хв., температура тіла - 37,6°C. Які зміни можливі на рентгенограмі грудної порожнини?
Правильна відповідь	Наявність порожнини з горизонтальним рівнем рідини
B	Однорідна округла тінь в легеновому полі
C	Тінь в нижньому відділі з косою верхньою межею
D	Зміщення середостіння в сторону гомогенної тіні
E	Затемнення частки легені

№	крок 2019
Тема	Нагнійні захворювання легень та плеври
Текст завдання	Хвора 36-ти років скаржиться на задишку, відчуття стискання в правій половині грудної клітки, підвищення температури до 38,7°C, кашель з виділенням невеликої кількості слизово-гнійного харкотиння. Хворіє понад тиждень. Скарги пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: легкий акроціаноз губ, пульс ритмічний, 90/хв., артеріальний тиск - 140/85 мм рт.ст. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно справа нижче кута лопатки прослуховується тупість. В цій ділянці дихання відсутнє. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Плеврит
В	Ателектаз легені
С	ТЕЛА
Д	Абсцес легені
Е	Позагоспітальна пневмонія
№	крок 2019
Тема	Ускладнення виразкової хвороби шлунка
Текст завдання	Хворий 48-ми років госпіталізований з нападами судом. Багато років страждає на виразку 12-ти палої кишки (ДПК). Протягом останнього місяця спостерігає щоденне блювання, схуд на 20 кг. Об'єктивно: хворий виснажений. В епігастральній ділянці визначається "шум плеску". Нижня межа шлунка на рівні гребінцевої лінії. Лабораторно: загальний білок - 47 г/л; К - 2,1 ммоль/л, Na-118 ммоль/л, Са -1,6 ммоль/л, хлориди - 82 ммоль/л, гематокрит - 64%. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Субкомпенсований стеноз воротаря
В	Кровоточива виразка 12-ти палої кишки
С	Малігнізована виразка шлунка
Д	Декомпенсований стеноз воротаря
Е	Компенсований стеноз воротаря

№	крок 2019
Тема	Хірургічні ускладнення цукрового діабету
Текст завдання	Чоловік 53-х років хворіє на цукровий діабет протягом 5-ти років. Звертається до лікаря зі скаргами на болі та судоми в нижніх кінцівках, відчуття оніміння в них, мерзлякуватість. При обстеженні нижніх кінцівок ступні звичайного кольору, теплі на дотик, усі види чутливості значно знижені, гіперкератози, пульсація на артеріях кінцівок збережена. Яке ускладнення най-більш імовірно виникло у пацієнта?
Правильна відповідь	Синдром діабетичної стопи, ішемічна форма
В	Синдром діабетичної стопи, змішана форма
С	Синдром діабетичної стопи, нейропатична форма
D	Облітеруючий ендартеріт
Е	Хронічна венозна недостатність
№	крок 2020
Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'яких тканин
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржитися на наявність декількох щільних, болючих вузлів у правій пахвовій ділянці, підвищення температури тіла до 38°(7, загальну слабкість. Хворіє 3 доби. Локально: в правій пахвовій області є три вузлопо-дібних утворення, які підвищуються над поверхнею шкіри, розмірами від 0,5 см до 1,5 см в діаметрі, різко болючі при пальпації, з чіткими контурами, шкіра над ними багрово-синюшного відтінку, підняття верхньої кінцівки обмежене через біль. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Гнійний гідраденіт
В	Абсцес
С	Карбункул
D	Фурункул
Е	Гнійний лімфаденіт

№	крок 2020
Тема	Захворювання підшлункової залози
Текст завдання	Хворий 32-х років скаржиться на ту-пий біль у лівому підребер'ї після прийому жирної та копченої їжі, блювання без полегшення. Випорожнення блискучі, з неприємним запахом. Хворіє впродовж 8 років, зловживає алкоголем. Знижено-го живлення. Шкіра бліда і суха. Язик з білим нашаруванням. Живіт помірно зду-тий, болючий в зоні Шоффара, точках Дежардена, Мейо-Робсона. Який імовір-ний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний панкреатит
В	Виразкова хвороба
С	Хронічний гепатит
D	Хронічний холецистит
Е	Хронічний гастродуоденіт
№	крок 2020
Тема	Захворювання щитоподібної залози
Текст завдання	Чоловік 45-ти років звернувся до лі-каря зі скаргами на дратівливість, підви-щену втомленість, схуднення, серцебит-тя, перебої в роботі серця. При пальпації лівої долі щитоподібної залози пальпує-ться утворення, щільно-еластичної кон-систенції, безболісне, яке при ковтанні зміщується разом із щитоподібною за-лозою. Позитивні очні симптоми, екзо-фтальм, порушення конвергенції. Арте-ріальний тиск - 135/80 мм рт.ст., пульс - 110/хв. При ультразвуковому досліджен-ні щитоподібної залози у лівій долі візуа- лізується гіперехогенне округле утво-рення розмірами 2х3 см, з чіткими кон-турами, однорідної структури. Який ви-сновок лікаря після проведеного обсте-ження буде найбільш коректним?
Правильна відповідь	Дифузно-токсичний зоб
В	Рак щитоподібної залози
С	Кіста щитоподібної залози



D	Гострий тиреоїдит
E	Вузол щитоподібної залози
№	крок 2020
Тема	Травми
Текст завдання	Хворий 25-ти років надійшов через 2 години після дорожньо-транспортної аварії зі скаргами на постійний інтенсивний біль у правій паховій ділянці та у сим-фізі тазу, неможливість самостійно пересуватися. При огляді: положення хворого вимушене - поза "жаби" (позитивний симптом Волковича). Садна й синці на шкірі в проекції симфізу та горизонтальної гілки лобкової кістки праворуч, виражений набряк м'яких тканин. Позитивний симптом "прилиплої п'яти" праворуч. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Закритий перелом лобкової кістки праворуч
B	Травматична пахвинна грижа
C	Вивих правого стегна
D	Забій кісток тазу
E	Травматична аневризма стегнової артерії
№	крок 2020
Тема	Проктологія
Текст завдання	Пацієнт скаржиться на виражений біль в анальному каналі та періанальній ділянці. При огляді періанальної ділянки на 3, 7 і 11 годин умовного циферблата виявляються пухлиноподібні утворення, всередині яких визначаються тромби; помірно виражена періанальна гіперемія. Ваш попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий геморой
B	Хронічна анальна тріщина
C	Гострий парапроктит
D	Хронічний геморой

Е	Випадання прямої кишки
№	крок 2020
Тема	Травми живота
Текст завдання	Хворий 47-ми років госпіталізований в клініку в тяжкому стані із скаргами на біль у черевній порожнині, слабкість, за-паморочення. Одну годину назад отри-мав сильний удар в ліву половину жи-вота, свідомість не втрачав. При огля-ді - блідість шкіри та слизових оболо-нок. Пульс - 120/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. Живіт при пальпації напружений, болю-чий зліва від пупка. Симптом Щоткіна- Блюмберга позитивний. Сеча без змін. Загальний аналіз крові: еритроцити - $2,8 \cdot 10^{12}/л$ , НЬ- 90 г/л. Яке пошкодження можна припустити в першу чергу?
Правильна відповідь	Розрив селезінки. Внутрішня кровоте-ча
В	Субкапсулярний розрив селезінки
С	Закрита травма черевної порожнини без пошкодження внутрішніх органів
Д	Розрив товстої кишки. Каловий пери-тоніт
Е	Пошкодження нирки
№	крок 2020
Тема	Патологія судин. Кровотечі.
Текст завдання	Вам довелося прийти на допомогу жінці 58-ми років, у якої виникла рясна кровотеча з розірваного варикозно роз-ширеного венозного вузла на лівій гоміл-ці. У чому полягає перша допомога?
Правильна відповідь	Підвищене положення кінцівки. Сти-скальна стерильна пов'язка
В	Накладання джгута проксимально до джерела кровотечі
С	Накладання джгута дистально до дже-рела кровотечі
Д	Z-подібний шов на розірваний варико-зний вузол
Е	Операція Троянова-Тренделенбурга

№	крок 2020
Тема	Ускладнення операції на щитоподібній залозі .
Текст завдання	У хворої 31-го року після проведе-ної субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу токсичного зоба вини-кли серцебиття, пітливість, психомотор-не збудження. Пацієнтка знепритомніла. Об'єктивно: температура тіла - 39,1°C, частота дихання - 38/хв.; ЧСС- 135/хв., миготлива аритмія. АТ- 190/80 мм рт.ст. Ускладнення?
Правильна відповідь	Тиреотоксичний криз
В	Рецидив дифузного токсичного зоба
С	Гіпертонічний криз
Д	Бактеріальний шок
Е	Істеричний напад
№	крок 2020
Тема	Захворювання стравоходу.
Текст завдання	До лікаря звернувся чоловік 36-ти ро-ків зі скаргами на пекучий загрудипний біль, що зазвичай виникає через 1-1,5 го-дини після вживання їжі. Зазначає, що біль підсилюється в горизонтальному по-ложенні. При ендоскопії верхнього відді-лу ШКТ виявлені 2 вогнищевих уражен-ня нижньої третини слизової оболонки стравоходу до 5 мм в межах однієї склад-ки. Яка тактика лікаря буде найбільш до-речною?
Правильна відповідь	Призначення інгібіторів протонної помпи
В	Хірургічне лікування
С	Призначення ненаркотичних анальге- тиків
Д	-
Е	Призначення кларитроміцину.
№	крок 2020
Тема	Захворювання печінки та жовчовивідних шляхів.

Текст завдання	Жінка 45-ти років скаржиться на колькоподібний біль у правому підре-бер'ї, що виникає після вживання жирної їжі, фізичного навантаження, іррадіює в праву лопатку та праве плече, зменшу-ється при прийомі спазмолітиків. Хво-ріє впродовж року, періодично зазначає пожовтіння склер під час нападів болю. Який метод обстеження слід призначити в першу чергу для встановлення діагно-зу?
Правильна відповідь	Ультрасонографію
В	Дуоденальне зондування
С	Комп'ютерну томографію
Д	Рентгенографію органів черевної порожнини
Е	Фіброгастродуоденоскопію
№	крок 2020
Тема	Доброякісні новоутворення молочної залози.
Текст завдання	Пацієнтка 35-ти років пред'являє скарги на сукровичні виділення з соска лівої молочної залози. При огляді, паль-пації - патології не виявлено. Для якого доброякісного захворювання є характер-ним даний симптом?
Правильна відповідь	Внутрішньопротокова папілома
В	Інфільтративний мастит
С	Масталгія
Д	Фібroadенома молочної залози
Е	Кіста молочної залози
№	крок 2020
Тема	Патологія судин.

Текст завдання	Хворий 45-ти років скаржиться на біль по внутрішній поверхні гомілки і стегна справа. Хворіє протягом 5 днів, коли після фізичного навантаження з'явився біль у гомілці, який поступово поширився на стегно. Об'єктивно: у проекції великої підшкірної вени на гомілці та стегні спостерігається гіперемія шкіри і припухлість, при пальпації - ущільнення та болючість. Набряки правої нижньої кінцівки відсутні, пульсація артерій на стопах визначається. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?
Правильна відповідь	Висхідний тромбофлебіт
В	Гострий тромбоз підколінної та стегно-вих вен
С	Гострий тромбоз підколінної та стегно-вої артерій
Д	Спонтанний розрив великої підшкірної вени
Е	Гострий лімфангіт
№	крок 2020
Тема	Невідкладна торакальна хірургія.
Текст завдання	Хворий 41-го року доставлений в торакальне відділення з ножовим пораненням грудної клітки зліва. При огляді: загальний стан вкрай важкий. Шкіра та видимі слизові синюшні. Дихання важке, уривчасте, ЧД- 32/хв. При перкусії грудної клітки межі серця розширені. Пульс - 120/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст. Яка тактика ведення хворого?
Правильна відповідь	Невідкладна торакотомія
В	Торакоцентез
С	Торакоскопія
Д	Рентгенографія ОГК
Е	Плевральна пункція
№	крок 2020
Тема	Захворювання щитоподібної залози.

Текст завдання	Хвора 35-ти років скаржиться на пе-ребої в роботі серця, зниження ваги, біль передньої поверхні шиї, що почалися після ГРВІ. Пульс - 110/хв., АТ- 130/60 мм рт.ст. Щитоподібна залоза незначно збільшена, болюча при пальпації. ШОЕ- 40 мм/год. ТТГ- 0,05 мОд/л, вТ4 - 34,3 пмоль/л. Який найбільш імовірний діа-гноз?
Правильна відповідь	Підгострий тиреоїдит
В	Тиреоїдит Хашимото
С	Дифузний токсичний зоб
Д	Гострий тиреоїдит
Е	Пароксизмальна тахікардія
№	крок 2020
Тема	Захворювання щитоподібної залози.
Текст завдання	Жінка 46-ти років знайшла при паль-пації вузол в ділянці щитоподібної зало-зи розміром 2-3 см, який зміщується при ковтанні, з чіткими межами. При скану-ванні визначається "холодний вузол" у правій частці щитоподібної залози. Лім-фовузли шиї не збільшені. При пункції отримано клітини проліферуючого епі-телію. Яка лікувальна тактика?
Правильна відповідь	Правобічна гемітиреоїдектомія з тер-міновим гістологічним дослідженням
В	Спостереження
С	Тиреоїдектомія з висіченням кліткови-ни шиї за Крайлем
Д	Геміструмектомія
Е	Променеве лікування
№	крок 2020
Тема	Захворювання судин.

Текст завдання	Хворий 75-ти років перебуває на консервативному лікуванні у відділенні судинної неврології з приводу ТІА. Згідно з останніми даними кольорового ду-плексного сканування у пацієнта наявний стеноз лівої внутрішньої сонної артерії гомогенною атеросклеротичною бляшкою більше 70%. Судинний хірург рекомендував пацієнту проведення оперативного втручання. Про яке оперативне втручання йде мова?
Правильна відповідь	Ендартеректомія з лівої внутрішньої сонної артерії
В	Магістралізація лівої зовнішньої сонної артерії
С	Тромбектомія з лівої внутрішньої сонної артерії
Д	Підключично-зовнішньосонне шунтування зліва
Е	Перев'язка лівої внутрішньої сонної артерії
№	крок 2020
Тема	Сепсис.
Текст завдання	У хворого 47-ми років на восьмий день після операції з приводу панкреонекрозу, перитоніту з'явилося підвищення температури тіла до 39°C, анемія, лейкоцитоз, гіпопротеїнемія, спленомегалія, токсична енцефалопатія. Яке ускладнення має розвиток у цій ситуації?
Правильна відповідь	Загальна гнійна інфекція (сепсис)
В	Гостра ниркова недостатність
С	Гостра печінкова недостатність
Д	Внутрішньоочеревинна кровотеча
Е	Гострий менінгіт
№	крок 2020
Тема	Гнійні захворювання шкіри та м'яких тканин.

Текст завдання	У породіллі через 3 тижні після по-логів підвищилася температура тіла до 38°C, з'явилися остуда, слабкість та біль в лівій молочній залозі. Молочна залоза збільшена, нагубла, болюча при паль-пації; розм'якшення та флуктуації в ді-лянці інфільтрату немає. В крові - помір-ний лейкоцитоз. Який найбільш імовір-ний діагноз?
Правильна відповідь	Серозний мастит
В	Лактостаз
С	Мастопатія
Д	Інтензивний мастит
Е	Абсцедивний мастит
№	крок 2020
Тема	Травми.
Текст завдання	Чоловіка 42-х років, шахтаря, че-рез 12 годин звільнено з-під завалу. Об'є-ктивно: обидві гомілки і ступні блідого кольору. Пульсації периферійних судин немає. Чутливість та пасивні рухи в су-глобах відсутні. Доставлений із джгутами на обох кінцівках. Які невідкладні заходи першої лікарської допомоги необхідно провести для запобігання міоглобінурії та гострої ниркової недостатності?
Правильна відповідь	Джгут не знімати, ампутація кінцівок вище джгута
В	Зняти джгут, дезінтоксикаційна тера-пія
С	Джгут не знімати, дезінтоксикаційна терапія
Д	Зняти джгут, гіпербарична оксигенація
Е	Джгут не знімати, гіпербарична окси-генація.
№	крок 2021
Тема	Захворювання щитоподібної залози



Текст завдання	Чоловік 45 років звернувся до лікаря зі скаргами на дратівливість, підвищену втомленість, схуднення, серцебиття, перебої в роботі серця. Під час пальпації лівої долі щитоподібної залози пальпується утворення щільно-еластичної консистенції, безболісне, яке під час ковтання зміщується разом із щитоподібною залозою. Позитивні очні симптоми, екзофтальм, порушення конвергенції. Артеріальний тиск - 135/80 мм рт. ст., пульс - 110/хв. Під час ультразвукового дослідження щитоподібної залози у лівій долі візуалізується гіперехогенне округле утворення розмірами 2х3 см, з чіткими контурами, однорідної структури. Який висновок лікаря після проведеного обстеження буде найбільш коректним?
Правильна відповідь	Вузол щитоподібної залози
В	Дифузно-токсичний зоб
С	Рак щитоподібної залози
Д	Кіста щитоподібної залози
Е	Гострий тиреоїдит
№	крок 2021
Тема	Онкологічні захворювання
Текст завдання	Мати хлопчика 3 років під час купання дитини виявила пухлиноподібний утвір у животі. Під час обстеження визначається щільний, неболючий, із рівною поверхнею, малорухомий пухлиноподібний утвір великих розмірів, розташований під лівою реберною дугою. Температура тіла - 37,5°C, ЧСС - 110/хв., АТ - 150/90 мм рт. ст. У загальному аналізі крові виявлено: еритроцити - $3,2 \cdot 10^{12}/л$ , НЬ - 90 г/л, лейкоцити - $10,4 \cdot 10^9/л$ , ШОЕ - 35 мм/год. У загальному аналізі сечі виявлено: еритроцити на все поле зору. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?
Правильна відповідь	Пухлина Вільямса
В	Вроджений гідронефроз

С	Крижово-куприкова тератома
D	Гострий пієлонефрит
E	Карбункул нирки
№	крок 2021
Тема	Захворювання кишківника
Текст завдання	У хлопця 18 років скарги на переймоподібний біль у животі, рідкі випорожнення до 6 разів на добу з домішками слизу та свіжої крові. Хворіє впродовж року. Схуд на 10 кг. Об'єктивно встановлено: живіт м'який, болючий по ходу товстої кишки, особливо зліва. Сигмовидна кишка спазмована. У крові виявлено: еритроцити - $3,2 \cdot 10^{12}/л$ , НЬ - 92 г/л, лейкоцити - $10,6 \cdot 10^9/л$ , ШОЕ - 34 мм/год. Іригоскопія показала: товста кишка звужена, гаустри відсутні, контури нечіткі, симптом «водопровідної труби». Який найбільш ймовірний діагноз?
Правильна відповідь	Неспецифічний виразковий коліт
B	Амебна дизентерія
С	Хронічний ентероколіт
D	Туберкульоз кишечника
E	Хвороба Крона
№	крок 2021
Тема	Гнійні захворювання кисті
Текст завдання	Жінка 45 років звернулась до лікарні за 12 діб після початку захворювання зі скаргами на біль та припухлість I пальця лівої кисті. Під час обстеження виявлено підвищення температури тіла до 38,9°C. Нігтьова фаланга I пальця кол-боподібно потовщена, синьо-багряного кольору. Під нігтьовою пластинкою та місцями під епідермісом видно гній. Під час пальпації відчуває різкий біль. На Ro-грамі пальця видні деструктивні зміни в кістці нігтьової фаланги. Який вид панарицію у хворої?
Правильна відповідь	Кістковий

В	Підшкіряний
С	Шкіряний
Д	Сухожилльний
Е	Суглобовий
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів черевної порожнини
Текст завдання	У породіллі 29 років на 3 добу після операції кесарського розтину з'явилась блювота, сильний біль внизу живота, по-тім по всьому животу, затримка стула та газів. Загальний стан важкий. Шкіряні покрови бліді, губи та язик сухі. Температура тіла - 39,4°C. Живіт вздутий, симптоми подразнення очеревини позитивні у всіх відділах. Перистальтика кишківника послаблена. Діурез знижений. Матка велика, болюча під час пальпації, з неприємним запахом виділень із піхви. Про яку патологію можна думати?
Правильна відповідь	Розповсюджений перитоніт
В	Панметрит
С	Метроендометрит
Д	Інфекція післяопераційної рани
Е	Пельвіоперитоніт
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів грудної клітки
Текст завдання	Чоловік 42 років госпіталізований до клініки з діагнозом: бронхоектатична хвороба, загострення. На рентген знімках броихоектази локалізовані в межах окремих сегментів однієї долі. Яка подальша тактика лікування?
Правильна відповідь	Хірургічне лікування
В	Консервативне лікування
С	Антибактеріальна терапія

D	Дихальна гімнастика
E	Диспансерне спостереження
№	крок 2021
Тема	Травма
Текст завдання	До опікового відділення доставлено потерпілого чоловіка 28 років зі циркулярними опіками тулуба та нижніх кінцівок. Визначте розмір опікової поверхні у потерпілого:
Правильна відповідь	72%
B	36%
C	30%
D	45%
E	20%
№	крок 2021
Тема	Хірургічна інфекція
Текст завдання	Жінка за 10 днів після травми ділянки стопи відчула утруднення під час відкриття рота. Наступного дня з важкістю могла приймати їжу, з'явилося напруження м'язів потилиці, спини, живота. Під час прийому в стаціонар на 3 день хвороби встановлено тонічне напруження всіх груп м'язів, генералізовані судоми кожні 10-15 хвилин. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Правець
B	Менінгітоенцефаліт
C	Тетанія
D	Геморагічний інсульт
E	Епілепсія
№	крок 2021
Тема	Хірургічні захворювання судин

Текст завдання	Чоловік 30 років скаржиться на біль у гомілках обох ніг, який посилюється під час ходьби. Хворий змушений зупинятися через 150-200 м. Переміжна кульгавість з'явилась рік тому, відстань між зупинками скоротилася. Обидві ступні бліді, прохолодні. Пульс на тильних артеріях ступнів відсутній. Шкіра суха, на підошвах гіперкератоз, нігті потовщені, легко ламаються, матового кольору. На гомілках - ділянки облісіння. Яка стадія облітеруючого ендартеріїту у цього пацієнта?
Правильна відповідь	II стадія - стадія субкомпенсації
B	IV стадія - стадія деструктивних змін
C	I стадія - стадія функціональної компенсації
D	
E	III стадія - стадія декомпенсації
№	крок 2021
Тема	Травма
Текст завдання	Чоловіка 42 років, шахтаря, через 12 годин звільнено з-під завалу. Об'єктивно встановлено: обидві гомілки і ступні блідого кольору. Пульсації периферійних судин немає. Чутливість та пасиви рухи в суглобах відсутні. Доставлений із джгутами на обох кінцівках. Які невідкладні заходи першої лікарської допомоги необхідно провести для запобігання міоглобінурії та гострої ниркової недостатності?
Правильна відповідь	Джгут не знімати, ампутація кінцівок вище джгута
B	Джгут не знімати, дезінтоксикаційна терапія
C	Зняти джгут, гіпербарична оксигенація
D	Зняти джгут, дезінтоксикаційна терапія
E	Джгут не знімати, гіпербарична оксигенація
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів черевної порожнини

Текст завдання	У чоловіка 52 років, який страждає на постхолецистектомічний синдром, під час ретроградної холецистопанкреатографії виявлено стеноз сфінктера Одді з помірною дилатацією загального жовчного протока і рефлюксом контрасти у Вірсунгів проток. Конкрементів у протоках немає. Діагноз хронічного панкреатита безсумнівний. Яка операція адекватна для корекції цієї патології?
Правильна відповідь	Ендоскопічна папілосфінктеротомія
В	Трансдуоденальна папілосфінктеропластика
С	Продольна панкреатикоєюностомія
Д	Холедохо-дуоденостомія
Е	Холецисто-єюностомія
№	крок 2021
Тема	Захворювання молочної залози
Текст завдання	Пацієнтка 35 років скаржиться на сукровичні виділення з соска лівої молочної залози. Під час огляду, пальпації патології не виявлено. Для якого доброякісного захворювання є характерним цей симптом?
Правильна відповідь	Внутрішньопротокова папілома
В	Інфільтративний мастит
С	Масталгія
Д	Кіста молочної залози
Е	Фібroadенома молочної залози
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів черевної порожнини
Текст завдання	Під час операції у жінки 67 років із приводу гострого деструктивного холециститу визначена наявність гнійного холангіта. Під час ревізії холедоха не знайдені конкременти та ознаки стенозу дуоденального соска. Виконано холециектомію. Як слід закінчити операцію?

Правильна відповідь	Виконати зовнішнє дренування холедоха
B	Виконати холедохоеюностомію
C	Накласти супрадуоденальний холедо- ходоуденоанастомоз
D	Накласти гепатікоєюностомію
E	Виконати трансдуоденальну холедохо- дуоденостомію
№	крок 2021
Тема	Захворювання судин
Текст завдання	Чоловік 45 років скаржиться на біль у внутрішній поверхні гомілки і стегна справа. Хворіє протягом 5 днів, коли після фізичного навантаження з'явився біль у гомілці, який поступово поширився на стегно. Об'єктивно встановлено: у проекції великої підшкірної вени на гомілці та стегні спостерігається гіперемія шкіри і припухлість. При пальпації виявлено: ущільнення та болючість. набряки правої нижньої кінцівки відсутні, пульсація артерій на стопах визначається. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?
Правильна відповідь	Висхідний тромбофлебіт
B	Спонтанний розрив великої підшкірної вени
C	Гострий тромбоз підколінної та стегнової артерій
D	Гострий тромбоз підколінної та стегнових вен
E	Гострий лімфангіт
№	крок 2021
Тема	Захворювання судин
Текст завдання	Чоловік 54 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на утруднення дихання, слабкість. Останні два тижні турбував біль та набряк правої нижньої кінцівки. Ці симптоми відчуває вперше в житті, раніше на обліку у лікаря не перебував. АТ - 110/70 мм рт. ст., ЧСС - 96/хв. Який діагностичний метод має вирішальне значення?

Правильна відповідь	Мультиспіральна КТ ангіографія
B	Рентгенографія органів грудної клітки
C	Ехокардіографія
D	Функція зовнішнього дихання
E	Електрокардіографія
№	крок 2021
Тема	Захворювання молочної залози
Текст завдання	У породіллі на 12-ту добу післяпологового періоду раптово підвищилася температура тіла до 38,2°C. Спостерігається загальна слабкість, біль в ділянці правої молочної залози протягом 1 доби. Під час огляду встановлено: молочна залоза напружена, гаряча, у правому верхньому квадранті пальпується інфільтрат, болючий, щільної консистенції. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Лактаційний мастит
B	Аномалії розвитку молочних залоз
C	Пухлина молочної залози
D	Мастопатія
E	Лактостаз
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів грудної клітки
Текст завдання	У жінки 32 років за 6 годин після фіброфагогастроскопії підвищилася температура тіла до 39°C, болі за грудиною, сухість у роті, нагірстає задишка. Під час обстеження виявлено позитивний симптом Романова-Кірке та підшкірну емфізему в надключичному просторі зліва. Який попередній діагноз?



Правильна відповідь	Гострий медіастиніт
B	Гострий абсцес легені
C	Емпієма плеври
D	Піопневмоторакс
E	Пневмонія
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів грудної клітки
Текст завдання	Чоловік 38 років захворів 2 тижні тому, з'явився кашель, слабкість, підвищилася температура до 38,0°C. Стан різко погіршився до кінця 1-го тижня, коли з'явилися остуда, проливний піт, надвечір температура підвищилася до 39,0°C. За 2 дні до госпіталізації у хворого під час кашлю виділилася велика кількість смердючого харкотиння з кров'ю, після чого стан пацієнта поліпшився. Пульс - 80/хв., частота дихання - 20/хв., температура тіла - 37,6°C. Які зміни можливі на рентгенограмі грудної порожнини?
Правильна відповідь	Наявність порожнини з горизонтальним рівнем рідини
B	Однорідна округла тінь у легеневому полі
C	Тінь у нижньому відділі з косою верхньою межею
D	Затемнення частки легені
E	Зміщення середостіння в бік гомогенної тіні
№	крок 2021
Тема	Захворювання молочної залози
Текст завдання	Пацієнтці 37 років, після збору анамнезу та огляду виставлено діагноз: дифузна форма мастопатії обох молочних залоз. Який інструментальний метод дослідження найбільш інформативний у цьому разі?

Правильна відповідь	Мамографія
B	УЗД молочних залоз
C	Дуктографія
D	Пневмокістографія
E	Біопсія молочної залози
№	крок 2021
Тема	Хірургічна інфекція
Текст завдання	Чоловік 35 років надійшов до клініки з явищами хірургічного сепсису, джерелом якого, ймовірно, був великий карбункул лопаткової області. Під час обстеження виявлені вторинні гнійні вогнища в печінці та правій легені. Назвіть фазу хірургічного сепсису:
Правильна відповідь	Септикопемія
B	Септицемія
C	Гнійно-резорбтивна лихоманка
D	Токсемія
E	Термінальна
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів грудної клітки
Текст завдання	До лікаря звернувся чоловік 36 років зі скаргами на пекучий за грудинний біль, що зазвичай виникає за 1-1,5 години після вживання їжі. Зазначає, що біль підсилюється в горизонтальному положенні. Під час ЕГДС виявлено 2 вогнищевих ураження нижньої третини слизової оболонки стравоходу до 5 мм у межах однієї складки. Яка тактика лікаря буде найбільш доречною?
Правильна відповідь	Призначення інгібіторів протонної помпи
B	Хірургічне лікування
C	Призначення кларитроміцину

D	-
E	Призначення ненаркотичних анальгетиків
№	крок 2021
Тема	Травма
Текст завдання	Чоловік 25 років надійшов через 2 години після дорожньо-транспортної аварії зі скаргами на постійний інтенсивний біль у правій паховій ділянці та у симфізі тазу, неможливість самостійно пересуватися. Під час огляду встановлено: положення хворого вимушене - поза «жаби» (позитивний симптом Волковича). Садна й синці на шкірі в проекції симфізу та горизонтальної гіл-ки лобкової кістки праворуч, виражений набряк м'яких тканин. Позитивний симптом «прилиплої п'яти» праворуч. Поставте попередній діагноз:
Правильна відповідь	Закритий перелом лобкової кістки праворуч
B	Травматична аневризма стегнової артерії
C	Травматична пахвинна грижа
D	Вивих правого стегна
E	Забій кісток тазу
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів грудної клітки
Текст завдання	У післяопераційного хворого, якому 6 днів тому проведено видалення нижньої частки лівої легені через бактеріальну деструкцію і розвиток пневмотораксу, наросла задишка до 48/хв., PaO2 знизився до 50 мм рт. ст., PaCO2 підвищився до 65 мм рт. ст., з'явився кашель, виділення великої кількості харкотиння, загальний ціаноз шкіри, гіпотонія - 60/20 мм рт. ст. Під час аускультатії правої і лівої легень прослуховується велика кількість різнокаліберних хрипів, різко ослаблене дихання. Яку невідкладну допомогу потрібно надати хворому, щоб ліквідувати дихальну недостатність?

Правильна відповідь	Провести лаваж трахеобронхіального дерева
B	Пункція плевральної порожнини
C	Гіпербарична оксигенація через маску з резервуаром
D	Положення ортопное
E	Провести інтубацію трахеї з ШВЛ
№	крок 2021
Тема	Травма
Текст завдання	Чоловік госпіталізований після тупої травми грудної клітки. АТ - 100/60 мм рт. ст., пульс - 98/хв. На рентгенограмі виявлено: ОГК без особливостей. Ехокардіографія встановила: вільна рідина в порожнині перикарду в кількості 100 мл. Через годину спостерігається зниження АТ до 85/50 мм рт. ст., набухання шийних вен, пульс - 106/хв., тони серця різко ослаблені. Які найперші заходи слід вжити?
Правильна відповідь	Пункція перикарду
B	Ввести діуретики в/в
C	В/в введення серцевих глікозидів
D	Антибіотикотерапія
E	Інфузія симпатоміметиків
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів черевної порожнини

Текст завдання	Чоловік 36 років скаржиться на постійний тупий біль у лівому підребер'ї після прийому жирної та копченої їжі блювоту, яка не приносить полегшення. Калові маси блискучі, з неприємним запахом. Хворіє протягом 8 років; зловживає алкоголем, багато курить. Об'єктивно встановлено: астеничної тілобудови шкіра бліда і суха, язик з білим налітом живіт помірно здутий. Під час пальпації - біль у зонах Шоффара, Іубергриця, Сеульського, точках Дежардена, Мейо- Робсона. Про яке захворювання можна подумати насамперед?
Правильна відповідь	Хронічний панкреатит у стадії загострення
В	Хронічний гастродуоденіт у стадії загострення
С	Хронічний холецистит у стадії загострення
Д	Рак голівки підшлункової залози
Е	Виразкова хвороба у стадії загострення
№	крок 2021
Тема	Захворювання щитоподібної залози
Текст завдання	Дівчина 23 років звернулася до клініки зі скаргами на серцебиття, пітливість, слабкість, зниження працездатності, тремтіння пальців рук. Протягом місяця схудла на 10 кг. Під час огляду встановлено: частота серцевих скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 130/70 мм рт. ст. Під час ультразвукового дослідження (УЗД) в щитоподібній залозі виявлено вузол 2х2 см. Під час сканування в місці вузла виявлено ділянку підвищеного накопичення радіофармпрепарату. Решта тканин щитоподібної залози РФП не накопичує. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Токсична аденома щитоподібної залози
В	Змішаний токсичний зоб
С	Тиреотропінома
Д	Підгострий тиреоїдит
Е	Аутоімунний тиреоїдит

№	крок 2021
Тема	Захворювання органів черевної порожнини
Текст завдання	Хворий 40-ка років скаржитися на біль в епігастральній ділянці натще, печію. При пальпації помірна болючість у пілородуоденальній зоні. Який метод діагностики буде найінформативнішим?
Правильна відповідь	Фіброезофагогастродуоденоскопія
В	Рентгеноскопія шлунка та 12-палої кишки
С	Внутрішньошлункова рН-метрія
Д	Дихальний уреазний тест
Е	УЗД черевної порожнини
№	крок 2021
Тема	Хірургічна інфекція
Текст завдання	У дитини 9-ти років з'явився біль у верхній третині правої гомілки, підвищилась температура тіла до 39°C. Дитина не може стати на праву ногу. З анамнезу відомо, що дитина мала травму гомілки та перенесла ангіну. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Гострий гематогенний остеомієліт
В	Туберкульозний артрит
С	Перелом кісток правої гомілки
Д	Злоякісна пухлина кістки
Е	Гострий ревматизм
№	крок 2021
Тема	Захворювання щитоподібної залози
Текст завдання	Хвора 35-ти років скаржитися на перебої в роботі серця, зниження ваги, біль передньої поверхні шиї, що почалися після ГРВІ. Пульс - 110/хв., АТ- 130/60 мм рт.ст. Щитоподібна залоза незначно збільшена, болюча при пальпації. ШОЕ- 40 мм/год. ТТГ- 0,05 мОд/л, вТ4 - 34,3 пмоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	Підгострий тиреоїдит
B	Гострий тиреоїдит
C	Пароксизмальна тахікардія
D	Тиреоїдит Хашимото
E	Дифузний токсичний зоб
№	крок 2021
Тема	Онкологічні захворювання
Текст завдання	Хвора 72-х років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність новоутворення на шкірі правої щоки, яке виявила самостійно близько 6 місяців тому. Об'єктивно: на шкірі правої щоки виразка неправильної форми з підритими краями та нечіткими контурами діаметром 1,5x2,0 см, багряно-червоного кольору, контактено кровить. Встановлено діагноз: підозра на рак шкіри правої щоки. Який метод верифікації діагнозу найбільш доцільний у даному випадку?
Правильна відповідь	Зішкріб пухлини
B	Пункційна тонкоголова аспіраційна біопсія
C	Мазок-відбиток
D	Трепан-біопсія
E	Інцизійна біопсія
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів грудної клітки
Текст завдання	Чоловік 56-ти років хворіє на ХОЗЛ упродовж 20-ти років. На висоті значного фізичного навантаження відчув зненацька різку змішану задишку, біль у грудній клітці справа, серцебиття. Об'єктивно: стан важкий, АТ- 100/70 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., ЧД- 28/хв., права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно: коробковий звук над пра-вою легенею, аускультативно дихання різко ослаблене. Який невідкладний стан у хворого?

Правильна відповідь	Спонтанний пневмоторакс
B	Інфаркт міокарда
C	Напад бронхіальної астми
D	Негоспітальна пневмонія
E	Тромбоемболія легеневої артерії?
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів грудної клітки
Текст завдання	У хворого 46-ти років після перенесеної пневмонії скарги на біль в лівій половині грудної клітки, підвищення температури тіла до 39°C, непродуктивний кашель, загальну слабкість. Хворіє два тижні. При аускультатії в нижніх відділах зліва дихання не вислуховується, при перкусії - притуплення легеневого звуку. Який додатковий інструментальний метод дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Комп'ютерна томографія
B	Спірографія
C	Бронхографія
D	Бронхоскопія
E	Медіастиноскопія
№	крок 2021
Тема	Захворювання щитоподібної залози
Текст завдання	У хворої 31-го року після проведеної субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу токсичного зоба виникли серцебиття, пітливість, психомоторне збудження. Пацієнтка знепритомніла. Об'єктивно: температура тіла - 39,7°C, частота дихання - 38/хв.; ЧСС- 135/хв., миготлива аритмія. АТ- 190/80 мм рт.ст. Імовірно ускладнення:
Правильна відповідь	Тиреотоксичний криз



В	Гіпертонічний криз
С	Рецидив дифузного токсичного зоба
Д	Істеричний напад
Е	Бактеріальний шок
№	крок 2021
Тема	Захворювання судин
Текст завдання	Вам довелося прийти на допомогу жінці 58-ми років, у якої виникла рясна кровотеча з розірваного варикозно розширеного венозного вузла на лівій гомілці. У чому полягає перша допомога?
Правильна відповідь	Підвищене положення кінцівки. Стискальна стерильна пов'язка
В	Накладання джгута дистально до джерела кровотечі
С	Накладання джгута проксимально до джерела кровотечі
Д	Z-подібний шов на розірваний варикозний вузол
Е	Операція Троянова-Тренделенбурга
№	крок 2021
Тема	Захворювання щитоподібної залози
Текст завдання	Жінка 46-ти років знайшла при пальпації вузол в ділянці щитоподібної залози розміром 2-3 см, який зміщується при ковтанні, з чіткими межами. При скануванні визначається "холодний вузол" у правій частці щитоподібної залози. Лімфовузли шиї не збільшені. При пункції отримано клітини проліферуючого епітелію. Яка лікувальна тактика?
Правильна відповідь	Правобічна гемітиреоїдектомія з терміновим гістологічним дослідженням
В	Променева лікування
С	Спостереження
Д	Тиреоїдектомія з висіченням клітковини шиї за Крайлем
Е	Геміструмектомія

№	крок 2021
Тема	Хірургічна інфекція
Текст завдання	У хворого 47-ми років на восьмий день після операції з приводу панкреонекрозу, перитоніту з'явилося підвищення температури тіла до 390С, анемія, лейкоцитоз, гіпопротеїнемія, спленомегалія, токсична енцефалопатія. Яке ускладнення має розвиток у цій ситуації?
Правильна відповідь	Загальна гнійна інфекція (сепсис)
В	Гостра печінкова недостатність
С	Гостра ниркова недостатність
Д	Гострий менінгіт
Е	Внутрішньоочеревинна кровотеча
№	крок 2021
Тема	Захворювання молочної залози
Текст завдання	У породіллі через 3 тижні після пологів підвищилася температура тіла до 38°С, з'явилися остуда, слабкість та біль в лівій молочній залозі. Молочна залоза збільшена, нагрубла, болюча при пальпації; розм'якшення та флуктуації в ділянці інфільтрату немає. В крові - помірний лейкоцитоз. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Серозний мастит
В	Абсцедивний мастит
С	Гангренозний мастит
Д	Лактостаз
Е	Мастопатія
№	крок 2021
Тема	Травма

Текст завдання	Хворий 47-ми років госпіталізований в клініку в тяжкому стані із скаргами на біль у черевній порожнині, слабкість, запаморочення. Одну годину назад отримав сильний удар в ліву половину живота, свідомість не втрачав. При огляді - блідість шкіри та слизових оболонок. Пульс - 120/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. Живіт при пальпації напружений, болючий зліва від пупка. Симптом Щьоткіна- Блюмберга позитивний. Сеча без змін. Загальний аналіз крові: еритроцити - $2,8 \cdot 10^{12}/л$ , НЬ- 90 г/л. Яке пошкодження можна припустити в першу чергу?
Правильна відповідь	Розрив селезінки. Внутрішня кровоте-ча
В	Пошкодження нирки
С	Розрив товстої кишки. Каловий перитоніт
D	Закрита травма черевної порожнини без пошкодження внутрішніх органів
Е	Субкапсулярний розрив селезінки
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів черевної порожнини
Текст завдання	Жінка 45-ти років скаржиться на колькоподібний біль у правому підребер'ї, що виникає після вживання жирної їжі, фізичного навантаження, іррадіює в праву лопатку та праве плече, зменшується при прийомі спазмолітиків. Хворіє впродовж року, періодично зазначає пожовтіння склер під час нападів болю. Який метод обстеження слід призначити в першу чергу для встановлення діагнозу?
Правильна відповідь	Ультрасонографію
В	Комп'ютерну томографію
С	Дуоденальне зондування
D	Рентгенографію органів черевної порожнини
Е	Фіброгастродуоденоскопію
№	крок 2021
Тема	Захворювання прямої кишки

Текст завдання	Пацієнт скаржиться на виражений біль в анальному каналі та періанальній ділянці. При огляді періанальної ділянки на 3, 7 і 11 годин умовного циферблата виявляються пухлиноподібні утворення, всередині яких визначаються тромби; по-мірно виражена періанальна гіперемія. Ваш попередній діагноз:
Правильна відповідь	Гострий геморой
В	Хронічна анальна тріщина
С	Гострий парапроктит
Д	Хронічний геморой
Е	Випадання прямої кишки
№	крок 2021
Тема	Захворювання органів черевної порожнини
Текст завдання	Хворий 48-ми років госпіталізований з нападами судом. Багато років страждає на виразку 12-палої кишки (ДПК). Протягом останнього місяця спостерігає щоденне блювання, схуд на 20 кг. Об'єктивно: хворий виснажений. В епігастральній ділянці визначається "щум плеску". Нижня межа шлунка на рівні гребінцевої лінії. Лабораторно: загальний білок - 47 г/л; К - 2,1 ммоль/л, Na -118 ммоль/л, Са -1,6 ммоль/л, хлориди - 82 ммоль/л, гематокрит - 64%. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Декомпенсований стеноз воротаря
В	Субкомпенсований стеноз воротаря
С	Компенсований стеноз воротаря
Д	Малігнізована виразка шлунка
Е	Кровоточива виразка 12-палої кишки
№	крок 2021
Тема	Захворювання судин

Текст завдання	Хворий 75-ти років перебуває на консервативному лікуванні у відділенні судинної неврології з приводу ТІА. Згідно з останніми даними кольорового дуплексного сканування у пацієнта наявний стеноз лівої внутрішньої сонної артерії гомогенною атеросклеротичною бляшкою більше 70%. Судинний хірург рекомендував пацієнту проведення оперативного втручання. Про яке оперативне втручання йде мова?
Правильна відповідь	Ендартеректомія з лівої внутрішньої сонної артерії
В	Перев'язка лівої внутрішньої сонної артерії
С	Тромбектомія з лівої внутрішньої сонної артерії
Д	Підключично-зовнішньосонне шунтування зліва
Е	Магістралізація лівої зовнішньої сонної артерії
№	крок 2021
Тема	Травма
Текст завдання	Хворий 41-го року доставлений в торакальне відділення з ножовим пораненням грудної клітки зліва. При огляді: загальний стан вкрай важкий. Шкіра та видимі слизові синюшні. Дихання важке, уривчасте, ЧД- 32/хв. При перкусії грудної клітки межі серця розширені. Пульс - 120/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст. Яка тактика ведення хворого?
Правильна відповідь	Невідкладна торакотомія
В	Рентгенографія ОГК
С	Торакоскопія
Д	Плевральна пункція
Е	Торакоцентез
№	крок 2021
Тема	Хірургічна інфекція

Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність декількох щільних, болючих вузлів у правій пахвовій ділянці, підвищення температури тіла до 38°C, загальну слабкість. Хворіє 3 доби. Локально: в правій пахвовій області є три вузлоподібних утворення, які підвищуються над поверхнею шкіри, розмірами від 0,5 см до 1,5 см в діаметрі, різко болючі при пальпації, з чіткими контурами, шкіра над ними багрово-синюшного відтінку, підняття верхньої кінцівки обмежене через біль. Поставьте діагноз:
Правильна відповідь	Гнійний гідраденіт
B	Гнійний лімфаденіт
C	Карбункул
D	Фурункул
E	Абсцес
№	крок 2021
Тема	Хірургічна інфекція
Текст завдання	Хвора 25-ти років скаржиться на наявність декількох щільних, болючих вузлів у правій пахвовій ділянці, підвищення температури тіла до 38°C, загальну слабкість. Хворіє 3 доби. Локально: в правій пахвовій області є три вузлоподібних утворення, які підвищуються над поверхнею шкіри, розмірами від 0,5 см до 1,5 см в діаметрі, різко болючі при пальпації, з чіткими контурами, шкіра над ними багрово-синюшного відтінку, підняття верхньої кінцівки обмежене через біль. Поставьте діагноз:
Правильна відповідь	Гнійний гідраденіт
B	Гнійний лімфаденіт
C	Карбункул
D	Фурункул
E	Абсцес