



ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТР ЯКОСТІ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ID здобувача / Student ID							
4	0	7	1	1	2	7	3

Прізвище / Surname							
І	С	М	А	І	Л	О	В

Варіант / Variant 40

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО
ІСПИТУ

КРОК 3

Спеціальність
«ОФТАЛЬМОЛОГІЯ»

1. У пацієнта віком 53 роки на профілактичному огляді виявлено підвищення внутрішньоочного тиску на правому оці до 30 мм рт. ст. Укажіть структуру ока, яка забезпечує продукцію внутрішньоочної рідини.

- A. Рогівка
- B. Циліарне тіло ✓
- C. Кришталік
- D. Райдужка
- E. Склоподібне тіло

2. Чоловік віком 53 роки скаржиться на погіршення гостроти зору на обох очах, появу мушок і туману перед очима. З анамнезу відомо, що в пацієнта початкова катаракта обох очей. Який метод дослідження дозволить підтвердити цей діагноз?

- A. Кампіметрія
- B. Біомікроскопія
- C. Гоніоскопія
- D. Офтальмоскопія
- E. Оптична когерентна томографія

3. Через 48 год після операції з видалення катаракти пацієнт скаржиться на біль в очах і втрату зору. Під час огляду виявлено: змішана ін'єкція, набряк рогівки та відсутній рефлекс із очного дна. Яке ускладнення варто насамперед запідозрити?

- A. Бактеріальний ендoftальміт
- B. Передній увеїт
- C. Вторинну глаукому
- D. Відшарування сітківки
- E. Крововилив у передню камеру

4. До дитячої лікарки-офтальмологині звернувся хлопець віком 16 років зі скаргами на зниження гостроти зору. Із анамнезу відомо, що зниження гостроти зору у нього спостерігається з раннього дитинства, призначались окуляри, які він один час носив із оклюдером для правого ока, але з 5-го класу взагалі перестав їх носити. Об'єктивно спостерігається: гострота зору правого ока — 0,2 зі сферою $-8,5 D = 0,3$, гострота зору лівого ока — 0,6 зі сферою $-2,75 D = 1,0$; оптичні середовища обох очей прозорі, на очному дні міопічний конус у темпоральному відділі на правому оці. Укажіть причину зниження гостроти зору правого ока.

- A. Міопія високого ступеня
- B. Рефракційна амбліопія
- C. Вроджена глаукома
- D. Вроджена катаракта
- E. Астенопія

5. Після повного офтальмологічного обстеження трирічного хлопчика лікар-офтальмолог дитячий встановив діагноз: рефракційна акомодатійна езотропія. Укажіть необхідне лікування.

- A. Лікування не потребує
- B. Призначити окуляри для корекції міопії
- C. Хірургічне лікування езотропії
- D. Повна оптична корекція гіперметропії
- E. Призначити біфокальні окуляри

6. Пацієнт віком 56 років скаржиться на біль у лівому оці, світлобоязнь, слезотечу, почервоніння ока в медіальному куті впродовж 2-х тижнів. Гострота зору обох очей — 1,0. Під час огляду спостерігається: біля внутрішнього кута лівого ока інфільтрат у вигляді круглого утворення, яке підвищується над склерою. Під час пальпації ділянка інфільтрату болісна. Яке захворювання спостерігається в пацієнта?

- A. Кератит
- B. Епісклерит
- C. Склеромаляція
- D. Увеїт
- E. Склерит

7. Пацієнт віком 64 роки під час планового огляду лікарем-офтальмологом на другий день після факоемульсифікації катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи на лівому оці скаржиться на затуманення зору та незначний біль в оці. Об'єктивно спостерігається: набряк рогівки від лімба до лімба, помутніння вологи передньої камери, ниця розширена, раптове підвищення внутрішньоочного тиску до 32 мм рт. ст., склоподібне тіло прозоре. Відомо, що для обробки та стерилізації офтальмологічних інструментів використовували миючі засоби на основі ензимів. Яке післяопераційне ускладнення виникло в пацієнта?

- A. Гострий набряк рогівки
- B. Токсичний синдром переднього сегмента ока
- C. Внутрішньоочна гіпертензія
- D. Ендoftальміт
- E. Передній увеїт

8. Жінка віком 54 роки звернулася зі